UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y GENÓMICA DE PLANTAS

FUNCIÓN DE LOS FACTORES C/S1 BZIP EN LAS REDES
REGULADORAS DE LA RESPUESTA A ESTRÉS ABIÓTICO
EN Arabidopsis thaliana

TESIS DOCTORAL

DENNYS MARCELA GÓMEZ PÁEZ

Bióloga, Licenciada en Biología

Madrid, 2018

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)
DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y GENÓMICA DE PLANTAS, CBGP (UPM-INIA)
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

FUNCIÓN DE LOS FACTORES C/S1 BZIP EN LAS REDES REGULADORAS
DE LA RESPUESTA A ESTRÉS ABIÓTICO EN *Arabidopsis thaliana*

Memoria presentada por Dennys Marcela Gómez Páez
para optar al grado de Doctor en el programa de doctorado
“Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos Asociados”
Departamento de Biotecnología (UPM)

Trabajo realizado en el CBGP (grupo consolidado “Redes Reguladoras en la
Semilla: Integración del Desarrollo, Metabolismo y Condiciones
Medioambientales”), bajo la dirección del Profesor Jesús Vicente-Carbajosa
y el Dr. Joaquín Medina Alcázar

Madrid, Julio 2018

VºBº LOS DIRECTORES

LA DOCTORANDA

Prof. Jesús Vicente-Carbajosa Dr. Joaquín Medina Alcázar Dennys Marcela Gómez Páez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid el día de de 2018

Presidente:

Secretario/a:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Suplente:

Suplente:

Realizada la defensa y lectura de Tesis el día de de 2018 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

A Melissa Moreno

RECONOCIMIENTOS

Este trabajo se ha llevado a cabo en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), adscrito al Departamento de Biotecnología - Biología Vegetal de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), dentro del marco de dos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en los cuales participaron miembros de distintos grupos, incluido el liderado por el Prof. Jesús Vicente-Carbajosa. El primero de ellos fue el *MERIT (Metabolic Reprogramming by Induction of Transcription)*, que corresponde a un proyecto *Marie Curie Initial Training Network*, financiado por la Unión Europea, con acuerdo de subvención número 264474, y el otro fue el proyecto *TRANSPLANTA*; Función y potencial biotecnológico de factores de transcripción en plantas, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, bajo el programa CONSOLIDER-INGENIO 2010.

Inicialmente, quisiera agradecer a mis directores de tesis, el Prof. Jesús Vicente-Carbajosa, por darme la oportunidad de formar parte de su grupo de investigación, así como al Dr. Joaquín Medina Alcázar, quienes me han orientado en el transcurso de esta investigación y me han transmitido conocimientos teórico-prácticos, requeridos para la realización de esta tesis.

También quisiera reconocer el papel del Dr. Jan Zouhar en la revisión de documentos y presentaciones en inglés para la divulgación de resultados obtenidos en esta tesis, y en su orientación durante la obtención de las proteínas solubles de los bZIP C/S1, requeridas para el experimento de la unión de proteínas al ADN basado en micromatrices. Así mismo, quisiera reconocer la contribución de Mar González Ceballos en la obtención y reproducción de líneas homocigotas para la colección de materiales del proyecto de *TRANSPLANTA*, en la generación de algunas construcciones para el experimento de doble y triple híbrido de levaduras y en su orientación general en cuanto a las metodologías rutinarias que se realizan en el laboratorio del Prof. Vicente-Carbajosa.

Por otra parte, quisiera agradecer al Prof. Dr. Wolfgang Dröge-Laser de la Universidad de Würzburg (Alemania), por proporcionar las distintas líneas de pérdida de función de los bZIP (mutantes individuales: *bzip10*, *bzip25*, *bzip1* y *bzip53*; dobles: *bzip10-bzip25*, *bzip1-bzip53*, *bzip10-bzip53*; triple: *bzip10-bzip25-bzip53*; y cuádruple: *bzip10-bzip25-bzip1-*

bzip53) y las líneas *Pro_{AtbZIP10}:GUS*, *Pro_{AtbZIP25}:GUS*, *Pro_{AtbZIP1}:GUS*, *Pro_{AtbZIP53}:GUS* y *35S::bZIP25-GFP*, analizadas en este estudio. Al Prof. Luis Oñate por la cesión de la genoteca de levaduras y la explicación del procedimiento general de titulación y rastreo para realizar el experimento de doble híbrido de levaduras, y finalmente al Dr. José Manuel Franco Zorrilla de la Unidad de Genómica del CNB-CSIC, por llevar a cabo el procedimiento de la unión de proteínas al ADN basado en micromatrices, a partir de las proteínas solubles de los bZIP C/S1 fusionadas a la MBP enviadas al servicio de genómica del CNB-CSIC.

ÍNDICE

RESUMEN	i
SUMMARY	iii
ABREVIATURAS	v
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 El estrés abiótico en plantas: Conceptos y Generalidades.	2
1.1.1 Estrés hídrico: Efectos sobre el crecimiento y desarrollo.	4
1.1.2 Generalidades del estrés hídrico en plantas.....	6
1.1.2.1 Señalización y respuesta al estrés hídrico.....	8
1.1.2.2 Rutas de respuesta a la deshidratación en <i>Arabidopsis</i>	10
1.1.2.3 Estrés hídrico durante el desarrollo: La semilla.	14
1.1.3 Respuesta al estrés osmótico	16
1.1.4 Respuesta al estrés salino.....	18
1.1.5 Respuesta al estrés oxidativo	19
1.1.5.1 Estrés oxidativo como estrés secundario.....	19
1.1.5.2 Estrés oxidativo inducido por Cadmio.....	20
1.2 Regulación de la transcripción en plantas	22
1.2.1 Factores de transcripción	24
1.2.2 Familia de factores bZIP en plantas	27
1.2.2.1. La red de factores transcripcionales C/S1 de la familia bZIP	28
1.3. Nuevos métodos de estudio de la función génica.....	33
1.3.1 Aproximaciones basadas en tecnologías ómicas.....	33
1.3.1.1 Transcriptómica	36
1.3.1.2 Proteómica.....	37
1.3.1.3 Metabolómica.....	37
1.3.2. Predicción de la función génica mediante métodos bioinformáticos	38
1.3.2.1. Análisis <i>in silico</i>	38
1.3.2.2. Utilización de la teoría de redes en el análisis de datos ómicos.....	39
2. OBJETIVOS.....	44
3. MATERIALES Y MÉTODOS	47
3.1. Material biológico	48
3.1.1 Cepas bacterianas	48
3.1.2 Cepas de levaduras.....	48
3.1.3 Material Vegetal.....	48
3.2. Métodos de Cultivo	50
3.2.1 Cultivo de Bacterias	50
3.2.2 Cultivo de Levaduras.....	50
3.2.3 Cultivo de Plantas	51
3.3. Métodos de clonación y transformación	51
3.3.1 Clonación convencional	51
3.3.2 Clonación mediante el sistema <i>Gateway</i> ®	53
3.3.3 Verificación de clonajes	53

3.3.4 Transformación de células competentes (bacterias).....	54
3.3.5 Transformación de levaduras	54
3.4. Aislamiento y cuantificación de ácidos nucleicos	55
3.4.1 Aislamiento de ADN plasmídico.....	55
3.4.2 Aislamiento de ADN genómico	55
3.4.3 Aislamiento de ARN total.....	56
3.4.4. Cuantificación de ácidos nucleicos	57
3.5. Amplificación de ácidos nucleicos	57
3.5.1 PCR convencional	57
3.5.2 Síntesis de ADNc.....	58
3.5.3 Análisis de expresión mediante PCR cuantitativa a tiempo real qRT-PCR.....	58
3.6. Expresión y purificación de proteínas	60
3.7. Técnicas electroforéticas	61
3.7.1 Electroforesis en geles de agarosa	61
3.7.2 Electroforesis SDS-PAGE.....	61
3.8. Análisis histoquímico	62
3.8.1 Detección de actividad de la β -glucuronidasa en líneas transgénicas.....	62
3.9 Evaluación de la tolerancia al estrés abiótico	62
3.9.1 Ensayo de tolerancia a sequía (déficit de riego)	62
3.9.2 Ensayo de deshidratación	63
3.9.3 Ensayo de estrés osmótico	63
3.9.4 Ensayo de estrés oxidativo	64
3.10. Análisis de expresión génica	64
3.10.1 Análisis transcriptómicos mediante secuenciación masiva de ARN (<i>RNA-Seq</i>)	64
3.10.2 Análisis de la expresión de los bZIP C/S1 en respuesta a tratamientos de estrés abiótico	65
3.11. Análisis de dianas de unión al ADN de homo y heterodímeros de los factores bZIP C/S1	65
3.12. Ensayos de doble y triple híbrido de levaduras	66
3.12.1 Construcciones y condiciones de rastreo de factores candidatos.....	66
3.13. Ensayos de expresión transitoria en protoplastos	69
3.14. Análisis bioinformáticos.....	69
3.14.1 Construcción y representación de redes parenclíticas	70
3.15. Consideraciones estadísticas.....	71
4. RESULTADOS	72
4.1. PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES bZIP C/S1 EN LA RESPUESTA A ESTRÉS ABIÓTICO EN <i>Arabidopsis</i>	73
4.1.1. Estudios de expresión génica.....	74
4.1.1.1 Análisis <i>in silico</i> de la expresión de los factores <i>bZIP10</i> y <i>25</i> del grupo C, y <i>bZIP1</i> y <i>53</i> del grupo S1 durante el desarrollo y en respuesta a estrés abiótico.....	74
4.1.1.2 Análisis de expresión de los genes <i>bZIP10</i> , <i>bZIP25</i> , <i>bZIP1</i> y <i>bZIP53</i> en condiciones de estrés hídrico y osmótico en <i>Arabidopsis</i>	77
4.1.1.3 Localización tisular de la expresión de los genes <i>bZIP10</i> , <i>25</i> , <i>1</i> y <i>53</i> , en respuesta al estrés osmótico inducido por manitol.....	80
4.1.2. Análisis Funcional: Estudio fenotípico de plantas con ganancia y pérdida de función en los factores bZIP C/S1	82
4.1.2.1 La sobreexpresión de los genes <i>bZIP10</i> , <i>25</i> y <i>53</i> en <i>Arabidopsis</i> incrementa la tolerancia a la desecación	82

4.1.2.2	La sobre-expresión de <i>bZIP10</i> , 25 y 53 en <i>Arabidopsis</i> reduce la pérdida de agua por transpiración	85
4.1.2.3	Los mutantes de pérdida de función de <i>bZIP10</i> , 25, 1 y 53 muestran mayor sensibilidad a tratamientos que promueven estrés hídrico y osmótico en <i>Arabidopsis</i>	85
4.1.2.4	Las líneas de ganancia de función de <i>bZIP10</i> , 25, 1 y 53 son más tolerantes a tratamientos que promueven estrés oxidativo, mientras las líneas de pérdida de función son más sensibles que el control.....	88
4.1.3.	Caracterización molecular de los mecanismos de acción de los factores bZIP C/S1	90
4.1.3.1	Análisis transcriptómico mediante secuenciación masiva de ARN de mutantes <i>bzip10-bzip25</i> (C), <i>bzip1-bzip53</i> (S1) y <i>bzip10-bzip25-bzip1-bzip53</i> (C/S1), bajo condiciones de estrés osmótico...	91
4.1.3.2	Identificación y análisis de genes regulados por los factores <i>bZIP10</i> , <i>bZIP25</i> , <i>bZIP1</i> y <i>bZIP53</i> en condiciones de estrés osmótico.....	94
4.1.4	Identificación de las secuencias de unión al ADN de los factores <i>bZIP1</i> , 10, 25 y 53	97
4.1.5	Análisis de las redes reguladoras en las que participa el grupo C/S1 bZIP: Identificación de factores de transcripción que interaccionan con <i>bZIP25</i> , <i>bZIP53</i> y el heterodímero <i>bZIP53/bZIP25</i>	101
4.1.5.1	Identificación de las funciones asociadas a los factores que interaccionan específicamente con <i>bZIP25</i> , <i>bZIP53</i> y su heterodímero (<i>bZIP53/bZIP25</i>)	105
4.1.5.2	Relevancia funcional de los factores que interaccionan con el heterodímero <i>bZIP53/bZIP25</i> : Análisis de expresión transitoria en protoplastos de <i>Arabidopsis</i>	108
4.2.	IDENTIFICACIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA SEÑALIZACIÓN Y RESPUESTA AL ESTRÉS ABIÓTICO MEDIANTE EL MÉTODO DE REDES PARENCLÍTICAS	110
4.2.1	Redes <i>parenclíticas</i> : desarrollo de un nuevo método de representación de redes	111
4.2.2	Análisis de un grupo de datos sintéticos para comprobar la fiabilidad del método <i>parenclítico</i>	113
4.2.3	Análisis de datos biológicos usando el método de redes <i>parenclíticas</i> para evaluar la respuesta al estrés osmótico de <i>A. thaliana</i>	114
4.2.4	Comprobación experimental de las predicciones realizadas con el método <i>parenclítico</i> , de genes candidatos involucrados en la respuesta al estrés osmótico	116
4.2.5	Análisis de los resultados de la validación <i>in vivo</i> en el contexto de las redes predictivas obtenidas	118
4.2.6	El análisis de representación de redes <i>parenclíticas</i> permite predecir la participación de bZIPs de los grupos C/S1 en la respuesta a estrés osmótico en <i>Arabidopsis</i>	119
5.	DISCUSIÓN	121
5.1.	Los factores transcripcionales <i>bZIP10</i>, 25, 1 y 53 participan en la regulación de la respuesta a estrés abiótico en <i>Arabidopsis</i>	122
5.1.1.	Estudio de los patrones de expresión de los bZIPs C/S1 en <i>Arabidopsis</i>	123
5.1.2.	Estudio funcional de mutantes de ganancia y pérdida de función de los factores bZIP C/S1 en sus respuestas al estrés abiótico	124
5.1.3.	Caracterización molecular de los mecanismos de acción de los factores bZIP C/S1 ...	125
5.1.3.1	<u>Un análisis transcriptómico de plantas de pérdida de función de diferentes bZIPs</u>	<u>125</u>
5.1.3.2	<u>La identificación de las secuencias diana de los distintos bZIP-C/S1</u>	<u>126</u>
5.1.3.3	<u>La capacidad de formación de complejos transcripcionales de homodímeros y heterodímeros de los bZIP-C/S1</u>	<u>126</u>
5.2	El método <i>parenclítico</i> ofrece una nueva forma de representación y análisis de redes...	127
5.2.1	Aplicación del método <i>parenclítico</i> en la identificación de nuevos genes relevantes en las respuestas a estrés abiótico en plantas	129
6.	CONCLUSIONES	131

7. BIBLIOGRAFÍA.....	135
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA.....	151
FIGURAS SUPLEMENTARIAS	152
TABLAS SUPLEMENTARIAS	163

RESUMEN

El estrés abiótico es una de las principales causas de pérdidas económicas en la agricultura, ya que sus efectos conducen a una baja productividad de los cultivos. Estreses como la sequía, salinidad, frío y calor, producen alteraciones fenotípicas y fisiológicas en las plantas, afectando su crecimiento y desarrollo, con la consecuente reducción en la biomasa, tamaño, número y calidad de los frutos, entre otros parámetros de producción. Por estos motivos, es importante identificar los mecanismos de percepción, señalización y respuestas al estrés en plantas, pues permiten diseñar estrategias para el mejoramiento y la obtención de cultivos capaces de crecer bajo condiciones medioambientales desfavorables.

Entre los estreses abióticos que afectan a las plantas, la sequía tiene un efecto negativo en un gran número de plantas cultivadas. Especialmente, su impacto se ha extendido en grandes áreas del mundo en los últimos 30 años, debido a la expansión de las áreas secas y el incremento de la desecación en suelos como consecuencia del cambio climático. Esta situación representa un desafío en la biotecnología de plantas, en la búsqueda de soluciones alternativas a la agricultura tradicional, para mejorar el problema de la baja productividad de los cultivos inducida por la sequía.

En esta tesis se han seguido dos enfoques diferentes para identificar genes involucrados en la percepción y la respuesta al estrés abiótico, concretamente a la deshidratación. i) La primera estrategia se fundamenta en la hipótesis de que genes implicados en el desarrollo de la semilla y la tolerancia al estrés hídrico del embrión, puedan tener también un papel en la respuesta al estrés abiótico en otros tejidos/órganos durante el desarrollo vegetativo. ii) En la segunda se ha utilizado una aproximación basada en la biología de sistemas, que permite la identificación de genes reguladores a través de un nuevo método bioinformático (la construcción de redes *parenclíticas*) para la generación y representación gráfica de redes, utilizando datos de expresión génica en respuesta al estrés.

La utilización de ambas estrategias en este trabajo, ha conducido al estudio y análisis de nuevas funciones de un grupo de factores de transcripción (FTs) de tipo bZIP pertenecientes a los grupos C y S1: *bZIP10*, *bZIP25*, *bZIP1* y *bZIP53*, en las respuestas al

estrés abiótico en *Arabidopsis*.

La familia bZIP de plantas se encuentra dividida en diez grupos principales, de acuerdo a la similitud de sus secuencias y las especificidades de unión al ADN. Dentro del grupo C de *Arabidopsis*, hay dos miembros que han sido asociados con procesos del desarrollo y maduración de la semilla, concretamente los factores *bZIP10* y *25*. En estudios previos se ha demostrado que estos FTs son capaces de formar dímeros entre si y de heterodimerizar de forma efectiva con miembros del grupo S1, especialmente con los factores *bZIP1* y *53*, incrementando su actividad transcripcional.

En este trabajo se han analizado plantas de *Arabidopsis thaliana* con pérdida y ganancia de función de los bZIPs C/S1, para evaluar el papel que desempeñan en tejidos vegetativos en la respuesta a la deshidratación, además de otros estreses asociados como el osmótico y oxidativo. El análisis transcriptómico global de los distintos mutantes, ha permitido identificar genes y módulos transcripcionales controlados por estos factores en la respuesta al estrés osmótico. Además, se han determinado las secuencias de unión al ADN de estos factores, mediante un método basado en la utilización de proteínas purificadas en ensayos de unión a micromatrices de ADN, desvelando que las secuencias diana consenso son distintas para los factores de las clases C y S1. Finalmente, se han realizado rastreos de doble y triple híbrido en levaduras, que han permitido describir nuevos factores con los que interaccionan, y proponer mecanismos de regulación basados en la formación de homodímeros y heterodímeros de dichos factores y las redes en las que participan, en respuesta a otros tipos de estrés y programas de desarrollo.

Los resultados obtenidos en *Arabidopsis* indican que los factores estudiados desempeñan un papel importante en la respuesta a la desecación y otros estreses abióticos, por lo que podrían utilizarse en la obtención de plantas cultivadas con mayor tolerancia a condiciones ambientales adversas, sin comprometer el rendimiento.

SUMMARY

Abiotic stress is one of the main causes of economic losses in agriculture resulting in low crop productivity. Stresses such as drought, salinity, cold and heat, produce phenotypical and physiological alterations in plants, affecting growth and development with the consequent reduction in biomass, number, size and quality of fruits, among other yield parameters. In this context, the identification of the mechanisms involved in the perception, signaling and stress responses in plants is of special interest, in order to design strategies for crop improvement, which allow to obtain plants more tolerant to abiotic stress.

Among the abiotic stresses affecting plant growth, drought is of particular relevance since it has a negative impact on a great number of crops. In addition, its effects have extended over large areas around the world during the last 30 years, due to the increased soil desiccation and the expansion of dry areas as a consequence of climate change. This situation represents a challenge in plant biotechnology, and the necessity to develop alternative solutions to traditional agriculture to solve the low crop productivity caused by drought.

In this work, we have followed two different approaches to identify genes involved in the perception and response to abiotic stress in plants, in particular to dehydration. The first strategy relies on the hypothesis that genes involved in the dehydration responses of the embryo during seed development, might participate in drought and osmotic stress tolerance in other tissues/organs in vegetative development. We used genetic approaches using gain and loss of function mutants, to test whether these genes are involved in the sensing, signaling and responses to dehydration.

The second is based on bioinformatics analyses of gene expression data available in public databases. We have used a novel predictive method based on network construction and representation techniques, to identify candidate genes involved in the response to osmotic stress in *Arabidopsis* (the construction of *parenclitic* networks).

The use of both strategies allowed the identification and analysis of members of the family of basic domain-containing leucine-zipper (bZIP) transcription factors (TFs), belonging to the C and S1 classes: *bZIP10* and *25*; and *bZIP1* and *53*, respectively, which have important functions in the regulation of different developmental processes and adaptive responses to the environment in plants.

The bZIP TF family in plants is divided into 10 main groups, according to their protein sequence similarities and binding specificities to DNA. Within the group C of *Arabidopsis*, two members have been associated with processes of seed development and maturation, concretely the *bZIP10* and *25*. Previous studies have shown that these TFs are able to form dimers between them and effectively heterodimerize with members of the group S1, specially with *bZIP1* and *53*, increasing their activation activity.

In this study, we used *Arabidopsis thaliana* plants with gain and loss of function of C/S1 bZIP members, for evaluating their role in responses to several conditions related to dehydration, including osmotic, drought and oxidative stresses. We have performed global transcriptomic analyses of different mutants to identify the genes and transcriptional modules regulated by particular C/S1 members under osmotic stress conditions. Furthermore, we have expressed and purified bZIP proteins of the C/S1 groups and used them in an *in vitro* microarray based protein-DNA binding assay, to determine the consensus binding sites of C and S1 classes. Finally, using yeast two and three hybrid screenings, we could identify transcription factors, specifically interacting with homo- and heterodimers of C/S1 bZIPs, which led to the proposal of precise activation models and regulatory networks controlling responses to different stress and developmental processes.

The results obtained in *Arabidopsis* unveiled the participation of C/S1 bZIPs in abiotic stress responses in vegetative development and their potential biotechnological use in cultivated plants, to increase tolerance under adverse environmental conditions without compromising plant yield.

ABREVIATURAS

%: Porcentaje

°C: Grado centígrado

3-AT: 3-Amino-1,2,4-triazol

A: Adenina

ABA: Ácido abscísico

ABI: *ABA Insentitive* – Insensible al ABA

ABRE: *ABA responsive element* – Elemento de respuesta al ABA

AcLi: Acetato de Litio

AD: *Activation domain* – Dominio de activación

ADN: Ácido desoxirribonucleico

ADNc: Ácido desoxirribonucleico complementario

AmpR: Gen de resistencia a la ampicilina

APX: Ascorbato Peroxidasa

AR: *After-ripening*

ARN: Ácido ribonucleico

ARNm: ARN mensajero

BAR: *The Bio-Analytic Resource for Plant Biology*

BD: *Binding Domain* – Dominio de unión

BiFC: *Bimolecular Fluorescent Complementation* – Complement. Bimol. Fluorescente

BSA: *Bovine Serum Albumin* – Albúmina de suero bovino

bZIP: *Basic Leucine Zipper*

bZIPs: Plural de *Basic Leucine Zipper*

CAT: Catalasa

CaMV: *Cauliflower mosaic virus* – Virus del mosaico de la coliflor

ccdB: Muerte celular constitutiva (marcador de selección)

Cd: Cadmio

CdSO₄: Sulfato de cadmio

CLi: Cloruro de Litio

cm: centímetros

CmR: Gen de resistencia al cloranfenicol

CRE: *Cis-regulatory element* – Elemento regulador en cis-

D: Ácido aspártico

dATP: 2'-desoxiadenosina-5'-trifosfato

dCTP: 2'-desoxicitidina-5'-trifosfato

DPEC: Dietil pirocarbonato

dGTP: 2'-desoxiguanosina-5'-trifosfato

DMSO: Dimetilsulfóxido

dNTP: 2'-desoxinucleótido-5'-trifosfato

DO: Densidad Óptica

DOF: *DNA binding with one finger* – Unión al ADN con un dedo de Zinc

DPE: *Down-stream Promoter Element* – Elemento del promotor aguas abajo

DRE: *Dehydration-Responsive Element* – Elemento de respuesta a la deshidratación

dTTP: 2'-desoxitimidina-5'-trifosfato

EDTA: Ácido etilendiaminotetra-acético

EMSA: *Electrophoretic Mobility Shift Assay* – Ensayo de Cambio en la Movilidad Electroforética

ET: Etileno

EtOH: Etanol

FAO: *Food and Agriculture Organization* – Org. para la Alimentación y la Agricultura

g/l: gramos por litro

GA: GAs- Ácido giberélico, giberelinas

GDEs: Genes Diferencialmente Expresados

GFP: *Green Fluorescent Protein* – Proteína verde fluorescente

GLM: *GNC4-Like Motif* – Motivo similar al GCN4

GSH: Glutathione -Glutación

GR: Glutación Reductasa

GTF: *General Transcription Factor* –Factor de transcripción general

GUS: β -Glucuronidasa

H: Histidina

HE: Heterocigota

HO: Homocigota

HR: *Hypersensitive Response* – Respuesta Hipersensible

HSP: *Heat Shock Protein* – Proteína de choque térmico

IAA: *Indol-3 acetic acid* – Ácido Indol-3 acético

IPTG: Isopropil β -D-tiogalactopiranósido

JA: *Jasmonic Acid*-Ácido Jasmónico

K: Potasio

Kw: kilovatio

Ko: *Knock-out*

L: Leucina

LAC Z: β -Galactosidasa

LB: Luria-Bertoni

LEA: *Late Embryogenesis Abundant*

LTPs: *Lipid Transfer Proteins* – Proteínas de transferencia de lípidos

M: Molar

MAPK: *Mitogen Activated Protein Kinase* – Proteínas quinasas activadas por mitógeno

MBD: *Methyl Binding Domain* – Dominio de unión a grupos metilo

Mbp: Millones de pares de bases

MBP: *Maltose binding protein* – Proteína de unión a la maltosa

mg: miligramo

MgCl₂: Cloruro de Magnesio

miARN: micro ARN

MES: *2-(N-Morpholino) ethanesulfonic acid* – Ácido 2-(N-Morfolino) etanosulfónico

ml: mililitro

mM: milimolar

MS: *Murashige & Skoog*

N₂: Nitrógeno

Na: Sodio

ng: nanogramo

NLS: *Nuclear Localization Signal* – Señal de localización nuclear

NO: *Nitric Oxide* – Óxido nítrico

NRD: *Negative Regulatory Domain* – Dominio de regulación negativa

OG: Ontología genética

ORA: *Over-Representation Analysis* – Análisis de sobre-representación

ORF: *Open Reading Frame* – Marco de lectura abierta

p/v: peso/volumen

PAGE: *Polyacrylamide gel electrophoresis* – Electroforesis en gel de poliacrilamida

pb: Pares de bases

PCD: *Programmed Cell Death* – Muerte celular programada

PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa

PEG: Polietilenglicol

pl: Punto Isoeléctrico

PIC: *Pre-Initiation Complex* – Complejo de pre-iniciación de la transcripción

PIL5: *Phytochrome Interacting Factor Like 5*

POD: Peroxidasa

P2H: *Protoplast Two Hybrid* – Dos híbridos de protoplastos

P3H: *Protoplast Three Hybrid* – Tres híbridos de protoplastos

RIN: *RNA integrity Number* – Número de integridad del ARN

RNA-seq: *RNA sequencing*

rpm: Revoluciones por minuto

qRT-PCR: *Real Time Quantitative PCR* – PCR cuantitativa a tiempo real

ROS: *Reactive Oxygen Species* – Especies reactivas de oxígeno

SA: Ácido salicílico

Sac.: Sacarosa

SDS: Dodecil sulfato de sodio

siRNA - ARNsi: *Small Interfering RNA* – ARN pequeño de interferencia

SOD: Superóxido dismutasa

SSPs: *Seed Storage Proteins* – Proteínas de reserva de semilla

TAD: *Transcriptional Activation Domain* – Dominio de activación transcripcional

TAIR: *The Arabidopsis Information Resource*

TBP: *TATA-box Binding Protein* – Proteína de unión a la caja TATA

TEMED: Tetrametiletilendiamina

TF: *Transcription Factor* - Factor de transcripción

UBQ: Ubiquitina 10

µg: microgramo

µl: microlitro

µM: micromolar

µm: micrometro

v/v: volumen/volumen

W: Triptófano

WT: *Wild type* – Fenotipo silvestre

X-Gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranosido

Y2H: *Yeast Two Hybrid* – Dos híbridos de levadura

Y3H: *Yeast Three Hybrid* – Tres híbridos de levadura

1. INTRODUCCIÓN

1.1 El estrés abiótico en plantas: Conceptos y Generalidades.

El estrés es un efecto negativo que puede sufrir un organismo y puede ser clasificado como interno o externo. El estrés interno es aquel derivado de mutaciones o divisiones celulares anormales que puede producir cambios metabólicos, mientras el externo puede tener un origen biótico o abiótico. En plantas, el estrés biótico puede ser causado por el ataque de herbívoros y patógenos, y el abiótico es producido por cambios físicos o químicos en el medioambiente del organismo (Madlung y Comai, 2004).

El estrés abiótico comprende todas las condiciones medioambientales que reducen el crecimiento y rendimiento de las plantas por debajo de los niveles óptimos (Cramer *et al.*, 2011), y tiene un impacto significativo sobre su productividad, reduciendo la calidad y disponibilidad de cultivos de importancia agronómica. Algunos ejemplos de estreses abióticos que afectan a las plantas incluyen, escasez de los recursos hídricos, temperaturas extremas (calor o congelación), disminución de la disponibilidad de nutrientes del suelo y/o exceso de iones tóxicos, exceso ó falta de luz, incremento en la dureza en suelos secos, etc. (Duque *et al.*, 2013).

Entre los estreses abióticos, periodos de sequía y la salinidad son los que presentan un mayor impacto sobre tierras agrícolas en todo el mundo, siendo este último debido fundamentalmente a la mala calidad del agua usada para el riego, el drenaje inadecuado, las inundaciones de agua salada en las tierras costeras y la acumulación de sal en las zonas secas (Kijne, 2006). Además, se estima que la frecuencia de este tipo de estreses aumentará como consecuencia del cambio climático lo que tendrá un impacto negativo en la mayor parte de los cultivos de importancia agroalimentaria. Se estima que las temperaturas globales aumentarán entre 1.1°C y 6.4°C durante el próximo siglo (IPCC 2007), produciendo una alteración en los patrones climáticos, lo que ocasionará inundaciones, sequías y salinidad de forma regular, que podrán comprometer la productividad de los cultivos y por ende, el acceso a los recursos alimenticios (Karan y Subudhi, 2012).

Las distintas especies de plantas han desarrollado múltiples estrategias y mecanismos moleculares y fisiológicos que les permite desarrollar un reajuste celular y tolerancia en

respuesta a distintas condiciones de estrés abiótico. Estos mecanismos están determinados por el genotipo de la planta, y suelen ser dependientes del estado de desarrollo, así como de la duración y severidad del estrés (Bray, 2002). En general, la respuesta al estrés abiótico comienza con la percepción de estímulos de estrés a través de sensores o receptores específicos, que inducen una cascada de transducción de señales que involucra mensajeros secundarios como iones calcio (Ca^{+2}), especies reactivas de oxígeno (ROS) y moléculas fosfolípídicas que modulan la activación de algunas proteínas tipo quinasas. Estos eventos convergen finalmente en la inducción de un programa de expresión génica, que involucra tanto la represión como inducción de genes específicos controlados por factores de transcripción (Fig.1). Las quinasas, fosfatasa, y factores de transcripción (FTs), hacen parte de los componentes de señalización clave involucrados en la regulación de la expresión de genes en respuesta a condiciones de estrés abiótico (Bray, 2002).

En general, los cambios inducidos por estrés sobre el fenotipo y metabolismo celular pueden ser atribuidos a variaciones en los patrones de expresión de genes. Algunos de estos genes expresados diferencialmente, codifican proteínas que se acumulan en respuesta a una determinada condición de estrés o a distintos tipos de estreses, haciendo compleja la identificación de funciones génicas específicas, debido al entrecruzamiento de algunas vías de respuesta existentes. La identificación funcional de factores de transcripción involucrados en la regulación de la expresión génica, es un paso clave para detectar los mecanismos moleculares relacionados con la activación de respuestas al estrés en distintas especies de plantas (Vinocur y Altman, 2005; Yamaguchi- Shinozaki y Shinozaki, 2006).

Como mecanismo de respuesta al estrés abiótico, se ha observado en distintas especies de plantas cambios en los niveles de expresión de numerosos genes relacionados con la señalización y respuesta al estrés, y acumulación de metabolitos para sobrevivir en estas condiciones. Entre las respuestas de las plantas al estrés (Fig.1), la sobreproducción de diferentes tipos de solutos orgánicos compatibles de bajo peso molecular, es una de las más comunes. Estos solutos son compuestos solubles, no tóxicos en altas concentraciones celulares, que pueden proteger a las plantas del estrés, a través de su participación en el ajuste osmótico de la célula, la detoxificación de especies reactivas de oxígeno (ROS), la estabilización de enzimas/proteínas y la protección de la integridad de la membrana celular

(Yancey *et al.*, 1982; Bohnert y Jensen, 1996). De igual manera, estos solutos se pueden considerar osmoprotectores, debido a que muchos de ellos también protegen los componentes celulares del daño por deshidratación, entre ellos se encuentran la prolina, sacarosa, polioles, trehalosa, y compuestos de amonio cuaternario tales como la glicinbetaína, alaninabetaína, prolinabetaína, colina y pipecolatobetaína (Rhodes y Hanson, 1993).

1.1.1 Estrés hídrico: Efectos sobre el crecimiento y desarrollo.

El estrés hídrico en plantas genera tanto cambios en los procesos fisiológicos y bioquímicos, como en los patrones anatómicos y del desarrollo. A pesar de la diversidad de especies de plantas, estas presentan una respuesta genérica inducida por estrés a nivel anatómico que comprende principalmente tres componentes: la inhibición de la elongación celular, la estimulación localizada de la división celular y alteraciones en el estado de diferenciación celular. Esto produce cambios generales en las características anatómicas de órganos básicos de las plantas, principalmente en raíces, el xilema y hojas, lo que favorece la adaptación a condiciones medioambientales desfavorables (Patakas, A., 2012).

Igualmente, el estrés hídrico suele afectar negativamente al crecimiento y desarrollo de las plantas. Precisamente, procesos como la división celular, elongación, y diferenciación se encuentran afectadas bajo condiciones de deshidratación debido a la pérdida de turgencia, las actividades enzimáticas alteradas, y la disminución del suministro de energía de la fotosíntesis (Shao *et al.*, 2008). La reducción de la turgencia conlleva a la supresión de la expansión y el crecimiento celular, dos procesos necesarios para la fase inicial del crecimiento y establecimiento de las plantas (Bhargava y Sawant, 2012).

Figura 1. Esquema de la respuesta de las plantas al estrés abiótico. Los estreses primarios, tales como la sequía, salinidad, frío, calor y deficiencia de nutrientes, están con frecuencia interconectados y pueden causar daño celular y estreses secundarios como el osmótico y oxidativo. Las señales de estrés inicial (por ej. Efectos iónicos y osmóticos o cambios en la temperatura) desencadenan los procesos de señalización y el control transcripcional, que activa los mecanismos de respuesta al estrés para reestablecer la homeostasis y proteger y reparar las proteínas y membranas dañadas, llevando finalmente a la adquisición de la tolerancia o resistencia al estrés en plantas (Adaptado de Vinocur y Altman, 2005).

1.1.2 Generalidades del estrés hídrico en plantas

El estrés hídrico o estrés promovido por periodos de sequía es considerado como una pérdida moderada del contenido hídrico en las plantas. Este estrés, además de provocar una frecuente pérdida de agua, induce el cierre estomático, un intercambio de gases obstaculizado, la alteración del metabolismo celular, y conduce si persiste a muerte celular (Jaleel *et al.*, 2009).

Las alteraciones climáticas son el principal factor que desencadena el estrés promovido por periodos de sequía a nivel global. Sin embargo, el déficit hídrico también es provocado por condiciones tales como las altas y bajas temperaturas, la alta intensidad lumínica, el viento seco, salinidad moderada y la exposición a agentes osmóticos. Todos estos factores provocan un incremento en la evaporación del agua del suelo y/o incrementan la pérdida de agua de las plantas y en consecuencia, promueven su exposición al estrés hídrico (Salehi-Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016). La comprensión de estos fenómenos, es un objetivo de gran importancia para mejorar el rendimiento agrícola frente a las sequías recurrentes y en consecuencia, abordar los desafíos del cambio climático (Tombesi *et al.*, 2018).

El estrés por sequía es un estrés multidimensional que con frecuencia produce cambios en los rasgos fisiológicos, morfológicos, bioquímicos, y moleculares de las plantas (Salehi-Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016). En general, los efectos del estrés hídrico dependen de tres factores que influyen en la percepción y señalización de este estrés: la severidad del estrés; la duración del estrés; y las respuestas de las plantas después de la exposición al estrés (Zlatev y Lidon, 2012).

Las plantas han desarrollado diversas estrategias para enfrentarse a las condiciones de déficit hídrico. Estas estrategias se agrupan en 3 clases: escape, evitación/evasión y tolerancia. Aunque las estrategias de escape son en parte estrategias de evasión, ya que las plantas que escapan de la sequía no se exponen realmente a déficit hídrico (Salehi-Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016). En el caso de las estrategias de escape de la sequía, la más destacable es el desarrollo de ciclos de vida más cortos o de crecimiento

estacional que permite que las plantas se reproduzcan y persistan en forma de semilla antes de que el ambiente se vuelva seco (Akhtar y Nazir, 2013). El escape de la sequía ocurre cuando el desarrollo fenológico coincide con los períodos durante los cuales la humedad del suelo está disponible.

Las estrategias de la evitación, tienen como objetivo primordial la preservación de un alto potencial hídrico en plantas. La principal característica de estos tipos de estrategias es la reducción de la pérdida de agua de las plantas en condiciones de estrés mediante el control estomático de la transpiración, el mantenimiento de la absorción de agua del suelo por un sistema de raíces extenso y prolífico, desarrollo de cutícula y hojas pilosas que ayudan a mantener un alto potencial hídrico en los tejidos de la planta entre otros. Sin embargo, la producción de estas estructuras conlleva una disminución del rendimiento de la planta debido a la energía consumida para producirlas.

Finalmente, existen especies de plantas que desarrollan verdaderas estrategias de tolerancia que consisten en adaptaciones permanentes que les permitan tolerar y completar su ciclo vital en condiciones de estrés. Entre estas cabría destacar la limitación en el número, y el área de las hojas en respuesta al déficit hídrico; sin embargo, esta estrategia conduce a la pérdida del rendimiento (Akhtar y Nazir, 2013). Además, es frecuente el desarrollo de rasgos xeromórficos, como el desarrollo de hojas pilosas y la producción de tricomas en ambas superficies de las hojas. También es destacable el desarrollo raíces principales y laterales más largas. Considerando que la raíz es el órgano principal para la absorción de agua del suelo, su tasa de crecimiento, densidad, proliferación y tamaño, son factores clave que influyen en la respuesta de las plantas al estrés por sequía (Farooq *et al.*, 2009). Además otros mecanismos involucrados en desarrollo de tolerancia de las plantas a la sequía, involucran el desarrollo de un ajuste metabólico general que incluye la acumulación de solutos compatibles y la adaptación osmótica, la inducción de un sistema antioxidante y alteraciones en rutas metabólicas implicadas en la asimilación del carbono y de macro/micro nutrientes, así como incremento del ratio raíz/parte aérea y el cierre de los estomas (Salehi-Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016).

En la Figura 2 se presenta un diagrama que resume la respuesta de las plantas a la sequía e incluye sus causas y consecuencias.

Figura 2. Resumen de las causas, síntomas, efectos y respuestas de las plantas a estrés promovido por deshidratación (Modificado de Salehi-Lisar y Bakhshayeshan-Agdam, 2016).

1.1.2.1 Señalización y respuesta al estrés hídrico

Las plantas han desarrollado mecanismos de respuesta dinámicos para activar de forma eficiente las rutas de señalización y respuesta a distintos estreses abióticos, entre ellos, al estrés hídrico (Hirayama y Shinozaki, 2010). Los genes que cambian sus patrones de expresión génica en respuesta a estrés forman parte de la maquinaria de respuesta al estrés hídrico. Estos presentan distintas fases de inducción debido a que dependen de la síntesis *de novo* de proteínas y moléculas señalizadoras, tales como el ABA (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006), demostrando la complejidad de las respuestas al estrés, debido a que la fase de inducción puede ser controlada por mecanismos de señalización específica y diferentes factores reguladores.

Entre los genes que codifican proteínas con una función reguladora, destacan, por su abundancia los que codifican FTs, que tienen la capacidad de regular la expresión de

amplios grupos de genes implicados directamente en la respuesta a estrés, o actúan en la biosíntesis de moléculas reguladoras como la fitohormona ABA (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006). Los FTs inducibles por estrés incluyen miembros de las principales familias de FTs en *Arabidopsis* (Tabla 1), y pueden modular la expresión de genes que responden a estrés de forma conjunta o separada constituyendo redes. El conjunto de genes regulado por mismo factor regulador se conoce como “**regulón**”. Durante los últimos años se ha desarrollado mucho trabajo en la identificación y caracterización de elementos reguladores en *cis* y de FTs responsables de los cambios de la expresión génica en respuesta a estrés hídrico. El estudio de las regiones reguladoras de los genes inducibles por sequía y deshidratación y de los FTs que los regulan, han permitido la identificación de distintos sistemas independientes de regulación de la expresión génica en respuesta a estrés hídrico en *Arabidopsis* (Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki, 2000; 2006). De estos, tres regulones pertenecen a la vía dependiente de la hormona ABA como son AREB/ABF, NAC y MYB/MYC, y los otros a la vía independiente del ABA que incluye los regulones CBF/DREB y NAC/ZFHD (Nakashima *et al.*, 2009).

Por otro lado, se ha descrito que distintas quinasas de tipo MAPK (*Mitogen-Activated Protein Kinase*) son componentes de señalización celular muy importantes en la respuesta al estrés abiótico en plantas. En *Arabidopsis* se han identificado 20 MAPK, 10 MAPKK y 60 MAPKKK (Ichimura *et al.*, 2002). El hecho de que las distintas MAPK pueden funcionar en diversos procesos de señalización diferentes y constituir redes complejas, ha dificultado enormemente la caracterización funcional de cada componente. Entre las quinasas que han sido mejor caracterizadas, se encuentran las quinasas relacionadas con SNF1 (*Sucrose non-fermentation 1*), como quinasas de tipo SnRK1, SnRK2 y SNRK3, que participan en la respuesta a varios estreses y en la respuesta a ABA. En *Arabidopsis*, dos quinasas tipo SnRK1 (KIN10/SnRK1.1 y KIN11/SnRK1.2) han sido estudiadas en detalle debido a que desempeñan un papel en la regulación de distintas rutas metabólicas en respuesta a estrés abiótico (Baena-González *et al.*, 2007). En este sentido, cabe destacar dentro del grupo SnRK2 SRK2J/SnRK2.9, SRK2D/SnRK2.2, SRK2I/SnRK2.3 y SRK2E/OST/SnRK2.6 de los cuales distintos estudios han demostrado que son esenciales para la señalización mediada por la fitohormona ABA (Nakashima *et al.*, 2009).

Además de las quinasas, se ha reportado de forma exhaustiva el papel del calcio en la

señalización del estrés. El Ca^{2+} es uno de los mensajeros secundarios más importantes en la respuesta a estímulos extracelulares en plantas, ya que distintas condiciones de estrés, tales como el estrés hídrico, inducen un incremento en los niveles de Ca^{2+} intracelular a través de moléculas señalizadoras, tales como el inositol trifosfato, diacilglicerol, inositol hexafosfato, cADP-ribosa o especies reactivas de oxígeno. Se han postulado dos proteínas quinasas como dianas de la señalización del Ca^{2+} en plantas, SnRK3s y CDPKs (*Ca^{2+} -Dependent Protein Kinase*). Las quinasas de tipo SnRK3s tienen actividad dependiente de las proteínas CBL (*calcineurin B-like*) de unión al Ca^{2+} (Hrabak *et al.*, 2003). Entre las 25 quinasas tipo SnRK3, SOS2 (*Salt Overly Sensitive 2*) es la mejor caracterizada, y ha sido identificada como un factor esencial en la respuesta al estrés por salinidad. SOS2, junto con la proteína de unión al Ca^{2+} SOS3, activan el antiportador de Na^+/H^+ de la membrana plasmática (SOS1), requerido para la tolerancia a la salinidad (Luan, 2009). En cuanto a las quinasas tipo CDPK, se han identificado más de 30 genes que codifican CDPKs en *Arabidopsis*, algunos de los cuales están involucrados en las respuestas al estrés osmótico y al ABA. CPK3 y CPK6 regulan la respuesta al ABA en las células guarda (Mori *et al.*, 2006), y CPK4, CPK11 y CPK32 regulan positivamente la respuesta al ABA. Entre estos últimos, se ha reportado que CPK4 y CPK11 fosforilan factores de transcripción tipo AREB/ABF en una forma dependiente del ABA (Zhu *et al.*, 2007).

1.1.2.2 Rutas de respuesta a la deshidratación en *Arabidopsis*

De forma general las plantas responden a la deshidratación a nivel celular y molecular, mediante cambios en los niveles de expresión de numerosos genes a través de redes complejas de señalización molecular. Así, en condiciones de estrés hídrico se ha descrito la inducción de la expresión de diversos genes en varias especies de plantas (Xiong *et al.*, 2002; Bartels y Sunkar, 2005), muchos de los cuales se han identificado a través de experimentos de micromatrices (Kreps *et al.*, 2002; Kilian, *et al.* 2007). La identificación de estas rutas de señalización y elementos reguladores, podría generar oportunidades para el desarrollo de plantas tolerantes a la deshidratación.

El grado de complejidad de la respuesta al estrés hídrico a nivel de control de la expresión génica, se ha puesto de manifiesto a partir de distintos análisis transcriptómicos y de biología de sistemas realizados fundamentalmente en especies modelo como *Arabidopsis*

en respuesta a distintos tipos de estrés abiótico (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006; Cramer *et al.*, 2011). En el caso de *Arabidopsis*, entre el 10 y el 25% del transcriptoma, cambia sus niveles de expresión en respuesta a estreses tales como la salinidad, sequía y tratamientos con ABA. Además, estos estudios han revelado un gran solapamiento entre la respuesta a estos estreses, lo que indica la existencia de entrecruzamientos significativos entre las respuestas a la sequía y alta salinidad (Seki *et al.*, 2002). De igual manera, la clasificación de los genes según sus patrones de expresión permitió identificar dos grupos de genes con diferentes perfiles de expresión. Un primer grupo de genes, que responde de forma rápida y transitoria en respuesta a tratamientos de sequía y salinidad, alcanzando un máximo en pocas horas después del estrés; y otro grupo, que responde de forma más lenta y que permanece estable después del tratamiento de estrés durante al menos 10h. La mayoría de estos últimos genes codifican enzimas de decodificación, enzimas para la síntesis de compuestos osmoprotectores y del metabolismo primario (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006). Por otro lado, el análisis de mutantes deficientes o insensibles a ABA (*aba* y *abi*) de *Arabidopsis*, para estudiar la respuesta transcripcional de genes regulados por sequía, ha demostrado que esta está regulada tanto por rutas dependientes como independientes del ABA (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006; Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki, 2007). A continuación, se describen los principales genes reguladores involucrados en estas vías de señalización (Fig. 3).

1.1.2.2.1 Rutas dependientes de ABA

El ácido abscísico (ABA) ha sido ampliamente estudiado por su papel en el desarrollo y la respuesta de las plantas a condiciones medioambientales (Daszkowska-Golec y Szarejko, 2013). En el modelo *Arabidopsis* y varias especies cultivables, distintos ensayos de estrés hídrico para evaluar la respuesta a condiciones de alta salinidad y sequía, han demostrado que el ABA tiene un papel importante en la adaptación de las plantas a estos estreses, así como en los procesos de maduración y dormancia de la semilla (Shinozaki *et al.*, 2003). Esta fitohormona promueve el cierre estomático en las células guarda y regula la expresión de muchos genes involucrados en la tolerancia a la deshidratación, tanto en el tejido vegetativo como en la semilla (Himmelbach *et al.*, 2003).

Muchos genes inducibles por ABA contienen un elemento regulador en *cis* de respuesta al

ABA, conocido como ABRE (*ABA-Responsive Element*; de secuencia PyACGTGGC) en sus regiones promotoras. ABRE es el principal elemento regulador en *cis*, involucrado en la expresión de genes regulados por ABA (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006). Por ejemplo en el caso del gen *RD29B* de *Arabidopsis*, involucrado en la respuesta al ABA y la deshidratación (Uno *et al.*, 2000), se ha determinado que se necesitan dos secuencias ABRE para la expresión del gen tanto en la semilla, como en respuesta al ABA en tejido vegetativo.

Por otro lado, se han identificado factores de transcripción de tipo bZIP que reconocen el motivo ABRE y se han denominado proteínas de unión a ABRE (AREB) o factores de unión a ABRE (ABFs; Suzuki *et al.*, 2003). Los factores AREB/ABF han sido ampliamente estudiados y demostrando que los miembros de esta familia están involucrados en las rutas de transducción de señales en respuesta al ABA en semillas o en tejidos vegetativos (Lopez-Molina y Chua, 2000; Uno *et al.*, 2000)

Otro gen inducible por sequía cuya expresión está mediada por ABA, es el *RD22* (*Responsive to dehydration 22*) que requiere de la biosíntesis de los factores MYC2 y MYB2 para su expresión dependiente de ABA. Los factores *AtMYC2* (RD22BP1), y *AtMYB2*, se unen a los elementos reguladores *cis* del promotor de *RD22* y activan cooperativamente su transcripción (Abe *et al.*, 2003). Estas proteínas MYC2/MYB2 se expresan en respuesta a la acumulación de ABA endógeno, con lo cual, se ha descrito que tienen un papel en las respuestas al estrés en un estado más tardío de la respuesta.

Asimismo, se ha identificado el gen *RD26* (*Responsive to Dehydration 26*) que codifica un factor de transcripción tipo NAC (Tabla 1), cuya expresión se induce por sequía, salinidad y tratamientos con ABA y ácido jasmónico (JA). Además, se ha demostrado que la sobreexpresión de este factor en *Arabidopsis* promueve un aumento de la sensibilidad (hipersensibilidad) al ABA, mientras que plantas transgénicas que lo reprimen son insensibles al ABA. Consistentemente, el análisis de expresión de distintos genes inducibles por estrés y ABA, reveló que estos son inducidos en líneas sobre-expresoras de *RD26* y reprimidos en las líneas represoras (Fujita *et al.*, 2004).

1.1.2.2.2 Rutas independientes de ABA

Distintos trabajos han revelado que la expresión del gen *RD29A/COR78/LTI78* es inducida en condiciones de sequía, frío y en el tratamiento con ABA. Debido a que este gen es también regulado en mutantes *aba* y *abi* por tratamientos de sequía y bajas temperaturas, se ha propuesto que está regulado tanto por rutas dependientes como independientes del ABA, en respuesta a ambas condiciones de estrés (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006). Asimismo se ha descrito el elemento en *cis* regulador DRE (Dehydration Responsive Element) presente en el promotor de gen RD29A, el cual es esencial para la respuesta a condiciones de deshidratación y el frío mediante una ruta independiente del ABA. Este elemento también se encuentra en las regiones promotoras de numerosos genes inducibles por sequía y frío (Thomashow, 1999). Los factores transcripcionales *DREB1/CBF* y *DREB2*, que pertenecen a la familia ERF/AP2, tienen la capacidad de unión a los elementos DRE/CRT (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2005). Además, numerosos análisis funcionales han demostrado que ambos tipos de factores desempeñan un papel central en el desarrollo y tolerancia a la deshidratación promovida por la sequía, salinidad y las bajas temperaturas (Liu *et al.*, 1998; Sakuma *et al.*, 2006; Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki, 2007).

Figura 3. Redes de regulación transcripcional implicadas en señalización y respuesta a estrés abiótico. Se han identificado distintas rutas de transducción de señales, tanto dependientes como independientes del ABA, en respuesta a los estreses de sequía y salinidad. En las rutas dependientes del ABA, el elemento regulador en cis ABRE participa en la señalización mediada por ABA. Además los factores tipo AREB/ABFs, RD26 (NAC), MYB2 y MYC2, están involucrados en la expresión de genes en respuesta al estrés mediado por ABA. En las rutas independientes del ABA; NAC, HD-ZIP y DREB2 participan en el control de la expresión de genes en respuesta a los estreses salino y sequía (Modificado de Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki, 2007).

1.1.2.3 Estrés hídrico durante el desarrollo: La semilla.

Las plantas no solo experimentan estrés como consecuencia de las condiciones medioambientales cambiantes, éstas también son afectadas por estreses derivados de su programa de desarrollo. Un ejemplo de ello, es el estrés hídrico promovido durante el programa de desarrollo del polen y la semilla (Franchi *et al.*, 2011). Durante el desarrollo de la semilla, el embrión se ve expuesto a un elevado nivel de estrés hídrico que supera gracias a una respuesta compleja coordinada durante esta fase. Así, embriones en desarrollo

entran en fase de maduración cuando experimentan una transición del crecimiento por división celular al crecimiento mediante elongación celular y comienzan a acumular sustancias de reserva y compuestos que le permiten adquirir tolerancia a la deshidratación. Esta transición del crecimiento está correlacionada con un incremento en el contenido de ABA de la semilla, que se requiere para la interrupción del ciclo celular en la transición G1/S (Liu *et al.*, 1994). Durante la maduración de la semilla, hay dos momentos en los que ocurren máximos de acumulación de ABA (Fig. 4), el ABA de origen materno provee el máximo inicial y el posterior es principalmente embrionario (Kanno *et al.*, 2010). La acumulación inicial de ABA en la semilla, junto con los factores reguladores *FUS3* y *LEC*, se requiere para prevenir la germinación prematura al final de la fase de división celular de la embriogénesis (Raz *et al.*, 2001). El nivel máximo posterior de ABA es esencial para la inducción de la dormancia, momento en el cual *PYL5* (At5g05440) es el receptor de ABA que se expresa de forma más significativa (Schmid *et al.*, 2005). Este hecho ha llevado a proponer que *PYL5* desempeña un papel central en la respuesta al ABA durante la maduración de la semilla (Finkelstein, 2013).

La acumulación de reservas y la expresión de genes tipo *LEA* (*Late Embryogenesis-Abundant*) durante la maduración de la semilla, están regulados de forma coordinada por la acción combinatoria de distintos factores de transcripción. Análisis de secuencias de promotores de genes que codifican proteínas de reserva y *LEA*, han demostrado la presencia de elementos reguladores requeridos para la respuesta a hormonas y la especificidad de tejidos. Entre los reguladores principales se encuentran miembros de dos familias de factores de transcripción, las proteínas del dominio B3 y bZIP (Finkelstein, 2013). La familia del dominio B3 se compone de dos grupos que actúan de forma antagónica: las proteínas *AFL* (*ABI3/FUS3/LEC2*) promueven la maduración del embrión, mientras las proteínas *VAL* (*VP1/ABI3-Like*) reprimen procesos embrionarios para permitir la fase de transición a la germinación, en parte a través de la asociación con factores de remodelación de la cromatina (Suzuki y McCarty, 2008; Carbonero *et al.*, 2017).

Además, durante el desarrollo del embrión, participan factores de transcripción de tipo *LEC1/AFL* y *ABI*. Estos difieren en sus patrones de expresión espacio temporal y desarrollan una regulación cruzada entre ellos. Así, *LEC1* promueve la expresión de *LEC2* y *FUS3*, que a su vez promueven el desarrollo embrionario, incluyendo la expresión de

factores como *ABI3*, *ABI4*, y *ABI5* que regulan la respuesta al ABA (Suzuki y McCarty, 2008; Junker *et al.*, 2010). Por otro lado, *FUS3* y *ABI3*, 4 y 5, muestran niveles altos de expresión sólo cuando los niveles de *LEC* disminuyen durante la maduración de la semilla (Nakabayashi *et al.*, 2005).

Arabidopsis thaliana

Figura 4. Diagrama que representa las interacciones entre señales hormonales y del desarrollo, y elementos reguladores durante la embriogénesis, maduración, dormancia y germinación de la semilla de *Arabidopsis thaliana*. HSPs, Proteínas de Choque Térmico; LEAs, Proteínas Abundantes de la Embriogénesis Tardía; PA, Proantocianidinas; SSPs, Proteínas de Almacenamiento de la Semilla; TIPs, Proteínas Intrínsecas del Tonoplasto; TTG1, Transparent Testa Glabra 1; TT2, Transparent Testa 2 (Adaptado de Carbonero *et al.*, 2017).

1.1.3 Respuesta al estrés osmótico

La pérdida de agua intracelular promovida por condiciones de salinidad, sequía y temperaturas variables, produce estrés osmótico en las plantas. Para prevenirlo y proteger las proteínas celulares, las plantas acumulan muchos compuestos orgánicos tales como aminoácidos (prolina), amonio cuaternario y aminos (glicina betaína y poliaminas), una

variedad de azúcares (principalmente fructosa y sacarosa), alcoholes de azúcar, azúcares complejos (como trehalosa y fructanos) y ácidos orgánicos (oxalato, malato) (Valliyodan y Nguyen, 2006). Estos metabolitos con función osmótica se conocen también como solutos compatibles u osmoprotectores y pueden acumularse en altas concentraciones sin alterar la bioquímica intracelular. Además, la acumulación de osmolitos también tiene un papel vital en el mantenimiento de las actividades celulares. Por ejemplo, la acumulación de prolina a través de la sobre-expresión del gen P5CS en *Medicago truncatula*, produjo un incremento en la osmotolerancia y también ayudó a mantener la actividad fijadora de nitrógeno bajo estrés osmótico (Verdoy *et al.*, 2006). Para minimizar los posibles efectos pleiotrópicos negativos como los mencionados anteriormente, la modificación de rutas para la sobreproducción de solutos compatibles debe realizarse a través de una regulación inducible por estrés y/o específica de tejidos (Su y Wu, 2004).

Distintos estudios con plantas transgénicas, han explorado el desarrollo de genotipos tolerantes mediante la manipulación de enzimas que sintetizan osmolitos específicos (Chen y Murata, 2008; Szabados y Saviouré, 2010). Debido a que la función de los osmolitos no se limita al ajuste osmótico, sino que también confiere osmoprotección, se han encontrado variaciones en el éxito de la adquisición de la tolerancia al estrés (Krishnan *et al.*, 2008). Así se ha llevado a cabo un número considerable de estudios exitosos con plantas transgénicas que sobre-expresan genes que codifican osmoprotectores como la glicina betaína (Bensen *et al.*, 2008; Chen y Murata, 2008) y la prolina (Verdoy *et al.*, 2006; Szabados y Savoure, 2010). También se han seleccionado distintos azúcares y alcoholes de azúcares (manitol, trehalosa, mioinositol y sorbitol) como diana para la ingeniería de la sobreproducción de solutos compatibles, protegiendo así los complejos de proteínas y la membrana celular durante el estrés (Gao *et al.*, 2000; Penna *et al.*, 2006). En particular, hay una creciente investigación en el metabolismo de la trehalosa como un medio para conferir tolerancia al estrés en los cultivos (Penna, 2003). Por ejemplo, la sobreexpresión del gen *Trehalosa-6-Fosfato Sintasa* de levaduras en tomate aumentó la tolerancia a la salinidad, sequía y estrés oxidativo (Cortina y Culiáñez-Macià, 2005). Por otro lado, también se ha demostrado que distintas líneas transgénicas de plantas que acumulan mayor cantidad de poliaminas mostraron un incremento en la tolerancia a múltiples estreses abióticos, tales como metales pesados, salinidad, sequía, y temperaturas variables (Capell *et al.*, 2004; Prabhavathi y Rajam, 2007).

Por otro lado, la acumulación de osmolitos además de funciones relacionadas con osmotolerancia también tiene un papel vital en el mantenimiento de las actividades celulares. La acumulación de prolina a través de la sobre-expresión del gen *P5CS* en *Medicago truncatula*, produjo un incremento en la osmotolerancia y también ayudó a mantener la actividad fijadora de nitrógeno bajo estrés osmótico (Verdoy *et al.*, 2006). Para minimizar los posibles efectos pleiotrópicos negativos como los mencionados anteriormente, la modificación de rutas para la sobreproducción de solutos compatibles debe realizarse a través de una regulación inducible por estrés y/o específica de tejidos (Su y Wu, 2004).

1.1.4 Respuesta al estrés salino

La salinidad es una condición del suelo caracterizada por una alta concentración de sales solubles, principalmente cloruro y sulfatos de sodio en el suelo. El estrés salino afecta distintos aspectos de la fisiología vegetal, puede inhibir la germinación de la semilla y promover alteraciones en la morfología de las plantas, generando una reducción en el rendimiento de los cultivos. Tanto el cloruro como las sales de sodio, causan daño al sistema radicular de las plantas. Las lesiones provocadas por el cloruro se identifican por los extensos síntomas de quemaduras en la lámina foliar, mientras la acumulación de sales de sodio produce manchas en las hojas y necrosis foliar. Distintos estudios han determinado que la salinidad del suelo desencadena tanto los estreses osmótico como iónico en las plantas. La presencia de sales en solución en el suelo, reduce la capacidad de las plantas para tomar agua, y esto conlleva a una reducción en la tasa de crecimiento, denominada efecto osmótico o de déficit hídrico de la salinidad. Si una cantidad excesiva de sal entra en la planta en la corriente de transpiración, causa daño a las células en las hojas que transpiran, produciendo una reducción adicional en el crecimiento de la planta. Esto es llamado el efecto salino específico o efecto iónico de la salinidad (Greenway y Munns, 1980). El estrés por salinidad es cuantificado finalmente como una disminución en el potencial hídrico. Las plantas han desarrollado diferentes mecanismos para tolerar bajos potenciales hídricos mediante la acumulación de osmolitos y la modificación de las propiedades de las paredes celulares a través de la producción de proteínas protectoras (Verslues *et al.*, 2006), difiriendo ampliamente en su tolerancia a la salinidad. La mayoría

de los cultivos agroalimentarios comúnmente utilizados son sensibles a la salinidad (Flowers y Colmer, 2008). Entre los cereales, el arroz (*Oryza sativa*) es el más sensible y la cebada (*Hordeum vulgare*) es el más tolerante. El trigo hexaploide (*Triticum aestivum*) es moderadamente más tolerante que el trigo tetraploide (*Triticum turgidum* ssp. durum). La variación en la tolerancia a la salinidad en especies dicotiledóneas es aún mayor que en especies monocotiledóneas. La salinidad reduce la tasa de expansión foliar, y promueve el cierre de estomas y por lo tanto, reduce la fotosíntesis, debido al déficit hídrico causado por el estrés osmótico (Rahnama *et al.*, 2010). La exposición a la salinidad del suelo, provoca la acumulación de concentraciones tóxicas de Na^+ en las hojas, lo que impone una limitación adicional al crecimiento al reducir la longevidad de los tejidos fotosintéticos (Munns, 2002). El control del transporte del Na^+ y su exclusión efectiva de las células del mesófilo de las hojas, es un requisito importante para la tolerancia a la salinidad. Entre los principales componentes que controlan la tolerancia a la sal se destacan, la absorción o exclusión de la sal; el incremento del ratio K^+/Na^+ ; la tolerancia de los tejidos; el cierre de los estomas; la regulación positiva del sistema antioxidante para la protección contra las especies reactivas de oxígeno (ROS); la síntesis de osmolitos; la eficiencia en el uso del agua; el florecimiento temprano; y un crecimiento vigoroso para diluir la concentración de sales en los tejidos de la planta (Colmer *et al.*, 2005; Ismail *et al.*, 2007).

1.1.5 Respuesta al estrés oxidativo

1.1.5.1 Estrés oxidativo como estrés secundario

La exposición de las plantas a distintos estreses medioambientales como la sequía, salinidad y altas temperaturas, puede producir estrés oxidativo como un estrés secundario, debido a la producción de moléculas ROS (*Reactive Oxygen Species*), tales como radicales superóxido (O_2^-), radicales hidroxilo (OH), peróxido de hidrógeno (H_2O_2), radicales alcoxi (RO), y singletes de oxígeno, causando daño oxidativo a nivel celular. Las ROS pueden reaccionar con proteínas, lípidos y otras macromoléculas importantes, provocando la desnaturalización de su estructura y alterando la función de estas macromoléculas. En condiciones de estrés hídrico, se producen moléculas ROS en muchos compartimentos celulares, tales como cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas. Generalmente, la acumulación de ROS conlleva a la fragmentación del ADN, la oxidación de aminoácidos, proteínas y pigmentos fotosintéticos, la peroxidación de lípidos, entre otros. Las plantas han

desarrollado diversos mecanismos para evitar el daño causado por ROS, estos mecanismos forman un sistema de defensa antioxidante que incluye componentes enzimáticos y no enzimáticos. La SOD (superóxido dismutasa), CAT (catalasa), POD (peroxidasa), APX (ascorbato peroxidasa), y GR (glutación reductasa) son algunas de las enzimas involucradas en las respuestas antioxidantes de las plantas. Asimismo, algunos compuestos como el glutatión, ácido ascórbico, carotenoides, y α -tocoferol están involucrados en el sistema de defensa antioxidante de las plantas (Revisado en Bartels y Sunkar *et al.*, 2005).

1.1.5.2 Estrés oxidativo inducido por Cadmio

El cadmio (Cd) es uno de los metales pesados más nocivos en la naturaleza, debido a que afecta negativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas incluso a bajas concentraciones. La evidencia demuestra que la generación de ROS inducida por Cd juega un papel importante en la toxicidad celular, y los efectos producidos son dependientes de la dosis y la especie (Benavides *et al.*, 2005; Sandalio *et al.*, 2009). Sin embargo, las ROS también actúan como moléculas señal, ya que regulan una gran red de genes involucrados en la respuesta de las células a los estreses bióticos y abióticos (Revisado en Sandalio *et al.*, 2012).

En la Figura 5 se representa un esquema de la respuesta de las plantas a la exposición al Cd, tanto a corto como a largo plazo.

Figura 5. El cadmio induce una respuesta diferencial en las plantas dependiendo del tiempo del tratamiento. La respuesta rápida a corto plazo produce NO y una explosión oxidativa, que induce la expresión de genes para prevenir el daño oxidativo causado por este metal. A largo plazo se produce la acumulación de ROS y una reducción de NO causando daños severos. Además se promueve la expresión de genes implicados en la reparación del daño oxidativo y la muerte celular. GSH, Glutatión; PCs, Fitoquelatinas; HSPs, Proteínas de choque térmico (Adaptado de Sandalio *et al.*, 2012).

El Cd es considerado un elemento fitotóxico, debido a que puede interferir con la nutrición mineral y cambiar la concentración y composición de los nutrientes de plantas. El Cd^{2+} puede interferir con la absorción de nutrientes mediante la alteración de la permeabilidad de la membrana plasmática y también puede alterar la conformación de proteínas, incluyendo enzimas, transportadores, o proteínas reguladoras, debido a su fuerte afinidad por los grupos sulfhidrilo y carboxilo (Gonçalves *et al.*, 2009). En varios estudios se ha evaluado el efecto del Cd sobre la absorción de nutrientes en las plantas (Dong *et al.*, 2006; Gonçalves *et al.*, 2009). A bajas concentraciones, este elemento puede afectar su

interacción con minerales, debido a puede hiperpolarizar las membranas plasmáticas sobre la superficie de las raíces, aumentando el potencial transmembrana (Gonçalves *et al.*, 2009). Dong *et al.*, (2006) revelaron que los principales efectos tóxicos del Cd^{2+} resultan de su interacción con elementos esenciales, especialmente aquellos que tienen la misma valencia, tales como el Cu^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} , y Zn^{2+} . Así mismo, se han identificado estrechas relaciones entre Cd^{2+} y Fe^{2+} , Cd^{2+} y Zn^{2+} , y Cd^{2+} y Cu^{2+} , tanto en las raíces como en las hojas de arroz (Liu, *et al.*, 2003).

Estudios sobre las interacciones entre la disponibilidad de azufre y la exposición al Cd, han desvelado que el Cd tiene un papel importante en la síntesis de sustancias complejas basadas en tioles de fitoquelatinas, mediante la regulación positiva de la biosíntesis del glutatión (Astolfi *et al.*, 2004). En trabajos previos se demostró que la presencia del Cd en el medio de cultivo disminuye la concentración de K y Ca en diferentes órganos de las plantas (Kim *et al.*, 2002; Ghnaya *et al.*, 2005). Esta disminución puede deberse a la competición del Cd^{2+} con el Ca^{2+} y otros cationes para entrar en las células de las plantas.

1.2 Regulación de la transcripción en plantas

Las plantas han desarrollado complejos patrones de expresión génica que varían a lo largo de su ciclo de vida y en respuesta a señales externas. El control transcripcional es entre otros el mecanismo más importante mediante el cual se regulan los niveles y la expresión espacio-temporal de un gen (Bemer *et al.*, 2017).

La transcripción de un gen comienza con la formación de un complejo de iniciación por la RNA-polimerasa II y los factores de transcripción en el promotor del gen que se va a transcribir. Inicialmente, se forma lo que se conoce como complejo de pre-iniciación (PIC), que consiste en la unión de la RNA-polimerasa II a los factores transcripcionales basales o generales del complejo TFIID (del inglés *Transcription Initiation Factor IID*), tales como la proteína de unión a la caja TATA (TBP; del inglés *TATA-box Binding Protein*) y algunos factores asociados. A este complejo, se unen además factores transcripcionales que interaccionan específicamente con los elementos reguladores en *cis* (*CRE*) presentes en los promotores de sus genes diana. Estos factores se clasifican en activadores si

incrementan la expresión de un gen, y en represores si la disminuyen. Otra clase de factores transcripcionales son los co-activadores o co-represores, que regulan la transcripción interaccionando con el PIC o con reguladores específicos que se unen al ADN. Además, se pueden unir factores transcripcionales estructurales (cofactores remodeladores o modificadores de la cromatina) que están involucrados en el grado de empaquetamiento del ADN en nucleosomas ó estructuras cromatínicas de orden superior (Martínez, 2002).

La expresión de un gen se regula a través de la acción integrada de muchos elementos *CRE*, localizados en los promotores centrales y elementos próximos a los promotores, así como de varios módulos de regulación en *cis* que están localizados a grandes distancias de los sitios de inicio de la transcripción (TSS; *Transcription Start Sites*) tales como, potenciadores, silenciadores, aisladores y elementos de anclaje. Entre este grupo de elementos, los potenciadores y sus FTs asociados tienen un papel clave en la iniciación de la expresión génica. Los potenciadores son pequeños segmentos de ADN, típicamente de pocos cientos de pares de bases (pb) de longitud, que sirven como plataformas operativas para reclutar FTs a través de secuencias de ADN cortas y específicas (motivos) para regular la transcripción. Estos tienen la capacidad inherente de funcionar de forma modular y autónoma, con algunas excepciones (Revisado en Spitz y Furlong, 2012).

La regulación de los genes en eucariotas ocurre mediante la modulación de la actividad del complejo de la RNA- polimerasa II, a través de interacciones específicas con los distintos factores transcripcionales. La composición de este complejo, unido a un promotor determinado, puede cambiar en respuesta a determinadas señales exógenas o endógenas. De esta forma, se pueden formar un gran número de combinaciones diferentes (control combinatorio de la regulación transcripcional) que regularían la expresión de los distintos genes a distintos tiempos. De acuerdo a esto, un factor de transcripción determinado puede tener distintas funciones, regulando la expresión de diversos genes en respuesta a los estímulos percibidos por la planta o a los procesos fisiológicos de la misma (Bemer *et al.*, 2017).

En especies de plantas como *Arabidopsis*, se estima que más del 7% de sus genes codifican FTs (Revisado en Udvardi *et al.*, 2007), siendo este porcentaje superior al de otros eucariotas tanto unicelulares como pluricelulares, tales como *Saccharomyces cerevisiae*,

Caenorhabditis elegans y *Drosophila melanogaster*, que está alrededor del 3,5% (Shiu *et al.*, 2005).

1.2.1 Factores de transcripción

Los factores de transcripción son proteínas que se unen a secuencias reguladoras del ADN (motivos), localizadas usualmente en la región 5'-aguas arriba de los genes diana, para modular la tasa de la transcripción génica. Esto puede producir un incremento o disminución en la transcripción de los genes, la síntesis de proteínas, y una subsecuente función celular alterada (Adcock y Caramori, 2009).

Los FTs están formados por distintos dominios estructurales, que incluye distintos dominios funcionales: dominios requeridos para su unión a los *CRE*, la regulación transcripcional (dominios de activación y represión), las interacciones proteína-proteína y la localización subcelular, con al menos una señal de localización nuclear (NLS) (Liu *et al.*, 1999). Estos dominios, esenciales para la función de los factores transcripcionales, son descritos a continuación:

- El **dominio de unión al ADN**, reconoce secuencias específicas presentes en los promotores. Los residuos de aminoácidos responsables de esta unión están muy conservados entre todos los FTs de una misma familia y por este motivo, es el principal criterio utilizado para clasificar los FTs.
- El **dominio de activación o represión**, está implicado en reclutar la maquinaria de transcripción directa o indirectamente a través de cofactores. A diferencia del dominio de unión al ADN, el dominio de activación no está bien definido y presenta estructuras muy variadas. Por lo general, son regiones ricas en aminoácidos de carácter ácido (aspártico/glutámico) y en serina/treonina, aunque otras regiones sin estas características también tienen un potente papel activador.
- El **dominio de localización nuclear** (NLS: Señal de Localización Nuclear), es necesario para que los FTs, que son sintetizados en el citoplasma, se transporten al núcleo, donde ejercen su función biológica. La NLS puede ser de tres tipos; 1) una región corta de

aminoácidos básicos; 2) una región corta con carácter hidrofóbico que contiene dos aminoácidos básicos; y 3) dos regiones de aminoácidos básicos separadas por al menos cuatro aminoácidos (Raikhel, 1992).

- El **dominio de oligomerización**, participa en la interacción con otros FTs para formar complejos reguladores que pueden contener dos o más factores.

Los FTs de plantas se han clasificado en distintas familias, de acuerdo a sus dominios de unión al ADN y la similitud de sus secuencias (Tabla 1), y su activación tiene lugar dentro del núcleo, a menudo con el factor de transcripción unido al ADN, o dentro del citoplasma, lo que requiere la exposición de señales de localización nuclear y la orientación al núcleo (Ito *et al.*, 2006).

La regulación de los factores transcripcionales se lleva a cabo a través de distintos mecanismos, entre los que se encuentran: la autorregulación, modificaciones post-traduccionales, la degradación por el proteosoma y autofagosoma, el transporte al núcleo y por microARNs (Schwechheimer *et al.*, 1998; Jones-Rhoades *et al.*, 2006). Distintos estudios han demostrado que las modificaciones post-traduccionales de los factores de transcripción por fosforilación, acetilación y metilación, pueden tener profundos efectos sobre la capacidad de unión al ADN o la actividad transcripcional de un factor de transcripción (Perkins, 2006).

Tabla 1. Familias de factores transcripcionales de plantas (Adaptado de Shiu *et al.*, 2005; González de la Calle., 2014).

FAMILIA	DOMINIO DE UNIÓN AL ADN	SECUENCIA CRE CONSENSO
bZIP	Dominio básico en el extremo N-terminal	5'-RYACGTGKYR-3'
B3	Secuencia conservada de 120 aminoácidos en el extremo C-terminal	5'-CATGCAY-3'
DOF	Dedo de Zinc conformado por cuatro cisteínas con un ion Zn^{2+}	5'-(W)AAAG(S)-3'
AP2	Región de 68 aminoácidos con un dominio conservado que forma una α -hélice antipática	5'-(T)(W)RCCGCC-3' 5'-(T)RYCGAC(A)(T)-3'
MYB	De una a cuatro repeticiones imperfectas de 52 aminoácidos que conforman una hélice-giro-hélice	MYB-R2R3: 5'-HAACHM-3' MYB-R1R2R3 5'-TAACAAAC)-3' MYBR1-SHAQKYF: 5'-TATCCAY-3'
MYC	Cremallera de leucinas en estructura hélice-giro-hélice	5'-CANNTG-3'
C2H2	Dedo de Zinc con dos cisteínas y dos histidinas que unen un ion Zn^{2+}	5'-GGGCGG-3' 5'-CTCCTC-3'
RING-finger	Anillo de Zinc conformado por siete cisteínas y una histidina que unen dos iones Zn^{2+}	-
WRKY	Dedo de Zinc con la secuencia WRKYGQK conservada en la N-terminal	5'-(T)(T)TGAC(Y)-3'
HOMEBOX	Tres o cuatro hélices y un brazo N-terminal con 60 residuos	5'-TAATVATTA 3'
MADS	Motivo de 60 aminoácidos que adquiere una estructura de una α -hélice larga y dos láminas β	5'-TTWCYAWWWWTRGWAA-3'
bHLH	Región rica en residuos básicos, próxima a un motivo hélice-lazo-hélice	5'-CACGTG-3'
GATA	Dedo de Zinc conformado por cuatro cisteínas con un ion Zn^{2+} seguido de una región básica	5'-WGATMR-3'
NF-Y	Dominio de unión al motivo CCAAT similar a histonas	5'-CCAAT-3'
HSF	Hélice-giro-hélice seguida de siete residuos hidrofóbicos	5'-TNGAANNTTCNAG-3'
YABBY	Dedo de Zinc C2-C2, seguido de una estructura hélice-lazo-hélice	-
TCP	Región de 59 aminoácidos que forma la estructura hélice-lazo-hélice	5'-GTGGGNCCNN-3'
GRAS	Motivo pentapartito formado por: un heptámetro de leucinas, el motivo VHID, otro heptámetro de leucinas, el motivo PFYRE y el motivo SAW	-
NAC	Región en el extremo N-terminal dividida en 5 subdominios	-

R=G/A; Y=C/T; W=T/A; S=G/C; M=A/C; K=G/T; H=C/T/A; V=G/C/A; N=A/C/G/T

1.2.2 Familia de factores bZIP en plantas

Los FTs que pertenecen a la familia bZIP (*Basic Leucine Zipper*) están involucrados en numerosos procesos cruciales para los organismos. En plantas, contribuyen a la regulación de procesos fisiológicos y del desarrollo, tales como rutas de respuesta al estrés y hormonas, el control del balance del nitrógeno/carbono, la respuesta a proteínas mal plegadas, la maduración de la semilla y el desarrollo floral, el crecimiento de hojas y raíces, la homeostasis energética y la respuesta a patógenos (Corrêa *et al.*, 2008; Kirchler *et al.*, 2010).

Los bZIP se caracterizan por tener un dominio conservado (dominio bZIP) de 40 a 80 aminoácidos de longitud, que está compuesto por dos motivos: una región básica responsable de la unión específica de estos factores a sus dianas de ADN en la N-terminal, y una cremallera de leucinas requerida para la dimerización de FTs en la C-terminal (Corrêa *et al.*, 2008). Las secuencias diana de los bZIP a menudo consisten en un núcleo ACGT con nucleótidos adyacentes que forman hexámeros palindrómicos o pseudo-palindrómicos. Teniendo en cuenta el nucleótido 3- flanqueante, estas cajas se denominan cajas G (CACGTG), cajas C (GACGTC), etc. Sin embargo, algunos bZIP se unen a otros motivos que no contienen el núcleo ACGT (O'Malley *et al.*, 2016).

La familia bZIP de *Arabidopsis* está compuesta por 78 miembros organizados en 13 grupos (A-M), de acuerdo a la homología de sus secuencias y la estructura de sus dominios (Jakoby *et al.*, 2002; Dröge-Laser *et al.*, 2018). Se han identificado numerosos miembros de la familia de factores bZIP a nivel del genoma completo en otras especies de plantas. Por ejemplo, se han reportado 89 en arroz (Nijhawan *et al.*, 2008), 125 en maíz (Wei *et al.*, 2012), 89 en cebada (Pourabed *et al.*, 2015), 55 en la vid (Liu J. *et al.*, 2014), 69 en tomate (Li *et al.*, 2015) y 96 en *Brachypodium distachyon* (Liu y Chu, 2015). Sin embargo, se conoce la función de un número limitado de los factores bZIP hasta el momento.

Se ha caracterizado en detalle la capacidad de dimerización entre los factores bZIP, para conformar tanto homo- como heterodímeros, y se ha postulado el mecanismo de unión al ADN como homodímeros. Esta unión se logra a través de la interacción de dos segmentos

α -helicoidales, cada uno con siete repeticiones de aminoácidos por giro de ADN (Schütze *et al.*, 2008). Datos estructurales han demostrado que solamente se requieren cinco aminoácidos de cada domino básico para facilitar el contacto con el ADN (Dröge-Laser *et al.*, 2018), pero la evidencia experimental sugiere una mayor complejidad en la dimerización de factores bZIP de plantas, así como en la formación de heterodímeros (Oñate *et al.*, 1999; Ehlert *et al.*, 2006; Weltmeier *et al.*, 2006; Schütze *et al.*, 2008).

1.2.2.1. La red de factores transcripcionales C/S1 de la familia bZIP

Durante los últimos años se han reportado distintos trabajos que proponen que factores bZIP pertenecientes a los grupos C y S1, desempeñan funciones muy importantes en el mantenimiento de la homeostasis de carbohidratos y desarrollo de la semilla, así como en la respuesta a condiciones de estrés promovido por periodos de oscuridad o salinidad (Dietrich *et al.*, 2011; Llorca *et al.*, 2015; Dröge-Laser *et al.*, 2018; Dröge-Laser y Weiste, 2018).

En el genoma de *Arabidopsis*, se han identificado cinco factores bZIP pertenecientes al grupo S1 y cuatro al grupo C (Jakoby *et al.*, 2002). Diferentes estudios utilizando técnicas de unión al ADN y ensayos de dos híbridos en levaduras, han permitido describir que los factores de los grupos C y S1 son capaces de formar tanto homodímeros, como heterodímeros específicos entre ambos grupos. Así, se ha demostrado que los *bZIP9*, *10*, *25* y *63* (grupo C) heterodimerizan con los *bZIP1*, *2*, *11*, *44* y *53* (grupo S1) (Ehlert *et al.*, 2006). En el caso particular de *bZIP53*, se ha demostrado mediante ensayos de doble híbrido en levaduras, *BiFC* (*Bimolecular Fluorescence Complementation*) y ensayos de interacción en protoplastos, que no funciona preferentemente como homodímero, por lo que requiere formar heterodímeros con otros factores para ejercer su papel regulador (Weltmeier *et al.*, 2006).

Aunque aún faltan estudios estructurales detallados, se ha propuesto que la especificidad en la heterodimerización de los bZIP C y S1 radica en el dominio de la cremallera de leucinas excepcionalmente largo, que incluye hasta ocho repeticiones (Ehlert *et al.*, 2006; Llorca *et al.*, 2015). Por todo ello, y debido a la compleja interacción funcional entre estos factores bZIP, se ha propuesto que forman parte de una red reguladora que se ha

denominado "**red bZIP C/S1**" (Weltmeier *et al.*, 2006). Estos hallazgos han fomentado la investigación sobre el impacto funcional de la formación de heterodímeros específicos entre estos bZIP en la última década. En este sentido, hay que destacar trabajos que han evaluado la relación funcional entre dímeros mediante experimentos de mutagénesis, donde se intercambian aminoácidos específicos del dominio de la cremallera de leucinas, encontrando que estas mutaciones, además de promover la interrupción de la estructura α -helicoidal del dominio, interfieren tanto en la heterodimerización entre factores, como en la activación de la expresión de los genes diana (Weltmeier *et al.*, 2006; Alonso, *et al.*, 2009).

Figura 6. Esquema que muestra las posibilidades de heterodimerización entre factores de transcripción bZIP de los grupos C y S1 detectados mediante Y2H. Los miembros del grupo C se representan en color azul y los del grupo S1 en color púrpura (Adaptado de Ehlert *et al.*, 2006).

Genes ortólogos a los bZIP del grupo C de *Arabidopsis* han sido identificados en cereales. El primero fue el gen *Opaque-2* (*O2*) de maíz (Schmidt *et al.*, 1990), seguido de los ortólogos en trigo (Albani *et al.*, 1997) y cebada (Vicente-Carbajosa *et al.*, 1998; Oñate *et al.*, 1999). Los miembros del grupo C relacionados con *O2* de cereales corresponden a los *bZIP10* y *bZIP25*, estos factores se unen de forma específica a los elementos ACGT (*G-box-like*) presentes en los promotores de genes que codifican albúmina y cruciferinas, y están involucrados en la regulación de estos genes diana (Lara *et al.*, 2003). De igual manera, los *bZIP10* y *bZIP25* se expresan durante el desarrollo de la semilla, desde estados muy

tempranos del desarrollo hasta la mitad de la maduración, y luego decae su nivel de expresión conforme avanza la desecación. Mediante ensayos de interacción de doble híbrido de levaduras y EMSA (*Electrophoretic Mobility Shift Assay*), se encontró que los *bZIP10* y *bZIP25* interaccionan físicamente con el *ABI3* (*Abscissic Acid Insensitive 3*), aumentando tanto la unión al ADN *in vitro* de las proteínas bZIP a los promotores de SSPs (*Seed Storage Proteins*), como su capacidad de activación *in vivo* (Lara *et al.*, 2003).

Existen pocos estudios sobre la función de los *bZIP10* y *bZIP25* en otros órganos fuera de la semilla. Sin embargo, el factor *bZIP10* se ha estudiado por su papel en la respuesta al estrés oxidativo. Kaminaka *et al.*, (2006), han demostrado que *bZIP10* es un regulador positivo de la respuesta hipersensible (HR) inducida por patógenos, las respuestas de defensa basal y la muerte celular inducida por oxígeno reactivo. Además, describen que la actividad de *bZIP10* está regulada negativamente por *LSD1* (*Lesions Simulating Disease resistance 1*), una proteína de la familia ZF (*Zinc-Finger*) específica de plantas. *bZIP10* es retenido en el citoplasma por *LSD1* y mediante mecanismos aún desconocidos, es luego liberado de *LSD1* para ser translocado al núcleo y regular la expresión génica en respuesta a patógenos y estrés oxidativo.

1.2.2.1.1. Papel de los factores bZIP-C/S1 en el sistema de respuesta a la baja energía celular

La importancia funcional de la red reguladora bZIP-C/S1 se ha demostrado en distintos trabajos que se han centrado en el estudio de la función de la quinasa metabólica central SnRK1 (Baena-González *et al.*, 2007). Así, se ha reportado que la pareja de quinasas SnRK1 y TOR (*TARGET OF RAPAMYCIN*), constituyen un módulo regulador conservado evolutivamente que controla la homeostasis de la energía de la planta, mediante el control del balance de la oferta y demanda de energía durante el crecimiento, el desarrollo y las respuestas al estrés (Tomé *et al.*, 2014; Li y Sheen, 2016; Dobrenel *et al.*, 2016; Nukarinen *et al.*, 2016).

Análisis transcriptómicos obtenidos a partir de experimentos de expresión transitoria en protoplastos, sugieren que SnRK1 desempeña un papel crucial en las rutas de señalización que controlan la expresión génica en condiciones de limitación de nutrientes y

oscuridad. Es destacable como ejemplo, el caso del gen *ASPARAGINA SINTETASA 1* (*ASN1*) de *Arabidopsis* que esta regulado por SnRK1, ya que se ha demostrado que un elemento *cis* (una caja G) presente en su promotor, es necesario para controlar la transcripción en condiciones de limitación de energía (Baena-González *et al.*, 2007). Teniendo en cuenta que *ASN1* interviene en la biosíntesis de asparagina, y que en *Arabidopsis* es el principal aminoácido transportado en condiciones oscuridad, se ha propuesto que su biosíntesis forma parte del reajuste metabólico de la planta para asegurar la supervivencia frente el estrés. Asimismo, se ha propuesto que factores de la red C/S1 son posibles activadores de *ASN1* dependientes de SnRK1, debido a que las cajas G son sitios clásicos de unión al ADN de muchos bZIP. Este supuesto ha sido demostrado en parte mediante ensayos en protoplastos y de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), donde se ha observado la unión directa de bZIPs del grupo S1 al promotor del gen *ASN1* (Dietrich *et al.*, 2011).

Por otro lado, se ha descrito que distintos miembros del grupo S1 de los bZIPs están implicados en la respuesta de la planta a condiciones de ayuno, y en particular, en el metabolismo de aminoácidos. En este sentido, se ha identificado que el *bZIP1*, y en menor medida el *bZIP53*, se activan tanto a nivel transcripcional como post-transcripcional en respuesta al estrés por baja energía, lo que promueve la transcripción de genes clave en el metabolismo de aminoácidos como la *Prolina Deshidrogenasa* (*ProDH*) y *ASN1*, que resulta finalmente en la acumulación de aminoácidos inducida por el ayuno (Dietrich *et al.*, 2011). Por otro lado, el análisis con líneas de pérdida de función simples y múltiples para los distintos factores C/S1, ha llevado a proponer que factores de esta red de tipo bZIP desempeñan funciones redundantes y cooperan para regular las respuestas al estrés de baja energía en *Arabidopsis* (Dietrich *et al.*, 2011).

Tomado en conjunto, la evidencia experimental sugiere que miembros de la red C/S1 de bZIPs, podrían participar en la señalización mediada por el sensor metabólico SnRK1, bajo condiciones que promueven el estrés por baja energía. Las distintas funciones de los miembros de la red bZIP-C/S1 sobre el metabolismo, crecimiento, desarrollo y respuestas al estrés, se resumen en la Fig. 7.

Figura 7. Funciones y genes diana controlados por la red C/S1 de bZIP de *Arabidopsis*. Se representan los bZIPs pertenecientes a los grupos C (azul) y S1 (naranja). Los factores de dimerización asociados, que aún no están caracterizados están coloreados en gris. Los asteriscos marcan las dianas directas confirmadas mediante la técnica de inmunoprecipitación de la cromatina (Adaptado de Dröge-Laser y Weiste, 2018).

1.2.2.1.2. Participación de la red bZIP-C/S1 en el control de la expresión génica en condiciones de estrés abiótico

Se ha reportado que la limitación de nutrientes y la mayoría de estreses, tanto bióticos como abióticos, tienen un impacto sobre el estado energético de la planta, que conlleva a respuestas que convergen en rutas de señalización comunes y en consecuencia a

respuestas transcripcionales similares (Baena-González y Sheen, 2008). Por este motivo, se ha propuesto que la señalización del módulo SnRK1-C/S1 tiene un papel importante en las respuestas a situaciones de “bajo nivel energético” promovido por distintas condiciones de estrés abiótico.

Estudios previos demostraron que la fitohormona ABA está implicada en la respuesta a distintos tipos de estrés abiótico, y que existe una estrecha conexión entre la señalización mediada por ABA y glucosa, como se ha demostrado utilizando distintos mutantes que afectan ambas rutas de señalización (Finkelstein, 2013). La mayoría de estudios sobre la participación de los bZIP en las respuestas al estrés, han revelado que algunos de ellos se inducen por ABA y regulan la expresión de genes relacionados con el estrés, a través de la interacción con elementos en *cis* reguladores de respuesta al ABA (ABRE) en su región promotora (Kim *et al.*, 2004; Fujita *et al.*, 2011).

Distintos trabajos sugieren que el *bZIP63* integra las señales mediadas por ABA y niveles de glucosa en plántulas, aunque sus mecanismos moleculares no han sido desvelados por completo (Matiolli *et al.*, 2011). Asimismo, se ha determinado que las quinasas SnRK2 y factores bZIP pertenecientes al grupo A, participan en la regulación génica mediada por ABA, y que las rutas de señalización de las SnRK1 y SnRK2 están interconectadas por las mismas fosfatasa (ABI1 y PP2CA), implicadas en la regulación negativa de la señalización mediada por ABA (Finkelstein, 2013; Rodrigues *et al.*, 2013). En el caso de SnRK1, se ha descrito además que juega un papel central en la reprogramación del metabolismo y la adaptación a la salinidad mediada por el *bZIP1* y su homólogo el *bZIP53* en raíces de *Arabidopsis*. En ese estudio se descubrió que factores de los grupos C, S1 y A participan conjuntamente en el control transcripcional de grupos específicos y comunes de genes, en respuesta al estrés salino, lo que sugiere un alto nivel de complejidad en la regulación génica mediada por la señalización de ABA/SnRK2/A-bZIP y el módulo SnRK1-C/S1 (Hartmann *et al.*, 2015).

1.3. Nuevos métodos de estudio de la función génica

1.3.1 Aproximaciones basadas en tecnologías ómicas

En los últimos años, los avances tecnológicos en la biología molecular han permitido el análisis de la función génica en el contexto del genoma completo. Si bien siguen siendo imprescindibles los estudios genéticos, basados fundamentalmente en el análisis de mutantes, la aparición de las tecnologías ómicas ha cambiado el paradigma de análisis e interpretación de la función génica. La utilización y el desarrollo de metodologías post-genómicas, tales como análisis globales de transcriptomas, proteomas y metabolomas integrados en sólidas plataformas bioinformáticas, ha incrementado notablemente nuestro conocimiento y comprensión holística de la función de los genes de las plantas, incluida la respuesta a estreses abióticos (Mochida y Shinozaki, 2011). El análisis basado en sistemas puede involucrar múltiples niveles de complejidad, que van desde orgánulos o células individuales, tejidos y órganos, hasta organismos completos. Estas variables se pueden combinar con múltiples estados de desarrollo e interacciones medioambientales, sugiriendo un gran número de variaciones adicionales (Cramer *et al.*, 2011).

El gran avance en las tecnologías ómicas ha llevado a diseñar mejores experimentos que aporten una visión profunda de la función de los genes y sus efectos sobre el cambio fenotípico en un contexto biológico específico (Jogaiah *et al.*, 2013). Los enfoques de la biología de sistemas, pueden superar algunas barreras que anteriormente bloqueaban la transferencia del conocimiento obtenido desde las plantas modelo como *A. thaliana* a otras especies de plantas económicamente importantes, a la luz del progreso actual en la generación de nuevas secuencias genómicas de especies cultivables y recursos funcionales (Cramer *et al.*, 2011; Nambara y Nonogaki, 2012). Se prevé que esta tendencia continuará en la próxima década gracias al desarrollo actual de recursos funcionales de los cultivos (Nambara y Nonogaki, 2012) y en vista del número creciente de artículos publicados sobre estudios de estrés abiótico en plantas, usando un enfoque de biología de sistemas (Cramer *et al.*, 2011).

La mayoría de estrategias de la biología de sistemas en plantas, se basan en tres ejes principales: transcriptómica, proteómica y metabolómica (Fig. 8).

Además de estos estudios, la interacción entre ADN y proteínas, y los interactomas proteína-proteína, se están usando con éxito para identificar proteínas reguladoras involucradas en respuestas complejas de plantas (Zhang *et al.*, 2010). La bioinformática ha sido clave en cada aspecto de la investigación basada en la ómica, para manejar

efectivamente distintos grupos de datos a escala del genoma, extraer información valiosa y facilitar el intercambio de conocimiento con otros organismos modelo (Mochida *et al.*, 2011; Shinozaki y Sakakibara, 2009).

Figura 8. Esquema general de una aproximación de biología de sistemas comúnmente utilizada para estudiar las respuestas al estrés abiótico en plantas. 2D, Dos dimensiones; MS, Espectrometría de Masas; NMR, Resonancia Magnética Nuclear; GC-MS, Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas (Modificado de Duque *et al.*, 2013).

1.3.1.1 Transcriptómica

La Transcriptómica capta la expresión espacial y temporal de los genes dentro de los tejidos de las plantas o en poblaciones celulares, en un contexto biológico específico (por ej., el genotipo, crecimiento o condición medioambiental). En muchos casos, el análisis transcriptómico se utiliza para rastrear genes candidatos para programas de mejoramiento que buscan obtener plantas tolerantes al estrés abiótico (Jogaiah *et al.*, 2013), o para predecir la función génica putativa mediante la asociación de genes diferencialmente expresados o co-expresados, con la alteración del fenotipo de las plantas (Francki *et al.*, 2012). Los enfoques transcriptómicos deben incorporar mediciones altamente específicas, sensibles y cuantitativas en un gran rango dinámico y flexible, para identificar novedades no anticipadas en las secuencias y estructuras de los transcritos (Lister *et al.*, 2009).

La determinación de perfiles de transcritos a gran escala o la identificación de genes diferencialmente regulados en plantas se puede llevar a cabo mediante varias técnicas, tales como micromatrices de ADN, análisis seriales de la expresión de genes (SAGE) o perfiles digitales de expresión de genes (DGE), aprovechando las herramientas basadas en la secuenciación de nueva generación (NGS), como la secuenciación de ARN (*RNA-seq*) (Lister *et al.*, 2009; Cramer *et al.*, 2011; Jogaiah *et al.*, 2013). Los métodos basados en la hibridización, como los usados en análisis de micromatrices, junto con la disponibilidad de secuencias de genomas completos, el incremento de repositorios públicos de datos de micromatrices y herramientas de análisis de datos, han abierto nuevas vías para el análisis de las respuestas al estrés a nivel del genoma completo (Mochida *et al.*, 2011; Jogaiah *et al.*, 2013).

Los análisis de transcriptomas utilizando tecnologías de micromatrices y *RNA-seq*, han permitido descubrir muchos genes inducibles por estrés que están involucrados en la respuesta y la tolerancia al estrés abiótico (Revisado en Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki, 2006).

1.3.1.2 Proteómica

La proteómica se puede definir como la ciencia que estudia el proteoma, es decir, el conjunto de proteínas expresadas en una célula dada, tejido, órgano, organismo o población. La proteómica se centra normalmente en dos tipos de estudios: 1) La caracterización de un proteoma, en la cual se identifican todas las proteínas expresadas en las células, tejidos, etc.; y 2) La proteómica diferencial, en la cual se compara un proteoma con otro, por ej. en condiciones control frente a un tratamiento, o se comparan perfiles de expresión de proteínas entre diferentes variedades de una especie determinada (Duque *et al.*, 2013).

Dos técnicas de laboratorio son fundamentales en los estudios de proteómica, la electroforesis de proteínas, (en concreto, la electroforesis bidimensional y DIGE, *Difference In Gel Electrophoresis*) y la identificación de proteínas mediante espectrometría de masas. En particular, la proteómica diferencial se ha aplicado ampliamente al estudio de los efectos de distintos estreses abióticos, tales como el déficit hídrico, temperaturas variables o exposición a radiación UV, sobre los órganos y tejidos de las plantas. Los resultados muestran un gran número de proteínas afectadas por estreses abióticos y algunas rutas metabólicas que son posteriormente alteradas, dando una visión general de las consecuencias del estrés abiótico sobre el metabolismo de las plantas (Kosová *et al.*, 2011).

1.3.1.3 Metabolómica

Las plantas sintetizan una amplia gama de compuestos que difieren en su complejidad química y actividad biológica, y desempeñan papeles cruciales en las defensas químicas contra los estreses bióticos y abióticos (Dixon y Strack *et al.*, 2003; Saito y Matsuda *et al.*, 2010). Debido a ello, la metabolómica (estudio del metaboloma o grupo de metabolitos encontrados en un tejido u órgano determinado de la planta) juega un papel importante en la interpretación de las relaciones entre fenotipo y genotipo (Badjakov *et al.*, 2012). El creciente número de publicaciones apoya la idea de que la metabolómica no es solo una nueva ómica, sino una herramienta valiosa para estudiar los fenotipos y sus cambios, inducidos por estreses bióticos y abióticos (Revisado en Badjakov *et al.*, 2012).

Los experimentos de metabolómica comienzan con la adquisición de perfiles de metabolitos a través de tecnologías de separación, basadas en las propiedades fisicoquímicas de cada metabolito (Jogaiah *et al.*, 2013). Debido a las limitaciones de una sola tecnología para detectar todos los compuestos presentes en un organismo, generalmente se recurre a una combinación de múltiples técnicas analíticas, tales como la cromatografía de gases, cromatografía líquida, electroforesis por capilaridad acoplada a espectrometría de masas, y resonancia magnética nuclear, siguiendo protocolos establecidos (Saito y Matsuda *et al.*, 2010; Jogaiah *et al.*, 2013).

Los perfiles metabolómicos de las plantas bajo estrés son una importante aproximación para estudiar los cambios inducidos por estrés en grupos de metabolitos. En la mayoría de estos estudios, los perfiles de metabolitos son analizados en combinación con análisis transcriptómicos, en donde se correlacionan los niveles de metabolitos con un gen determinado que produce una respuesta específica o un fenotipo observado (Urano *et al.*, 2010; Jogaiah *et al.*, 2013). Hace algunos años, la mayoría de los análisis de metabolitos se realizaban en especies modelo como *Arabidopsis* (Cook *et al.*, 2004), pero actualmente estas tecnologías se están utilizando con éxito en forrajes (Sanchez *et al.*, 2012), cereales (Sicher y Barnaby, 2012) y otros cultivos agronómicos (Hernández *et al.*, 2007).

1.3.2. Predicción de la función génica mediante métodos bioinformáticos

1.3.2.1. Análisis *in silico*

Con la creciente generación de datos biológicos, ha aumentado el número de repositorios de información disponibles y herramientas de análisis de datos, que han permitido estudiar la función de genes concretos, tanto a partir de datos generados en experimentos propios, como de datos almacenados en repositorios *on-line*, y realizar comparaciones entre ambos grupos de datos. Dentro de los repositorios de información utilizados con mayor frecuencia en estudios relacionados con la especie *A. thaliana* se encuentran el TAIR (*The Arabidopsis Information Resource*), Araport (*The Arabidopsis Information Portal*), el BAR (*The Bio-Analytic Resource for Plant Biology*) y Genevestigator, aunque en los dos últimos se encuentra información de una gran variedad de especies. En general, estos repositorios

agrupan tanto información como herramientas para procesar y visualizar datos generados en el estudio de *Arabidopsis*, permitiendo realizar búsquedas de grupos de genes para consultar su anotación génica, descripción funcional, perfiles de expresión, productos génicos, interacciones proteína-proteína, participación en rutas metabólicas, entre otros. Además, con base en la descripción y los datos disponibles sobre un gen o grupos de genes relacionados, es posible realizar la predicción de funciones asociadas a genes particulares y obtener representaciones gráficas como mapas de expresión, clústeres, pictogramas y redes (descritas más adelante), que facilitan la interpretación de los datos a través de estas herramientas de visualización.

Entre los análisis *in silico* que aportan mayor información sobre la función génica, el análisis de ontología de genes (OG) es uno de los más utilizados para interpretar datos moleculares obtenidos a partir de estudios transcriptómicos y evaluar funciones asociadas a los grupos de genes identificados. Hay gran variedad de herramientas disponibles para realizar análisis de enriquecimiento de OG, que permiten obtener tanto representaciones gráficas, como información detallada de las anotaciones de genes dentro de tres categorías: Procesos Biológicos (PB), Funciones Moleculares (FM) y Componentes Celulares (CC). En algunas bases de datos, los términos de PB y FM son usualmente listados como funciones y los CC como localización celular ó subcelular. Algunos ejemplos de herramientas *on-line* para el análisis de GO incluyen: *agriGO* (<http://systemsbiology.cau.edu.cn/agriGOv2/>); *REViGO* (<http://revigo.irb.hr>); *Genecodis* (<http://genecodis.cnb.csic.es>); *g:Profiler* (<https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/>); y *DAVID Bioinformatics Resources* (<https://david.ncifcrf.gov>).

1.3.2.2. Utilización de la teoría de redes en el análisis de datos ómicos

La disponibilidad de datos masivos derivados del empleo de las tecnologías ómicas anteriormente descritas, ha conducido a la posibilidad de utilizar nuevos métodos de análisis de datos, entre los cuales la teoría de redes representa un marco ideal de integración propio de la biología de sistemas. En particular, se han podido abordar problemas como el de la asignación de la función génica en una nueva dimensión, fuera de los límites de la genética, donde los análisis de asociación fenotipo-genotipo determinan la capacidad de análisis incluso en las situaciones de mayor complejidad como son los caracteres cuantitativos (QTL).

Alternativamente, en los últimos años se han llevado a cabo distintas aproximaciones bioinformáticas para predecir la función de un gran número de genes con funciones desconocidas o parcialmente descritas, utilizando datos masivos disponibles en repositorios de acceso público. Los métodos basados en la construcción y análisis de redes permiten visualizar fácilmente las distintas conexiones predichas entre grupos de genes, así como la fuerza o el peso de cada gen y sus interacciones en una red particular, facilitando su asociación con funciones o condiciones específicas (Usadel *et al.*, 2009; Liseron-Monfils y Ware, 2015).

De acuerdo a la teoría de grafos, una red refleja todas las relaciones entre los distintos componentes de un sistema. En este caso, los componentes serían los genes o sus productos (transcritos, proteínas o los metabolitos resultantes de las actividades enzimáticas correspondientes), lo que ha conducido al concepto de “metagen”. Además, para llevar a cabo la construcción de una red, se precisa de una función que permita establecer las conexiones entre estos elementos, generando diferentes tipos de redes en función de cuales sean los elementos y funciones consideradas (Liseron-Monfils y Ware, 2015).

En cuanto a la exploración de la función génica se han utilizado distintas clases de redes, basadas fundamentalmente en (1) interacciones moleculares e (2) inferencia de patrones de expresión.

1. Redes de interacciones moleculares: Se construyen normalmente sobre datos que reflejan interacciones físicas entre proteínas (derivados por ejemplo de estudios de interacciones en el sistema de dos híbridos en levaduras, o de aproximaciones proteómicas que detectan interacciones selectivas entre las mismas). Se pueden utilizar igualmente datos de interacción ADN-proteína (por ejemplo, entre promotores de genes y proteínas reguladoras), obtenidos en este caso a partir del sistema de un híbrido en levaduras o de experimentos de inmunoprecipitación de la cromatina. Esta clase de interacciones son particularmente relevantes en la construcción de redes reguladoras. Un tercer tipo de redes de interacción molecular lo constituyen las redes metabólicas, donde de forma experimental o predictiva se recogen interacciones entre diferentes metabolitos y las enzimas que

participan en su interconversión (Bassel *et al.*, 2012).

Entre los repositorios y bases de datos que recogen redes de este tipo se encuentran: *BioGRID*, <https://thebiogrid.org/>; *IntAct*, <https://www.ebi.ac.uk/intact/>; *STRING*, <https://string-db.org/>; *BioCyc*, <https://biocyc.org/>; o el *Bio-Analytic Resource* (BAR), <http://bar.utoronto.ca/>.

2. Inferencia de redes de patrones de expresión: Este tipo de redes se generan a partir de datos de expresión, obtenidos normalmente por cualquiera de las tecnologías ómicas de gran cobertura. La forma más utilizada para relacionar los distintos genes es a través del cálculo de los patrones y valores de coexpresión, para lo cual se han empleado diversas métricas: coeficiente de correlación de Pearson (PCC), modelos gráficos gaussianos (GGM), aproximaciones bayesianas (BNs), ó cálculo de información mutua (MI), entre otras (López-Kleine *et al.*, 2013). De forma general, todas ellas se pueden aplicar dentro de dos estrategias generales, una que reuniría la totalidad de las observaciones (condiciones): condición-independiente, u otra que incluiría un grupo de observaciones previamente seleccionadas: condición-dependiente (por ejemplo: estrés abiótico, tratamientos hormonales, etc.). Se puede destacar que los valores de coexpresión varían considerablemente en función del grupo de observaciones seleccionadas. Una vez calculados los valores de coexpresión para todas las parejas de genes, se puede establecer un nivel de corte selectivo, de este modo se simplifica la construcción de la red, reflejando sólo las interacciones relevantes por encima del corte elegido (Liseron-Monfils y Ware, 2015).

Recientemente se ha propuesto una nueva metodología en la construcción de redes basadas en patrones de expresión, que ha sido aplicada en este trabajo: la construcción de redes *parenclíticas* (Zanin y Boccaletti, 2011). En este procedimiento, en lugar de calcular un índice de coexpresión para cada pareja de genes, se calcula una función que refleje su comportamiento a través de todas las observaciones. Esto proporciona una referencia frente a la cual se puede medir la diferencia del comportamiento real de ambos genes en una condición particular, frente a la predicción esperada (la función de ajuste calculada). Análogamente al procedimiento descrito, a partir de un índice de coexpresión, se podría construir una red tomando un punto de corte para el cual las observaciones reales se

apartan un cierto valor establecido (punto de corte) con respecto a la predicción (función de referencia). Este tipo de redes se ha utilizado con éxito en ámbitos tan diversos como modelos económicos, de tráfico aéreo o sistemas biológicos.

En comparación con las redes de coexpresión, hay varios aspectos destacables en las redes *parenclíticas* que las hacen muy diferentes en su concepto:

1. Una **red de coexpresión** es una **red única**, construida a partir de **n** observaciones, cuyas medidas permiten calcular un índice de coexpresión derivado de todas las observaciones. Sin embargo, las **redes *parenclíticas*** son un conjunto de **redes múltiples**, correspondientes a cada una de las **n** observaciones, en las cuales los valores que relacionan cada pareja de genes no corresponden a un índice derivado de todas las observaciones, sino a una medida de desviación con respecto a la función de ajuste predicha.
2. En una red de coexpresión, dos nodos fuertemente unidos reflejan un alto índice de coexpresión entre los genes correspondientes y un comportamiento semejante a través de las observaciones. Contrariamente, la unión fuerte entre nodos de una red *parenclítica* (correspondiente a una condición **n**) refleja que el comportamiento de ambos en esa condición se aparta de la función esperada para los mismos (predicha a partir de todas las observaciones).

Por todo ello, el poder predictivo de las redes *parenclíticas* radica en que los nodos con una alta centralidad, corresponderían a genes cuyo valor se aparta del esperado y por lo tanto, representarían los genes que se alteran en el sistema como respuesta a una condición particular (Zanin *et al.*, 2014). Podría decirse que una red de coexpresión refleja la “coordinación” de los genes en su comportamiento a través de las distintas condiciones, mientras que en una red *parenclítica* se observa la “descoordinación” de ciertos genes bajo una condición específica, indicando su relevancia funcional en la adaptación del sistema a la misma.

La construcción de redes es una herramienta importante en la asignación de funciones génicas, a partir de datos experimentales derivados de tecnologías ómicas. En particular,

la construcción de redes de coexpresión ha permitido la predicción de nuevas funciones de muchos genes, con base en sus relaciones con otros nodos de función previamente establecida. En este trabajo se ha utilizado la construcción de redes *parenclíticas* como método de identificación de genes relevantes, en la respuesta de las plantas a condiciones de estrés abiótico.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

En las plantas hay diversas familias de factores transcripcionales que regulan de forma específica distintos genes involucrados en procesos importantes para su supervivencia, desde los programas de desarrollo, a la adaptación al medio ambiente modulando respuestas concretas al estrés biótico y abiótico. A pesar de los esfuerzos por desvelar sus funciones y mecanismos de acción, muchos de estos genes son todavía desconocidos o no han sido aún caracterizados en detalle. La creciente producción de datos biológicos generados con las nuevas tecnologías requiere el desarrollo de métodos de análisis de datos y ensayos experimentales para validar las hipótesis generadas. En nuestro grupo de investigación estamos interesados en desarrollar nuevas metodologías que junto con las ya disponibles permitan identificar nuevas funciones de factores transcripcionales.

En este estudio, se utilizaron dos aproximaciones para inferir y verificar las funciones de factores de transcripción relacionados con las respuestas al estrés abiótico en *Arabidopsis*:

- i) La primera está basada en la hipótesis de que reguladores implicados en el desarrollo de la semilla y la tolerancia al estrés hídrico del embrión puedan tener un papel adicional en la respuesta al estrés abiótico en distintos tejidos/órganos en otras fases del desarrollo de la planta.
- ii) La segunda consiste en utilizar una aproximación de biología de sistemas que utiliza un nuevo método bioinformático de generación y representación gráfica de redes. Este método utiliza datos de expresión génica en respuesta a estrés y permite predecir genes candidatos implicados en respuestas adaptativas a condiciones medioambientales concretas.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se plantearon dos objetivos específicos y actividades asociadas, descritos a continuación:

1. Caracterización de nuevas funciones de los factores de transcripción C/S1-bZIP en *Arabidopsis thaliana* en tejido vegetativo, fuera de la semilla, mediante las siguientes actividades:

- Estudio de la expresión de los factores bZIP C/S1.
- Caracterización fenotípica de líneas de pérdida y ganancia de función de los factores bZIP10, 25, 1 y 53 bajo distintas condiciones de estrés abiótico.
- Estudio de los mecanismos de acción de los factores C/S1-bZIP por medio de:
 - Identificación de genes diana y los correspondientes módulos de expresión derivados del análisis de datos transcriptómicos obtenidos por secuenciación masiva de ARN, utilizando mutantes de pérdida de función *bzip10-25* (clase C), *bzip1-53* (clase S1) y *bzip10-25-1-53* (clase C y S1) sometidos a condiciones de estrés osmótico.
 - Caracterización de secuencias de unión al ADN para cada uno de los factores C/S1-bZIP y sus heterodímeros (grupo C y grupo S1), empleando un ensayo de unión de proteína-ADN basado en micromatrices.
 - Estudio de las redes y complejos reguladores en las que participan los bZIPs C/S1, mediante la identificación de nuevos factores transcripcionales que interaccionan con homo y heterodímeros de estos factores.

2. Construcción y análisis de redes génicas mediante la metodología de “Redes parenclíticas” para predecir nuevas relaciones funcionales e identificar genes reguladores involucrados en la respuesta a estrés abiótico en *Arabidopsis*.

- Validación de las predicciones obtenidas mediante análisis *in vivo*.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Material biológico

3.1.1 Cepas bacterianas

- . *Escherichia coli* (*E. coli*) XL1-blue (Stratagene)
- . *Escherichia coli* DH5α (Woodcock *et al.*, 1989)
- . *Escherichia coli* Rosetta™ (DE3) (Novagen®) (Tegel *et al.*, 2010)

3.1.2 Cepas de levaduras

- . *Saccharomyces cerevisiae* (*S. cerevisiae*) pJ694-α (Clontech)
- . *Saccharomyces cerevisiae* YM4271-a (Clontech)

3.1.3 Material Vegetal

En todos los experimentos llevados a cabo en este estudio, se utilizó el genotipo Columbia (*Col-0*) de *Arabidopsis thaliana* como control. Además, se utilizaron mutantes de pérdida de función de los bZIP pertenecientes a los grupos C/S1 (10, 25/ 1, 53), tanto individuales (*bzip10*, *bzip25*, *bzip1* y *bzip53*), como dobles (*bzip10-25*, *bzip1-53* y *bzip10-53*), un triple (*bzip10-25-53*) y el cuádruple (*bzip10-25-1-53*), cuyos códigos Salk se detallan en la Tabla 2. Estos materiales fueron descritos por Dietrich *et al.*, 2011. Asimismo, se analizaron líneas de ganancia de función de los *bZIP10*, *25* y *53*. Las líneas de *bZIP10* y *25* se obtuvieron previamente en el laboratorio del Prof. Jesús Vicente-Carbajosa (Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas UPM – INIA Parque Científico y Tecnológico de la U.P.M.), a partir de plantas *Col-0* transformadas mediante el método de inmersión de botones florales (Clough and Bent, 1998), usando la cepa AgroC58C1 de *A. tumefaciens* para transformar las construcciones *35S::AtbZIP10* (69.1c; 69.1e) y *35S::AtbZIP25* (70.6h; 70.7e), que contienen las regiones codificantes de estos bZIP (CDS; del inglés *Coding DNA Sequence*), fusionadas al promotor constitutivo *CaMV35S* y clonadas previamente en el vector binario pROKII (Baulcombe *et al.*, 1986). En el caso de la línea *35S::HA-AtbZIP53*, fue cedida por el laboratorio del Prof. Wolfgang Dröge-Laser (Julius-Maximilians, Universität Würzburg, Julius-von-Sachs-Institut, Pharmazeutische Biologie).

Para detectar la actividad de la β -glucuronidasa, se utilizaron líneas de *Arabidopsis* transformadas con las siguientes construcciones: *Pro_{AtbZIP10}:GUS*, *Pro_{AtbZIP25}:GUS*, *Pro_{AtbZIP1}:GUS* y *Pro_{AtbZIP53}:GUS*, que contenían el promotor de cada bZIP fusionado a un promotor GUS. Estos materiales fueron descritos por Weltmeier *et al.*, (2006; 2009) y cedidos por el Lab. del Prof. Dröge-Laser. Además, para el ensayo de localización celular de bZIP25, se utilizó la línea *35S::bZIP25-GFP* que fue cedida también por el Lab. del Prof. Dröge-Laser.

Todas las líneas utilizadas en los experimentos estaban en homocigosis y se compararon con *Col-0* (*wt*).

Tabla 2. Líneas de pérdida de función utilizadas en este estudio

Mutante	Código SALK	Sitio de la inserción	<i>Knock-out/Knock-down</i>
<i>bzip1</i>	SALK_059343	ORF	<i>Knock out</i>
<i>bzip10</i>	SALK_106031	3er. Exon	<i>Knock out</i>
<i>bzip25</i>	SALK_119931	1er. Exon	<i>Knock out</i>
<i>bzip53</i>	SALK_069883	5'UTR	<i>Knock-down</i>
<i>bzip10-bzip25</i>	SALK_106031	3er. Exon	<i>Knock out</i>
	SALK_119931	1er. Exon	<i>Knock out</i>
<i>bzip1-bzip53</i>	SALK_059343	ORF	<i>Knock out</i>
	SALK_069883	5'UTR	<i>Knock-down</i>
<i>bzip10-bzip53</i>	SALK_106031	3er. Exon	<i>Knock out</i>
	SALK_069883	5'UTR	<i>Knock-down</i>
<i>bzip10-bzip25-bzip53</i>	SALK_106031	3er. Exon	<i>Knock out</i>
	SALK_119931	1er. Exon	<i>Knock out</i>
	SALK_069883	5'UTR	<i>Knock-down</i>
<i>bzip10-bzip25-bzip1-bzip53</i>	SALK_106031	3er. Exon	<i>Knock out</i>
	SALK_119931	1er. Exon	<i>Knock out</i>
	SALK_059343	ORF	<i>Knock out</i>
	SALK_069883	5'UTR	<i>Knock-down</i>

Para llevar a cabo los experimentos del Capítulo II (redes parenclíticas), se utilizaron líneas inducibles de *Arabidopsis* pertenecientes a la colección de *Transplanta* (Transplanta 2011), junto con el ecotipo *Col-0* usado como control. Cada una de las líneas transgénicas de la colección expresa individualmente un factor de transcripción de *Arabidopsis*, bajo el control de un promotor inducible con β -estradiol.

3.2. Métodos de Cultivo

3.2.1 Cultivo de Bacterias

Las diferentes cepas bacterianas se inocularon en el medio Luria-Bertoni (LB) líquido (10g/L de triptona, 5g/L de extracto de levadura y 10g/L de NaCl, ajustados a pH 7 con NaOH), o en LB sólido (conteniendo además 15g/L de agar), y se incubaron a 37°C durante 16-20h, con agitación constante a 200 rpm en un agitador orbital. En ambos casos se adicionó la cantidad correspondiente de antibióticos al medio de selección (©Duchefa Biochemie): Carbenicilina (75mg/ml), higromicina (40µg/ml), kanamicina (50µg/ml) ó cloranfenicol (34µg/ml).

3.2.2 Cultivo de Levaduras

Las cepas de *S. cerevisiae* se crecieron en los medios YPD e YPAD. Ambos medios tienen componentes similares (20g/L de peptona, 10g/L de extracto de levadura, 2% (p/v) de glucosa, 15ml/L de hemisulfato de adenina al 0,2% (p/v) sólo para el medio YPAD, pH ajustado a 5,8 con HCl al 37% y 18g/L de agar para el medio sólido). Las cepas transformadas con los plásmidos pDEST™22 (*Invitrogen™, Life Technologies*), pDEST™32 (*Invitrogen™, Life Technologies*) y pTFT1 (Egea-Cortines *et al.*, 1999), se cultivaron en los medios selectivos correspondientes de DOB-CSM (medio base-mezcla de suplementos completa), a pH 5,8 ajustado con KOH y 18g/L de agar para el medio sólido. En la Tabla 3 se especifican los distintos compuestos utilizados.

Tabla 3. Componentes de los medios utilizados para seleccionar las cepas transformadas

Nombre	Compañía	Referencia
DOB	<i>MP Biomedicals</i>	4025-012
CSM-LEU	<i>MP Biomedicals</i>	4510-512
CSM-TRP	<i>MP Biomedicals</i>	4511-012
CSM-LEU-TRP	<i>MP Biomedicals</i>	4520-012
CSM-ADE-LEU	<i>MP Biomedicals</i>	4521-522
CSM-HIS-LEU-TRP	<i>MP Biomedicals</i>	4530-112
CSM-ADE-HIS-LEU-TRP	<i>MP Biomedicals</i>	4540-412
Hemisulfato de adenina	Sigma-Aldrich®	A9126

3.2.3 Cultivo de Plantas

Para los experimentos realizados en placa, se utilizaron semillas esterilizadas y estratificadas a 4°C durante 48h para mejorar la uniformidad en la germinación. Las semillas se sembraron en placas de cultivo con sales de MS ½ (medio *Murashige & Skoog*, incluyendo vitaminas Gamborg B5) suplementadas con 0,5x de sacarosa y 0,7% (p/v) de agar (©*Duchefa Biochemie*) para obtener el material de inicio en cada ensayo, y se transfirieron a cámaras de cultivo con condiciones constantes de temperatura (22°C), una humedad relativa del 65% y un fotoperiodo de día largo (16h/8h de luz/oscuridad).

En los ensayos efectuados en suelo, las plantas se crecieron en macetas cuadradas de 8cmx8cmx8cm con turba:vermiculita (3:1), a 22°C de temperatura constante, 65% de humedad relativa y condiciones de día largo.

3.3. Métodos de clonación y transformación

3.3.1 Clonación convencional

La clonación de fragmentos de ADN en los distintos vectores (Tabla 4) se realizó mediante amplificación por PCR (sección 3.8.1) o digestión con endonucleasas de restricción (*Thermo Scientific™*), y la comprobación del tamaño de los fragmentos se llevó a cabo en

geles de agarosa al 0,8% (p/v) (sección 3.10.1). Una vez separados los fragmentos de ADN en los geles de agarosa, se utilizó un bisturí para aislar la sección del gel con el fragmento de interés y se purificó el ADN mediante el *kit* Qiaex II (Qiagen), siguiendo las instrucciones del fabricante.

De acuerdo a los requerimientos, en algunos casos se realizó la defosforilación de los extremos 5'-P con fosfatasa alcalina (*Invitrogen™, Life Technologies*) para evitar la religación de los vectores utilizados en las clonaciones. Además, se realizó la ligación de fragmentos de ADN utilizando un enzima T4-ADN ligasa (*Invitrogen™, Life Technologies*), conservando la proporción molar de 3:1 (inserto:vector). En cada reacción enzimática, se siguieron las recomendaciones del fabricante en cuanto al tiempo y temperatura de incubación con cada enzima, y las construcciones obtenidas se enviaron al servicio de secuenciación de SECUGEN S.L. (CIB, Madrid, España) para su comprobación.

Tabla 4. Vectores utilizados en este estudio

Vector	Utilidad
pGEM®T-easy	Sub-clonación de productos de PCR (<i>Promega</i>)
pENTR™-3C	Clonación de fragmentos para ensayos de protoplastos y de dos híbridos de levadura. Tecnología Gateway (<i>Invitrogen™, Life Technologies</i>)
pDEST™22	Ensayos de dos híbridos de levadura. Tecnología Gateway (<i>Invitrogen™, Life Technologies</i>)
pDEST™32	Ensayos de dos híbridos de levadura. Tecnología Gateway (<i>Invitrogen™, Life Technologies</i>)
pHBTL	Ensayos de protoplastos (Ehlert <i>et al.</i> , 2006)
pTFT1	Ensayos de dos híbridos de levadura (Egea-Cortines <i>et al.</i> , 1999)
pDEST-TH1	Expresión de proteínas. Fusión a la proteína MBP (Hammarström <i>et al.</i> , 2002)
pMAL-c2X	Expresión de proteínas. Fusión a la proteína MBP (<i>New England Biolabs®</i>)

3.3.2 Clonación mediante el sistema *Gateway*®

La tecnología *Gateway*®, inventada y comercializada por *Invitrogen*™, está basada en el sistema de recombinación específica de sitio utilizada por el bacteriófago lambda, para transferir secuencias entre plásmidos que tienen los sitios de recombinación compatibles (*att*) (Hartley, Temple, y Brasch, 2000).

El objetivo principal del sistema *Gateway*® es generar un clon de expresión que requiere generalmente de dos pasos, la clonación del gen de interés en un vector de entrada mediante la reacción BP y la sub-clonación del gen de interés desde dicho vector, en el vector de destino mediante la reacción LR, produciendo el clon de expresión. En el primer paso, el gen de interés clonado en el vector de entrada, está flanqueado por los sitios de recombinación *attL1* y *attL2*. Este vector es transcripcionalmente silencioso y contiene el gen para la resistencia a la kanamicina (Km^r). Para producir el clon de expresión, el gen debe ser sub-clonado en un vector de destino que contiene las secuencias necesarias para la expresión, el gen para la resistencia a la ampicilina (Ap^r), y dos sitios de recombinación (*attR1* and *attR2*) que flanquean un gen para la selección negativa, *ccdB* (la proteína codificada es tóxica para las cepas estándar de *E. coli*). Para terminar la reacción, los dos plásmidos (vectores de entrada y de destino) se mezclan y se adiciona la mezcla del enzima LR Clonasa. Esta reacción es direccional y específica, de modo que *attL1* solamente reacciona con *attR1* y *attL2* con *attR2*. La recombinación produce dos construcciones: el clon de expresión requerido y el subproducto, donde el clon de expresión producido está bajo dos formas de selección que incluyen, la resistencia al antibiótico y la selección negativa por la proteína tóxica *ccdB*.

Las reacciones de clonación efectuadas con el sistema *Gateway*®, se llevaron a cabo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las construcciones generadas se verificaron mediante secuenciación en el servicio de SECUGEN S.L. (CIB, Madrid, España).

3.3.3 Verificación de clonajes

Para confirmar si los insertos de ADN se introdujeron correctamente en el vector elegido, se llevaron a cabo dos procedimientos. Primero se realizó la digestión del ADN utilizando enzimas de restricción específicas para confirmar la integridad de las construcciones de

manera rápida, para ello se usaron endonucleasas de restricción tipo II con los tampones suministrados por el fabricante y se realizaron electroforesis en gel de agarosa al 0,8% (p/v)(sección 3.10.1) para visualizar el tamaño de los fragmentos. Una vez comprobado el tamaño de los plásmidos que contienen cada inserto, se realizó la secuenciación de doble hebra de ADN a través del servicio de SECUGEN S.L. (CIB, Madrid, España).

3.3.4 Transformación de células competentes (bacterias)

Se utilizaron células competentes de distintas cepas bacterianas de *E. coli* (Sección 3.1.1) dependiendo de cada procedimiento (confirmación de insertos de ADN, XL1-blue; expresión de proteínas, DH5α y Rosetta™(DE3)). Las transformaciones se realizaron mediante choque térmico utilizando alícuotas de 200μl de células competentes, se adicionaron 50 a 100ng de ADN plasmídico o el volumen correspondiente a una reacción de ligación o recombinación, se incubó la mezcla durante 30 min en hielo, se realizó un choque térmico incubando a 42°C durante un min y 40 s y enfriando en hielo durante cinco min. Se añadieron 500μl de medio LB líquido para recuperar las células e incubarlas a 37°C con agitación constante durante una hora. Las células transformadas se plaquearon en placas petri con medio LB sólido conteniendo los antibióticos apropiados y se crecieron a 37°C durante toda la noche.

3.3.5 Transformación de levaduras

La transformación genética de *S. cerevisiae* se llevó a cabo mediante el método del polietilenglicol (PEG) (Gietz y Woods, 2002). A partir de un cultivo saturado en YPAD líquido (DO 1,5-2,0), se colectaron las células por centrifugación (1ml por transformación), se resuspendió el precipitado en 1ml de acetato de litio (AcLi) a 100mM mediante vórtex y se incubó durante 5 min a 30°C. En una segunda centrifugación, se colectaron de nuevo las células y se añadieron los siguientes componentes conservando el orden: 240μl de PEG al 50% (p/v), 36μl de 1M de AcLi, 25μl de una solución de 2mg/ml de ADN de esperma de salmón previamente desnaturalizado (*Sigma-Aldrich*®) y 500ng-1μg de las distintas construcciones de ADN plasmídico. La mezcla se agitó usando un vórtex y se incubó a 42°C durante 20 min y luego a temperatura ambiente durante toda la noche. Finalmente, las células se plaquearon en el medio selectivo carente de los aminoácidos para los que las

levaduras transformadas presentaban auxotrofía, y se crecieron a 28°C durante dos a tres días.

3.4. Aislamiento y cuantificación de ácidos nucleicos

3.4.1 Aislamiento de ADN plasmídico

La extracción de ADN de los plásmidos multiplicados en *E. coli*, se realizó a pequeña escala mediante mini-preparaciones, a partir de cultivos crecidos en 5ml de LB, inoculados con colonias individuales e incubados a 37°C durante toda la noche con agitación constante. Para la purificación, se transfirieron 2ml de los cultivos a tubos estériles y se colectaron las bacterias por centrifugación, se descartó el sobrenadante y se repitió este paso para colectar las células de un volumen total de 4ml. Las células colectadas fueron tratadas con el *kit* comercial GeneJET Plasmid Miniprep (*Thermo Scientific™*), basado en la lisis alcalina y retención de ADN plasmídico en una membrana de sílice, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El ADN obtenido se almacenó a -20°C hasta su utilización.

3.4.2 Aislamiento de ADN genómico

El ADN genómico se aisló a partir de tejido foliar congelado en nitrógeno líquido (N₂) y almacenado a -80°C. Se introdujo aprox. 1g de tejido previamente pulverizado con N₂ líquido, en tubos de 2ml, se adicionaron 500µl de tampón de extracción (100mM de Tris-HCl a pH 8, 50mM de EDTA, 500mM de NaCl y 10mM de β-mercaptoetanol) y 500µl de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1; v/v/v). Se mezclaron las muestras usando un vórtex durante 10-15 s, se centrifugaron durante 20 min a 13000 rpm, se recogió el sobrenadante, se transfirió a un tubo nuevo y se añadieron 500µl de isopropanol para precipitar el ADN a -20°C durante 1 hora. Posteriormente, se centrifugaron las muestras durante 20 min a 13000 rpm, se lavó el precipitado con 500µl de etanol al 70% (v/v), se removió el sobrenadante y se dejó evaporar el etanol restante para resuspender el precipitado en 50µl de tampón TE (10mM Tris-HCl pH 8.0 y 1mM EDTA).

3.4.3 Aislamiento de ARN total

Para obtener el ARN total requerido para la síntesis de ADNc y las qRT-PCRs, se utilizó el procedimiento descrito por Oñate-Sánchez y Vicente-Carbajosa (2008). Para ello, se pulverizaron las muestras de hojas o plántulas completas de *Arabidopsis* (dependiendo del experimento) con N₂ líquido y se dispensaron aprox. 300mg de tejido macerado en tubos estériles de 2ml, se adicionaron 600µl de fenol y 600µl de tampón de extracción (200mM de Tris HCl (pH 9); 0,4M de CILi; 25mM de EDTA; 1% (p/v) de SDS). Las muestras se agitaron dos veces usando un vórtex y se centrifugaron 2 min a 13000 rpm, se transfirió la fase acuosa a un tubo nuevo y se mezcló con 600µl de fenol mediante vórtex. Las muestras se centrifugaron nuevamente durante 2 min a 13000 rpm para transferir la fase acuosa a un tubo nuevo, se adicionaron 600µl de cloroformo, se agitaron las muestras en un vórtex y se centrifugaron durante 2 min a 13000 rpm. Se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo midiendo el volumen transferido con una micropipeta. La medición del volumen permitió calcular la cantidad requerida de 8M de CILi (1/3 del volumen transferido). Una vez se adicionó el CILi, se agitó la mezcla dos veces usando un vórtex y se enfrió en una cubeta con hielo guardada a 4°C durante al menos 2h. Después de este tiempo, las muestras se centrifugaron durante 30 min a 13000 rpm y 4°C, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el precipitado en 300µl de agua Milli-Q estéril, 30µl de 3M de acetato de sodio y 600µl de EtOH al 96% (v/v), se agitaron los tubos 4-5 veces por inversión manual y se enfriaron a -20°C durante toda la noche. Al día siguiente se centrifugaron las muestras durante 20 min a 13000 rpm y 4°C, se descartó el sobrenadante cuidadosamente y se lavaron las muestras con 150µl de EtOH frío al 80% (v/v), se desechó de nuevo el sobrenadante y se dejó secar el precipitado a temperatura ambiente. Finalmente se resuspendió el ARN en 30µl de agua Milli-Q estéril.

Por otra parte, el ARN obtenido para la cuantificación de transcritos realizada mediante el método del *RNA-Seq*, se aisló a partir de aprox. 100mg de plántulas pulverizadas con N₂ líquido, utilizando el kit comercial *RNeasy Plant Mini Kit* (Qiagen®), de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

En ambos métodos de aislamiento, el ARN purificado se trató con el enzima *RQ1 RNase-Free DNase* (*Promega*), para eliminar las trazas de ADN siguiendo el protocolo del proveedor, se verificó la calidad del mismo en un gel de agarosa al 1,5% (p/v) (sección 3.10.1), se cuantificó (sección 3.6) y se guardó a -80°C para su conservación.

3.4.4. Cuantificación de ácidos nucleicos

La concentración de ácidos nucleicos se cuantificó mediante la medición de la absorbancia de UV a 260nm, utilizando el espectrofotómetro Nanodrop® ND-1000 V3.1.2 (*NanoDrop Technologies*, Wilmington, USA). La unidad de absorbancia a 260nm equivale a 40µg/µl de ARN y 50µg/µl de ADN. Por el contrario, la absorbancia a 280nm, indica una posible contaminación con proteínas y compuestos fenólicos, razón por la cual, para asegurar la buena calidad de ambos ácidos nucleicos, la relación de la absorbancia de 260/280 debe estar entre 1,8 y 2,0 (Sambrook y Russell 2001).

Para verificar la calidad del ARN, se realizó además la medición del RIN (del inglés *RNA Integrity Number*) y del ratio *28S:18S*, usando el *Bioanalyzer* Agilent 2100 (CNB-CSIC). Estos parámetros debían tener valores ≥ 7 y ≥ 1 , respectivamente, para poder ser utilizados en el análisis transcriptómico.

3.5. Amplificación de ácidos nucleicos

3.5.1 PCR convencional

La amplificación de fragmentos de ADN mediante PCR convencional, se llevó a cabo mediante una reacción en la que se incluyeron un cebador sentido y uno antisentido a una concentración de 0,5µM c/u, la mezcla de los cuatro dNTPs (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) a una concentración de 0,25mM, 1X de tampón de reacción que incluye MgCl₂, 0,4U de la DreamTaq DNA Polimerasa (5U/µl) (*Thermo Scientific*™, Ref. #EP0703), 50ng de ADN plasmídico o 50-100ng de ADN genómico, y agua Milli-Q estéril hasta un volumen final de 15µl. Las PCRs se llevaron a cabo en un termociclador Bio-Rad C-1000 (*Bio-Rad Labs.*), utilizando las siguientes condiciones de amplificación: Una desnaturalización inicial de 5

min a 94°C, 30 ciclos de 30 s a 94°C para desnaturalizar, 40 s a 55°C-65°C para el anillamiento de los cebadores y 1-2 min a 72°C para la extensión, más una extensión final de 5 min a 72°C. En la Tabla 5 se muestran las secuencias de los cebadores utilizados en cada PCR.

Tabla 5. Listado de cebadores utilizados en las PCRs

Nombre	Secuencia
bZIP1 malE F	5'-GGATCCATGGCAAACGCAGAGAAGACA
bZIP1 malE R	5'-CTGCAGTCATGTCTTAAAGGACGCCAT
MBP F	5'-TGCCGTGCGTACTGCGGTGATCA
Salk_061811 F	5'-CTGCTGCCATTCTCATTCTTC
Salk_061811 R	5'-CAATTTCTCCGTTCTCTGCTG
CBF2 F	5'-GAATTCATGAACTCATTTTCT
CBF2 R	5'-GTCGACTTAATAGCTCCATAA
ATERF4 F	5'-GAATTCATGGCCAAGATGGGC
ATERF4 R	5'-GTCGACTCAGGCCTGTTCCGA
Drfp F	5'-GAATTCATGGATTCCGATTCA
Drfp R	5'-GTCGACTTATAAGCTGTCATC
DREB sub A-2 F	5'-GAATTCATGCCCAGGAAACGG
DREB sub A-2 R	5'-GTCGACCTAGTCTGACCTGAC

3.5.2 Síntesis de ADNc

El ADNc de cadena sencilla se sintetizó a partir de 1µg de ARN total de las muestras aisladas (hojas o plántulas de *Arabidopsis*), usando el *kit AMV Reverse Transcriptase* [AMV-RT (*Promega*)] y el cebador Oligo(dT)₁₈ (*Thermo Scientific™*), de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

3.5.3 Análisis de expresión mediante PCR cuantitativa a tiempo real qRT-PCR

Los análisis de las qRT- PCRs se realizaron por medio del sistema de detección de PCR en tiempo real CFX96 Touch™ (*Bio-Rad Labs.*), utilizando el fluoróforo SYBR-Green®. Se utilizaron placas de 96 pocillos para llevar a cabo las reacciones en un volumen total de 20µl por pocillo al que se añadieron: 10µl de FastStart Universal SYBR Green Master-Rox

(Roche Molecular Systems), 6µl de la mezcla de cebadores 1µM, 1µl del ADNc y 3µl de H₂O Milli-Q. Todos los ensayos se llevaron a cabo con tres réplicas biológicas y al menos dos réplicas técnicas, y para cada par de cebadores se utilizaron blancos donde se añadió 1µl de H₂O Milli-Q en lugar de ADNc. Para cada gen se utilizaron cebadores específicos (Tabla 6) diseñados con el programa *Primer3Plus* (Untergasser *et al.*, 2007) y la ubiquitina (*UBQ*) como gen de referencia.

El análisis y normalización de los datos de las qRT-PCRs se realizó manualmente utilizando el programa Excel, de acuerdo a lo siguiente:

- Cálculo de la media y desviación estándar para cada muestra.
- Normalización de las muestras control y tratamiento con su respectivo gen de referencia (*UBQ*), mediante el cálculo del valor ΔC_t , donde C_t (del inglés *Cycle threshold*) corresponde al número de ciclo de la PCR en el cual el amplicón alcanza la fase exponencial.
- Comparación del valor ΔC_t normalizado entre el tratamiento y control, obteniendo el valor $\Delta\Delta C_t$.
- Cálculo del nivel de expresión del Gen(X) = $2^{-\Delta C_t \text{ Gen(X) Normalizado}}$
- Cálculo del *Fold-change* para medir el cambio en el nivel de expresión del gen, se calcula como $2^{-(1*(\Delta\Delta C_t))}$.

Tabla 6. Cebadores utilizados en las qRT-PCRs

Nombre	Secuencia
UBQ.F	5'-GCTCTTATCAAAGGACCTTCG
UBQ.R	5'-CGAACTTGAGGAGGTTGCAAA
RT.bZIP1.F	5'-ACTCGGTCGAAACGGAGAAC
RT.bZIP1.R	5'-ACAATCGCCACCACCACT
RT.bZIP10.F	5'-GTTGTTTCTCTTCGGGTTGG
RT.bZIP10.R	5'-TTCTCCTGGGGTCATCAAAG
RT.bZIP25.F	5'-GTCGTGTGGGAAGTGTGAAA
RT.bZIP25.R	5'-TTCTTTTGCGTGCTTGTTGT
RT.bZIP53.F	5'-TGAGGGCACAGGCTTCGGAGT
RT.bZIP53.R	5'-AAGGCATCTGCCAAGGGTTCTGC

3.6. Expresión y purificación de proteínas

Para la expresión de proteínas, se realizó por separado el pre-cultivo de tres colonias individuales previamente obtenidas en la transformación de la cepa Rosetta™(DE3) (Novagen®) de *E.coli* con las construcciones de cada bZIP fusionado a la MBP (del inglés *Maltose Binding Protein*) (sección 3.14). Cada colonia se inoculó en 5ml de medio 2XYT (16 g/L de triptona, 10 g/L de extracto de levadura y 5 g/L de NaCl a pH 7.0) conteniendo 75mg/ml de carbenicilina y se incubó a 37°C durante toda la noche a 200 rpm. Se seleccionó un tubo por construcción con pre-cultivo saturado, para inocular 500µl en un matraz con 500ml de medio 2XYT conteniendo 0,2% de glucosa y 75mg/ml de carbenicilina, que se incubó a 37°C y 280 rpm hasta una OD₆₀₀ de ~0,5. Se realizó la inducción de las proteínas añadiendo IPTG (Isopropil β-D-1-thiogalactopiranosido) a una concentración final de 0,3mM e incubando durante tres horas a 30°C y 280 rpm. Se colectaron las células mediante centrifugación a 4.000x *g* durante 20 min y se descartó el sobrenadante para resuspenderlas en 10ml de buffer de columna (20mM de Tris-HCl, 200mM de NaCl y 1mM de EDTA). Se congelaron las muestras durante toda la noche a -20°C, se descongelaron en agua fría y se transfirieron a un baño de agua-hielo para sonicarlas en pulsos cortos de 15 s hasta completar 1-2 min. Se centrifugaron a 20.000 x *g* durante 20 min, se guardó el sobrenadante (extracto crudo) y se diluyó una fracción del extracto crudo en una proporción de 1:6 en buffer de columna. Se vertió 1ml de resina de amilosa (*New England Biolabs*®, Ref. #E8021S) en una columna de 2,5 x 10cm para cada muestra, y se hicieron lavados con 5 volúmenes de buffer de columna. Se adicionó el extracto crudo diluido y se incubó con la resina durante 1h a 4°C con agitación leve por inversión, antes de dejar pasar el extracto a través de la columna. Se hicieron lavados con 12 volúmenes de buffer de columna y se eluyó la proteína de fusión usando buffer de columna supl. con 10mM de maltosa, donde se colectaron 10 fracciones de 2ml c/u.

La cantidad de proteína total en cada fracción se determinó por el método de Bradford (1976) utilizando albúmina de suero bovino (BSA) como estándar. Las proteínas cuantificadas se almacenaron a 4°C y se comprobó el tamaño de cada proteína fusionada mediante una electroforesis en gel de poliacrilamida -SDS (SDS-PAGE) al 10% (sección 3.10.2), y un *Western-blot*, usando el anticuerpo monoclonal *anti-MBP* 1:30.000 (*New*

England Biolabs®, Ref. #E8032S) y un anticuerpo secundario *anti-Mouse IgG* 1:10.000 (*Thermo Scientific™*), de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

3.7. Técnicas electroforéticas

3.7.1 Electroforesis en geles de agarosa

Las muestras de ADN y los fragmentos amplificados por PCR se verificaron en geles de agarosa (0,8%-1,5% p/v, dependiendo del tamaño de los fragmentos), en tampón TAE 1X (40mM de Tris-Acetato y 1mM de EDTA a pH 8) más bromuro de etidio al 0,3% (p/v).

En el caso de las muestras de ARN, se separaron en geles de agarosa al 1,5% p/v, en tampón TAE 1X preparado con H₂O Milli-Q tratada con DEPC (dietilpirocarbonato) más bromuro de etidio al 3%.

Ambos ácidos nucleicos se visualizaron usando luz ultravioleta y en el caso del ADN, se estimó el tamaño de los fragmentos utilizando marcadores comerciales estándar, el GeneRuler™ Express DNA Ladder (SM1551) y GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder (SM0321) de *Thermo Scientific™*.

3.7.2 Electroforesis SDS-PAGE

La separación de proteínas se realizó en geles de poliacrilamida al 10% (p/v; acrilamida: N-N' metilenbisacrilamida, 37,5:1, p/p) en tampón 1M de Tris-HCl a pH 8,8, polimerizados con TEMED (N, N, N', N' - Tetramethylethylenediamine) al 0,05% (v/v) y persulfato de amonio al 0,05% (v/v). Las muestras se mezclaron con un tampón de carga para proteínas (60mM de Tris-HCl a pH 6,8, glicerol al 34,8% (v/v), SDS al 2% (p/v), 2-β-mercaptoetanol al 0,07% (v/v) y azul de bromofenol al 0,01% (p/v)), se desnaturalizaron a 95°C durante 5 min y se corrieron durante 2h a 30mA en el tampón de electroforesis (3 g/L de Tris base, 14,4 g/L de glicina y 1 g/L de SDS a pH 8,3), utilizando el sistema *Mini-PROTEAN Tetra Cell system* (*Bio-Rad Labs.*). Se utilizó un marcador de peso comercial para estimar el tamaño de los fragmentos (PageRuler™ Unstained Broad Range Protein Ladder de *Thermo Scientific™*, Ref. 26630) y para visualizar las proteínas, se tiñeron los geles durante una hora con azul de Coomassie R-250 al 1% (p/v) en metanol al 50% (v/v) y ácido acético al 10% (v/v), y

después se destiñeron con metanol al 50% (v/v) y ácido acético al 10% (v/v) para eliminar el fondo teñido. Se tomaron fotografías de los geles sobre un transiluminador de luz blanca.

3.8. Análisis histoquímico

3.8.1 Detección de actividad de la β -glucuronidasa en líneas transgénicas

Se llevó a cabo un análisis histoquímico de la actividad β -glucuronidasa en líneas de *Arabidopsis* transformadas con las construcciones *Pro_{bZIP}:GUS* (sección 3.1.3). Estas líneas se crecieron en el medio control (MS ½ con 0,5x sac.) y se transfirieron a los cinco días de crecimiento a los medios control y tratamiento (MS ½ supl. con 0,5x sac. y 300mM de manitol). La tinción GUS se realizó con 2mM de X-Gluc, de acuerdo al protocolo descrito por Jefferson *et al.* (1987), después de 24h de tratamiento. Para ello se colectaron diez plántulas por genotipo y se distribuyeron de a dos plántulas en tubos de 2ml conteniendo 1ml de la solución de tinción GUS [100mM del tampón fosfato de sodio a pH 7.0, 0,5M de EDTA a pH 8.0, 20% (v/v) de tritón X-100 y 20mM de X-Gluc (Duchefa)]. Se incubaron a 37°C en oscuridad durante toda la noche, se descartó la solución GUS y se realizaron lavados consecutivos con diferentes concentraciones de etanol [(10%, 30%, 70% y 100% (v/v))], incubando las muestras durante una hora con cada una de ellas.

Las plántulas teñidas se visualizaron utilizando el estereoscopio LEICA MZ10F (©Leica Microsystems) y el registro fotográfico se realizó con la cámara CCD de color Leica DFC 400C de 5 megapíxeles.

3.9 Evaluación de la tolerancia al estrés abiótico

3.9.1 Ensayo de tolerancia a sequía (déficit de riego)

Para evaluar la respuesta a la deshidratación de las distintas líneas de pérdida y ganancia de función descritas anteriormente, se analizaron sus fenotipos y se compararon con *Col-0*, después de someter 12 plantas transgénicas de tres semanas crecidas en el sustrato turba:vermiculita (3:1) a 22°C en condiciones de día largo, a un periodo de deshidratación de 15 días (sin riego), seguido de dos semanas de recuperación (riego). Se observaron los

fenotipos de las plantas después de la deshidratación, señalando como sensibles o tolerantes, aquellas plantas con menor o mayor tolerancia que *Col-0* respectivamente, y se calculó la tasa de supervivencia para cada genotipo después del periodo de recuperación, teniendo en cuenta el número de plantas vivas al final del experimento con respecto al número inicial de plantas usadas por genotipo. Este experimento se repitió tres veces para verificar la reproducibilidad de los resultados.

3.9.2 Ensayo de deshidratación

Para medir la pérdida de agua por transpiración, se calculó la pérdida de peso fresco durante un periodo de tiempo corto (0-3h) de todas las líneas utilizadas en el experimento anterior. Para llevar a cabo este ensayo, se registró el peso inicial de la parte aérea (partiendo de 0,5-1g) de plantas de tres semanas crecidas en turba:vermiculita (3:1) a 22°C bajo condiciones de día largo, luego se midió su peso cada diez minutos hasta completar una hora, su peso después de dos y tres horas, y se calculó la tasa de pérdida de peso fresco para todas las líneas evaluadas, como fue sugerido por Yoshida *et al.*, 2002.

3.9.3 Ensayo de estrés osmótico

Para evaluar la respuesta a la deshidratación inducida por un agente osmótico se utilizó el manitol ($C_6H_{14}O_6$) de ©Duchefa Biochemie (Ref. M0803). En este ensayo, se utilizaron plántulas de 5 días crecidas en el medio MS $\frac{1}{2}$ con 0.5x de sacarosa a un pH 5,7, que fueron transferidas con pinzas estériles a placas con MS $\frac{1}{2}$ y 0.5x de sacarosa, suplementadas con 0mM, 200mM y 300mM de manitol, y se ubicaron verticalmente durante 10 días en una cámara de crecimiento *in vitro* en condiciones controladas (22°C, periodo de día largo). Después de este periodo, se tomaron fotos de estas plantas con una cámara digital, para detectar fenotipos y medir la longitud de la raíz primaria utilizando el software *ImageJ* 1.46r (Abràmoff *et al.*, 2004).

3.9.4 Ensayo de estrés oxidativo

En este ensayo se evaluó la respuesta de las líneas antes descritas, al estrés oxidativo promovido por tratamientos con cadmio (Cd). Se usaron plántulas de 5 días crecidas en medio MS ½ con 0.5x de sacarosa para ser transferidas a placas con MS ½ suplementado con 0.5x de sacarosa y 0µM, 85µM y 100µM de CdSO₄ (Sulfato de cadmio) de *SIGMA-Aldrich*® (Ref. 481882). Las placas fueron colocadas verticalmente durante 12 días en una cámara de crecimiento (22°C, periodo de día largo) y las mediciones se realizaron como se describió en el ensayo anterior.

3.10. Análisis de expresión génica

3.10.1 Análisis transcriptómicos mediante secuenciación masiva de ARN (*RNA-Seq*)

Para el análisis transcriptómico de los C/S1-bZIP mediante *RNA-Seq*, se realizó la extracción de ARN de los siguientes mutantes de pérdida de función de bZIPs usados en experimentos anteriores; dos mutantes dobles (*bzip10-bzip25*; *bzip1-bzip53*), un cuádruple mutante (*bzip10-bzip25-bzip1-bzip53*) y *Col-0* (wt), después de transferir plántulas de cinco días a los medios control (MS ½ con 0,5x sac.) y tratamiento (MS ½ supl. con 0,5x sac. y 300mM de manitol), y crecerlas en posición vertical a 22°C y 16h/8h de luz/oscuridad, durante 10 días más. Después de este periodo, las plantas se colectaron, pulverizaron con N₂ líquido y se congelaron a -80°C hasta la extracción de ARN. El ARN se aisló usando un *kit* comercial (sección 3.5.3), se cuantificó su concentración (sección 3.6) y se midieron el RIN y el ratio *28S:18S* (sección 3.6). Además, se comprobó la ausencia de ADN en las muestras purificadas, mediante una PCR utilizando cebadores específicos (Salk_061811, Tabla 4) que amplifican un fragmento de un intron de *Arabidopsis*, y mediante una electroforesis en gel de agarosa al 0,8% (p/v) (sección 3.10.1) para visualizar los fragmentos amplificados. Se enviaron 40µg por cada muestra al Instituto de Genómica de Beijing (BGI-Hong Kong; www.genomics.cn), donde llevaron a cabo la cuantificación de transcritos, bajo condiciones control (MS) y de estrés osmótico (Osmo), mediante el método del *RNA-Seq*. Las comparaciones seleccionadas para el análisis bioinformático realizado por el BGI fueron las siguientes: Wt_MS vs Wt_Osmo; C_MS vs C_Osmo; S_MS vs

S_Osmo y CS_MS vs CS_Osmo, además de Wt_MS vs C_MS; Wt_MS vs S_MS; Wt_MS vs CS_MS; Wt_Osmo vs C_Osmo; Wt_Osmo vs S_Osmo y Wt_Osmo vs CS_Osmo, donde C, S y CS corresponden a los mutantes *bzip10-bzip25*, *bzip1-bzip53* y *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53*, respectivamente, y Wt a *Col-0*. Los datos obtenidos se analizaron teniendo en cuenta los genes diferencialmente expresados (GDE), revelados tras la comparación por pares de muestras analizadas y filtrados mediante los valores del FDR $\leq 0,001$ (del inglés *False Discovery Rate*), $p\text{-value} \leq 0,01$ y $\log_2\text{-Ratio} \geq 1$.

3.10.2 Análisis de la expresión de los bZIP C/S1 en respuesta a tratamientos de estrés abiótico

Para evaluar los niveles de expresión de los bZIP en respuesta al estrés abiótico, se utilizaron plántulas de cinco días de *Arabidopsis* (*Col-0*) que fueron sometidas a tratamientos de estrés osmótico inducido por 300mM de manitol ($C_6H_{14}O_6$) durante 3h, 6h y 24h, o fueron tratadas con 20 μ M de la fitohormona ácido abscísico (ABA) durante 1h, 2h, 3h y 4h. Para el tratamiento de sequía, se emplearon plantas de tres semanas crecidas en turba:vermiculita (3:1), se separaron las raíces de la parte aérea (rosetas), dejando deshidratar esta última sobre placas petri vacías para colectar hojas a las 0h, 3h y 6h de deshidratación. Además, se analizaron las muestras de *Col-0* tratadas con 300mM de manitol que se enviaron al BGI-Hong Kong para el experimento del *RNA-Seq* (plántulas de cinco días tratadas durante 10 días), para comprobar la expresión de los C/S1-bZIP en el *wt* bajo estrés osmótico. Las muestras tratadas y no tratadas (controles; 0h) se colectaron, pulverizaron con N_2 líquido, se extrajo el ARN de las mismas mediante el procedimiento descrito por Oñate-Sánchez y Vicente-Carbajosa (2008), o con un *kit* comercial (sección 3.5.3) en el caso de las *Col-0* usadas para el *RNA-Seq*. Se sintetizó el ADNc (sección 3.7) y se realizó la cuantificación de transcritos mediante qRT-PCR (sección 3.8.2).

3.11. Análisis de dianas de unión al ADN de homo y heterodímeros de los factores bZIP C/S1

Para detectar las dianas de unión de los bZIP C/S1, se prepararon las construcciones de cada *bZIP* fusionado a la proteína de unión a la maltosa (MBP; *Maltose Binding Protein*),

mediante la clonación de las CDS (del inglés *Coding DNA Sequence*) de los bZIP10, bZIP25, bZIP1 y bZIP53, en los vectores de expresión de proteínas pDEST-TH1 (Hammarström *et al.*, 2002) (bZIP10 y 25) y pMAL-c2X (New England Biolabs®, <http://www.neb.com/>) (bZIP1 y 53), usando el sistema de recombinación Gateway® (Invitrogen™)(sección 3.3.2). La transformación, expresión e inducción de proteínas se realizó como se indica en las secciones 3.3.4 y 3.6.

Las proteínas se cuantificaron mediante el método de Bradford (3.6), se comprobó el tamaño de las fusiones a MBP (sección 3.7.2), se homogenizaron a una concentración de 0,6mg/ml y se combinaron en proporciones de 1:1 y 3:1 (C:S1) para su dimerización *in-vitro*, en donde se incubaron a 50°C durante 15 min., y se guardaron a 4°C para facilitar la formación de dímeros. Tanto las proteínas individuales como las combinadas se enviaron al servicio de la Unidad de Genómica del CNB-CSIC (Centro Nacional de Biotecnología-Consejo Superior de Investigaciones Científicas), donde realizaron el ensayo de la unión de proteínas al ADN basado en micromatrices (PBM11; del inglés *protein-binding microarray*), para determinar la especificidad de la unión al ADN de los bZIP, de acuerdo al protocolo descrito por Godoy *et al.*, 2011.

3.12. Ensayos de doble y triple híbrido de levaduras

3.12.1 Construcciones y condiciones de rastreo de factores candidatos

En este trabajo, las construcciones generadas en el vector pDEST™32 para los ensayos de doble y triple híbrido de levaduras, se obtuvieron a partir de las ORFs (del inglés *Open Reading Frame*) de los *bZIP25* y *bZIP53*, clonadas previamente en el vector pENTR™-3C mediante clonación convencional (sección 3.3.1). A continuación, se sub-clonaron en el vector pDEST™32 que confiere la auxotrofia a la leucina (L) mediante una reacción LR. Para la expresión de la tercer proteína, en el ensayo de tres híbridos de levaduras, se utilizó el vector pTFT1 que tiene el promotor de ADH1, la señal de localización nuclear del plásmido pGAD424 (Clontech) y complementa la auxotrofia *ade2* de *Saccharomyces cerevisiae*. La ORF de *bZIP25* se clonó en dicho vector mediante clonación convencional

(sección 3.3.1) y se comprobó la integridad de la secuencia mediante secuenciación (sección 3.3.3).

La genoteca de levaduras utilizada contiene FTs de dos colecciones (REGIA (Paz-Ares *et al.*, 2002) + REGULATORS (Castrillo *et al.*, 2011); genoteca RR) que incluyen 1,172 ORFs de FTs únicos representando 43 familias diferentes (Tabla 7). Estas ORFs, habían sido recombinadas en un plásmido compatible de levaduras que confiere la auxotrofía al triptófano (W) como fusiones transduccionales a la C-terminal de GAL4AD (pDEST™22; *Invitrogen*™), fueron verificadas mediante secuenciación en la colección de plásmidos resultante y clonadas individualmente en levaduras (*Saccharomyces cerevisiae* YM4271; *mating* tipo A). La genoteca de levaduras generada se encuentra almacenada en viales con glicerol, en placas de 96 pocillos (Castrillo *et al.*, 2011).

Para identificar candidatos interactores de los *bZIP25*, *bZIP53* y su heterodímero, se llevaron a cabo rastreos de doble y triple híbrido en levaduras como se describe a continuación. Las ORFs de *bZIP25* y *bZIP53* clonadas en el vector pDEST™32 (*Invitrogen*™) se co-transformaron con el vector pTFT™ vacío (∅) (*Invitrogen*™) que confiere la auxotrofía a la adenina (A), en la cepa levaduras pJ694 (tipo α). En el caso del heterodímero de *bZIP53/bZIP25* se realizó un ensayo de triple híbrido de levaduras (Y3H; del inglés *yeast three hybrid*), donde se clonaron por separado el *bZIP53* en el vector pDEST™32 y la ORF de *bZIP25* en el vector pTFT™, para ser co-transformados en la cepa pJ694α. Además, se utilizó la genoteca de levaduras clonada previamente en el vector pDEST™22 (*Invitrogen*™). Se llevó a cabo la titulación de células diploides obtenidas después del *mating* de la cepa que contiene las construcciones de BD-*bZIP25*-pDEST™32_pTFT™∅ (pJ694), con la cepa de la genoteca (YM4271) conteniendo una construcción GFP-pDEST™22 (AD-GFP), para evaluar la expresión del gen delator HIS3. Esta titulación también se realizó para las diploides con las construcciones de BD-*bZIP53*-pDEST™32_pTFT™∅ (pJ694) y la cepa de la genoteca, y para las diploides del heterodímero de BD-*bZIP53*-pDEST™32_*bZIP25*-pTFT™ y la cepa de la genoteca. De esta forma, se establecieron las concentraciones apropiadas de un inhibidor del producto del gen HIS3, en las que se identificaron los candidatos interactores de los FTs *bZIP25*, *53* y *bZIP53/bZIP25*, mediante el bloqueo de la transactivación de los BD-*bZIP*, utilizando distintas concentraciones del inhibidor 3AT (3-Amino-1,2,4-triazole; *SIGMA-Aldrich*®): 0, 1,

2.5, 5, 15, 30, 45 y 60mM. Las concentraciones escogidas de 3AT se usaron en los medios de selección de positivos para llevar a cabo los rastreos. Cada uno de los rastreos se realizó como se sugiere en Castrillo *et al.*, 2011, con algunas modificaciones descritas por Berrocal-Lobo *et al.*, 2018 (artículo en revisión), y una modificación adicional en los medios de selección de diploides y de candidatos positivos, que carecían de adenina (DOB-A-L-W y DOB-A-L-W-H supl. con 2,5 o 60mM de 3AT dependiendo del rastreo).

Los candidatos positivos se seleccionaron teniendo en cuenta las colonias de levaduras que crecieron en su correspondiente medio selectivo, después de 3 a 5 días de incubación a 28°C.

Tabla 7. Proteínas pertenecientes a diversas familias de FTs incluidas en la genoteca de levaduras

Familia	Número	Familia	Número	Familia	Número
ABI3/VP1	14	CCCH	1	NAC	77
AP2/EREBP	124	CO-like	31	PcG	2
ARF	9	Control	29	PHD	3
ARR	3	DC1	3	SBP	12
AUX-IAA	23	DOF	33	SET	6
B3	21	EIL	2	TCP	23
BES1/BZR	4	G2-like	34	Pseudo-retro	2
BHLH	87	GATA	29	TFII	9
Bromodomain	2	GRAS	28	Trihelix	7
BTB/POZ	2	HMG	8	Unique	2
bZIP	63	Homeobox	66	WD-40	6
C2H2	37	HRT	2	WRKY	61
C3HC4	44	HSF	18	YABBY	4
CCAAT	24	MADS	83	ZZ	6
CCHC	7	MYB	150	TOTAL	1201

3.13. Ensayos de expresión transitoria en protoplastos

Se llevó a cabo un ensayo de doble y triple híbrido de protoplastos, en el cual se obtuvieron las construcciones iniciales que contienen las CDS de tres de los genes interactores del heterodímero de *bZIP53/25* (*RD26*, *DREB2H* y *ERF4*), mediante clonación convencional (sección 3.3.1) en el vector pGEM®T-easy, utilizando cebadores específicos (Tabla 5). Se comprobó la calidad de las secuencias (sección 3.3.3) y se sub-clonaron las CDS en el vector pENTR™-3C para ser enviadas al grupo colaborador (Lab. del Prof. Dröge-Laser), donde se efectuó el ensayo de expresión transitoria en protoplastos. Se cuantificó la actividad transcripcional de los *bZIP53*, *bZIP53pp* (Weltmeier *et al.*, 2006) (con dos residuos conservados (leucine₅₁ y alanine₇₂) sustituidos por prolinas), *bZIP25*, y de los tres interactores escogidos por separado, cuando se unen a los promotores (*proProDH1* y *proProASN1*). Además de estas mediciones, se evaluó la actividad transcripcional de *bZIP53*, *bZIP53pp* y *bZIP25*, cuando forman dímeros con cada uno de los tres interactores y se unen a los promotores *proProDH1* y *proProASN1*, y de los heterodímeros de *bZIP53/25* y *bZIP53pp/25* cuando dimerizan con *RD26*, *DREB2H* ó *ERF4* y se unen al promotor mencionado anteriormente. La construcción de los plásmidos efectores, y el aislamiento y transformación de protoplastos se realizaron de acuerdo a Ehlert *et al.*, (2006) y Weltmeier *et al.*, (2006).

3.14. Análisis bioinformáticos

A partir de los datos obtenidos en la cuantificación de transcritos por el método del *RNAseq*, se obtuvieron varias listas de genes en las distintas comparaciones de muestras, que fueron confrontadas y representadas en diagramas de venn, utilizando las herramientas *on-line Venny* 2.1 [CNB-CSIC; Oliveros, (2007-2015)] y *Venn diagram* (Universidad de Ghent; <http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/>). Además, se realizó la búsqueda de la descripción y anotación génica de los genes únicos detectados en cada comparación, utilizando el servidor web de *g:Profiler* (Reimand *et al.*, 2016), se llevó a cabo un análisis de ontología de genes (OG) mediante el programa *agriGO* (Du *et al.*, 2010), y se transfirieron los términos de OG al servidor web de *REVIGO* (Supek *et al.*, 2011), para representar de forma gráfica las funciones asociadas a los genes detectados. Los listados con los genes únicos se analizaron mediante el programa *MapMan*

(<http://mapman.gabipd.org/home>) y los clústeres previamente obtenidos por el servicio de bioinformática del BGI, se visualizaron usando el programa *Java Treeview* (Saldanha, A., 2004), para comparar los patrones de expresión de los GDE en las distintas muestras analizadas.

La herramienta *Venny 2.1* también se utilizó para detectar los factores únicos y comunes al comparar los listados de interactores candidatos de *bZIP25*, *bZIP53* y su heterodímero *bZIP53/25*, obtenidos en los rastreos de doble y triple híbrido de levaduras.

Por otra parte, en los análisis de los sitios de unión de los C/S1-bZIP se detectaron motivos que se utilizaron para identificar genes potencialmente regulados por estos bZIP, mediante la herramienta *on-line Promoter* (BAR, *Bio-Analytic Resource for Plant Biology*; http://142.150.215.158/ntools/cgi-bin/BAR_Promoter.cgi), que permitió realizar la búsqueda de las secuencias de las dianas de unión, entre bases de datos de promotores de genes de *Arabidopsis*.

3.14.1 Construcción y representación de redes parenclíticas

Para la construcción y análisis de las redes *parenclíticas*, se utilizaron datos de expresión de 1701 genes cubriendo el repertorio de factores transcripcionales de *Arabidopsis* (Klok *et al.*, 2002) disponible en *AtGenExpress* (<https://www.arabidopsis.org/portals/expression/microarray/ATGenExpress.jsp>; Seki *et al.*, 2002). Estos datos de expresión se han obtenido utilizando la matriz ATH1 (Affimetrix) de *Arabidopsis*. El experimento en el que está basado este estudio, corresponde a plantas de 18 días que fueron transferidas a un medio con 300mM de Manitol y se trataron durante seis periodos de tiempo diferentes (30min, 1h, 3h, 6h, 12h y 24h). Posteriormente, en colaboración con el laboratorio del Dr. Stefano Boccaletti (Centro de Tecnología Biomédica, CTB-UPM) y utilizando el método descrito por Zanin y Boccaletti, 2011, se calcularon y representaron las redes parenclíticas para cada uno de los tiempos analizados. Para cada red obtenida, se estimaron los valores de α -centralidad de todos los nodos (Bonacich y Lloyd, 2001) y se seleccionaron los 20 factores con los valores más altos dentro cada red para su análisis (Zanin *et al.*, 2014). Se realizó la descripción funcional para cada uno de

los factores candidatos, con base en los datos disponibles en la base de datos del TAIR (<https://www.arabidopsis.org/>), y se efectuó su clasificación teniendo en cuenta si tenían o no funciones relacionadas con la respuesta al estrés osmótico. Finalmente, se realizó la verificación experimental de los candidatos seleccionados mediante ensayos de crecimiento de raíz en presencia de manitol, como se indica en el apartado 3.1.3.

3.15. Consideraciones estadísticas

Se calculó la media, desviación y error estándar para todos los datos cuantitativos presentados en esta tesis. Los datos de los fenotipos en los distintos tratamientos se analizaron mediante test *t-student*, comparando cada mutante con el *wt*. Los indicadores de significancia representan el promedio de al menos tres réplicas biológicas y los resultados son considerados significativos si el *p-value* ≤ 0.05 .

Los análisis derivados de los datos transcriptómicos se presentan en las secciones 3.10.1 y 3.10.2.

4. RESULTADOS

CAPÍTULO 1

4.1. PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES bZIP C/S1 EN LA RESPUESTA A ESTRÉS ABIÓTICO EN *Arabidopsis*

4.1. PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES bZIP C/S1 EN LA RESPUESTA A ESTRÉS ABIÓTICO EN *Arabidopsis*

Para abordar esta cuestión se han planteado diferentes tipos de estudios que incluyen:

- Análisis de la expresión de dichos factores bajo diversas condiciones de estrés abiótico.
- Estudio funcional basado en la utilización de mutantes de ganancia y pérdida de función de factores bZIP-C/S1 en distintas combinaciones, que han sido fenotipados en su capacidad de respuesta al estrés abiótico.
- Caracterización molecular de los mecanismos de acción de los factores bZIP-C/S1.

4.1.1. Estudios de expresión génica

4.1.1.1 Análisis *in silico* de la expresión de los factores *bZIP10* y *25* del grupo C, y *bZIP1* y *53* del grupo S1 durante el desarrollo y en respuesta a estrés abiótico

Con el fin de investigar posibles nuevas funciones de los factores bZIPs de los grupos C y S1 en relación a los programas de desarrollo y las respuestas al estrés abiótico, se realizó en primer lugar un análisis de la expresión *in silico* de los bZIPs, a partir de datos de expresión de repositorios de información de *Arabidopsis* (*Bio-Analytic Resource -BAR-*, <http://bar.utoronto.ca/>; Toufighi *et al.*, 2005; *Genevestigator*, <https://genevestigator.com/gv/>; Hruz *et al.*, 2008). Como se puede observar en la Figura 9, durante el desarrollo en *Arabidopsis*, los factores bZIP C y S1 se expresan de forma significativa a distinto nivel en plántulas, semillas, rosetas, flores y silicuas. Así mismo, se puede destacar que los *bZIP1*, *53*, *10* y *25* también se expresan de forma notable durante la senescencia (Fig. 9), periodo en el cual las plantas están sometidas a intensas condiciones de estrés energético asociado a la removilización de nutrientes.

Figura 9. Altas de expresión de los genes del grupo bZIP C/S1 de *Arabidopsis* durante distintas etapas del desarrollo. Clúster representando la expresión de los bZIP C/S1 durante distintas etapas del desarrollo de la planta. Se utilizó la herramienta *Biclustering* y los datos de micromatrices de *Genevestigator* (Hruz *et al.*, 2008) para el análisis.

Por otra parte, usando la misma aproximación, se analizaron los niveles de expresión de los *bZIPs* en respuesta a distintas condiciones de estrés abiótico, tales como temperaturas extremas, salinidad, estrés osmótico y oxidativo, encontrando que entre los *bZIPs* de los grupos C y S1, especialmente los *bZIP10* y *25* (grupo C), y *bZIP1* y *53* (grupo S1), cambian sus niveles de expresión de forma significativa en respuesta a distintos tipos de estrés abiótico, en particular, en respuesta al déficit hídrico, estrés osmótico y salinidad, tanto en la parte aérea como en la raíz (Fig. 10). Asimismo, se puede destacar que los *bZIP10*, *25*, *1* y *53* se inducen en las raíces y hojas bajo condiciones de estrés osmótico, oxidativo y de forma más moderada en respuesta a la sequía, excepto el *bZIP10* que en esta última condición, se muestra levemente reprimido (Fig. 10).

Figura 10. Atlas de expresión de los genes que codifican para los factores del grupo bZIP C/S1 de *Arabidopsis*, en respuesta a diversas condiciones de estrés abiótico. (A) Mapa de calor mostrando los cambios en la expresión de todos los miembros de los grupos C (*bZIP9*, *bZIP10*, *bZIP25* y *bZIP63*) y S1 (*bZIP1*, *bZIP2*, *bZIP11*, *bZIP44* y *bZIP53*) de los bZIP, en las raíces (gris) y parte aérea de las plantas (verde), en respuesta a diferentes estreses medioambientales. De izquierda a derecha: frío, osmótico, salino, sequía, oxidativo y calor. **(B)** Mapa de calor reflejando cambios en los niveles de expresión de dos miembros del grupo C (*bZIP10* y *bZIP25*) y dos del grupo S1 (*bZIP1* y *bZIP53*) estrechamente relacionados, en las raíces y parte aérea de *Arabidopsis*, frente a los estreses antes mencionados. En los recuadros púrpura se resaltan los estreses osmótico, sequía y oxidativo. Se utilizaron datos de experimentos disponibles en la base de datos del

BAR (*The Bio-Analytic Resource*; Toufighi *et al.*, 2005), y se usó la herramienta *e-Northerns* para obtener los dos mapas de calor.

Los datos de expresión representados muestran que los factores bZIP C/S1, concretamente los *bZIP10*, *25*, *1* y *53*, cambian sus niveles de expresión en respuesta a distintos estreses abióticos, sugiriendo que podrían desempeñar un papel importante en la adaptación a diversas condiciones de estrés ambiental en *Arabidopsis*.

En base a estos resultados, se ha planteado el estudio de los factores transcripcionales *bZIP10*, *25*, *1* y *53*, para tratar de identificar su posible papel en la respuesta al estrés abiótico en tejido vegetativo. Para este propósito, se realizó un análisis funcional de estos factores, a través de un estudio fenotípico y molecular, utilizando tanto mutantes de pérdida de función individuales (*bzip10*, *bzip25*, *bzip1* y *bzip53*), dobles (*bzip10-25*; *bzip1-53*; *bzip10-53*), un triple (*bzip10-25-53*) y el cuádruple (*bzip10-25-1-53*), así como líneas de ganancia de función de los *bZIP10*, *bZIP25* y *bZIP53*, bajo el control del promotor constitutivo *35S*, disponibles en el laboratorio, con el objetivo de evaluar las respuestas de estas líneas a distintos estreses abióticos en *Arabidopsis*.

4.1.1.2 Análisis de expresión de los genes *bZIP10*, *bZIP25*, *bZIP1* y *bZIP53* en condiciones de estrés hídrico y osmótico en *Arabidopsis*

Para verificar los cambios observados en los niveles de expresión de los genes *bZIP10*, *25*, *1* y *53*, identificados en los análisis *in silico* en respuesta al estrés hídrico, se analizaron sus niveles de expresión mediante RT-qPCR en plantas sometidas a distintos tratamientos que promueven estrés hídrico/osmótico. Se utilizaron plántulas de cinco días de *Arabidopsis thaliana* (*Col-0*) que fueron transferidas a medios control o suplementados con 300mM de manitol a distintos periodos de tiempo (0h, 3h, 6h, y 24h). Además, se usaron plantas de tres semanas, a las que se escindieron las hojas y se sometieron a deshidratación a temperatura ambiente, durante distintos intervalos de tiempo (0, 3h y 6h). En la Figura 11 se muestran los resultados obtenidos apreciándose que los genes *bZIP1*, *53* y *25* aumentan de forma significativa sus niveles de expresión en respuesta a ambos tratamientos. Es destacable que *bZIP1* aumenta su expresión en más de 10 veces a las 6h del tratamiento de deshidratación, mientras que *bZIP25* en más de cinco veces a las 3h (Fig. 11). En

respuesta al estrés osmótico inducido por manitol, se observó también un incremento en los niveles de expresión de los mismos genes (Fig. 11). Sin embargo en el caso de *bZIP10* se observó un incremento de expresión muy limitado solo después de 24h de tratamiento osmótico con respecto a los controles.

Considerando el comportamiento observado en la expresión de los genes frente a los tratamientos inductores de estrés abiótico, se evaluó además su respuesta a la hormona ABA, ya que está implicada en este tipo de respuestas. Se utilizaron plántulas de cinco días de *Arabidopsis thaliana* (*Col-0*) que fueron transferidas a un medio control y suplementado con 20 μ M de ABA y se tomaron muestras a distintos periodos de tiempo (0h, 1h, 2h, 3h y 4h; Fig.11). Los resultados obtenidos muestran distintos patrones de expresión para los genes en respuesta al tratamiento con ABA. *bZIP25* aumenta sus niveles de expresión de forma rápida, *bZIP1* parece reprimirse, mientras que en los genes *bZIP53* y *10* no se observaron diferencias significativas respecto al control.

En su conjunto, estos datos confirman que los genes *bZIP1*, *53*, *10* y *25*, cambian sus niveles de expresión en tejido vegetativo, en respuesta al estrés hídrico y osmótico.

Figura 11. Análisis de expresión mediante RT-qPCR de *bZIP1*, *53*, *10* y *25* en plantas de *Arabidopsis* expuestas a distintas condiciones de estrés abiótico. Se utilizó ARN total extraído de hojas de plantas de tres semanas, sometidas a deshidratación **(A)**, o de plántulas de cinco días de *Arabidopsis* (*Col-0*) que fueron sometidas a tratamientos con 300mM de manitol **(B)** y 20 μ M de ABA **(C)** a los periodos de tiempo indicados. Se utilizó el gen de la *UBIQUITINA21* como referencia (Czechowski *et al.*, 2005). Los datos muestran el valor de la media $\pm$ el error estándar (n=3). Los asteriscos representan diferencias significativas con el WT, * $p < 0,05$; Test *t-student*.

4.1.1.3 Localización tisular de la expresión de los genes *bZIP10*, *25*, *1* y *53*, en respuesta al estrés osmótico inducido por manitol

Para investigar en mayor detalle las posibles funciones de los factores bZIPs se analizaron los patrones espaciales de expresión de los genes *bZIP10*, *25*, *1* y *53* en respuesta a estrés osmótico. Para ello, se realizó un análisis histoquímico de la actividad *GUS* de líneas de *Arabidopsis* transformadas con las construcciones *Pro_{AtbZIP}:GUS*, conteniendo el promotor (1KB) de cada uno de los cuatro bZIPs fusionados al gen delator *uidA* (*GUS*). Estas líneas se cultivaron en medio control (MS½, 0,5x de Sacarosa) y fueron transferidas después de 5 días de crecimiento a los medios control y tratamiento (MS½, 0,5x de Sacarosa, 300mM manitol), en los que se mantuvieron durante 24h, para su posterior tinción y observación al estereoscopio.

Los datos obtenidos se muestran en la Figura 12 e indican que en condiciones control los genes que codifican para factores *bZIP10* y *25* se expresaban preferentemente en la región del hipocótilo y en los haces vasculares de la hoja. En cambio, después del tratamiento con manitol, *bZIP10* incrementó su nivel de expresión en dichos tejidos mientras que el bZIP25 presentó un incremento de expresión de forma más moderada en los mismos tejidos (Figura 12). En el caso de los *bZIP1* y *53*, se observó expresión en el hipocótilo, haces vasculares de la hoja y de forma muy limitada en el sistema radicular en condiciones control. Tras el tratamiento con manitol, se detectó un incremento significativo de los niveles de expresión en el hipocótilo, haces vasculares de la hoja (*bZIP1*), y principalmente en el meristemo radicular y zonas de elongación y maduración de la raíz (*bZIP53*), con respecto al control.

Los datos obtenidos indican que estos genes aumentan sus niveles de expresión en los distintos tejidos, en repuesta a estrés osmótico, sobre todo en haces vasculares y meristemos de hojas y raíces, presentando además patrones de expresión en gran medida solapantes.

Figura 12. Análisis histoquímico de la actividad GUS en las líneas *promobZIP::GUS* bajo estrés osmótico inducido por 300mM de manitol. Para detectar la expresión GUS en las líneas C y S1 de bZIPs, se utilizaron plantas transformadas con el promotor (1kb) nativo de cada bZIP (*ProbZIP*) fusionadas al gen *uidA* (*GUS*). Se transfirieron plántulas de cinco días a medios MS½ suplementados con 0,5X de sacarosa (control -C) o a MS½ suplementado con 0,5X de sacarosa y 300mM de manitol (tratamiento -T), durante 24h y fueron teñidas con 2mM de X-Gluc. Se muestran fotos representativas de la tinción GUS de la parte aérea (izquierda) y raíz (derecha), de líneas transformadas con las construcciones *ProbZIP10::GUS* y *ProbZIP25::GUS* (**A**), y *ProbZIP1::GUS* y *ProbZIP53::GUS* (**B**), transferidas a los medios control (izquierda) y tratamiento (derecha).

4.1.2. Análisis Funcional: Estudio fenotípico de plantas con ganancia y pérdida de función en los factores bZIP C/S1

Con el objetivo general de investigar el posible papel de los factores bZIP C/S1 en la respuesta a estrés abiótico en *Arabidopsis*, se llevó a cabo un análisis fenotípico de las distintas líneas de pérdida y ganancia de función sometidas a distintas condiciones de estrés abiótico tales como la deshidratación, el estrés osmótico y oxidativo.

4.1.2.1 La sobreexpresión de los genes *bZIP10*, *25* y *53* en *Arabidopsis* incrementa la tolerancia a la desecación

Se evaluó la respuesta a la deshidratación mediante la observación del fenotipo de las líneas bZIP con ganancia o pérdida de función, después de someter plantas de 21 días a un periodo de desecación (sin riego) de tres semanas y media (para líneas de ganancia de función) o de tres semanas (para líneas de pérdida de función), y a un posterior periodo de recuperación (riego) de 2 semanas. Se evaluó el fenotipo de las plantas después del tratamiento de déficit de riego (Figs. 13 y 15) y para las líneas de ganancia de función se calculó la tasa de supervivencia tras el periodo de recuperación, teniendo en cuenta el número de plantas vivas al final del experimento, con respecto al número inicial de plantas utilizadas (Fig. 13).

Los resultados obtenidos mostraron que las líneas de ganancia de función son más tolerantes que las líneas control (*Col-0*) (Fig. 13; Tabla Supl.1) y que los mutantes dobles, triple y cuádruple son más sensibles a la desecación comparados con *Col-0* (Fig. 15; Tabla Supl.1). La tasa de supervivencia calculada al final del experimento permitió confirmar el fenotipo de tolerancia a la desecación de las líneas de sobre-expresión de los *bZIP10*, *25* y *53* (Fig. 13), donde líneas de *bZIP10* (69.1e), *bZIP25* (70.6h) y *bZIP53* mostraron mayores tasas de supervivencia respecto a *Col-0*. En el caso de las líneas de pérdida de función no se calculó la tasa de supervivencia, debido a que tras el periodo de recuperación, en ninguna de estas líneas mutantes se detectaron plantas vivas.

A **B**

Figura 13. Tolerancia a la sequía de plantas de *Arabidopsis* con ganancia de función de los *bZIP10*, *25* y *53*. (A) El gráfico de barras muestra la tasa de supervivencia de las líneas con ganancia de función *35S::bZIP10*, *25* y *53* comparadas con *Col-0* (control). La supervivencia está representada como el porcentaje de plantas vivas tras dos semanas del periodo de recuperación (re-hidratación), con respecto al número inicial de plantas usadas en el experimento para cada genotipo (20). Los datos muestran la media y error estándar de dos experimentos independientes. (B) Fenotipos de las líneas con ganancia de función para *bZIP10*, *25* y *53*, observados antes de la deshidratación (arriba), tres semanas y media después del tratamiento de

deshidratación (sin riego; centro), y dos semanas después del periodo de recuperación (re-hidratación; abajo). Todas las líneas fueron comparadas con *Col-0*.

Figura 14. Tolerancia a estrés osmótico de líneas de ganancia de función de *bZIP10*, *25* y *53*.

(A) El gráfico de barras representa la longitud de la raíz primaria de las líneas con ganancia de función de los *bZIP10*, *25* y *53*, comparadas con *Col-0*, en condiciones de estrés osmótico inducido por 200 y 300mM de manitol. **(B)** Foto representativa de los fenotipos de las líneas *35S::bZIP* con respecto a *Col-0*, sometidas a estrés osmótico inducido por 300mM de manitol. Los datos muestran el valor de la media $\pm$ el error estándar ($n=3$). Los asteriscos representan diferencias significativas con el WT, $*p<0,05$, Test *t-student*.

4.1.2.2 La sobre-expresión de *bZIP10*, *25* y *53* en *Arabidopsis* reduce la pérdida de agua por transpiración

La medición de la pérdida de agua por transpiración permite evaluar de forma indirecta la capacidad del cierre estomático de las plantas, como mecanismo inmediato de respuesta a la deshidratación. Un método comúnmente utilizado para monitorear esta pérdida, es la medición de la pérdida de peso fresco durante periodos de tiempo determinados. Para estudiar la respuesta a la deshidratación de los bZIPs C/S1 en periodos cortos (0-3 horas), se calculó la pérdida de peso fresco en el tiempo de todas las líneas mutantes *ko* y de sobre-expresión empleadas en el experimento anterior. Para ello, se registró el peso inicial de la parte aérea de plantas de tres semanas crecidas en condiciones de día largo (16h luz/8h oscuridad), se midió su peso en intervalos de diez minutos hasta completar 1h, a las 2h y 3h, y se calculó el porcentaje de pérdida de peso para todas las líneas evaluadas.

Los datos obtenidos muestran que las líneas de sobre-expresión perdían peso más lentamente que *Col-0* (Fig. Supl. 1), y que las *35S::bZIP25* y *35S::bZIP53*, presentaron diferencias significativas comparadas con el genotipo silvestre (Fig. Supl. 1). Sin embargo, en los mutantes de pérdida de función no se apreciaron diferencias claras con respecto a *Col-0* (Fig. Supl. 1).

4.1.2.3 Los mutantes de pérdida de función de *bZIP10*, *25*, *1* y *53* muestran mayor sensibilidad a tratamientos que promueven estrés hídrico y osmótico en *Arabidopsis*

Para corroborar los resultados obtenidos en el experimento de desecación, se evaluó la respuesta a la deshidratación producida por el agente osmótico manitol, en condiciones de cultivo *in vitro*. En este ensayo se utilizaron plántulas de 5 días crecidas en medio MS½ en condiciones de día largo, que fueron transferidas a medios MS½ suplementados con 200 y 300mM de manitol, y crecidas de forma vertical durante 10 días. Después de este periodo de crecimiento se estimó la longitud de la raíz primaria de las plantas.

Los resultados obtenidos muestran que los mutantes dobles, el triple y cuádruple, presentan alteraciones de crecimiento muy evidentes, con reducción significativa en la longitud de la raíz con respecto al genotipo silvestre en los tratamientos con 200 y 300mM de manitol, mientras que todos los mutantes individuales presentaron diferencias significativas solamente a 200mM de manitol, exceptuando el *bzip25 ko*, cuyas diferencias fueron significativas en ambas concentraciones de manitol (Fig. 15), indicando que estos FTs podrían participar en procesos de señalización y respuesta al estrés osmótico inducido por manitol. Además, se observó que todos los mutantes dobles *bzip10-bzip25* (S), *bzip1-bzip53* (C) y *bzip10-bzip53* (CS) analizados, presentan una mayor reducción del crecimiento de la raíz que los mutantes simples. Es destacable que el mutante doble *bzip10-bzip25* (C) presenta una mayor reducción del crecimiento de la raíz en las condiciones de estrés que el doble *bzip1-bzip53* (S1). Estos resultados sugieren que los factores de ambos grupos C y S1 desempeñan su función de forma conjunta, ya que los mutantes de una única clase (C ó S1) muestran fenotipos de sensibilidad notoria, indicando que ambos grupos son necesarios para la respuesta a estrés osmótico en *Arabidopsis*.

Finalmente, los análisis del triple y cuádruple mutante, indicaron que estos presentan una reducción significativa en la longitud de la raíz con respecto al genotipo silvestre en presencia de manitol, mostrando reducciones semejantes o mayores a las observadas en los distintos dobles mutantes *bzip10-bzip25* (C), *bzip1-bzip53* (S1) y *bzip10-bzip53* (CS1), en ambas concentraciones de manitol (200 y 300mM; Fig. 15). Estos resultados parecen indicar, que aunque ambos grupos son necesarios para la respuesta a estrés osmótico, los factores del grupo C desempeñan funciones más importantes que los del grupo S1 en respuesta a este estrés.

En los ensayos con las líneas sobre-expresoras *35S::BZIP*, en general todas mostraron diferencias significativas, con valores mayores de longitud de la raíz comparadas con *Col-0*, en medios suplementados con altas concentraciones de manitol (300mM) (Fig. 14). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en la longitud radicular de *Col-0* con respecto a las líneas sobre-expresoras a 200mM de manitol (Fig. 14).

Figura 15. Sensibilidad a la deshidratación de líneas de pérdida de función para *bZIP10*, *25*, *1* y *53*. (A) Fotos representativas del mutante doble (*bzip10/53*), un triple (*bzip10/25/53*) y el cuádruple, comparados con *Col-0*, tanto antes (arriba), como después del periodo de deshidratación (abajo). Las imágenes fueron registradas después de dos semanas de crecimiento en suelo (antes de la deshidratación) y tres semanas después del tratamiento de deshidratación (sin riego). (B) Gráfico de barras mostrando la longitud de la raíz primaria de los mutantes de pérdida de función de los *bZIP10*, *25*, *1* y *53*, tanto individuales, como dobles, un triple y el cuádruple, comparados con *Col-0*, después de 10 días de ser transferidos a medios suplementados

con 200 y 300mM de manitol. Los datos muestran el valor de la media $\pm$ el error estándar (n=3). Los asteriscos representan diferencias significativas con el WT, *p<0,05 mediante Test *t-student*. **(C)** Fotos representativas de mutantes individuales (*bzip10*, *bzip25* y *bzip53*) comparados con *Col-0* (izquierda), un mutante doble (*bzip10/53*) y el cuádruple mutante (*bzip1/10/25/53*) comparados con *Col-0* (derecha), bajo condiciones de estrés osmótico inducido por 300mM de manitol.

4.1.2.4 Las líneas de ganancia de función de *bZIP10*, *25*, *1* y *53* son más tolerantes a tratamientos que promueven estrés oxidativo, mientras las líneas de pérdida de función son más sensibles que el control

De modo general, la exposición a condiciones de estrés abiótico, tales como la deshidratación o las temperaturas bajas, provoca en las plantas una gran producción de distintas especies reactivas de oxígeno (ROS). Debido a su toxicidad y para contrarrestar sus efectos, las plantas sintetizan moléculas con capacidad protectora (antioxidante) y desarrollan diversos mecanismos de compartimentación y exclusión de las mismas (Foyer *et al.*, 1994; Benavides *et al.*, 2005). Para estudiar si las alteraciones en la tolerancia al estrés hídrico/osmótico observadas en las líneas mutantes y sobreexpresoras, están relacionadas con un mejor manejo o tolerancia al estrés oxidativo, se verificó la tolerancia de las líneas mencionadas frente al estrés oxidativo producido por un agente químico (CdSO₄).

Para estimar la tolerancia a estrés oxidativo de las distintas líneas, se examinó el crecimiento y la tolerancia de plántulas de *Arabidopsis* de 5 días que fueron crecidas en condiciones control (MS½ + 0,5x de sacarosa) y transferidas a medios control y suplementados con 85 y 100µM de CdSO₄. Tras 12 días de crecimiento adicionales, se evaluó el estado general de las plantas y se realizaron mediciones del incremento de la longitud de la raíz, representado en este caso como porcentaje de crecimiento respecto a la condición control.

El análisis de los resultados mostró que las líneas de ganancia de función (*35S::bZIP*) presentaron una menor reducción en su longitud radicular con respecto a *Col-0* a 85µM de CdSO₄. En particular, las líneas *35S::bZIP10* redujeron menos su longitud que las demás

líneas analizadas (Fig. 16). Sin embargo, en el tratamiento con 100µM de CdSO₄ no se apreciaron diferencias significativas en las líneas de ganancia de función con respecto a *Col-0* (Fig. 16). Tanto en *Col-0*, como en las líneas de ganancia y pérdida de función, se observó un incremento en la clorosis foliar a medida que incrementaba la concentración de CdSO₄ en el medio de cultivo.

Para complementar estos análisis, se evaluaron además las líneas mutantes de pérdida de función, tanto simples como múltiples de los *bZIPs*, en las que se observó una reducción significativa en la longitud de la raíz primaria en los tratamientos con 85µM y 100µM de CdSO₄ con respecto a *Col-0* (Fig. 16). Todos estos resultados sugieren que tanto los factores bZIP del grupo C como los del grupo S1, desempeñan funciones importantes en el control de los efectos del estrés oxidativo promovido por Cd. Además, podrían explicar los fenotipos de tolerancia observados previamente, ya que la producción de radicales libres y el estrés oxidativo subsiguiente, suelen ser una consecuencia común a la exposición a los estreses hídrico, osmótico o salino.

Figura 16. Efecto del estrés oxidativo inducido por el cadmio (CdSO₄) en líneas de ganancia y pérdida de función de los *bZIP1*, *10*, *25* y *53*.

(A) Gráfico de barras que representa el porcentaje de reducción de la longitud de la raíz, de las líneas *35S::bZIP10*, *35S::bZIP25*, *35S::bZIP53* y *Col-0*, en medios suplementados con 85µM y 100µM de Cd con respecto a la condición control (MS_{1/2}).

(B) Fotografías representativas de plantas de dos líneas de sobre-expresión (*35S::bZIP10* y *35S::bZIP25*) comparadas con *Col-0*, después del tratamiento con 100µM de CdSO₄.

(C) Reducción en la longitud de la raíz (%) de líneas de pérdida de función de los bZIP C/S1. Se muestran los mutantes individuales (*bzip10*, *bzip25* y *bzip53*), dobles (*bzip1/53*, *bzip10/25*, *bzip10/53*) y un triple (*bzip10/25/53*) bajo las concentraciones de Cd antes mencionadas, con respecto a la condición control y comparadas con *Col-0*. Los datos muestran el valor de las medias ± el error estándar (n=3). Los asteriscos representan diferencias significativas con el WT, *p<0,05 mediante Test *t-student*.

(D) Fenotipos de líneas de pérdida de función (*bzip10/25* y *bzip10/53*) con respecto al control bajo 85µM de CdSO₄. Las imágenes fueron tomadas 12 días después de transferir las líneas bZIP a los medios con CdSO₄.

4.1.3. Caracterización molecular de los mecanismos de acción de los factores bZIP C/S1

La caracterización fenotípica de los mutantes en distintos miembros bZIP C y S1 revela su participación en las respuestas a estrés abiótico, pero especialmente pone de manifiesto la importancia de su actuación conjunta. Por ello se decidió investigar la contribución particular de cada grupo (C y S1) y los mecanismos moleculares que hacen relevante su actuación conjunta, derivada de su capacidad de formación de heterodímeros. Para este fin se investigaron tres aspectos fundamentales:

- Regulación de la expresión génica por los miembros de las clases C/S1.
- Capacidad de unión al ADN y especificidad de las secuencias diana reconocidas.
- Potencial de formación de complejos transcripcionales de los miembros C/S1 de forma independiente (homodímeros) o conjunta (heterodímeros).

Los siguientes apartados recogen los resultados relativos a estos aspectos.

4.1.3.1 Análisis transcriptómico mediante secuenciación masiva de ARN de mutantes *bzip10-bzip25* (C), *bzip1-bzip53* (S1) y *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (C/S1), bajo condiciones de estrés osmótico

Para investigar los mecanismos y bases moleculares que pudieran explicar los fenotipos observados de mayor sensibilidad a estrés promovido por deshidratación/osmótico, se realizó un análisis transcriptómico mediante secuenciación de ARN de las líneas de pérdida de función *bzip10-bzip25* (función C); *bzip1-bzip53* (función S1), *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (función C-S1) y de la línea WT (*Col-0*) bajo condiciones de estrés osmótico promovido por manitol. Se utilizaron plantas de las distintas líneas mutantes que después de 5 días crecimiento en MS se transfirieron a medio control o medio suplementado con 300mM de manitol, y fueron crecidas durante 10 días adicionales. Se empleó este tiempo de tratamiento para el estudio, porque en estas condiciones se observaron fenotipos de sensibilidad muy claros en los distintos mutantes. A partir de este material se aisló ARN total de 3 réplicas independientes de cada genotipo y tratamiento y se agruparon en una sola muestra común (relación 1:1) para posteriormente enviar a secuenciar (empresa BGI-Hong-Kong). En el caso de la línea WT (*Col-0*), los resultados revelaron que de los aproximadamente 24000 genes de *Arabidopsis*, 2107 cambiaban sus niveles de expresión (*Fold Change* > 2) en respuesta al tratamiento osmótico. Entre éstos, 1302 genes se encuentran sobre-expresados y 805 reprimidos en respuesta al tratamiento, siendo un número similar al encontrado en otros estudios, en respuesta a estrés osmótico en *Arabidopsis* (Kreps *et al.*, 2002).

El análisis inicial de los datos transcriptómicos de los distintos dobles y el cuádruple mutante en respuesta a estrés osmótico, reveló que cada clase (bZIP C o S1) presenta distintas funciones específicas en la respuesta a estrés. En el caso del doble mutante *bzip10-bzip25* (función C), se encontró un número mayor de genes diferencialmente expresados (2855 GDE) en respuesta a estrés que en el control *Col-0* (2107 genes), de los cuales 1753 se encontraron sobre-expresados y 1102 reprimidos (Fichero Suplementario). De igual

manera, en el mutante doble *bzip1-bzip53* se identificaron 3280 GDEs con respecto al control, de los cuales 2065 están sobre-expresados y 1215 reprimidos (Fig. 17).

La comparación de los grupos de genes diferencialmente expresados (GDE) en respuesta al tratamiento osmótico identificados en los mutantes *bzip10-bzip25* (C) y *bzip1-bzip53* (S1) con los GDEs de WT, mostró por un lado que el mutante *bzip10-bzip25* compartía 1235 DEGs comunes con WT, y 1620 GDEs nuevos que no se encontraron en el WT en respuesta a estrés osmótico. Mientras que en el mutante *bzip1-bzip53*, se identificaron 1632 GDEs que se comportaban como el WT y 1648 DEGs que no se encontraron en el WT en respuesta a estrés osmótico. Estos resultados sugieren que los FTs analizados de los grupos C y S1, tienen un impacto muy importante y específico en la respuesta transcripcional a estrés osmótico en *Arabidopsis*, bajo las condiciones experimentales utilizadas.

Por otro lado, el análisis del cuádruple mutante *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (C/S1) en el que faltan ambas funciones C-S1, permitió la identificación de 2088 GDEs en respuesta a estrés osmótico, 1336 sobre-expresados y 752 reprimidos (Fig. 17). Es destacable que entre ellos, 1204 GDEs se comportaban como en el WT y 884 son específicos del mutante cuádruple, de los cuales 189 son compartidos únicamente con el mutante *bzip10-bzip25*, 273 con el mutante *bzip1-bzip53*, 158 son comunes entre ambos mutantes y 264 GDEs aparecen de forma específica en el cuádruple mutante. Estos resultados indican que los factores bZIPs analizados de los grupos C y S1 regulan grupos de genes específicos, pero también que de forma conjunta, estos bZIP son necesarios para regular grupos particulares de genes, probablemente a través de la interacción con otros factores en nuevos complejos transcripcionales.

Figura 17. Análisis de expresión utilizando plantas *Col-0* (WT), *bzip10-bzip25* (C) *bzip1-bzip53* (S1) y *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (C-S1) en condiciones de estrés osmótico. (A) Diagrama que resume el procedimiento para la secuenciación de transcritos a través del método *RNAseq*. (B) Gráfico de barras mostrando el número de GDEs encontrados en las cuatro principales comparaciones de muestras [wt y mutantes *ko* (C, S y CS) crecidos en el medio control (MS½) o tratamiento (Osmo; MS½ +300mM de manitol)]. (C) Diagramas de Venn que muestran la superposición entre genes regulados diferencialmente en plantas *Col-0* (WT), *bzip10-bzip25* (C) *bzip1-bzip53* (S) y *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (CS) en condiciones de estrés osmótico. La superposición entre listas se indica como el número total de genes identificados como diferentes, expresados en ambos conjuntos de datos.

4.1.3.2 Identificación y análisis de genes regulados por los factores *bZIP10*, *bZIP25*, *bZIP1* y *bZIP53* en condiciones de estrés osmótico

En un segundo paso, para profundizar en el papel específico que juega cada grupo de los factores, los *bZIP10-25* (función C), *bZIP1-53* (función S1) y el *bZIP10-25-1-53* (función C/S1) en la respuesta a estrés osmótico, se compararon los transcriptomas en condiciones control y tratamiento de cada uno de los mutantes con el WT (Fig. 18) y se buscaron específicamente, aquellos grupos de posibles genes diana que estando regulados por el tratamiento de estrés osmótico en el WT, aparecieran como no regulados en los distintos fondos mutantes. Los resultados indicaron que una parte importante de genes que cambian su expresión en el genotipo WT en respuesta estrés osmótico, se encuentran desregulados en los mutantes y por lo tanto, podrían ser candidatos a formar parte de regulones específicos de cada grupo de bZIP C y S1.

En concreto, se identificaron en el mutante *bzip10-bzip25* (función C) 871 genes que no cambian su nivel expresión en respuesta a estrés osmótico, como lo hacen en el control WT. En el caso del mutante *bzip1-bzip53* (S1) se encontraron 474 genes que mostraron un comportamiento diferente al WT. Además, cuando se comparan los 2 grupos de genes desregulados se identificaron 113 genes específicos del mutante *bzip1-bzip53*, 510 específicos del mutante *bzip10-bzip25* y 361 genes que eran comunes en ambos (Fig. 18. Fichero Suplementario). Estos datos podrían indicar en primer lugar que los bZIPs C/S1 están implicados en una parte importante de la respuesta al estrés osmótico en *Arabidopsis*, regulando de forma específica e independiente grupos particulares de genes, y de forma conjunta otro grupo importante de genes regulados por estrés osmótico.

Figura 18. Diagramas de Venn que muestran la superposición entre genes desregulados en respuesta a estrés osmótico en los mutantes *bzip10-bzip25* (DesREG-C) *bzip1-bzip53* (DesREG-S1) y *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (DesRegCS1), comparados con el WT (*Col-0*). La superposición entre listas, se indica como el número total de genes identificados como diferentes, expresados en ambos conjuntos de datos.

Finalmente, en el caso del cuádruple mutante *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* en el que faltan ambas funciones C y S1, se encontraron 902 genes que no cambian su nivel expresión en respuesta a estrés osmótico como lo hacen en el genotipo control WT. Entre los cuales, 327 GDEs están presentes en ambos dobles mutantes *bzip10-bzip25* y *bzip1-bzip53*, 340 GDEs compartidos específicamente con el mutante *bzip10-bzip25*, y 64 GDEs particulares de *bzip1-bzip53*. Por otro lado, se analizaron los GDEs que aparecen de forma específica en cada genotipo y que podrían identificar los grupos de genes controlados por cada factor en respuesta a estrés osmótico. De esta forma se encontraron 170 GDEs específicos en el doble mutante *bzip10-bzip25* y 49 GDEs específicos del mutante *bzip1-bzip53*. Además, se encontraron 171 GDEs específicos del cuádruple mutante *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* que son nuevos genes que aparecen desregulados sólo cuando faltan simultáneamente las funciones C y S1. Lo que podría indicar que la presencia de ambas funciones de forma simultanea, es necesaria para regular la expresión de un conjunto específico de genes implicados en la respuesta a estrés osmótico.

La identificación y análisis de los distintos grupos de genes bajo el control de los bZIP C/S1 han puesto de manifiesto la implicación que tiene cada grupo de factores en

múltiples/distintos procesos relacionados con la respuesta a estrés. El análisis de ontología de los genes comunes que aparecen desregulados (327) en los mutantes dobles y cuádruple, reveló un enriquecimiento en grupos de genes asociados a términos relacionados con respuestas a estrés abiótico y metabolismo tales como, “estrés abiótico”, “limitación de nutrientes”, “regulación de metabolismo celular” , “azúcares y aminos” (Fig. 19). Esto indica que los factores C y S1 regulan un grupo común de genes que están implicados en el metabolismo primario y son importantes en la respuesta a estrés osmótico.

Respecto a los grupos de genes desregulados específicamente en cada mutante, se observa que cada grupo C ó S1 también regula conjuntos específicos de genes en respuesta a estrés y por lo tanto están implicados en distintas funciones. Así, en el caso del *bzip10-bzip25*, el análisis de ontologías identificó enriquecimientos en grupos de genes asociados a términos semánticos, relacionados con respuesta a estrés, regulación del metabolismo de lípidos, aminoácidos y lignina, apoptosis y organización de nucleosoma (Fig. 19). Sin embargo, los genes específicos identificados en el mutante *bzip1-bzip53* presentaron enriquecimientos relacionados con la biosíntesis y dinámica del sistema de endomembrana y componentes de la pared. Igualmente, en el caso de los genes identificados en el cuádruple mutante *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (C/S1), sorprendentemente aparecen nuevos términos asociados a biosíntesis de pigmentos y tetrapirrol (clorofila), señalización de membrana, metabolismo de ARN y del nitrógeno, y respuesta a estrés y jasmonato. Este resultado podría indicar que ambos grupos de factores C y S1, regulan de manera independiente procesos celulares/metabólicos importantes y necesarios para la respuesta a estrés osmótico en *Arabidopsis*, y que además actúan de forma conjunta posiblemente mediante su heterodimerización y/o la participación en complejos reguladores alternativos.

Figura 19. Análisis de ontología genética de los grupos desregulados en los mutantes de pérdida de función bZIP C/S1 en relación a WT, en respuesta a estrés osmótico. Análisis GO de genes desregulados en los 3 mutantes *bzip10-bzip25* (DesREG-C), *bzip1-bzip53* (DesREG-S1) y *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (DesReg-CS1), comparados con el WT (*Col-0*). El diagrama de Venn muestra la superposición entre genes desregulados en respuesta a estrés osmótico en los mutantes *bzip10-bzip25* (DesREG-C) *bzip1-bzip53* (DesREG-S1) y *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (DesReg-CS1) comparados con el WT (*Col-0*), junto a los términos semánticos sobre-representados en cada grupo de genes. Los diagramas de dispersión se realizaron utilizando la herramienta de análisis de *agriGO* para detectar los términos de OG (<http://bioinfo.cau.edu.cn/agriGO/analysis.php>). El color de las esferas indica *p-value*.

4.1.4 Identificación de las secuencias de unión al ADN de los factores *bZIP1*, *10*, *25* y *53*

De modo general, los factores transcripcionales regulan la transcripción de forma selectiva, mediante el reconocimiento y la unión a secuencias concretas en los promotores de los genes, activando o reprimiendo su expresión. En el caso de los bZIP pertenecientes a los grupos C y S1, se han identificado previamente sitios de unión al ADN mediante ensayos

de retraso en la movilidad electroforética (*Electrophoretic Mobility Shift Assay*-EMSA) (Lara *et al.*, 2003; Weltmeier *et al.*, 2006), y experimentos de expresión transitoria en protoplastos (Ehlert *et al.*, 2006; Weltmeier *et al.*, 2006; Llorca *et al.*, 2015). Sin embargo, no se conocen en detalle los sitios preferentes de unión al ADN para cada uno de los factores *bZIP10*, *25*, *1* y *53*, ni como se ven modificados cuando actúan como homo- o heterodímeros con otros factores bZIP.

Para determinar las posibles dianas de unión al ADN de los bZIP, se utilizó el método desarrollado en el servicio de Genómica del CNB. Este procedimiento se basa en la utilización de micromatrices que contienen oligonucleótidos de doble cadena con una región central de 11 pares de bases y de secuencia variable, de forma que contienen todas las combinaciones posibles, permitiendo detectar uniones selectivas con una determinada proteína (Godoy *et al.*, 2011).

Los factores *bZIP10*, *25*, *1* y *53* fueron expresados en *E. coli* como proteínas de fusión a la MBP, purificadas de forma independiente y se comprobó su integridad en geles de acrilamida (Fig. 20). Estas proteínas se incubaron con las micromatrices mencionadas anteriormente, como proteínas individuales (homodímeros) o en combinaciones (heterodímeros), para determinar los sitios consenso de unión. El procedimiento de hibridación, lectura y análisis estadístico de resultados fue determinado en el servicio de genómica del CNB y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 20.

El análisis de los datos obtenidos, permitió la identificación del sitio de unión consenso de cada homodímero de los bZIP estudiados, así como de los heterodímeros de *bZIP53/bZIP10* y *bZIP53/bZIP25* (Fig. 20). Los homodímeros de *bZIP10* y *25* reconocieron la misma secuencia de unión al ADN 5'-TG(C/A)TGAC-3', indicando que estos factores probablemente estén involucrados en la regulación de genes con funciones similares. Por el contrario, los homodímeros del *bZIP1* y *bZIP53* reconocen el sitio 5'-TG(C/G)ACGTG-3', sugiriendo que estos bZIP podrían regular genes diferentes de los reconocidos por los *bZIP10* y *25* (Fig. 20).

En un segundo paso, se realizaron experimentos para determinar si la formación de un heterodímero, mediante la combinación de un factor del grupo C y S1 (*bZIP53-bZIP10*, y

bZIP53-bZIP25), podría cambiar la capacidad y la especificidad de unión al ADN. Debido al modo de unión al ADN de los factores de tipo bZIP, cabría esperar que el sitio reconocido por el heterodímero incluyera la combinación de dos semi-sitios, correspondientes a cada uno de los factores participantes. Sin embargo, los resultados obtenidos (Figura 20), muestran secuencias muy similares al sitio de unión del homodímero de *bZIP53*, sugiriendo que la afinidad de éste como homodímero es mucho mayor que la de sus heterodímeros con factores de tipo C. El hecho de que incluso variando las proporciones de proteínas utilizadas (desde 1:1 a 1:3), no se modifique el sitio de unión obtenido, apoya esta hipótesis y sugiere el uso de un planteamiento experimental diferente para obtener la secuencia consenso de los heterodímeros.

Figura 20. Dianas de unión de los factores *bZIP1*, 10, 25 y 53, identificadas mediante un ensayo de unión de proteínas al ADN basado en micromatrices (A) Gel de poliacrilamida mostrando dos fracciones purificadas de cada *bZIP* (10, 25, 53 y 1) fusionado a la proteína de unión a la maltosa (MBP). Las flechas señalan las bandas correspondientes a cada fusión. MP (Marcador de proteínas). **(B)** Dianas consenso de unión al ADN detectadas para los homo- y heterodímeros **(C)** de los *bZIP10*, 25, 1 y 53.

A

Gel de poliacrilamida

B

C

4.1.5 Análisis de las redes reguladoras en las que participa el grupo C/S1 bZIP:

Identificación de factores de transcripción que interaccionan con *bZIP25*, *bZIP53* y el heterodímero *bZIP53/bZIP25*

Con el fin de investigar las redes reguladoras en las que participan los bZIPs C/S1 y poder explicar a nivel molecular los fenotipos observados en respuesta a distintos estreses abióticos, se realizó una búsqueda de factores transcripcionales capaces de interaccionar de forma directa con ellos, utilizando el sistema de 2 y 3 híbridos de levaduras y una genoteca de factores transcripcionales de *Arabidopsis*. Para las búsquedas (rastreos), se utilizaron los factores *bZIP25* (grupo C) y *bZIP53* (grupo S1) por su limitada capacidad de activación y por haberse demostrado previamente su potencial de actuación como heterodímeros con un efecto sinérgico en la capacidad de trans-activación de genes diana (Ehlert *et al.*, 2006; Llorca *et al.*, 2015).

Se rastreó una genoteca correspondiente a aprox. 1200 FTs de *Arabidopsis* (Castrillo *et al.*, 2011) siguiendo una doble estrategia: (i) una búsqueda de doble híbrido usando cada factor como cebo de forma independiente y; (ii) una búsqueda de triple híbrido usando ambos factores simultáneamente como cebo. Previamente se determinaron las condiciones del rastreo para cada factor, limitando en la levadura su capacidad de activación, utilizando concentraciones crecientes de 3AT para limitar el posible fondo con falsos positivos. En las condiciones mencionadas, se logró la identificación de 180 candidatos para el *bZIP25*, 27 para el *bZIP53* y 76 para el heterodímero *bZIP53-25*, cuyo análisis detallado en cuanto a capacidad de interacciones solapantes se recoge en la Figura 21 y Tabla Supl. 2.

Se puede destacar que en la búsqueda de interactores para el heterodímero se identificaron 37 nuevos factores que no aparecían en las búsquedas realizadas con los factores individuales, y que representan por lo tanto, interactores específicos del complejo heterodimérico. Es notorio que entre estos últimos se encontró el factor ABI3, descrito previamente como interactor del complejo *bZIP10/25/53*, implicado en la regulación de la expresión génica en la semilla (Alonso *et al.*, 2009), siendo un buen control positivo de la búsqueda realizada.

Para investigar si los factores identificados que interaccionan con el heterodímero *bZIP53/25*, podrían estar involucrados en la respuesta al estrés abiótico, se realizó un análisis de expresión *in silico* utilizando datos de *AtGenExpress-AbioticStress*. Como se puede observar en la Figura 21, una gran parte de los FTs identificados responden a distintos tipos de estrés abiótico. Estos datos sugieren que los nuevos FTs identificados, junto con los bZIPs C/S1, podrían integrar una red reguladora en la que de forma combinatoria podrían dar lugar a distintos complejos reguladores participantes en las respuestas a diferentes estreses abióticos en *Arabidopsis*.

En apoyo de esta posibilidad, están los datos recogidos en la Figura 21, donde se muestra una red de co-expresión obtenida con *GeneMANIA* (Warde-Farley *et al.*, 2010), conformada a partir de los interactores específicos del heterodímero, bajo las opciones de co-expresión, co-localización e interacciones físicas. Los resultados indicaron que los bZIPs C/S1 y los FTs identificados conforman junto a otros factores una red robusta y muy interconectada (Fig. 21). Además, el análisis de OGs del grupo de factores identificados, desveló la abundancia y/o enriquecimiento significativo de términos funcionales asociados a estrés abiótico, osmótico, hídrico y salino, así como términos relacionados con la regulación del desarrollo del tallo, raíz y la semilla, la señalización hormonal y el metabolismo. En la Tabla 8 se resume la información disponible en bases de datos (TAIR) y refleja que algunos de los FTs identificados, habían sido previamente descritos en relación a funciones muy importantes en la respuesta al estrés abiótico.

Tabla 8. Identificación de los Factores que interaccionan con el heterodímero *bZIP53/25*. Listado de sus posibles funciones conocidas, obtenidas del TAIR (<https://www.arabidopsis.org/>.)

N.	ID	Gen	Familia	Función
1	At4g27410	RD26	NAC	Respuesta a estrés abiótico
2	At2g43000	anac042	NAC	
3	At1g06180	AtMYB13	MYB	
4	At1g56280	ATDI19	RING finger	
5	At5g43840	AT-HSFA6A	HSF	
6	At3g06590	AIF2	bHLH	
7	At5g28300	AtGT2L	Trihelix	
8	At3g05700	Protein dehydration-induced 19-3	Drought-responsive	
9	At2g40350	DREB2c	ERF/AP2	
10	At4g25470	ATCBF2	ERF/AP2	
11	At1g02450	NIMIN1	NIMIN	Respuesta a estrés biótico
12	At3g15210	ATERF-4	ERF/AP2	
13	At3g24650	ABI3	B3	Semilla
14	At3g54810	BME3-ZF	GATA	

Figura 21. Análisis de los interactores de *bZIP25*, *bZIP53* y su heterodímero (*bZIP53/bZIP25*), detectados mediante rastreos de doble (Y2H) y triple híbrido (Y3H) de levaduras.

(A) Diagrama de Venn obtenido con la herramienta Venny v.2.1, representando el número de factores candidatos, tanto comunes como únicos, detectados en los tres rastreos llevados a cabo para identificar interactores de *bZIP25*, *bZIP53* y su heterodímero.

(B) Análisis de Ontologías (OGs) de los factores identificados. Se utilizó la herramienta *agriGO* (Du *et al.*, 2010; Tian *et al.*, 2017) para obtener los términos de OGs y los diagramas de dispersión se obtuvieron con la herramienta de visualización de *scatterplots* de REVIGO (Supek *et al.*, 2011).

(C) Atlas de expresión obtenido con los datos disponibles del *BAR* (Toufighi *et al.*, 2005), reflejando los cambios en los niveles de expresión de factores candidatos que interaccionan con *bZIP53/bZIP25* bajo distintos estreses abióticos. En rojo se enmarcan los genes que muestran mayores valores de expresión.

(D) Red de co-expresión que muestra las interacciones identificadas entre los factores que interaccionan con el heterodímero *bZIP53/bZIP25*, utilizando la base de datos de *Genemania* (<http://www.genemania.org/>).

4.1.5.1 Identificación de las funciones asociadas a los factores que interaccionan específicamente con *bZIP25*, *bZIP53* y su heterodímero (*bZIP53/bZIP25*)

Con el propósito de obtener mayor información sobre los factores candidatos que interaccionan únicamente con *bZIP25*, *bZIP53* y el heterodímero de *bZIP53/bZIP25*, detectados en los ensayos de doble y triple híbrido de levaduras, se llevó a cabo un análisis de ontologías, a partir de los listados de factores únicos derivados del análisis de diagramas de Venn (Fig. 21), utilizando las herramientas de *agriGO* (Du *et al.*, 2010; Tian *et al.*, 2017) y *REVIGO* (Supek *et al.*, 2011) (Fig. 22). Se encontró que en el caso del *bZIP25*, sus interactores participan en procesos de respuesta al estrés abiótico y del desarrollo de la planta principalmente, y algo menos en procesos metabólicos (Fig. 22), y que están

relacionados con funciones moleculares como la unión al ADN y proteínas, la unión a iones y metales, y actividades de heterodimerización y activación transcripcional (Fig. 22). En el caso del *bZIP53*, sus interactores están relacionados mayoritariamente con procesos metabólicos y con funciones moleculares como la unión y activación transcripcional (Fig. 22). Finalmente, en cuanto al heterodímero de *bZIP53/bZIP25*, sus interactores únicos participan tanto en procesos del desarrollo, como en respuestas al estrés y el metabolismo, además de estar relacionados con funciones moleculares que incluyen la unión, activación y regulación transcripcional (Fig. 22).

Figura 22. Análisis de Ontología de los Factores que interaccionan con *bZIP25*, *bZIP53* y su heterodímero (*bZIP53/bZIP25*)

(A) Resultados de enriquecimiento en términos OGs para los procesos biológicos de los factores candidatos detectados únicamente para el *bZIP25*, **(C)** *bZIP53* y *bZIP53/25* **(E)**. Las anotaciones de OGs se buscaron en *agriGO* (Du *et al.*, 2010; Tian *et al.*, 2017) y los diagramas de dispersión se obtuvieron con la herramienta de visualización de *scatterplots* de *REVIGO* (Supek *et al.*, 2011). El color de cada esfera indica el *p-value* del Log₁₀. **(B)** Análisis de enriquecimiento de OGs para las funciones moleculares de los factores candidatos únicos para el *bZIP25*, **(D)** *bZIP53* y *bZIP53/25* **(F)**, representados en diagramas circulares obtenidos en excel, a partir de los datos de anotaciones de OGs generados en *REVIGO* (Supek *et al.*, 2011).

4.1.5.2 Relevancia funcional de los factores que interaccionan con el heterodímero *bZIP53/bZIP25*: Análisis de expresión transitoria en protoplastos de *Arabidopsis*

Las búsquedas de interactores en levadura revelaron que un grupo particular de factores interaccionan de forma específica con el heterodímero *bZIP53/bZIP25*. Para investigar si estos FTs identificados confieren una actividad relevante como parte del complejo transcripcional, se realizaron experimentos de expresión transitoria en protoplastos de *Arabidopsis*, seleccionando para su verificación entre dichos FTs: *RD26*, *ERF4* y *DREB2c*. Estos fueron elegidos en base a sus patrones de expresión y por la existencia de datos previos, que indican que desempeñan funciones esenciales en la respuesta a distintos tipos de estrés abiótico y señalización hormonal.

Se realizaron co-transformaciones de protoplastos obtenidos de hojas de plantas de *Arabidopsis*, con plásmidos efectores para *bZIP53*, *bZIP25* y los FTs seleccionados, de forma individual o en diferentes combinaciones, utilizando una construcción delatora que contiene 1kb de la región del promotor del gen *ProDH* (*Prolina Dehydrogenasa*, AT3G30775, diana de *bZIP25/53*) fusionado al gen delator *LUC*. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 23, e indican que cuando se utiliza de forma individual *bZIP25* ó *bZIP53* (homodímeros) aumentan la actividad de la construcción delatora *promoProDH::LUC*. Sin embargo, de forma conjunta (heterodímeros), la transactivación es significativamente mayor, conforme a lo publicado anteriormente (Alonso *et al.*, 2009). Notablemente, este efecto se ve prácticamente eliminado cuando se utiliza alternativamente una construcción con el factor *bZIP53* mutagenizado (Leucina51 y Alanina72 por Prolina; *bZIP53pp*; Weltmeier *et al.*, 2006) que impide su dimerización y pone de manifiesto la relevancia de la formación del heterodímero.

Los experimentos de expresión transitoria realizados con los interactores identificados *ERF4*, *DREB2c* y *RD26* de forma individual, no permiten observar un aumento significativo de la actividad delatora de la construcción *promoProDH::LUC*. Cuando en los ensayos de transformación de protoplastos se utilizó cualquiera de los efectores *bZIP* de forma individual, *bZIP25* ó *bZIP53* en presencia de los FTs interactores *ERF4*, *DREB2c* y *RD26*, tampoco se observó un cambio significativo de la actividad delatora provocada por los

mismos (Fig. 23). Notablemente, si se utilizan simultáneamente *bZIP25*, *bZIP53* y los diferentes interactores, se observa un efecto potenciador, incluso superior al esperado por la formación del heterodímero. Además, este efecto desaparece cuando se emplea el mutante *bZIP53pp*, destacando la importancia de la formación de heterodímeros capaces de incorporar al complejo a los factores interaccionantes. Estos resultados indican que los FTs identificados pueden formar parte del complejo regulador y modular la actividad transcripcional del mismo.

Figura 23. Análisis de expresión transitoria en protoplastos. Ensayo de trans-activación del promotor del gen *Prolina Deshidrogena* (*ProDH*) utilizando los factores *bZIP25*, *bZIP53*, *bZIP53pp* (*bZIP53* mutado), y los tres interactores candidatos *DREB*, *ERF4* y *RD26*. Los asteriscos representan diferencias significativas entre las construcciones indicadas, * $p < 0,05$ mediante Test *t-student*.

CAPÍTULO 2

4.2. IDENTIFICACIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA SEÑALIZACIÓN Y RESPUESTA AL ESTRÉS ABIÓTICO MEDIANTE EL MÉTODO DE REDES *PARENCLÍTICAS*

4.2. IDENTIFICACIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA SEÑALIZACIÓN Y RESPUESTA AL ESTRÉS ABIÓTICO MEDIANTE EL MÉTODO DE REDES PARENCLÍTICAS

Entre las aproximaciones informáticas que permiten la asignación de funciones e identificación de nuevos genes que participan en procesos biológicos particulares está el análisis de redes complejas (Bassel *et al.*, 2012; Bray, 2002). En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación del método de construcción y análisis de Redes Parenclíticas, desarrollado sobre (1) un grupo de datos sintéticos y (2) datos de expresión de genes en respuesta al estrés abiótico de *Arabidopsis thaliana*, con objeto de identificar nuevos genes reguladores que participan en este proceso. Entre los diversos análisis transcriptómicos realizados en *Arabidopsis*, se seleccionaron datos correspondientes a dos estudios dirigidos a la caracterización de la expresión de genes en respuesta a condiciones de estrés osmótico y salino. Como resultado se demuestra la relevancia de la aproximación propuesta en la identificación de elementos funcionales clave en la reprogramación génica, y se compara este método predictivo con métodos alternativos estándar utilizados para análisis similares.

4.2.1 Redes *parenclíticas*: desarrollo de un nuevo método de representación de redes

Los principios del método de construcción y análisis de redes parenclíticas han sido previamente descritos (Zanin y Boccaletti, 2011) y se describen de manera general en la introducción. El punto de partida es una descripción de múltiples características de los elementos de un sistema, por ej. una colección de medidas fenotípicas o niveles de expresión de un gen, y su asociación con uno o múltiples grupos predefinidos. Si bien puede ser inviable trabajar con el grupo completo de datos, en este método se considera la proyección de los datos en todos los planos posibles, creados por pares de características. En la generación de estos planos se utilizan diferentes métodos (desde correlaciones lineales simples, hasta técnicas de minería de datos más sofisticadas) para extraer un modelo de referencia para cada grupo, teniendo en cuenta las características de los

elementos. Ver Figura 24 e introducción para una descripción más detallada del procedimiento completo.

Figura 24. Representación esquemática del método de reconstrucción de las redes *parencíticas*. (A) Representación gráfica del grupo inicial de datos, compuesto de 20 instancias (sistemas) y tres características. Cada instancia es representada por una esfera verde, localizada de acuerdo al valor de sus características en un espacio tridimensional. La superficie de restricción (superficie cableada gris) representa la relación estándar general F de la clase. Un sistema genérico no marcado es representado por una esfera roja. (B-D) Los datos son proyectados después sobre cada uno de los tres planos posibles. Las líneas discontinuas verdes representan los modelos extraídos en cada plano, es decir, $F_{\sim}$. Los puntos rojos son las posiciones del sistema no marcado, y las líneas rojas indican la distancia del sistema de los modelos. (E) La representación *parencítica* resultante es una red donde los nodos están asociados a características, y los enlaces se ponderan de acuerdo a las distancias calculadas (codificado, en esta figura, en diferentes anchos de línea).

El método de reconstrucción propuesto se basa en la técnica de representación de redes introducida en Bray (2002), pero su alcance se ha ampliado considerablemente. Mientras la técnica original sólo se enfocaba en las relaciones lineales entre los niveles de expresión génica, el método implementado en este estudio introduce una red matemática general que es compatible con cualquier tipo de relación y cualquier grupo de datos, siempre que las características sean observables y estén representadas por números.

Además, las características topológicas de la red resultante se pueden utilizar para extraer información importante acerca del sistema. En particular, las condiciones atípicas

corresponden a redes fuertemente heterogéneas, mientras que en las condiciones típicas o normativas se generan redes escasamente conectadas con nodos homogéneos (Bray, 2002). En la medida en que se construya una representación de redes de cada instancia con referencia a la población con la cual se compara, esta técnica se puede considerar como un buscador de diferencias.

4.2.2 Análisis de un grupo de datos sintéticos para comprobar la fiabilidad del método *parenclítico*

Como un primer paso para verificar la fiabilidad del método *parenclítico*, se analizó un grupo de datos sintéticos que comprende 20 instancias (correspondientes a grupos de niveles de expresión) y 10 características –ver métodos para más detalles–. En la Fig. 25 se reportan los resultados obtenidos con este grupo de datos sintéticos. El gráfico de la izquierda representa el comportamiento de las características 1 y 5, para las 9 instancias normales (cuadrados negros) y la instancia anormal (circulo rojo). Debido a la modificación de la característica 5 por la instancia 10, el circulo rojo se desvía del comportamiento normal esperado (línea punteada azul). Las dos redes, de las partes central y derecha de la Figura, respectivamente, representan el resultado de la técnica de reconstrucción *parenclítica* para las instancias 1 y 10, es decir, para una normal y la anormal. Hay dos hechos importantes que deben ser resaltados. Primero, la red correspondiente a la instancia normal tiene una densidad de conexiones mucho más baja que la anormal, indicando correctamente que la mayoría de las relaciones por pares de genes están cerca de la predicción del modelo. Además, la mayoría de los elementos centrales en la red anormal son los nodos 5 y 10, destacando las dos características que han sido alteradas. Es importante destacar que otros nodos también pueden tener una posición central, por ejemplo, el nodo 4, debido al término de ruido f incluido en el conjunto de datos. En general, este resultado indica que el método *parenclítico* identifica correctamente ambos nodos de discordancia.

Figura 25. Reconstrucción de la red *parenclítica* a partir de un grupo de datos sintéticos. El gráfico de la izquierda representa el ajuste lineal de las características 1 y 5; los cuadrados negros representan las instancias 1-9, mientras el punto rojo representa la instancia 10 (la única con niveles de expresión anormales). La red central (derecha) es el resultado del proceso de reconstrucción *parenclítica* para la instancia número 5 (10), es decir, para una instancia normal (anormal). Los nodos y enlaces están coloreados de acuerdo a su α -centralidad y peso, desde verde (baja) a roja (alta). Para mayor claridad, solamente los enlaces con un peso mayor a 1,5, y los nodos conectados al componente grande de la red son representados.

4.2.3 Análisis de datos biológicos usando el método de redes *parenclíticas* para evaluar la respuesta al estrés osmótico de *A. thaliana*

Como segundo paso, se utilizaron las redes *parenclíticas* para analizar datos de expresión de genes de la planta *Arabidopsis thaliana* bajo estrés osmótico, con el objetivo de identificar aquellos genes involucrados en la respuesta de las plantas a esta condición específica. Es importante mencionar que los estreses abióticos representan la causa principal de pérdidas en cultivos a nivel mundial, disminuyendo en más del 50% el rendimiento promedio de muchas plantas cultivables. Por este motivo, es de gran importancia investigar los mecanismos de respuesta de las plantas a dichos estreses y en particular la identificación de los genes implicados.

Los datos de expresión utilizados se han obtenido del proyecto *AtGenExpress* (Seki *et al.*, 2002), de los cuales se ha extraído la información de 1701 genes correspondientes al repertorio de factores transcripcionales (Klok *et al.*, 2002) representado en el *array ATH1* de *Arabidopsis*. El estudio incluye medidas de expresión tomadas en seis puntos de tiempo diferentes (30min, 1h, 3h, 6h, 12h y 24h después de la aplicación del estrés).

En la Figura 26 se muestra un ejemplo de las redes obtenidas (ver materiales y métodos para los detalles de la representación *parenclítica*). El componente más grande de la red que corresponde a 3h después del tratamiento osmótico se representa en la Fig. 26A. El color de los enlaces representa el peso de cada interacción, con tonos verdes o rojos, indicando los valores bajos o altos de los *Z-Scores*, respectivamente, y el tamaño de los nodos es proporcional a los valores de α -centralidad (Bonacich y Lloyd, 2001) -ver métodos para más detalles. Las topologías de la red resultante se caracterizaron por una estructura altamente heterogénea, dominada por un pequeño número de nodos –como se puede observar en la ampliación presentada en la Fig. 26B. Tales nodos, con altos valores de centralidad, indican que a las 3h los niveles de expresión de los genes correspondientes, se desvían fuertemente de las relaciones generalmente establecidas en otros tiempos. Esto sugiere que los factores incluidos en dichos ejes, podrían realizar alguna tarea específica en este punto de tiempo y, por lo tanto, que son actores clave en la regulación de la respuesta general de la planta a ese estrés en particular. La representación de la red *parenclítica* permitió identificar nuevos genes candidatos, descritos en la Tabla N.9. Estos factores eran previamente desconocidos o no se había identificado su relación con la respuesta al estrés osmótico.

Figura 26. Reconstrucción de una red *parenclítica* para evaluar la respuesta de *Arabidopsis thaliana* al estrés osmótico después de 3h de tratamiento. (A) Representación del gran componente de la red; para mayor claridad, no se muestran las conexiones con pesos inferiores a 3. **(B)** Ampliación de las conexiones del nodo más central, AT1G12610. Las etiquetas están ubicadas en la esquina inferior derecha de cada nodo, con

lo cual, AT4G13980 es la etiqueta del nodo pequeño de la izquierda. En ambos casos, el color representa el peso de las conexiones (de verde a rojo), y el tamaño de los nodos se asocia con el valor correspondiente de α -centralidad.

Tabla 9. Lista de nuevos genes identificados, involucrados en la respuesta al estrés osmótico y revelados mediante la representación de redes *parenclíticas*. Se indica para cada gen el código AGI correspondiente y su nombre común, así como el tiempo considerado en la construcción de la red. En la columna de la derecha se muestran los valores de α -centralidad. Posteriormente se logró validar experimentalmente su participación en la respuesta al estrés osmótico.

Periodo de tiempo	Gen	Nombre	Centralidad
30 m.	AT1G13300	HRS1	0.88111
30 m.	AT5G51910	TCP family transcription factor	0.729679
30 m.	AT4G23750	CRF2, Cytokinin response factor 2	0.507826
1 h.	AT1G44830	DREB	1.0
1 h.	AT3G12820	MYB10	0.236686
3 h.	AT2G46830	CCA1, Circadian clock associated 1	0.271497
3 h.	AT5G62320	MYB99	0.177404
3 h.	AT1G29160	COG1	0.148112
6 h.	AT4G16610	C2H2-like zinc finger protein	0.767785
6 h.	AT2G44910	ATHB-4	0.689358
12 h.	AT3G61910	NST2	0.264721
24 h.	AT1G09540	MYB61	0.709785
24 h.	AT2G40950	BZIP17	0.551008
24 h.	AT5G62320	MYB99	0.482752
24 h.	AT5G04410	ANAC078	0.438538

4.2.4 Comprobación experimental de las predicciones realizadas con el método *parenclítico*, de genes candidatos involucrados en la respuesta al estrés osmótico

Para confirmar las predicciones obtenidas mediante la representación *parenclítica*, se realizó una validación *in vivo* de la participación en la respuesta a estrés de los genes correspondientes a los nodos más centrales de cada gráfico. Para ello se alteraron artificialmente sus niveles de expresión (utilizando plantas transgénicas de la colección Transplanta) y se cuantificó si dicha alteración conlleva modificaciones en su respuesta al

estrés aplicado. En la Figura 27 se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos con siete de las líneas transgénicas analizadas, en las que se modificó artificialmente (mediante inducción química) la expresión con respecto a la línea silvestre, de un gen de alto valor de centralidad. En la figura se muestran las medias de la longitud de la raíz de las siete líneas, comparadas con la media de la longitud de la raíz de la línea silvestre (*Wt*, barra de color negro), crecidas ambas bajo condiciones de estrés osmótico. Se observa que la inducción de los genes seleccionados, produce una respuesta funcional significativa en el desarrollo de las plantas bajo las condiciones del estrés aplicado.

Figura 27. Verificación experimental *in vivo* de las predicciones realizadas por el método de las redes *parenclíticas*. (A) Media de la longitud radicular correspondiente al genotipo silvestre (WT, barra negra) y a otras siete líneas transgénicas en las cuales se indujo artificialmente un gen específico. Los bigotes representan la desviación estándar correspondiente a cada grupo y los asteriscos indican los grupos para los que la distribución de la longitud de la raíz es diferente con respecto al WT, con un 0,01 de nivel de significancia. (B) Fotos representativas de una planta de cada una de las ocho líneas al final del experimento. (C) y (D) Imágenes

de dos placas verticales donde crecieron las plántulas. En ambos casos, el lado izquierdo de las fotos se refiere a los fenotipos silvestres y el lado derecho a los fenotipos desarrollados por la línea transgénica.

4.2.5 Análisis de los resultados de la validación *in vivo* en el contexto de las redes predictivas obtenidas

Los resultados de las predicciones y validaciones *in vivo* se resumen en la Fig. 28. Para cada una de las seis redes analizadas (correspondientes a tiempos desde 30 minutos a 24 horas) sólo se consideraron los 20 genes más centrales en cada uno de los tiempos. Esta figura recoge el número de genes que han sido descritos en estudios previos como relevantes para la respuesta de la planta al estrés osmótico, y el número de genes desconocidos revelados por la representación *parenclítica* y que han sido confirmados experimentalmente en nuestro trabajo. Los resultados muestran que el uso de las representaciones de redes *parenclíticas* permitió la predicción y -posterior confirmación experimental- de factores de transcripción claves que no habían sido detectados anteriormente mediante metodologías alternativas.

Figura 28. Resumen de los resultados del experimento de estrés osmótico, comparados con las predicciones realizadas a través de las redes *parenclíticas*. Las barras representan los 20 genes más centrales en cada periodo de tiempo. Para los seis periodos de tiempo considerados, los colores de las barras se han asignado de acuerdo a lo siguiente: genes que no se consideraban involucrados en la respuesta de las plantas al estrés osmótico y que fueron comprobados experimentalmente para desarrollar (verde) o no (rojo) una diferencia estadísticamente significativa en el fenotipo, con respecto al fenotipo silvestre; (celeste) genes predichos mediante el análisis *parenclítico* que ya se consideraban asociados con la respuesta al estrés en la literatura; y (gris) genes previamente desconocidos que no se comprobaron experimentalmente, debido a que no había disponibilidad de las líneas en la colección de *TRANSPLANTA*.

4.2.6 El análisis de representación de redes *parenclíticas* permite predecir la participación de bZIPs de los grupos C/S1 en la respuesta a estrés osmótico en *Arabidopsis*

El análisis de los datos de expresión de factores transcripcionales de *Arabidopsis* en respuesta a estrés osmótico, muestra que los transcritos de *bZIP1*, *53*, *10* y *25* presentan cambios en sus niveles de expresión a distintos tiempos (Tabla 10). Además, en las *redes parenclíticas* correspondientes se observa que los genes de los grupos C/S1 poseen valores y rangos de centralidad importantes, en apoyo de su posible participación en la respuesta adaptativa a este estrés. La tabla que se adjunta a continuación recoge los valores de centralidad de los genes C/S1 (*bZIP10*, *bZIP25*, *bZIP1* y *bZIP53*) en las redes parenclíticas, generadas a partir de datos de expresión de raíces y parte aérea para los distintos tiempos considerados. En cada caso se indica además el cuartil (Q) al que pertenece el valor de la centralidad. Es especialmente destacable que los genes *bZIP10*, *25* y *53* corresponden a nodos con valores de centralidad pertenecientes a Q1 y Q2 en todas las redes obtenidas, lo que sugiere un alto potencial de participación en la respuesta al estrés osmótico. La validación funcional de estos genes se ha demostrado en los distintos ensayos presentados en el apartado 4.1.

Tabla 10. Valores de centralidad de los *bZIP1*, 10, 25 y 53 en las redes *parenclíticas*, en respuesta a estrés osmótico

Raíz	30 min		1h		3h		6h		12h		24h		
AT5G49450	0.05515	Q2	0.00041		0.00003		0.00062		0.00013		0.00077	Q2	bZIP1
AT4G02640	0.12210	Q1	0.05853	Q1	0.00608	Q1	0.21877	Q1	0.01250	Q2	0.22500	Q1	bZIP10
AT3G54620	0.24755	Q1	0.13052	Q1	0.00096	Q2	0.42035	Q1	0.11944	Q1	0.19086	Q1	bZIP25
AT3G62420	0.23629	Q1	0.18965	Q1	0.00112	Q2	0.08152	Q1	0.02124	Q1	0.14598	Q1	bZIP53

Parte aérea	30 min		1h		3h		6h		12h		24h		
AT5G49450	0.05515	Q2	0.00041		0.00003		0.00062		0.00013		0.00077		bZIP1
AT4G02640	0.12210	Q1	0.05853	Q1	0.00608	Q1	0.21877	Q1	0.01250	Q2	0.22500	Q1	bZIP10
AT3G54620	0.24755	Q1	0.13052	Q1	0.00096	Q2	0.42035	Q1	0.11944	Q1	0.19086	Q1	bZIP25
AT3G62420	0.23629	Q1	0.18965	Q1	0.00112	Q2	0.08152	Q1	0.02124	Q1	0.14598	Q1	bZIP53

5. DISCUSIÓN

5.1. Los factores transcripcionales *bZIP10*, *25*, *1* y *53* participan en la regulación de la respuesta a estrés abiótico en *Arabidopsis*

Los factores bZIP de las clases C y S1 fueron inicialmente descritos como importantes componentes reguladores de la expresión génica en la semilla, en particular, del control de la expresión de proteínas de reserva durante la fase de maduración. Desde la identificación del primer miembro fundacional de la clase C, el factor *Opaco2* (*O2*) de maíz, pronto se identificaron otros miembros capaces de dimerizar con *O2*, como el factor OHP1, poniendo de relieve la capacidad de heterodimerización de este grupo de proteínas. A partir de los miembros conocidos en monocotiledóneas, se fueron identificando los correspondientes genes ortólogos en dicotiledóneas. Especialmente, la disponibilidad de la secuencia del genoma completo de *Arabidopsis thaliana* permitió la anotación de la familia bZIP en esta especie y su clasificación en diversos grupos en base a sus secuencias proteicas.

En *Arabidopsis* existen cuatro miembros pertenecientes a la clase C (*bZIP9*, *10*, *25* y *63*), de los cuales los únicos que presentan expresión en el embrión durante el desarrollo de la semilla son *bZIP10* y *25*. Además, se identificaron cinco miembros pertenecientes a la clase S1 (*bZIP1*, *2*, *11*, *44* y *53*) capaces de formar heterodímeros con gran afinidad con los miembros de la clase C. En particular, se demostró que *bZIP53* participa junto con *bZIP10* y *25* en el control de los programas de maduración de la semilla, donde presenta altos niveles de expresión. A diferencia de las monocotiledóneas, donde existen miembros como *O2* cuya expresión se restringe exclusivamente a la semilla, en *Arabidopsis* todos los miembros de las clases C y S1, presentan además patrones de expresión en otros órganos, indicando que deben desempeñar funciones adicionales a las descritas en este órgano.

En esta tesis se han identificado nuevas funciones de los factores transcripcionales bZIP C/S1 en respuesta al estrés abiótico en tejidos vegetativos de *Arabidopsis*, concretamente en respuesta a estrés osmótico, de sequía y oxidativo, evidenciadas en primer termino por los análisis fenotípicos de distintas líneas de pérdida y ganancia de función de estos factores, en las que se observaron fenotipos de sensibilidad y tolerancia a dichos estreses,

respectivamente. Además, se han llevado a cabo diferentes estudios moleculares que han contribuido a desentrañar el modo de actuación de dichos factores y la relevancia de la formación de heterodímeros como un importante mecanismo regulador.

5.1.1. Estudio de los patrones de expresión de los bZIPs C/S1 en *Arabidopsis*

Con objeto de investigar las posibles funciones de los distintos miembros bZIP C/S1 y en particular de aquellos que participan en el control de la expresión génica en la semilla, se procedió a investigar detalladamente los patrones de expresión de los distintos bZIPs C/S1, con especial interés en los posibles solapamientos en su expresión, por las posibilidades combinatorias que esto conlleva, debido a la importancia de su actuación como dímeros.

En estudios previos realizados con líneas transgénicas de *Arabidopsis* que contienen promotores de bZIPs de los grupos C/S1 fusionados a un gen delator *uidA*, se detectaron patrones de expresión parcialmente solapantes de estos genes en tejidos sumidero específicos como hojas jóvenes, semillas y anteras (Weltmeier *et al.*, 2009). En particular, se observó que las fusiones a promotores de *bZIP10* y *bZIP53* presentaban actividad *GUS* en las semillas, mientras que las de *bZIP25* y *bZIP1* se expresaron en las valvas de las silículas. Así mismo, *bZIP25* también se expresa levemente en la semilla. Todos estos bZIP se expresaban en flores, específicamente en las anteras donde su expresión es diferencial debido a que *bZIP25*, *1* y *53* lo hacen en polen, mientras que *bZIP10* exclusivamente en el tejido conectivo (Weltmeier *et al.*, 2009). Utilizando este mismo sistema, se ha demostrado además que líneas de *bZIP10* y *bZIP53* incrementan su actividad *GUS* en el tejido meristemático foliar bajo condiciones de baja osmolaridad (hipo-osmolaridad), en contraste con el *bZIP25* que no presenta actividad en este tejido (Weltmeier *et al.*, 2006). Teniendo en cuenta que los bZIP C/S1 se expresan de forma constitutiva en distintos tejidos de la planta y que algunos de ellos cambian su expresión bajo estrés abiótico (Dietrich *et al.*, 2011), en este trabajo se evaluaron los patrones de expresión de los *bZIP10*, *25*, *1* y *53* en respuesta a estrés osmótico promovido por altas concentraciones de manitol.

Como se ha presentado en el apartado de resultados correspondiente, se estudió en primer lugar el comportamiento de dichos genes bajo condiciones de estrés osmótico inducido por manitol, mediante RT-qPCR. Además, utilizando líneas con fusiones de promotores al gen delator *uidA*, pudimos demostrar que existe expresión inducida de estos genes con un patrón solapante al menos en tejidos de la raíz, indicando su posible participación en las respuestas de la planta a dicho estrés.

5.1.2. Estudio funcional de mutantes de ganancia y pérdida de función de los factores bZIP C/S1 en sus respuestas al estrés abiótico

En base a los datos obtenidos en los estudios de expresión, procedimos a realizar un estudio funcional de diferentes líneas de *Arabidopsis* con ganancia y pérdida de función de los factores *bZIP1*, *10*, *25* y *53*, y su comportamiento frente a estrés osmótico.

En primer lugar, se analizaron plantas de ganancia de función (por sobreexpresión bajo el promotor *CaMV35s*) de cada uno de los factores, observándose que todas ellas muestran una mayor tolerancia a la sequía (mayores tasas de supervivencia y menor pérdida de agua en comparación con la línea silvestre *Col-0*). Así mismo, todas ellas presentan mayores niveles de tolerancia al estrés osmótico provocado por manitol, en ensayos de crecimiento de raíz.

Analizamos a continuación las plantas con pérdida de función (mutantes de inserción T-ADN) en los genes *bZIP1*, *10*, *25* y *53*, correspondientes a mutantes simples o múltiples en diferentes combinaciones. Sin entrar en detalle por haber sido descrito extensamente en el apartado de resultados, las mutaciones simples presentaron fenotipos opuestos a las líneas de ganancia de función: menor tolerancia a la sequía y al estrés osmótico por manitol. De manera destacable, las mutaciones en múltiples miembros resultan en fenotipos aditivos, siendo mas drásticas las que eliminan funciones en su totalidad C (*bzip10-bzip25*) o S1 (*bzip1-bzip53*) y aún en mayor medida los mutantes triples y el cuádruple (pérdida de

funciones C y S1). Estos resultados permiten concluir que deben existir interacciones entre ambas funciones, probablemente sustentadas en la capacidad de formación de dímeros, que son necesarias para manifestar la respuesta integral al estrés osmótico.

Hemos podido verificar que los mutantes de pérdida y ganancia de función presentan respectivamente los comportamientos de sensibilidad y tolerancia frente al estrés oxidativo (generado por cadmio), una forma de estrés que subyace de forma común a distintos tipos de estrés abiótico.

Para estudiar en profundidad los posibles mecanismos moleculares responsables del modo de acción de los bZIPs, correspondientes a las funciones C y S1, nos planteamos investigar diversos aspectos derivados de su capacidad de formación de heterodímeros que se discuten a continuación.

5.1.3. Caracterización molecular de los mecanismos de acción de los factores bZIP C/S1

Se plantearon tres tipos de estudios que permitieran distinguir la contribución específica de cada una de las funciones C y S1, así como los efectos resultantes de su interacción.

5.1.3.1 Un análisis transcriptómico de plantas de pérdida de función de diferentes bZIPs, en las que se encontraba suprimida la función C (*bzip10-25*), S1 (*bzip1-53*) y C/S1 (*bzip10-25-1-53*), bajo un tratamiento de estrés osmótico con respecto a la condición control, comparadas con el genotipo silvestre (*Col-0*) (ver sección 3.10.1). Los resultados del análisis mediante *RNAseq* permitieron identificar genes diferencialmente expresados en distintas comparaciones por pares de muestras, en condiciones de estrés osmótico con respecto al control (ver sección 4.1.3.1), encontrando que los bZIPs de los grupos C y S1, participan tanto en la regulación de la expresión de distintos grupos de genes, como en la regulación de genes en común para los dos grupos en respuesta al estrés osmótico. El posterior análisis de ontologías de genes llevado a cabo en este estudio, permite concluir que entre los genes regulados por la función C, una parte corresponde a genes relacionados

con mecanismos de respuesta al estrés abiótico. De forma análoga, se puede concluir lo mismo con respecto a los regulados por la función S1. Sin embargo, entre los genes regulados simultáneamente por ambas funciones C y S1, aparecen grupos nuevos de genes, relacionados con diferentes funciones metabólicas y procesos de señalización que podrían contribuir adicionalmente en la tolerancia frente al estrés abiótico. En este sentido, sería interesante realizar futuros experimentos de inmunoprecipitación de cromatina, para establecer si los mismos son regulados directamente por heterodímeros de bZIPs representantes de las funciones C y S1, o resultan de una regulación indirecta. Adicionalmente, la investigación del posible enriquecimiento en secuencias de reconocimiento de los diferentes bZIPs, en los promotores de los distintos grupos de genes, podría ser esclarecedora y se planea su realización (ver siguiente punto).

5.1.3.2 La identificación de las secuencias diana de los distintos bZIP-C/S1 se realizó mediante un ensayo de unión *in vitro* de las distintas proteínas con una micromatriz de oligonucleótidos de doble cadena, lo que permitió establecer las secuencias de unión consenso para cada uno de los bZIPs. Es de destacar que las secuencias consenso identificadas para los bZIPs de las clases C y S1 son distintas, lo que explicaría en parte los diferentes grupos de genes regulados por estos. En base a estos resultados, cabría especular la posibilidad de que genes regulados directamente por heterodímeros de los miembros C y S1, presentaran en sus promotores dianas formadas por combinaciones de semi-sitios diana de ambos.

5.1.3.3 La capacidad de formación de complejos transcripcionales de homodímeros y heterodímeros de los bZIP-C/S1 fue investigada para esclarecer las bases de su distinta actividad reguladora, independientemente de las secuencias diana con las que interaccionan. Los bZIPs C y S1 son capaces de formar dímeros entre sí y de dimerizar con factores miembros de otras familias (Ehlert *et al.*, 2006; Alonso *et al.*, 2009), incrementando su actividad transcripcional. Se realizó el rastreo de una colección de factores de transcripción de *Arabidopsis* mediante ensayos de doble y triple híbrido en levaduras, que permitió identificar factores que interaccionan con homodímeros de la clase C, homodímeros de la clase S1 y -de forma destacable- específicamente con heterodímeros de ambas. Este resultado tiene implicaciones importantes en cuanto a la capacidad de reclutar nuevos factores a complejos transcripcionales a través de los heterodímeros, que

no puede ser desarrollada por los homodímeros. Algunos de los factores identificados (*ERF4* y *DREB2H*) tienen importantes funciones en respuestas al estrés abiótico y hemos podido demostrar en ensayos de expresión transitoria en protoplastos, que aumentan significativamente la activación de genes diana de los heterodímeros (*ProDH1*, prolina deshidrogenasa).

En este trabajo de tesis se han obtenido datos de expresión de los genes bZIP C/S1 considerados, que junto con los ensayos fenotípicos realizados con mutantes de ganancia y pérdida de función de los mismos, apoyan su participación en las respuestas a estrés abiótico. Además, mediante análisis transcriptómicos se han identificado genes regulados por los mismos, cuyas funciones corresponden a procesos típicamente asociados a mecanismos de señalización y defensa frente a estrés. Adicionalmente se ha establecido la relevancia de la actuación conjunta de las funciones C y S1, y esclarecido las bases moleculares de su forma de actuación.

5.2 El método *parenclítico* ofrece una nueva forma de representación y análisis de redes

La disponibilidad creciente de datos derivados del uso de las tecnologías ómicas hace necesarios la aplicación y el desarrollo de diversos métodos de análisis entre los que la teoría de redes representa una opción muy atractiva, tal como se ha descrito en la introducción. En los últimos años, se ha extendido enormemente su uso en el tratamiento de datos biológicos y en particular de datos derivados de estudios de expresión génica. Es destacable el crecimiento masivo en el número de experimentos de este tipo que son depositados anualmente en las bases de datos (p.ej. más de 50.000 muestras derivadas de estudios en ratón/humanos fueron depositadas en *GEO Database* en el año 2016 (Lachmann *et al.*, 2018), lo que abre nuevas posibilidades de estudios comparativos y la necesidad de análisis de integración.

Este tipo de datos han sido tratados mediante diferentes técnicas, enfocadas desde el análisis de expresión diferencial (Lucretius, 1968; Seki *et al.*, 2002; Kilian *et al.*, 2007; Zanin y Boccaletti, 2011), a las redes de co-expresión (Bassett y Bullmore, 2006; Bullmore y

Sporns, 2009; Rubinov y Sporns, 2010). En este trabajo hemos aplicado una nueva metodología de construcción y representación de redes, el método *parenclítico*, enteramente distinta a las anteriores en sus principios por lo que se espera que sus resultados sean complementarios.

El método *parenclítico* permite la representación de redes tanto para grupos de datos estáticos (derivados de una observación puntual) como dinámicos (obtenidos de observaciones a través del tiempo). Mediante la explotación de datos asociados a un grupo de “sujetos” previamente etiquetados, y la extracción de un conjunto de modelos de referencia, es posible construir redes cuyas conexiones representen la presencia de desviaciones de las relaciones esperadas.

Específicamente, las redes de co-expresión, analizan las similitudes de niveles de expresión de pares de genes a través de un conjunto de observaciones, lo que permite asignarles un índice de proximidad. Por el contrario, la representación de redes *parenclíticas* se enfoca en pares de genes, cuya expresión se aparta de un modelo de referencia, concentrándose así en las diferencias que son valoradas igualmente con un índice cuantitativo. En comparación con las aproximaciones clásicas donde se obtiene una red única reflejando similitudes a través de distintas observaciones, en la representación *parenclítica*, la construcción de una red propia para cada observación permite hacer valoraciones de los componentes mas relevantes de la red en esa situación particular.

Frente a la interpretación intuitiva y directa de los resultados de una red clásica de coexpresión, donde la proximidad de los elementos permite inferir funciones semejantes entre los mismos (según el principio “*guilt by association*”), la interpretación de las redes *parenclíticas* es menos intuitiva. La proximidad de los elementos en este caso no implica inequívocamente funcionalidad semejante, sino descoordinación de los mismos en esa observación particular con respecto a su referencia común (obtenida de todas las observaciones). Indicaría que dichos elementos tienen un comportamiento anómalo en esa situación y por ello pueden ser relevantes. La metodología *parenclítica* fue inicialmente desarrollada sobre un conjunto de datos metabólicos de distintos sujetos, donde la alteración de relaciones entre distintos metabolitos permitió identificar marcadores relevantes asociados a disfuncionalidad en individuos concretos. En este trabajo hemos

aplicado esta metodología al estudio de la expresión génica, partiendo de la hipótesis de que los genes que se apartan de su “coordinación” (función de referencia), podrían estar implicados en las respuestas a una condición particular. Además, hemos decidido construir las redes seleccionando *a priori* genes reguladores (en este caso el repertorio conocido de factores de transcripción de *Arabidopsis*), con objeto de reducir el número de genes considerados y facilitar el cálculo de las redes, así como para aumentar la relevancia funcional de los mismos y facilitar la interpretación de los resultados.

5.2.1 Aplicación del método *parenclítico* en la identificación de nuevos genes relevantes en las respuestas a estrés abiótico en plantas

De acuerdo al planteamiento conceptual expuesto en el punto anterior, hemos seleccionado como datos de partida, el conjunto de experimentos que integran la serie de estrés abiótico de *Arabidopsis* AtGeneExpress, consistente en muestras de raíz y parte aérea de plantas sometidas a diversos estreses y a diferentes periodos de tiempo.

Para cada pareja de genes se ha construido una función de referencia utilizando las muestras correspondientes a cada tratamiento independiente (en este caso estrés osmótico) y origen de la muestra (parte aérea o raíz). Esta selección está motivada en haber utilizado para calcular la función de ajuste la regresión lineal y ser éste un procedimiento bastante restrictivo. Con respecto a esta referencia se han obtenido las redes *parenclíticas* correspondientes a cada tiempo (para tratamiento y tejido muestra) y se han calculado los valores de centralidad de sus nodos. Un mayor valor de centralidad indicaría una mayor conexión a distintos nodos, reflejando un comportamiento anómalo (“descoordinación”) de ese nodo con respecto a los demás. De acuerdo a la hipótesis planteada, esta descoordinación reflejaría una posible relevancia funcional y la implicación de que ese gen (FT) participe en la reprogramación de la expresión génica en la situación particular considerada.

La metodología propuesta permitió identificar genes clave que regulan la respuesta al estrés osmótico de la planta *Arabidopsis thaliana*, cuyas funciones eran previamente desconocidas en la literatura y que no habían sido desvelados por otros procedimientos de análisis de datos. El método *parenclítico* permitió obtener una selección de genes

candidatos sobre la que realizamos una validación experimental. Para ello se planteó la caracterización fenotípica de plantas en las que se viera alterada de forma artificial la expresión de dichos genes, verificando si presentan modificaciones con respecto a las plantas con niveles endógenos no alterados (en esencia se trata de la estrategia comúnmente utilizada en la caracterización de mutantes de ganancia o pérdida de función). Se empleó para tal fin la colección Transplanta (TPT, Coego *et al.*, 2014) que permite la inducción controlada de FTs de forma individualiza y por lo tanto posibilita discriminar si los efectos observados son debidos a la expresión de gen candidato de manera independiente al tratamiento de estrés (osmótico) aplicado.

A partir de las predicciones del método *parenclítico* se tomaron como genes candidatos para su validación experimental los 20 nodos con mayores valores de centralidad de cada una de las redes. Entre estos, se verificó que el 5% de había sido ya previamente descrito por su implicación en la tolerancia al estrés osmótico. De los restantes y de acuerdo a su disponibilidad en la colección TPT se tomaron 22 genes candidatos para su verificación experimental, de los cuales 6 resultaron ser falsos positivos. Sin embargo, los demás mostraron un fenotipo dependiente de la aplicación de estrés osmótico, confirmado el poder predictivo del método y un alto porcentaje de éxito.

Cabe mencionar que hemos realizado análisis semejantes al presentado aquí para estrés osmótico, utilizando datos de expresión de otros tipos de estrés abiotico (salinidad y estrés oxidativo). En ambos casos hemos obtenido predicciones similares, que han permitido identificar y validar experimentalmente nuevos reguladores implicados en dichos procesos. En definitiva, el método *parenclítico* representa una alternativa sólida a otros métodos de caracterización de procesos biológicos mediante el uso de redes, con una alta tasa de éxito en la predicción de genes implicados y asignación de nuevas funciones.

6. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

En este trabajo se han identificado nuevas funciones para los genes que codifican los factores transcripcionales de tipo bZIP C/S1: *bZIP10*, *bZIP25*, *bZIP1* y *bZIP53*, en la respuesta al estrés abiótico en *Arabidopsis*.

1. El análisis de expresión de los genes que codifican los factores *bZIP10*, *bZIP25*, *bZIP1* y *bZIP53* en respuesta a estreses abióticos, tales como la deshidratación, la salinidad y el estrés osmótico, indica que dichos genes están involucrados en las respuestas adaptativas a los mismos en tejidos vegetativos.
2. La sobreexpresión constitutiva de los genes *bZIP1*, *bZIP53*, *bZIP10* y *bZIP25* en *Arabidopsis* conlleva un aumento de la tolerancia a los estreses osmótico, hídrico y oxidativo.
3. Mutantes de pérdida de función sencillos y múltiples de los genes *bZIP10* y *bZIP25* (grupo C), *bZIP1* y *bZIP53* (grupo S1), son más sensibles a los estreses hídrico, osmótico y oxidativo que el silvestre (WT). La pérdida de función de múltiples genes presenta un efecto aditivo y sugiere que actúan conjuntamente, siendo necesarias ambas funciones C y S1 para una respuesta integral.
4. El análisis transcriptómico mediante secuenciación de ARNs de plantas con pérdida de las funciones C (*bzip10-bzip25*), S1 (*bzip1-bzip53*), C/S1 (*bzip10-bzip25-bzip1-bzip53*) y el silvestre (*Col-0*), sometidas a estrés osmótico, reveló que los factores bZIP-C/S1 controlan la expresión de grupos comunes y específicos de genes regulados por estrés osmótico.
5. El análisis de los genes diferencialmente expresados en dichos mutantes reveló que FTs de cada grupo C y S1 regulan distintas funciones en respuesta a estrés. Así, *bZIP10* y *bZIP25* controlan la expresión de genes implicados en el metabolismo de lípidos, aminoácidos y lignina, apoptosis y organización del nucleosoma; mientras

bZIP1 y *bZIP53* regulan genes implicados en el sistema de endomembrana y componentes de la pared. Además, el análisis del cuádruple mutante *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* (C/S1), reveló que los factores C y S1 regulan de forma conjunta la expresión de genes implicados en la biosíntesis de pigmentos y clorofila, señalización de membrana, metabolismo de ARN y del nitrógeno, y respuesta a estrés y jasmonato.

6. Los factores transcripcionales *bZIP10* y *bZIP25* (C) reconocen preferentemente una misma diana de ADN, con secuencia consenso 5'-TG(C/A)TGAC-3', mientras que *bZIP1* y *bZIP53* (S1) reconocen una diana con secuencia consenso 5'-TG(C/G)ACGTG-3', lo que sugiere que dichos FTs pueden regular distintos grupos de genes cuando actúan como homodímeros.
7. Se han identificado nuevos factores transcripcionales que son interactores específicos y comunes de *bZIP25* (C) y *bZIP53* (S1). Además, se han reconocido factores que interaccionan específicamente con el complejo heterodimérico *bZIP53/bZIP25*, entre los cuales se encuentran *RD26*, *RAP2.1* y *ERF4*, que desempeñan funciones relevantes en la respuesta al estrés abiótico.
8. Ensayos de expresión transitoria en protoplastos demostraron que la interacción del heterodímero *bZIP53/bZIP25* con *DREB2c* y *ERF4* aumenta la capacidad de transactivación del complejo sobre el promotor del gen diana *Prolina deshidrogenasa*.
9. Se ha aplicado un nuevo método de cálculo y representación de redes, que permitió predecir nuevas relaciones funcionales entre genes expresados en respuesta a estrés osmótico en *Arabidopsis*, así como identificar nuevos "genes candidatos" que participan en dicha respuesta.
10. La sobreexpresión en *Arabidopsis* de distintos "genes candidatos" identificados en el apartado anterior, promueve un aumento de la tolerancia al estrés osmótico, lo

que valida dicho método como una herramienta útil para el análisis de redes y la identificación de nuevas funciones génicas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Abe, H., Urao, T., Ito, T., Seki, M., Shinozaki, K., and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2003). *Arabidopsis* AtMYC2 (bHLH) and AtMYB2 (MYB) Function as Transcriptional Activators in Abscissic Acid Signaling. *The Plant Cell*, 15(1), 63–78.
- Abràmoff, M.D., Magalhães, P.J., and Ram, S.J. (2004). Image processing with ImageJ. *Biophotonics International*, 11(7), 36-42.
- Adcock, I.M., and Caramori, G. (2009). Transcription factors. *Asthma and COPD: Basic Mechanisms and Clinical Management*, pp. 373-380. ISBN: 9780123740014.
- Akhtar, I., and Nazir, N. (2013). Effect of Waterlogging and Drought Stress in Plants. *International Journal of Water Resources and Environmental Sciences*, 2(2), 34-40.
- Albani, D., Hammond-Kosack, M. C., Smith, C., Conlan, S., Colot, V., Holdsworth, M., and Bevan, M. W. (1997). The wheat transcriptional activator SPA: a seed-specific bZIP protein that recognizes the GCN4-like motif in the bifactorial endosperm box of prolamin genes. *The Plant Cell*, 9(2), 171–184.
- Alonso, R., Oñate-Sánchez, L., Weltmeier, F., Ehlert, A., Diaz, I., Dietrich, K., Vicente-Carbajosa, J., and Dröge-Laser, W. (2009). A pivotal role of the basic leucine zipper transcription factor *bZIP53* in the regulation of *Arabidopsis* seed maturation gene expression based on heterodimerization and protein complex formation. *The Plant Cell*, 21(6), 1747-1761.
- Astolfi, S., Zuchi, S., and Passera, C. (2004). Role of sulphur availability on cadmium-induced changes of nitrogen and sulphur metabolism in maize (*Zea mays* L.) leaves. *Journal of Plant Physiology*, 161(7), 795–802.
- Badjakov, I., Kondakova, V., and Atanassov, A. (2012). Metabolomics: Current View on Fruit Quality in Relation to Human Health. In: Benkeblia N. (Ed.), *Sustainable Agriculture and New Technologies*. Boca Raton: CRC Press, pp. 303-320.
- Baena-González, E., Rolland, F., Thevelein, J. M., and Sheen, J. (2007). A central integrator of transcription networks in plant stress and energy signalling. *Nature*, 448(7156), 938–942.
- Baena-González, E., and Sheen, J. (2008). Convergent energy and stress signaling. *Trends in Plant Science*, 13(9), 474–482.
- Bartels, D and Sunkar, R. (2005). Drought and salt tolerance in plants. *Critical Reviews in Plant Sciences*, 24(1), 23–58.
- Bassel, G.W., Gaudinier, A., Brady, S.M., Hennig, L., Rhee, S.Y., and De Smet, I. (2012). Systems Analysis of Plant Functional, Transcriptional, Physical Interaction, and Metabolic Networks. *The Plant Cell*, 24(10), 3859–3875.
- Bassett, D.S., and Bullmore, E. (2006). Small-World Brain Networks. *The Neuroscientist*, 12(6), 512–523.

- Bemer, M., van Dijk, A.D.J., Immink, R.G.H., and Angenent, G.C. (2017). Cross-Family Transcription Factor Interactions: An Additional Layer of Gene Regulation. *Trends in Plant Science*, 22(1), 66–80.
- Benavides, M.P., Gallego, S.M., and Tomaro, M. (2005). Cadmium toxicity in plants. *Brazilian Journal of Plant Physiology*, 17(1), 21–34.
- Bensen, R., Castiglioni, P., Korte, J., Bell, E., Hinchey, B., Loida, P., and Ahrens, J. (2008). Transgenic plants with increased glycine-betaine. United States Patent 7410800. Application Number:10/839092.
- Bensmihen, S., Rippa, S., Lambert, G., Jublot, D., Pautot, V., Granier, F., Giraudat, J., and Parcy, F. (2002). The homologous ABI5 and EEL transcription factors function antagonistically to fine-tune gene expression during late embryogenesis. *The Plant Cell*, 14(6), 1391-1403.
- Bhargava, S., and Sawant, K. (2012). Drought stress adaptation: metabolic adjustment and regulation of gene expression. *Plant Breeding*, 132(1), 21–32.
- Bohnert, H.J., and Jensen, R.G. (1996). Strategies for engineering water-stress tolerance in plants. *Trends in Biotechnology*, 14(3), 89–97.
- Bonacich P., and Lloyd P. (2001). Eigenvector-like measures of centrality for asymmetric relations. *Social Networks*, 23 (3), 191-201.
- Bradford, M.M (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*, 72(1-2), 248–254.
- Bray, E. A. (2002). Classification of Genes Differentially Expressed during Water-deficit Stress in *Arabidopsis thaliana*: an Analysis using Microarray and Differential Expression Data. *Annals of Botany*, 89(7), 803–811.
- Bullmore E., and Sporns O. (2009). Complex brain networks: Graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186–198.
- Capell, T., Bassie, L., and Christou, P. (2004). Modulation of the polyamine biosynthetic pathway in transgenic rice confers tolerance to drought stress. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(26), 9909–9914.
- Carbonero, P., Iglesias-Fernández, R., and Vicente-Carbajosa, J. (2017). The AFL subfamily of B3 transcription factors: evolution and function in angiosperm seeds. *Journal of Experimental Botany*, 68(4), 871–880.
- Carmona-Saez, P., Chagoyen, M., Tirado, F., Carazo, J. M., and Pascual-Montano, A. (2007). GENECODIS: a web-based tool for finding significant concurrent annotations in gene lists. *Genome Biology*, 8(1), R3. Available at: <http://genecodis.cnb.csic.es>.
- Castrillo, G., Turck, F., Leveugle, M., Lecharny, A., Carbonero, P., Coupland, G., *et al.*

(2011). Speeding *Cis-Trans* Regulation Discovery by Phylogenomic Analyses Coupled with Screenings of an Arrayed Library of *Arabidopsis* Transcription Factors. *PLoS ONE*, 6(6), e21524.

Chen, T. H.H., and Murata, N. (2008). Glycinebetaine: an effective protectant against abiotic stress in plants. *Trends in Plant Science*, 13(9), 499–505.

Choi, H., Hong, J., Ha, J., Kang, J., and Kim, S.Y. (2000). ABFs, a Family of ABA-responsive Element Binding Factors. *Journal of Biological Chemistry*, 275(3), 1723–1730.

Clough, S.J., and Bent, A.F. (1998). Floral dip: A simplified method for *Agrobacterium*-mediated transformation of *Arabidopsis thaliana*. *The Plant Journal*, 16(6), 735–743.

Coego, A., Brizuela, E., Castillejo, P., Ruíz, S., Koncz, C., del Pozo, J.C., Piñeiro, M., Jarillo, J.A., Paz-Ares, J., and León, J.; TRANSPLANTA Consortium (2014). The TRANSPLANTA collection of *Arabidopsis* lines: a resource for functional analysis of transcription factors based on their conditional overexpression. *The Plant Journal*, 77(6) 944–953.

Colmer, T.D., Munns, R., and Flowers, T.J. (2005). Improving salt tolerance of wheat and barley: future prospects. *Australian Journal of Experimental Agriculture*, 45(11), 1425-1443.

Cook, D., Fowler, S., Fiehn, O., and Thomashow, M.F. (2004). A Prominent Role for the CBF Cold Response Pathway in Configuring the Low-Temperature Metabolome of *Arabidopsis*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 101(42), 15243–15248.

Corrêa, L.G.G., Riaño-Pachón, D.M., Schrago, C.G., dos Santos, R.V., Mueller-Roeber, B., and Vincentz, M. (2008). The Role of bZIP Transcription Factors in Green Plant Evolution: Adaptive Features Emerging from Four Founder Genes. *PLoS ONE*, 3(8), e2944.

Cortina, C., and Culiáñez-Macià, F.A. (2005). Tomato abiotic stress enhanced tolerance by trehalose biosynthesis. *Plant Science*, 169(1), 75–82.

Cramer, G., Urano, K., Delrot, S., Pezzotti, M., and Shinozaki, K. (2011). Effects of abiotic stress on plants: a systems biology perspective. *BMC plant biology*, 11(1), 163.

Czechowski, T., Stitt, M., Altmann, T., Udvardi, M. K., and Scheible, W.-R. (2005). Genome-Wide Identification and Testing of Superior Reference Genes for Transcript Normalization in *Arabidopsis*. *Plant Physiology*, 139(1), 5–17.

Daszkowska-Golec, A., and Szarejko, I. (2013). The Molecular Basis of ABA-Mediated Plant Response to Drought. In: K. Vahdati and C. Leslie (Ed.), *Abiotic Stress - Plant Responses and Applications in Agriculture*. pp.103-133. ISBN: 978-953-51-1024-8. *InTech*.

Dietrich, K., Weltmeier, F., Ehlert, A., Weiste, C., Stahl, M., Harter, K., and Dröge-Laser, W. (2011). Heterodimers of the *Arabidopsis* transcription factors bZIP1 and bZIP53 reprogram amino acid metabolism during low energy stress. *The Plant Cell*, 23(1), 381–395.

Dixonm R.A., and Strack, D. (2003). *Phytochemistry Meets Genome Analysis and Beyond*.

Phyto-chemistry, 62(6), 815-816.

Dobrenel, T., Caldana, C., Hanson, J., Robaglia, C., Vincentz, M., Veit, B., and Meyer, C. (2016). TOR Signaling and Nutrient Sensing. *Annual Review of Plant Biology*, 67(1), 261–285.

Doidy, J., Li, Y., Neymotin, B., Edwards, M.B., Varala, K., Gresham, D., and Coruzzi, G.M. (2016). “Hit-and-Run” transcription: de novo transcription initiated by a transient bZIP1 “hit” persists after the “run”. *BMC Genomics*, 17(1), 92.

Dong, J., Wu, F., and Zhang, G. (2006). Influence of cadmium on antioxidant capacity and four microelement concentrations in tomato seedlings (*Lycopersicon esculentum*). *Chemosphere*, 64(10), 1659–1666.

Dröge-Laser, W., Snoek, B. L., Snel, B., and Weiste, C. (2018). The *Arabidopsis* bZIP transcription factor family — an update. *Current Opinion in Plant Biology*, 45, 36–49.

Dröge-Laser, W., and Weiste, C. (2018). The C/S1 bZIP Network: A Regulatory Hub Orchestrating Plant Energy Homeostasis. *Trends in Plant Science*, 23(5), 422-433.

Du, Z., Zhou, X., Ling, Y., Zhang, Z., and Su, Z. (2010). agriGO: a GO analysis toolkit for the agricultural community. *Nucleic Acids Research*, 38 (Web Server issue), W64–W70. Available at: <http://bioinfo.cau.edu.cn/agriGO/analysis.php>.

Duque, A.S., De Almeida, A.M., Da Silva, A.B., Da Silva, J.M., Farinha, A.P., Santos, D., Fevereiro, P., and De Sousa Araújo, S. (2013). Abiotic Stress Responses in Plants: Unraveling the Complexity of Genes and Networks to Survive. In: K. Vahdati and C. Leslie (Ed.), *Abiotic Stress - Plant Responses and Applications in Agriculture*. pp. 49-101. ISBN: 978-953-51-1024-8. *InTech*.

Egea-Cortines, M., Saedler, H., and Sommer, H. (1999). Ternary complex formation between the MADS-box proteins SQUAMOSA, DEFICIENS and GLOBOSA is involved in the control of architecture in *Antirrhinum majus*. *EMBO Journal*, 18(19): 5370-5379.

Ehlert, A., Weltmeier, F., Wang, X., Mayer, C., Smeekens, S., Vicente-Carbajosa, J., and Dröge-Laser, W. (2006). Two-hybrid protein-protein interaction analysis in *Arabidopsis* protoplasts: establishment of a heterodimerization map of group C and group S bZIP transcription factors. *The Plant Journal*, 46(5), 890–900.

Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., and Basra, S.M.A. (2009). Plant drought stress: effects, mechanisms and management. *Agronomy for Sustainable Development*, 29(1), 185–212.

Finkelstein, R.R., and Lynch, T.J. (2000). The *Arabidopsis* Absciscic Acid Response Gene *ABI5* Encodes a Basic Leucine Zipper Transcription Factor. *The Plant Cell*, 12(4), 599-609.

Finkelstein, R. (2013). Absciscic Acid synthesis and response. *The Arabidopsis book / American Society of Plant Biologists*, 11, e0166.

Flowers, T.J., and Colmer, T.D. (2008). Salinity tolerance in halophytes*. *New Phytologist*,

179(4), 945–963.

Foyer, C.H., Lelandais, M., and Kunert, K.J. (1994). Photooxidative stress in plants. *Physiologia Plantarum*, 92(4), 696–717.

Franchi, G.G., Piotto, B., Nepi, M., Baskin, C.C., Baskin, J.M., and Pacini, E. (2011). Pollen and seed desiccation tolerance in relation to degree of developmental arrest, dispersal, and survival. *Journal of Experimental Botany*, 62(15), 5267–5281.

Francki, M.G., Crawford, A.C., and Oldach, K. (2012). Transcriptomics, Proteomics and Metabolomics: Integration of Latest Technologies for Improving Future Wheat Productivity. In: Benkeblia N. (Ed.), *Sustainable Agriculture and New Technologies*. Boca Raton: CRC Press. pp. 425-452.

Fujita, M., Fujita, Y., Maruyama, K., Seki, M., Hiratsu, K., Ohme-Takagi, M., Tran, L.S.P., Yamaguchi-Shinozaki, K., and Shinozaki, K. (2004). A dehydration-induced NAC protein, RD26, is involved in a novel ABA-dependent stress-signaling pathway. *The Plant Journal*, 39(6), 863–876.

Fujita, Y., Fujita, M., Shinozaki, K., and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2011). ABA-mediated transcriptional regulation in response to osmotic stress in plants. *Journal of Plant Research*, 124(4), 509–525.

Gao, M., Sakamoto, A., Miura, K., Murata, N., Sugiura, A., and Tao, R. (2000). Transformation of Japanese persimmon (*Diospyros kaki* Thunb.) with a bacterial gene for choline oxidase. *Molecular Breeding*, 6(5), 501–510.

Ghnaya, T., Nouairi, I., Slama, I., Messedi, D., Grignon, C., Abdely, C., and Ghorbel, M. H. (2005). Cadmium effects on growth and mineral nutrition of two halophytes: *Sesuvium portulacastrum* and *Mesembryanthemum crystallinum*. *Journal of Plant Physiology*, 162(10), 1133–1140.

Gietz, R.D., and Woods, R.A. (2002). Transformation of yeast by lithium acetate/single-stranded carrier DNA/polyethylene glycol method. *Methods in Enzymology*, 350, 87-96.

Godoy, M., Franco-Zorrilla, J.M., Pérez-Pérez, J., Oliveros, J.C., Lorenzo, Ó., and Solano, R. (2011). Improved protein-binding microarrays for the identification of DNA-binding specificities of transcription factors. *The Plant Journal*, 66(4), 700–711.

Gonçalves, J.F., Antes, F.G., Maldaner, J., Pereira, L.B., Tabaldi, L.A., Rauber, R., ... Nicoloso, F.T. (2009). Cadmium and mineral nutrient accumulation in potato plantlets grown under cadmium stress in two different experimental culture conditions. *Plant Physiology and Biochemistry*, 47(9), 814–821.

González de la Calle, V. (2014). Factores Transcripcionales de la Clase DOF en *Brachypodium distachyon*: Caracterización Molecular de BdDOF24 durante la germinación de las semillas. Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid (España), pp. 39.

Greenway, H., and Munns, R. (1980). Mechanisms of Salt Tolerance in Nonhalophytes.

Annual Review of Plant Physiology, 31(1), 149–190.

Hammarström, M., Hellgren, N., van den Berg, S., Berglund, H., and Härd, T. (2002). Rapid screening for improved solubility of small human proteins produced as fusion proteins in *Escherichia coli*. *Protein Science: A Publication of the Protein Society*, 11(2), 313–321.

Hartley, J.L., Temple, G.F., and Brasch, M.A. (2000). “DNA Cloning Using In Vitro Site-Specific Recombination.” *Genome Research*, 10(11), 1788–1795.

Hartmann, L., Pedrotti, L., Weiste, C., Fekete, A., Schierstaedt, J., Göttler, J., Kempa, S., Krischke, M., Dietrich, K., Mueller, M.J., Vicente-Carbajosa, J., Hanson, J., and Dröge-Laser, W. (2015). Crosstalk between Two bZIP Signaling Pathways Orchestrates Salt-Induced Metabolic Reprogramming in *Arabidopsis* Roots. *The Plant Cell*, 27(8), 2244–2260.

Hernández, G., Ramírez, M., Valdés-López, O., Tesfaye, M., Graham, M.A., Czechowski, T., Schlereth, A., Wandrey, M., Erban, A., Cheung, F., Wu, H.C., Lara, M., Town, C.D., Kopka, J., Udvardi, M.K., and Vance, C.P. (2007). Phosphorus Stress in Common Bean: Root Transcript and Metabolic Responses. *Plant Physiology*, 144(2) 752–767.

Himmelbach, A., Yang, Y., and Grill, E. (2003). Relay and control of abscisic acid signaling. *Current Opinion in Plant Biology*, 6(5), 470–479.

Hruz, T., Laule, O., Szabo, G., Wessendorp, F., Bleuler, S., Oertle, L., Widmayer, P., Gruissem, W., and Zimmermann, P. (2008). Genevestigator V3: A Reference Expression Database for the Meta-Analysis of Transcriptomes. *Advances in Bioinformatics*, 2008, 1–5.

Huang, D.W., Sherman, B.T., and Lempicki, R.A. (2009). Systematic and integrative analysis of large gene lists using DAVID bioinformatics resources. *Nature Protocols*, 4(1), 44–57.

Huang, D.W., Sherman, B.T., and Lempicki, R.A. (2009). Bioinformatics enrichment tools: paths toward the comprehensive functional analysis of large gene lists. *Nucleic Acids Research*, 37(1), 1–13.

Ismail, A.M., Heuer, S., Thomson, M.J., and Wissuwa, M. (2007). Genetic and genomic approaches to develop rice germplasm for problem soils. *Plant Molecular Biology*, 65(4), 547–570.

Ito, K., Chung, K.F., and Adcock, I.M. (2006). Update on glucocorticoid action and resistance. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 117(3), 522–543.

Jakoby, M., Weisshaar, B., Dröge-Laser, W., Vicente-Carbajosa, J., Tiedemann, J., Kroj, T., and Parcy, F. (2002). bZIP transcription factors in *Arabidopsis*. *Trends in Plant Science*, 7(3), 106–111.

Jaleel, C.A., Manivannan, P., Wahid, A., Farooq, M., Al-Juburi, H.J., Somasundaram, R., and Panneerselvam, R. (2009). Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. *International Journal of Agriculture and Biology* 11(1), 100–105.

Jefferson, R.A., Kavanagh, T.A., and Bevan, M.W. (1987). GUS fusions: beta-glucuronidase as a sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants. *The EMBO Journal*, 6(13), 3901–3907.

Jogaiah, S., Govind, S.R., and Tran, L.S (2013). Systems biology-based approaches toward understanding drought tolerance in food crops. *Critical Reviews in Biotechnology*, 33(1), 23–39.

Junker, A., Hartmann, A., Schreiber, F., and Bäumllein, H. (2010). An engineer's view on regulation of seed development. *Trends in Plant Science*, 15(6), 303–307.

Kaminaka, H., Näke, C., Eppele, P., Dittgen, J., Schütze, K., Chaban, C., Holt, B.F., Merkle, T., Schäfer, E., Harter, K., and Dangl, J.L. (2006). bZIP10-LSD1 antagonism modulates basal defense and cell death in *Arabidopsis* following infection. *The EMBO Journal*, 25(18), 4400–4411.

Kanno, Y., Jikumaru, Y., Hanada, A., Nambara, E., Abrams, S.R., Kamiya, Y., and Seo, M. (2010). Comprehensive Hormone Profiling in Developing *Arabidopsis* Seeds: Examination of the Site of ABA Biosynthesis, ABA Transport and Hormone Interactions. *Plant and Cell Physiology*, 51(12), 1988–2001.

Kilian, J., Whitehead, D., Horak, J., Wanke, D., Weinl, S., Batistic, O., D'Angelo, C., Bornberg-Bauer, E., Kudla, J., and Harter, K. (2007). The AtGenExpress global stress expression data set: protocols, evaluation and model data analysis of UV-B light, drought and cold stress responses. *The Plant Journal*, 50(2), 347–363.

Kim, Y.-Y., Yang, Y.-Y., and Lee, Y. (2002). Pb and Cd uptake in rice roots. *Physiologia Plantarum*, 116(3), 368–372.

Kim, S., Kang, J.Y., Cho, D.I., Park, J.H., and Kim, S.Y. (2004). ABF2, an ABRE-binding bZIP factor, is an essential component of glucose signaling and its overexpression affects multiple stress tolerance. *The Plant Journal*, 40(1), 75–87.

Kirchler, T., Briesemeister, S., Singer, M., Schütze, K., Keinath, M., Kohlbacher, O., Vicente-Carbajosa, Jesús., Teige, M., Harter, K., and Chaban, C. (2010). The role of phosphorylatable serine residues in the DNA-binding domain of *Arabidopsis* bZIP transcription factors. *European Journal of Cell Biology*, 89(2-3), 175–183.

Klok, E.J., Wilson, I.W., Wilson, D., Chapman, S.C., Ewing, R.M., Somerville, S.C., Peacock, W.J., Dolferus, R., and Dennis, E.S. (2002). Expression Profile Analysis of the Low-Oxygen Response in *Arabidopsis* Root Cultures. *The Plant Cell*, 14 (10), 2481–2494.

Kosová, K., Vítámvás, P., Prášil, I.T., and Renaut, J. (2011). Plant Proteome Changes under Abiotic Stress- Contribution of Proteomics Studies to Understanding Plant Stress Response. *Journal of Proteomics*, 74(8), 1301–1322.

Kreps, J. A., Wu, Y., Chang, H.-S., Zhu, T., Wang, X., and Harper, J. F. (2002). Transcriptome Changes for *Arabidopsis* in Response to Salt, Osmotic, and Cold

Stress. *Plant Physiology*, 130(4), 2129–2141.

Krishnan, N., Dickman, M.B., and Becker, D.F. (2008). Proline modulates the intracellular redox environment and protects mammalian cells against oxidative stress. *Free Radical Biology and Medicine*, 44(4), 671–681.

Lachmann, A., Torre, D., Keenan, A.B., Jagodnik, K.M., Lee, H.J., Wang, L., Silverstein, M.C., and Ma'ayan, A. (2018). Massive mining of publicly available RNA-seq data from human and mouse. *Nature Communications*. 9(1):1366.

Lara, P., Oñate-Sánchez, L., Abraham, Z., Ferrándiz, C., Díaz, I., Carbonero, P., and Vicente-Carbajosa, J. (2003). Synergistic Activation of Seed Storage Protein Gene Expression in *Arabidopsis* by ABI3 and Two bZIPs Related to OPAQUE2. *Journal of Biological Chemistry*, 278(23), 21003–21011.

Li, D., Fu, F., Zhang, H., and Song, F. (2015). Genome-wide systematic characterization of the bZIP transcriptional factor family in tomato (*Solanum lycopersicum* L.). *BMC Genomics*, 16, 771.

Li, L., and Sheen, J. (2016). Dynamic and diverse sugar signaling. *Current Opinion in Plant Biology*, 33, 116–125.

Liseron-Monfils, C., and Ware, D. (2015). Revealing gene regulation and associations through biological networks. *Current Plant Biology*, 3-4, 30–39.

Lister, R., Gregory, B.D., and Ecker, J.R. (2009). Next is Now: New Technologies for Sequencing of Genomes, Transcriptomes and Beyond. *Current Opinion in Plant Biology*, 12(2), 107-118.

Liu, Y., Bergervoet, J.H.W., De Vos, C.H.R., Hilhorst, H.W.M., Kraak, H.L., Karssen, C.M., and Bino, R.J. (1994). Nuclear replication activities during imbibition of abscisic acid- and gibberellin-deficient tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) seeds. *Planta*, 194(3), 368–373.

Liu, J., Li, K., Xu, J., Liang, J., Lu, X., Yang, J., and Zhu, Q. (2003). Interaction of Cd and five mineral nutrients for uptake and accumulation in different rice cultivars and genotypes. *Field Crops Research*, 83(3), 271–281.

Liu, J., Chen, N., Chen, F., Cai, B., Dal Santo, S., Tornielli, G.B., Pezzotti, M., and Cheng, Z.-M. (Max). (2014). Genome-wide analysis and expression profile of the bZIP transcription factor gene family in grapevine (*Vitis vinifera*). *BMC Genomics*, 15, 281.

Liu, X., and Chu, Z. (2015). Genome-wide evolutionary characterization and analysis of bZIP transcription factors and their expression profiles in response to multiple abiotic stresses in *Brachypodium distachyon*. *BMC Genomics*, 16(1), 227.

Llorca, C. M., Berendzen, K. W., Malik, W. A., Mahn, S., Piepho, H.-P., and Zentgraf, U. (2015). The Elucidation of the Interactome of 16 *Arabidopsis* bZIP Factors Reveals Three Independent Functional Networks. *PLoS ONE*, 10(10), e0139884.

López-Kleine, L., Leal, L., and López, C. (2013). Biostatistical approaches for the reconstruction of gene co-expression networks based on transcriptomic data. *Briefings in Functional Genomics*, 12(5), 457–467.

Lopez-Molina, L., and Chua, N.H. (2000). A Null Mutation in a bZIP Factor Confers ABA-Insensitivity in *Arabidopsis thaliana*. *Plant and Cell Physiology*, 41(5), 541–547.

Lucretius Carus, T. (1968). *The Way Things Are: The De Rerum Natura of Titus Lucretius Carus*, Rolfe Humphries, Transl. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN: 978-0-253-20125-6.

Martínez, E. (2002). Multi-protein complexes in eukaryotic gene transcription. *Plant Molecular Biology*, 50(6), 925-947.

Matiolli, C.C., Tomaz, J.P., Duarte, G.T., Prado, F.M., Del Bem, L.E.V., Silveira, A.B., Gauer, L., Guedes C, L.G., Duarte D, R., Carvalho V, A.J., Di Mascio, P., Meyer, C., and Vincentz, M. (2011). The Arabidopsis bZIP Gene AtbZIP63 Is a Sensitive Integrator of Transient Absciscic Acid and Glucose Signals. *Plant Physiology*, 157(2), 692–705.

Mochida, K., Shinozaki, K. (2011). Advances in Omics and Bioinformatics Tools for Systems Analyses of Plant Functions. *Plant and Cell Physiology*, 52(12) 2017–2038.

Munns, R. (2002). Comparative physiology of salt and water stress. *Plant, Cell and Environment*, 25(2), 239–250.

Nakabayashi, K., Okamoto, M., Koshiba, T., Kamiya, Y., and Nambara, E. (2005). Genome-wide profiling of stored mRNA in *Arabidopsis thaliana* seed germination: epigenetic and genetic regulation of transcription in seed. *The Plant Journal*, 41(5), 697–709.

Nambara, E.E., and Nonogaki, H. (2012). Seed Biology in the 21st Century: Perspectives and New Directions. *Plant and Cell Physiology*, 53(1), 1–4.

Nijhawan, A., Jain, M., Tyagi, A. K., and Khurana, J.P. (2008). Genomic Survey and Gene Expression Analysis of the Basic Leucine Zipper Transcription Factor Family in Rice. *Plant Physiology*, 146(2), 333–350.

Nukarinen, E., Nägele, T., Pedrotti, L., Wurzinger, B., Mair, A., Landgraf, R., Börnke, F., Hanson, J., Teige, M., Baena-Gonzalez, E., Dröge-Laser, W., and Weckwerth, W. (2016). Quantitative phosphoproteomics reveals the role of the AMPK plant ortholog SnRK1 as a metabolic master regulator under energy deprivation. *Scientific Reports*, 6, 31697.

O'Malley, R.C., Huang, S.C., Song, L., Lewsey, M.G., Bartlett, A., Nery, J.R, Galli, M., Gallavotti, A., and Ecker, J.R. (2016). Cistrome and Epicistrome Features Shape the Regulatory DNA Landscape. *Cell*, 165(5), 1280–1292.

Oliveros, J.C. (2007-2015) Venny. An interactive tool for comparing lists with Venn's diagrams. Available at: <http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/index.html>.

Oñate, L., Vicente-Carbajosa, J., Lara, P., Díaz, I., and Carbonero, P. (1999). Barley BLZ2, a Seed-Specific bZIP Protein That Interacts with BLZ1 in vivo and Activates Transcription from the GCN4-like motif of B-hordein Promoters in Barley Endosperm. *Journal of Biological Chemistry*, 274(14), 9175–9182.

Para, A., Li, Y., Marshall-Colón, A., Varala, K., Francoeur, N.J., Moran, T.M., Edwards, M. B., Hackley, C., Bargmann, B.O.R., Birnbaum, K.D., McCombie, W.R., Krouk, G., and Coruzzi, G.M. (2014). Hit-and-run transcriptional control by bZIP1 mediates rapid nutrient signaling in *Arabidopsis*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(28), 10371–10376.

Patakas, A. (2012). Abiotic Stress-Induced Morphological and Anatomical Changes in Plants. In: Ahmad P., Prasad M. (Ed.), *Abiotic Stress Responses in Plants*. Springer, New York, NY. pp. 21-39.

Paz-Ares, J., and The REGIA Consortium. (2002). REGIA, An EU Project on Functional Genomics of Transcription Factors from *Arabidopsis thaliana*. *Comparative and Functional Genomics*, 3(2), 102–108.

Pedrotti, L., Weiste, C., Nägele, T., Wolf, E., Lorenzin, F., Dietrich, K., Mair, A., Weckwerth, M., Teige, M., Baena-González, E., and Dröge-Laser, W. (2018). Snf1-RELATED KINASE1-Controlled C/S1-bZIP Signaling Activates Alternative Mitochondrial Metabolic Pathways to Ensure Plant Survival in Extended Darkness. *The Plant Cell*, 30(2), 495–509.

Penna, S. (2003). Building stress tolerance through over-producing trehalose in transgenic plants. *Trends in Plant Science*, 8(8), 355–357.

Penna, S., Teixeira da Silva, J.A, and Bapat, V.A. (2006). Plant abiotic stress, sugars and transgenics: a perspective. In: Teixeira da Silva J.A (Ed.), *Floriculture, ornamental and plant biotechnology: advances and topical issues*, 1st ed. *Global Science Publishers*, London, UK, pp 86–93.

Perkins, N.D. (2006). Post-translational modifications regulating the activity and function of the nuclear factor *kappaB* pathway. *Oncogene*, 25, 6717–6730.

Pourabed, E., Ghane Golmohamadi, F., Soleymani Monfared, P., Razavi, S. M., and Shobbar, Z.-S. (2014). Basic Leucine Zipper Family in Barley: Genome-Wide Characterization of Members and Expression Analysis. *Molecular Biotechnology*, 57(1), 12–26.

Prabhavathi, V.R., and Rajam, M.V. (2007). Polyamine accumulation in transgenic eggplant enhances tolerance to multiple abiotic stresses and fungal resistance. *Plant Biotechnology*, 24(3), 273–282.

Rahnama, A., James, R.A., Poustini, K., and Munns, R. (2010). Stomatal conductance as a screen for osmotic stress tolerance in durum wheat growing in saline soil. *Functional Plant Biology*, 37(3), 255-263.

Raz, V., Bergervoet, J., and Koornneef, M. (2001). Sequential steps for developmental

arrest in *Arabidopsis* seeds. *Development*, 128(2), 243-252.

Rehem, B. C., Bertolde F.Z., and Furtado de Almeida, A-A. (2012). Regulation of Gene Expression in Response to Abiotic Stress in Plants. In: P. Bubulya (Ed.), Cell Metabolism - Cell Homeostasis and Stress Response. pp.13-38. ISBN: 978-953-307-978-3. *InTech*.

Reimand, J., Arak, T., Adler, P., Kolberg, L., Reisberg, S., Peterson, H., and Vilo, J. (2016). g:Profiler—a web server for functional interpretation of gene lists (2016 update). *Nucleic Acids Research*, 44 (Web Server issue), W83–W89. Available at: <https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/>.

Rhodes, D., and Hanson, A.D. (1993). Quaternary Ammonium and Tertiary Sulfonium Compounds in Higher Plants. *Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology*, 44(1), 357–384.

Rodrigues, A., Adamo, M., Crozet, P., Margalha, L., Confraria, A., Martinho, C., Elias, A., Rabissi, A., Lumberras, V., González-Guzmán, M., Antoni, R., Rodriguez, P.L., and Baena-González, E. (2013). ABI1 and PP2CA Phosphatases Are Negative Regulators of Snf1-Related Protein Kinase1 Signaling in *Arabidopsis*. *The Plant Cell*, 25(10), 3871–3884.

Rubinov M., and Sporns O. (2010). Complex network measures of brain connectivity: Uses and interpretations. *NeuroImage*, 52(3), 1059–1069.

Saito, K., and Matsuda, F. (2010). Metabolomics for Functional Genomics, Systems Biology, and Biotechnology. *Annual Review of Plant Biology*, 61(1), 463–489.

Saldanha, A.J. (2004). Java Treeview-extensible visualization of microarray data. *Bioinformatics*, 20(17), 3246–3248.

Salehi-Lisar, S.Y., and Bakhshayeshan-Agdam, H. (2016). Drought Stress in Plants: Causes, Consequences, and Tolerance. In: Hossain, M.A., Hussain Wani, S., Bhattacharjee, S., Burritt, D.J., and Phan Tran, L-S. (Ed.), Drought Stress Tolerance in Plants, Vol. 1, Physiology and Biochemistry (1st Ed., 1-2(1), 1-16). Springer International Publishing AG Switzerland. ISBN: 978-3-319-28897-0.

Sambrook, J., and Russel, D. W. (2001). Molecular cloning: a laboratory manual. 3rd edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.

Sanchez, D.H., Schwabe, F., Erban, A., Udvardi, M.K., and Kopka J. (2012). Comparative Metabolomics of Drought Acclimation in Model and Forage Legumes. *Plant, Cell and Environment*, 35(1), 136-149.

Sandalio L.M., Rodríguez-Serrano M., del Río L.A., and Romero-Puertas M. (2009). Reactive Oxygen Species and Signaling in Cadmium Toxicity. In: Rio L., Puppo A. (Eds) Reactive Oxygen Species in Plant Signaling. Signaling and Communication in Plants. Springer, Berlin, Heidelberg, pp 175-189.

Sandalio L.M., Rodríguez-Serrano M., Gupta D.K., Archilla A., Romero-Puertas M.C., and del Río L.A. (2012). Reactive Oxygen Species and Nitric Oxide in Plants Under Cadmium

Stress: From Toxicity to Signaling. In: Ahmad P., Prasad M. (Eds) Environmental Adaptations and Stress Tolerance of Plants in the Era of Climate Change. Springer, New York, NY, pp 199-215.

Schmid, M., Davison, T.S., Henz, S.R., Pape, U.J., Demar, M., Vingron, M., Schölkopf, B., Weigel, D., and Lohmann, J.U. (2005). A gene expression map of *Arabidopsis thaliana* development. *Nature Genetics*, 37(5), 501-506.

Schmidt, R.J., Burr, F.A., Aukerman, M.J., and Burr, B. (1990). Maize regulatory gene opaque-2 encodes a protein with a "leucine-zipper" motif that binds to zein DNA. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 87(1), 46–50.

Schütze, K., Harter, K., and Chaban, C. (2008). Post-translational regulation of plant bZIP factors. *Trends in Plant Science*, 13(5), 247-255.

Seki, M., Narusaka, M., Ishida, J., Nanjo, T., Fujita, M., Oono, Y., Kamiya, A., Nakajima, M., Enju, A., Sakurai, T., Satou, M., Akiyama, K., Taji, T., Yamaguchi-Shinozaki, K., Carninci, P., Kawai, J., Hayashizaki, Y., and Shinozaki, K. (2002). Monitoring the expression profiles of 7000 *Arabidopsis* genes under drought, cold and high-salinity stresses using a full-length cDNA microarray. *The Plant Journal*, 31(3), 279-292.

Shao, H.-B., Chu, L.-Y., Jaleel, C. A., and Zhao, C.-X. (2008). Water-deficit stress-induced anatomical changes in higher plants. *Comptes Rendus Biologies*, 331(3), 215–225.

Shinozaki, K., Yamaguchi-Shinozaki, K., and Seki, M. (2003). Regulatory network of gene expression in the drought and cold stress responses. *Current Opinion in Plant Biology*, 6(5), 410–417.

Shinozaki, K., and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2007). Gene networks involved in drought stress response and tolerance. *Journal of Experimental Botany*, 58(2), 221–227.

Shinozaki, K., and Sakakibara, H. (2009). Omics and bioinformatics: an essential toolbox for systems analyses of plant functions beyond 2010. *Plant and Cell Physiology*, 50(7), 1177–1180.

Shiu, S.-H., Shih, M.-C., and Li, W.-H. (2005). Transcription Factor Families Have Much Higher Expansion Rates in Plants than in Animals. *Plant Physiology*, 139(1), 18–26.

Sicher, R.C., and Barnaby, J.Y. (2012). Impact of Carbon Dioxide Enrichment on the Responses of Maize Leaf Transcripts and Metabolites to Water Stress. *Physiologia Plantarum*, 144(3), 238–253.

Spitz, F., and Furlong, E.E.M. (2012). Transcription factors: from enhancer binding to developmental control. *Nature Reviews Genetics*, 13(9), 613–626.

Su, J., and Wu, R. (2004). Stress-inducible synthesis of proline in transgenic rice confers faster growth under stress conditions than that with constitutive synthesis. *Plant Science*, 166(4), 941–948.

Supek, F., Bošnjak, M., Škunca, N., and Šmuc, T. (2011). REVIGO Summarizes and Visualizes Long Lists of Gene Ontology Terms. *PLoS ONE*, 6(7), e21800. Available at: <http://revigo.irb.hr>.

Suzuki, M., Ketterling, M.G., Li, Q.B., and McCarty, D.R. (2003). *Viviparous1* Alters Global Gene Expression Patterns through Regulation of Abscissic Acid Signaling. *Plant Physiology*, 132(3), 1664–1677.

Suzuki, M., and McCarty, D.R. (2008). Functional symmetry of the B3 network controlling seed development. *Current Opinion in Plant Biology*, 11(5), 548–553.

Szabados, L., and Saviouré, A. (2010). Proline: a multifunctional amino acid. *Trends in Plant Science*, 15(2), 89–97.

Tabas-Madrid, D., Nogales-Cadenas, R., and Pascual-Montano, A. (2012). GeneCodis3: a non-redundant and modular enrichment analysis tool for functional genomics. *Nucleic Acids Research*, 40(W1), W478–W483. Available at: <http://genecodis.cnb.csic.es>.

Tegel, H., Tourle, S., Ottosson, J., and Persson, A. (2010). Increased levels of recombinant human proteins with the *Escherichia coli* strain Rosetta (DE3). *Protein Expression and Purification*, 69(2), 159–167.

Tian, T., Liu, Y., Yan, H., You, Q., Yi, X., Du, Z., ... Su, Z. (2017). agriGO v2.0: a GO analysis toolkit for the agricultural community, 2017 update. *Nucleic Acids Research*, 45 (Web Server issue), W122–W129. Available at: <http://systemsbiology.cau.edu.cn/agriGOv2/>.

Tombesi, S., Frioni, T., Poni, S., and Palliotti, A. (2018). Effect of water stress “memory” on plant behavior during subsequent drought stress. *Environmental and Experimental Botany*, 150, 106–114.

Tomé, F., Nägele, T., Adamo, M., Garg, A., Marco-Illorca, C., Nukarinen, E., Pedrotti, L., Peviani, A., Simeunovic, A., Tatkiewicz, A., Tomar, M., and Gamm, M. (2014). The low energy signaling network. *Frontiers in Plant Science*, 5, 353.

Toufighi, K., Brady, S.M., Austin, R., Ly, E., and Provart, N.J. (2005). The Botany Array Resource: e-Northerns, Expression Angling, and Promoter Analyses. *The Plant Journal*, 43(1), 153–163. Available at: <http://bbc.botany.utoronto.ca>.

Transplanta collection, 2010 [search 05-08-2011]. Available at: http://bioinfo.cnb.csic.es/transplanta_dev/.

Udvardi, M.K., Kakar, K., Wandrey, M., Montanari, O., Murray, J., Andrianakaja, A., Zhang, J.-Y., Benedito, V., Hofer, J.M.I., Chueng, F., and Town, C.D. (2007). Legume Transcription Factors: Global Regulators of Plant Development and Response to the Environment. *Plant Physiology*, 144(2), 538–549.

UGent web tool. Available at: <http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/>.

Uno, Y., Furihata, T., Abe, H., Yoshida, R., Shinozaki, K., and Yamaguchi-Shinozaki, K. (2000). *Arabidopsis* basic leucine zipper transcription factors involved in an abscisic acid-dependent signal transduction pathway under drought and high-salinity conditions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 97(21), 11632–11637.

Untergasser, A., Nijveen, H., Rao, X., Bisseling, T., Geurts, R., and Leunissen, J. (2007). Primer3Plus, an enhanced web interface to Primer3. *Nucleic Acids Research*, 35, W71-W74. Available at: <http://www.bioinformatics.nl/primer3plus>.

Urano, K., Kurihara, Y., Seki, M., and Shinozaki K. (2010). 'Omics' Analyses of Regulatory Networks in Plant Abiotic Stress Responses. *Current Opinion in Plant Biology*, 13(2) 132-138.

Usadel, B., Obayashi, T., Mutwil, M., Giorgi, F.M., Bassel, G.W., Tanimoto, M., ... Provar, N.J. (2009). Co-expression tools for plant biology: opportunities for hypothesis generation and caveats. *Plant, Cell and Environment*, 32(12), 1633–1651.

Valliyodan, B., and Nguyen, H.T. (2006). Understanding regulatory networks and engineering for enhanced drought tolerance in plants. *Current Opinion in Plant Biology*, 9(2), 189–195.

Verdoy, D., Coba de la Pena, T., Redondo, F.J., Lucas, M.M., and Pueyo, J.J. (2006). Transgenic *Medicago truncatula* plants that accumulate proline display nitrogen-fixing activity with enhanced tolerance to osmotic stress. *Plant, Cell and Environment*, 29(10), 1913–1923.

Verslues, P.E., Agarwal, M., Katiyar-Agarwal, S., Zhu, J., and Zhu, J.-K. (2006). Methods and concepts in quantifying resistance to drought, salt and freezing, abiotic stresses that affect plant water status. *The Plant Journal*, 45(4), 523–539.

Vicente-Carbajosa J., Oñate L., Lara P., Diaz I., and Carbonero P. (1998). Barley BLZ1: a bZIP transcriptional activator that interacts with endosperm-specific gene promoters. (1998). *The Plant Journal*, 13(5), 629–640.

Vinocur, B., and Altman, A. (2005). Recent advances in engineering plant tolerance to abiotic stress: achievements and limitations. *Current Opinion in Biotechnology*, 16(2), 123–132.

Warde-Farley, D., Donaldson, S., Comes, O., Zuberi, K., Badrawi, R., Chao, P., Franz, M., Grouios, C., Kazi, F., Lopes, C.T., Maitland, A., Mostafavi, S., Montojo, J., Shao, Q., Wright, G., Bader, G.D., and Morris, Q. (2010). The GeneMANIA prediction server: biological network integration for gene prioritization and predicting gene function. *Nucleic Acids Research*, 38 (Web Server issue), W214–20. Available at: <http://www.genemania.org>.

Wei, K., Chen, J., Wang, Y., Chen, Y., Chen, S., Lin, Y., Pan, S., Zhong, X., and Xie, D. (2012). Genome-Wide Analysis of bZIP-Encoding Genes in Maize. *DNA Research: An International Journal for Rapid Publication of Reports on Genes and Genomes*, 19(6), 463–476.

Weltmeier, F., Ehlert, A., Mayer, C.S., Dietrich, K., Wang, X., Schütze, K., Alonso, R., Harter, K., Vicente-Carbajosa, J., and Dröge-Laser, W. (2006). Combinatorial control of *Arabidopsis* proline dehydrogenase transcription by specific heterodimerisation of bZIP transcription factors. *The EMBO Journal*, 25(13), 3133–3143.

Weltmeier, F., Rahmani, F., Ehlert, A., Dietrich, K., Schütze, K., Wang, X., Chaban, C., Hanson, J., Teige, M., Harter, K., Vicente-Carbajosa, J., Smeekens, S., and Dröge-Laser, W. (2009). Expression patterns within the *Arabidopsis* C/S1 bZIP transcription factor network: availability of heterodimerization partners controls gene expression during stress response and development. *Plant Molecular Biology*, 69(1-2), 107–119.

Woodcock, D.M., Crowther, P.J., Doherty, J., Jefferson, S., DeCruz, E., Noyer-Weidner, M., Smith, S.S., Michael, M.Z., and Graham, M.W. (1989). Quantitative evaluation of *Escherichia coli* host strains for tolerance to cytosine methylation in plasmid and phage recombinants. *Nucleic Acids Research*, 17(9), 3469–3478.

Xiong, L., Schumaker, K. S., and Zhu, J.-K. (2002). Cell Signaling during Cold, Drought, and Salt Stress. *The Plant Cell*, 14 (Suppl), s165–s183.

Yamaguchi-Shinozaki, K., and Shinozaki, K. (2006). Transcriptional Regulatory Networks in Cellular Responses and Tolerance to Dehydration and Cold Stresses. *Plant Biology*, 57(1), 781–803.

Yancey, P.H., Clarke, M.E., Hand, S.C., Bowlus R.D., and Somero G.N. (1982). Living with water stress: evolution of osmolyte systems. *Science*, 217(4566), 1214–1222.

Yoshida, R., Hobo, T., Ichimura, K., Mizoguchi, T., Takahashi, F., Aronso, J., Ecker, J.R., and Shinozaki, K. (2002). ABA-Activated SnRK2 Protein Kinase is Required for Dehydration Stress Signaling in *Arabidopsis*. *Plant and Cell Physiology*, 43(12), 1473–1483.

Zanin, M., and Boccaletti, S. (2011). Complex networks analysis of Obstructive Nephropathy data. *Chaos*, 21: 33103.

Zanin, M., Medina, J., Vicente-Carbajosa, J., Gómez-Páez, M., Papo, D., Sousa, P., Menasalvas, E., and Boccaletti, S. (2014). Parenclitic networks: uncovering new functions in biological data. *Scientific Reports*, 4, 5112.

Zhang, Y., Gao, P., and Yuan, J. (2010). Plant Protein-Protein Interaction Network and Interactome. *Current Genomics*, 11(1), 40–46.

Zlatev, Z., and Lidon, F.C. (2012). An overview on drought induced changes in plant growth, water relations and photosynthesis. *Emirates Journal of Food and Agriculture*, 24(1), 57-72.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

FIGURAS SUPLEMENTARIAS

Figura Suplementaria 1. Análisis de la tolerancia a la deshidratación de las líneas de pérdida y ganancia de función para los factores *bZIP1*, *10*, *25* y *53*. Se representa la pérdida de peso fresco de las líneas sobreexpresoras *35S::bZIP* y de pérdida de función de los *bZIP* (*bzip1/53*, *bzip10/25* y *bzip10/53*) comparadas con *Col-0* (**A-B**). Gráficos de líneas mostrando el porcentaje de pérdida de agua de las líneas de ganancia de función de los *bZIP* C/S1 (**A**) y de tres mutantes dobles de pérdida de función (*bzip1/53*, *bzip10/25* y *bzip10/53*) comparados con *Col-0* (**B**). En ambos gráficos se representan las medias $\pm$ el error estándar de cuatro réplicas. (*) Los asteriscos representan diferencias significativas entre las líneas *35S::bZIP10* y *35S::bZIP25* con el WT; $p < 0,05$ mediante Test *t-student*. (**C**) Fotos representativas de las líneas *35S::bZIP10* (a: 69.1c y b: 69.1e) y el control *Col-0* en condiciones de estrés promovido por deshidratación temprana. Las imágenes muestran la parte aérea de estas plantas a las 4h (panel superior) y 12h (panel inferior) después del tratamiento.

A

Análisis OG de GDEs en el mutante *bzip1-bzip53* en respuesta a estrés osmótico

B

Análisis OG de GDEs en el mutante *bzip10-bzip25* en respuesta a estrés osmótico

C

Análisis OG de GDEs en el mutante *bzip10-bzip25-bzip1-bzip53* en respuesta a estrés osmótico

Figura Suplementaria 2. Análisis de ontologías génicas de los genes diferencialmente expresados (GDEs) en las líneas de pérdida de función de los bZIPs del grupo S1 (*bzip1-bzip53*) (A), del grupo C (*bzip10-bzip25*) (B) y de ambos grupos (*bzip10-bzip25-bzip1-bzip53*) (C), en respuesta al estrés osmótico inducido por manitol. Los diagramas de dispersión se obtuvieron usando herramientas de *agriGO* y *ReviGO* (Du *et al.*, 2010; Supek *et al.*, 2011). El color de cada esfera refleja el *p-value*.

Redes *parenclíticas* calculadas para la respuesta a estrés osmótico en *Arabidopsis*

Estrés osmótico 30 min

Threshold:

Ranking	Gene	Centrality
1	AT5G04340	1
2	AT2G17040	0.892558
3	AT1G13300	0.88111
4	AT5G51910	0.729679
5	AT1G07520	0.7176
6	AT5G59450	0.681683
7	AT2G46310	0.655773
8	AT1G19850	0.641599
9	AT5G61590	0.597888
10	AT1G68550	0.588835

Ranking	Gene	Centrality
11	AT1G69780	0.58548
12	AT5G50570	0.554072
13	AT3G23210	0.54366
14	AT1G22190	0.529993
15	AT5G08190	0.525281
16	AT1G64000	0.52156
17	AT4G23750	0.507826
18	AT3G30260	0.497407
19	AT1G67310	0.492523
20	AT2G44745	0.458983

Estrés osmótico 1 hora

Threshold:

Ranking	Gene	Centrality
1	AT1G44830	1
2	AT1G43950	0.556858
3	AT5G60470	0.443326
4	AT2G22300	0.356115
5	AT3G59470	0.304019
6	AT4G11660	0.302265
7	AT1G34410	0.28188
8	AT1G19510	0.279082
9	AT2G42440	0.277754
10	AT5G25810	0.274417

Ranking	Gene	Centrality
11	AT2G22760	0.263515
12	AT1G14920	0.260332
13	AT3G19360	0.254924
14	AT3G12820	0.236686
15	AT1G58110	0.226594
16	AT4G02670	0.223216
17	AT1G22590	0.218421
18	AT1G26260	0.215531
19	AT2G01570	0.214557
20	AT1G43160	0.211835

Estrés osmótico 3 horas

Threshold:

Ranking	Gene	Centrality
1	AT1G12610	1
2	AT2G02080	0.35273
3	AT3G47500	0.281975
4	AT2G46830	0.271497
5	AT1G76880	0.201452
6	AT5G64220	0.197136
7	AT3G60030	0.193481
8	AT5G13180	0.190057
9	AT2G18380	0.182941
10	AT1G79430	0.180857

Ranking	Gene	Centrality
11	AT5G62320	0.177404
12	AT2G42280	0.176601
13	AT1G69170	0.156471
14	AT2G36270	0.150763
15	AT5G52170	0.149557
16	AT4G31920	0.148725
17	AT1G29160	0.148112
18	AT3G04670	0.146969
19	AT4G31620	0.143013
20	AT3G61150	0.139636

Estrés osmótico 6 horas

Threshold:

Ranking	Gene	Centrality
1	AT5G18090	1
2	AT5G16560	0.956474
3	AT4G14410	0.896794
4	AT4G36930	0.857808
5	AT2G23290	0.785677
6	AT5G17300	0.775678
7	AT4G16610	0.767785
8	AT5G06800	0.696333
9	AT2G44910	0.689358
10	AT1G21340	0.648005

Ranking	Gene	Centrality
11	AT5G04240	0.632106
12	AT1G64620	0.628534
13	AT4G13480	0.626289
14	AT2G21320	0.611769
15	AT5G06080	0.57223
16	AT2G38880	0.549349
17	AT5G49520	0.537823
18	AT5G60910	0.530204
19	AT4G24470	0.52045
20	AT3G23240	0.51464

Estrés osmótico 12 horas

Threshold:

Ranking	Gene	Centrality
1	AT3G49760	1
2	AT5G07210	0.302456
3	AT4G38340	0.300498
4	AT4G09820	0.274155
5	AT3G61910	0.264721
6	AT3G11090	0.250175
7	AT5G11050	0.234146
8	AT2G35700	0.231518
9	AT5G64530	0.229707
10	AT1G68640	0.229651

Ranking	Gene	Centrality
11	AT2G18060	0.224679
12	AT5G60440	0.222205
13	AT2G16910	0.206861
14	AT5G15830	0.193431
15	AT3G56660	0.191824
16	AT4G17980	0.187397
17	AT4G17710	0.18635
18	AT4G36590	0.181485
19	AT5G35550	0.180448
20	AT3G12720	0.179091

Estrés osmótico 24 horas

Threshold:

Ranking	Gene	Centrality
1	AT2G28450	1
2	AT2G35430	0.903528
3	AT1G09540	0.709785
4	AT1G10170	0.665937
5	AT5G35550	0.648662
6	AT5G64530	0.561945
7	AT5G65640	0.560654
8	AT1G31310	0.560351
9	AT2G40950	0.551008
10	AT5G08070	0.527118

Ranking	Gene	Centrality
11	AT4G01550	0.526316
12	AT2G31070	0.505044
13	AT2G40620	0.488967
14	AT5G62320	0.482752
15	AT5G05090	0.47681
16	AT3G07650	0.455153
17	AT1G17460	0.453413
18	AT5G04410	0.438538
19	AT1G06180	0.428758
20	AT1G26790	0.413385

Figura Suplementaria 3. Redes *parencíticas* calculadas para la respuesta a estrés osmótico en *Arabidopsis*. Se han obtenido los datos de expresión del proyecto *AtGenExpress* (Seki *et al.*, 2002). El experimento utilizado en este estudio, corresponde a plantas de 18 días de edad que fueron trasplantadas a un medio con 300mM Manitol y se tomaron muestras a seis puntos de tiempo diferentes (30min, 1h, 3h, 6h, 12h y 24h) después de la inducción del estrés. El análisis se limita a 1701 genes que componen los factores de transcripción de *Arabidopsis* representados en la matriz ATH1. Cada nodo esta etiquetado con el nombre de cada gen. En todos los casos, el color representa el peso del enlace (de verde a rojo) y el tamaño del nodo está asociado con el valor correspondiente de α -centralidad. En la parte inferior de cada red se listan los 20 factores transcripcionales con mayores valores de α -centralidad.

TABLAS SUPLEMENTARIAS

Tabla Suplementaria 1. Respuesta fenotípica a la sequía (déficit de riego) de las líneas de pérdida y ganancia de función de los bZIPs evaluados en este estudio

Línea	Fenotipo
<i>Col-0</i>	<i>wt</i>
<i>bzip10</i>	Similar al <i>wt</i>
<i>bzip25</i>	Similar al <i>wt</i>
<i>bzip1</i>	Similar al <i>wt</i>
<i>bzip53</i>	Similar al <i>wt</i>
<i>bzip10-bzip25</i>	Sensible
<i>bzip1-bzip53</i>	Sensible
<i>bzip10-bzip53</i>	Sensible
<i>bzip10-bzip25-bzip53</i>	Sensible
<i>bzip10-bzip25-bzip1-bzip53</i>	Sensible
<i>35S::bZIP10 (69.1c)</i>	Tolerante
<i>35S::bZIP10 (69.1e)</i>	Tolerante
<i>35S::bZIP25 (70.6h)</i>	Tolerante
<i>35S::bZIP25 (70.7e)</i>	Tolerante
<i>35S::bZIP53</i>	Tolerante

Tabla Suplementaria 2. Listado de interactores candidatos de bZIP25, bZIP53 y el heterodímero bZIP53/25, detectados en el análisis de los ensayos de Y2H y Y3H, realizados con la genoteca de levaduras

CANDIDATOS INTERACTORES DE bZIP25				
N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
1	001-A11	At5g10140	AGL25	MADS
2	001-B02	At5g23260	AGL32	MADS
3	001-B05	At4g02235	AGL51	MADS
4	001-C02	At5g39750	AGL81	MADS
5	001-D01	At3g54990	SMZ	AP2/EREBP
6	001-F12	At3g61180	ZF RING-type	C3HC4
7	001-G09	At1g63840	ZF RING-type	C3HC4
8	001-H03	At1g21960	ZF RING-type	C3HC4
9	001-H05	At1g21960	ZF RING-type	C3HC4
10	001-H07	At4g36060	bHLH11	bHLH
11	001-H08	At4g00480	ATMYC1	bHLH
12	001-H11	At4g00050	UNE10	bHLH
13	002-A01	At5g49450	AtbZIP1	bZIP
14	002-A02	At5g49450	AtbZIP1	bZIP
15	002-A03	At2g22850	AtbZIP6	bZIP
16	002-B01	At2g22760		bHLH
17	002-D02	At2g28160	ATBHLH029	bHLH
18	002-D05	At3g56980	BHLH039	bHLH
19	002-E01	At3g15170	ANAC054	NAC
20	002-F02	At3g15500	ATNAC3	NAC
21	002-F12	At3g29035	ANAC059	NAC
22	002-G08	At3g03200	anac045	NAC
23	002-H06	At3g21330		bHLH
24	002-H08	At1g06170		bHLH
25	002-H11	At5g04150	BHLH101	bHLH
26	003-A03	At2g21060	ATGRP2B	CCHC
27	003-A05	At1g53160	SPL4	SBP
28	003-A12	At2g33880	WOX9	Homeobox
29	003-C04	At1g67970	AT-HSFA8	HSF
30	003-C09	At4g11660	AT-HSFB2B	HSF
31	003-C11	At4g36710	AtHAM4	GRAS
32	003-D04	At1g50420	SCL3	GRAS
33	003-F01	At3g45150	TCP16	TCP
34	003-F02	At1g35560	TCP23	TCP
35	003-G08	At4g08150	KNAT1	Homeobox
36	003-G11	At1g62360	STM	Homeobox
37	003-G12	At5g25220	KNAT3	Homeobox
38	003-H03	At4g21750	ATML1	Homeobox
39	003-H12	At5g15840	CO	CO-like
40	004-A01	At1g75510	TFIIF	TFIIF-beta

N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
41	004-B07	At1g21450	SCL1	GRAS
42	004-C03	At3g13840		GRAS
43	004-C09	At2g40740	ATWRKY55	WRKY
44	004-D02	At5g43290	ATWRKY49	WRKY
45	004-D03	At5g64810	ATWRKY51	WRKY
46	004-D11	At2g24790	COL3	CO-like
47	004-D12	At5g24930	COL4	CO-like
48	004-F02	No gene		Control
49	004-H11	At5g48250	BBX8	CO-like
50	005-B01	No gene		Control
51	005-B07	At2g35940	BLH1	Homeobox
52	005-B08	At1g75410	BLH3	Homeobox
53	005-C02	At3g12820	AtMYB10	MYB
54	005-C11	No gene		Control
55	005-C12	No gene		Control
56	005-D01	At2g01060		MYB-like HTH
57	005-D04	At1g18710	AtMYB47	MYB
58	005-F03	At3g23240	ATERF1	AP2/EREBP
59	005-H06	At2g40970	MYBC1	G2-like
60	006-B03	At3g11260	WOX5	Homeobox
61	006-C05	At2g18550	HB-2; HB21	Homeobox
62	006-D02	At5g43270	SPL2	SBP
63	006-D03	At1g27370	SPL10	SBP
64	006-E01	No gene		Control
65	006-E03	At1g60250	BBX26	B-box ZF
66	006-E04	At1g78600	LZF1	B-box ZF
67	006-F01	At4g24060	Dof-type	DOF
68	006-F02	At2g41370	BOP2	BTB/POZ
69	006-F03	At3g07740	ADA2A	SWI/SNF
70	006-F12	At1g47570		C3HC4
71	006-G01	At1g14200		C3HC4
72	006-G11	At5g62430	CDF1	DOF
73	006-H02	At4g21040	DOF4.3	DOF
74	006-H03	At4g21050	DOF4.4	DOF
75	006-H11	At2g17900	SDG37	SET
76	007-A06	At2g01570	RGA1	VHIIID/DELLA
77	007-A07	At1g14920	GAI	GRAS
78	007-B02	At4g03250		Homeobox
79	007-B07	At2g15770		Cupredoxin
80	007-B10	At1g19220	ARF19	ARF
81	007-B12	At1g15050	IAA34	AUX-IAA
82	007-D06	At1g52150	ATHB-15	Homeobox
83	007-D11	At2g01200	IAA32	AUX-IAA
84	007-E02	At4g29080	PAP2	AUX-IAA
85	007-E03	At1g15050	IAA34	AUX-IAA

N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
86	007-E04	At5g62000	ARF2	ARF
87	007-F04	At1g77640		ERF/AP2
88	007-G01	At2g23340	DEAR3	ERF/AP2
89	007-G10	At1g77450	anac032	NAC
90	007-H06	At3g03750	SDG20	SET
91	007-H07	At5g04940	SUVH1	SET
92	008-A05	At1g35515	HOS10	MYB
93	008-B01	At1g72830	ATHAP2C	CCAAT-HAP2
94	008-B02	At3g48590	ATHAP5A	CCAAT-HAP5
95	008-B10	At1g04950	TAFII59	TAF
96	008-F03	At1g54360	TAF6b1	TAF
97	008-H02	At3g30530	AtbZIP42	bZIP
98	008-H03	At5g38800	AtbZIP43	bZIP
99	008-H06	At2g04038	AtbZIP48	bZIP
100	009-A02	At5g06839	TGA10	bZIP
101	009-B03	At3g09370	AtMYB3R3	MYB
102	009-D02	At4g38620	ATMYB4	MYB
103	009-E07	At4g25560	LAF1	MYB
104	009-F03	At3g10590		MYB
105	009-G01	At5g10280	ATMYB92	MYB
106	009-H03	At5g26660	ATMYB86	MYB
107	010-A02	At5g56270	ATWRKY2	WRKY
108	010-B02	At2g23320	ATWRKY15	WRKY
109	010-B08			RG_MYB1R12
110	010-C01	At4g18170	AtWRKY28	WRKY
111	010-C02	At4g23550	ATWRKY29	WRKY
112	010-C12	At4g11070	AtWRKY41	WRKY
113	010-D01	At4g04450	AtWRKY42	WRKY
114	010-D03	At2g37260	TTG2	WRKY
115	010-H01	At1g60880	AGL56	MADS
116	010-H02	At3g04100	AGL57	MADS
117	010-H03	At1g28450	AGL58	MADS
118	010-H10	At1g54760	AGL85	MADS
119	011-B02	At1g08000	GATA10	GATA
120	011-F01	At5g44080		bZIP
121	011-G05	At1g04550	IAA12	AUX-IAA
122	011-H03	At5g43700	ATAUX2-11	AUX-IAA
123	011-H06	At3g02150	PTF1	TCP
124	011-H10			
125	011-H11			
126	011-H12			
127	012-A06			MtN_19
128	012-B01	At5g07680	ANAC080	NAC
129	012-B02	At3g27920	GL1	MYB
130	012-B03	At4g31610	ATREM1	B3

N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
131	012-C02	At5g67300	ATMYBR1	MYB
132	012-C06	At2g46340	SPA1	WD-40
133	012-C09	At1g55960		START domain
134	012-E03	At3g62420	ATBZIP53	bZIP
135	012-F03	No gene		Control
136	012-F11			
137	012-H03			
138	012-H11	At1g15580	IAA5	AUX-IAA
139	013-A07	At5g56840		MYB
140	013-A09	At1g63100		GRAS
141	013-B01	At3g49760	AtbZIP5	bZIP
142	013-B07	At1g53170	ATERF-8	ERF/AP2
143	013-C01	At3g16350		MYB
144	013-D02	At5g11590	TINY2	ERF/AP2
145	013-E01	At1g49480	RTV1	B3
146	013-E03	At1g25550		Myb-like TF
147	013-H01	At1g61660	bHLH112	bHLH
148	013-H04	At3g57800		bHLH
149	013-H06	At3g47640	PYE	bHLH
150	014-A03	At4g11140	CRF1	ERF/AP2
151	014-B05	At3g24520	AT-HSFC1	HSF
152	014-B10	At4g29930		bHLH
153	014-C05	At3g50750	BEH1	BES1/BZR
154	014-C12	At2g21650	RSM1	MYB
155	014-D02	At4g39250	ATRL1	MYB
156	014-D04	At2g20880	ATERF53	AP2/ERF
157	014-D06	At5g62610		bHLH
158	014-E03	At1g72650	TRFL6	MYB
159	014-E05	At5g59430	ATTRP1	MYB
160	014-F01	At4g28140		ERF/AP2
161	014-F02	At4g25400		bHLH
162	014-F12	At4g13980	AT-HSFA5	HSF
163	014-H03	At5g65320		bHLH
164	014-H04	At4g31270		Trihelix
165	014-H06	At4g10350	ANAC070	NAC
166	014-H07	At4g02590	UNE12	bHLH
167	014-H10	At5g05550		Trihelix
168	015-B04	At1g51600	ZML2	GATA
169	015-B06	At4g21050	ATDOF4.4	DOF
170	015-E02	At2g18160	ATBZIP2	bZIP
171	015-E03	At4g34590	AtbZIP11	bZIP
172	015-E08	At1g33760		ERF/AP2
173	015-G06	At1g31630	AGL86	MADS
174	015-G11	At5g66940	Dof zinc finger protein DOF5.8	DOF
175	015-G12	At1g59530	ATBZIP4	bZIP

N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
176	015-H04	At4g18020	APRR2	Myb-like
177	015-H06	At2g21230		bZIP
178	015-H09	At2g30580	DRIP2	C3HC4
179	015-H10	At1g69780	ATHB13	Homeobox
180	015-H12	At4g38900		bZIP
CANDIDATOS INTERACTORES DE bZIP53				
N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
1	P1-B2	At5g23260	AGL32	MADS
2	P2-A6	At5g24800	BZIP9	bZIP
3	P3-E1	At1g67260	TCP1	TCP
4	P4-F3	At5g65590	SCAP1	DOF
5	P4-G2	At1g67180		C3HC4
6	P4-H1	At4g02640	ATBZIP10	bZIP
7	P4-H2	At3g54620	AtBZIP25	bZIP
8	P4-H4	No gene	Control	
9	P6-A4	At2g31380	STH	B-box ZF
10	P6-B4	At1g34650	HDG10	HD-ZIP
11	P11-H10	*	011-H10	*
12	P11-H12	*	011-H12	*
13	P12-D11	*	012-D11	*
14	P12-D12	*	012-D12	*
15	P12-E6	*	012-E6	*
16	P12-F11	*	012-F11	*
17	P12-G5	*	012-G5	*
18	P12-G11	At2g19810	OZF1	OZF
19	P13-B1	At3g49760	AtbZIP5	bZIP
20	P14-G4	At1g19000		MYB
21	P7-F2	At1g46768	RAP2.1	ERF/AP2
22	P11-C2	At5g57520	ATZFP2	C2H2
23	P11-F12	At3g44460	AtbZIP67	bZIP
24	P12-F2	At5g37020	ARF8	ARF
25	P12-E1	At1g28450	AGL58	MADS
26	P14-B4	At3g51910	AT-HSFA7A	HSF
27	P14-G11	At1g31310		MYB-like
CANDIDATOS INTERACTORES DE bZIP53/25				
N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
1	001-E01	At1g09530	PIF3	bHLH
2	001-E03	At3g12890	ASML2	CO-like
3	001-E12	No gene	Control	
4	001-H05	At1g21960		C3HC4
5	001-H07	At4g36060	bHLH11	bHLH
6	002-E12	At4g27410	RD26	NAC
7	002-F11	At5g62380	VND6	NAC
8	002-H08	At1g06170		bHLH
9	002-H09	At2g31210		bHLH
10	003-G03	At2g43000	anac042	NAC

N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
11	003-G12	At5g25220	KNAT3	Homeobox
12	003-H12	At5g15840	CO	CO-like
13	004-B11	At5g17490	AtRGL3	GRAS
14	004-F03	At5g65590	SCAP1	DOF
15	004-F04	At5g60200	TMO6	Dof-type
16	004-G02	At1g67180		C3HC4
17	004-H01	At4g02640	ATBZIP10	bZIP
18	004-H02	At3g54620	AtbZIP25	bZIP
19	004-H04	No gene	Control	
20	005-F03	At3g23240	ATERF1	ERF/AP2
21	005-G03	At5g21120	EIL2	EIL
22	005-H06	At2g40970	MYBC1	Myb-type
23	006-A04	At2g31380	STH	ZF, B-box
24	006-B04	At1g34650	HDG10	HD-ZIP
25	006-C05	At2g18550	HB-2; HB21	Homeobox
26	007-A07	At1g14920	GAI	GRAS
27	007-E01	At3g16500	PAP1	AUX-IAA
28	007-G01	At2g23340	DEAR3	ERF/AP2
29	009-H03	At5g26660	ATMYB86	MYB
30	010-E12	At1g06180	ATMYB13	MYB
31	010-H01	At1g60880	AGL56	MADS
32	010-H03	At1g28450	AGL58	MADS
33	010-H07	At1g77980	AGL66	MADS
34	011-D03	At3g46090	ZAT7	C2H2
35	011-H03	At5g43700	ATAUX2-11	AUX-IAA
36	011-H07	At3g24650	ABI3	B3
37	011-H10			
38	011-H12			
39	012-B12	At1g56280	ATDI19	RING finger
40	012-D12			
41	012-G02	At2g33720		AP2/B3-like
42	012-G12	At5g43840	AT-HSFA6A	HSF
43	012-H06			
44	012-H07			
45	012-H08			
46	012-H11	At1g15580	IAA5	AUX-IAA
47	012-H12	At1g02450	NIMIN1	NIMIN
48	013-D02	At5g11590	TINY2	ERF/AP2
49	013-E04	At1g49560		Myb-like
50	013-E12	At5g60830	AtbZIP70	bZIP
51	013-H01	At1g61660	bHLH112	bHLH
52	013-H09	At4g30180		bHLH
53	014-A03	At4g11140	CRF1	ERF/AP2
54	014-A12	At1g19490		bZIP
55	014-B12	At3g06590	AIF2	bHLH
56	014-C12	At2g21650	RSM1	MYB

N.	Código en Genoteca	ID	Gen	Familia
57	014-D12	At1g09710		MYB
58	014-E12	At5g28300	AtGT2L	Trihelix
59	014-F12	At4g13980	AT-HSFA5	HSF
60	014-G12	At3g50330	HEC2	bHLH
61	014-H12	At3g05700	Protein dehydration-induced 19-3	Drought-responsive
62	015-C04	At5g60200	TMO6	DOF
63	015-C08	At1g49120	CRF9	ERF/AP2
64	015-C10	At2g46960	CYP709B1	CitP450
65	015-C11	At2g34000		RING/U-box
66	015-E02	At2g18160	ATBZIP2	bZIP
67	015-E09	At1g50680		AP2/B3
68	015-E10	At1g77200		ERF/AP2
69	015-E11	At3g15210	ATERF-4	ERF/AP2
70	015-F02	At5g06500	AGL96	MADS
71	015-F11	At3g54810	BME3-ZF	GATA
72	015-G03	At2g40350	Putative DREB2H protein	ERF/AP2
73	015-G04	At4g25470	ATCBF2	ERF/AP2
74	015-G06	At1g31630	AGL86	MADS
75	015-G11	At5g66940	Dof zinc finger protein DOF5.8	DOF
76	015-H10	At1g69780	ATHB13	Homeobox