UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF)

POLITÉCNICA

**UNA VISIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN
LAS EMPRESAS EUROPEAS: LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RAZONES DE
APLICACIÓN A LA PROSTATITIS CRÓNICA**

TESIS DOCTORAL

VÍCTOR JIMÉNEZ DÍAZ-BENITO
GRADUADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

2019

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEL DEPORTE Y DEL OCIO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Título:

**UNA VISIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN
LAS EMPRESAS EUROPEAS: LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RAZONES DE
APLICACIÓN A LA PROSTATITIS CRÓNICA**

Autor:

Víctor Jiménez Díaz-Benito
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Directores:

Jesús Martínez del Castillo
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Doctor en Sociología

María Isabel Barriopedro Moro
Doctora en Psicología

2019

TRIBUNAL DE LA TESIS

Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de Madrid,
el día.....de.....de 20....

Presidente: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Secretario: _____

Suplente: _____

Suplente: _____

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día.....de.....de 20 ...
en la E.T.S.I. /Facultad.....

Calificación

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

CONSENTIMIENTO DIRECTORES

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

REGISTRO UPM (INEF)

Entrada Nº. 201900022613 29/05/2019
12:53:05

INFORME DEL DIRECTOR PARA LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LECTURA DE LA TESIS DOCTORAL (ART. 15 DEL REGLAMENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL)

Título de la tesis doctoral:

Nombre del autor/a de la tesis: **VÍCTOR JIMÉNEZ DÍAZ-BENITO**

Título de la tesis presentada: **UNA VISIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS EMPRESAS EUROPEAS: LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RAZONES DE APLICACIÓN A LA PROSTATITIS CRÓNICA**

Director/es de la tesis

Nombre: **JESÚS MARTÍNEZ DEL CASTILLO**

Centro y Departamento: **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE; CIENCIAS SOCIALES DE LA AF, EL DEPORTE Y EL OCIO**

Nombre: **MARIA ISABEL BARRIOPEDRO MORO**

Centro y Departamento: **FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE; CIENCIAS SOCIALES DE LA AF, EL DEPORTE Y EL OCIO**

Valoración de la tesis doctoral por parte del director

Esta tesis, centrada en los modelos de planificación para la promoción de la salud en el lugar de trabajo, pretende acumular evidencia acerca de los efectos de los Programas de Actividad Física (PAF), implementados en Europa, en el ámbito laboral. Esta evidencia se recoge en tres diferentes estudios: dos metaanálisis y un estudio cuasiexperimental. Un primer metaanálisis analiza los beneficios asociados a los PAF en empresas europeas. Esta revisión sirve de base para el diseño y la implementación, en una empresa española, de un PAF. Esta intervención constituye el segundo estudio de la tesis. Por último, el tercer estudio, realiza un metaanálisis sobre los efectos de los PAF en una enfermedad laboral concreta, la prostatitis crónica.

La revisión de los modelos teóricos aplicables a este problema es pertinente y profunda. Desde un punto de vista metodológico, la tesis esta impecablemente planteada y las inferencias se ajustan apropiadamente a lo que realmente revelan los datos. En resumen, a nuestro juicio, se trata de una contribución importante a la comprensión del fenómeno evaluado y cumple los criterios de calidad y originalidad necesarios para proceder al acto de su lectura y defensa.

Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

El director/Los directores de la tesis autoriza/an su presentación para:

- ☒ Su admisión a trámite de lectura.
☐ La solicitud de la mención "Doctor Internacional".

Madrid, a 30 de mayo de 2019

El/La directora/a

Fdo: Jesús Martínez del Castillo
Catedrático de Universidad
Departamento de Ciencias Sociales de la
Actividad Física, del Deporte y del Ocio
Universidad Politécnica de Madrid

El/La directora/a

Fdo: María Isabel Barriopedro Moro
Profesora Titular de Universidad
Departamento de Ciencias Sociales de la
Actividad Física, del Deporte y del Ocio
Universidad Politécnica de Madrid

AGRADECIMIENTOS

La culminación de la tesis doctoral cierra una etapa en la que me han acompañado muchas personas a las que me gustaría expresar mi gratitud.

En primer lugar, quisiera agradecer a los profesores Jesús Martínez del Castillo y María Isabel Barriopedro Moro por aceptar dirigir esta tesis y su valiosa tutela académica durante todos estos años. Humildemente, cuando uno mira hacia atrás puede ver el recorrido con cierta nitidez, sin embargo, mirar hacia adelante con vuestra lucidez intelectual supone una aspiración que me ha ayudado enormemente a iniciar mi formación investigadora. Siempre os estaré agradecido por vuestra enorme implicación y comprensión para la realización de esta tesis, pero todavía más por vuestras enseñanzas. Verdaderamente es un auténtico privilegio.

Me gustaría mostrar mi agradecimiento a Aitor por su inestimable ayuda para el diseño del programa y toda la realización del trabajo de campo en Valencia. Tu profesionalidad, desde tus primeras observaciones, hasta la consecución con éxito de todas las tareas llevadas a cabo durante el programa de ejercicio físico, me han enseñado muchísimo. Ha sido un auténtico placer trabajar a tu lado.

También a Frank Álvarez, por su generosa implicación en el registro gráfico de las sesiones de trabajo llevadas a cabo durante la realización del programa de intervención.

De igual modo, toda mi gratitud a Merxe y Andrés, por creer en el proyecto desde el principio y por su enorme convicción acerca del poder de promover la salud en las empresas. Vuestra generosa dedicación durante todas las fases del proyecto nos fue de gran ayuda y, particularmente, me mostraron nuevas expectativas profesionales e intelectuales en el campo de la salud laboral. Por su parte, conocer a todo vuestro equipo fue una experiencia tan enriquecedora como humana. Gracias a todas las personas que voluntariamente formaron parte del proyecto. A todos ellos les debo el haber podido intervenir en una organización empresarial, tras muchos meses de búsqueda, tras numerosas reuniones sin que nadie nos abriera las puertas, después de tantas comunicaciones formales, llamamientos a medios, tras tantas reuniones fallidas en las que, sencillamente, existían argumentos del tipo “no tenemos instalaciones para ello” o “qué va a pensar mi jefe sin me ve en chándal por la oficina”. Vosotros demostrasteis que se pueden hacer grandes cosas, si se pone voluntad, aun con partidas presupuestarias muy reducidas.

Hubo otras empresas, en cambio, que se ofrecieron a participar, sin embargo, no pudieron considerarse ante la falta de financiación de nuestro proyecto. A todas ellas también les quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento por su desprendido interés, con el deseo de que próximamente podamos realizar dichas intervenciones.

A Bea, por sus excelentes consejos a la hora de conectar con las empresas y encontrar las vías necesarias para que el contacto fuera exitoso.

A Sandra y Rocío, sin duda su inestimable talento como “guías espirituales de marcas” fueron determinantes para conformar una imagen sólida del proyecto.

A todos los compañeros y amigos de la Universidad Politécnica de Madrid, por concederme la oportunidad de aprender a su lado y que tan amablemente me acogieron a mi llegada. Gracias a quienes me ayudaron a buscar empresas para conformar la muestra y a todos los que, en algún momento, tuvieron a bien interesarse por el objeto de estudio de esta tesis. Durante mi estancia en el Centro he podido conocer a personas maravillosas en las apasionantes reuniones de representación estudiantil. Gracias a Javier y Ángel por compartir vuestras inquietudes conmigo, y también por vuestro cariño y reconocimiento durante esta etapa. Gracias, Juan, por tu amabilidad. Tu alegría me ha ayudado mucho a seguir el camino con buena actitud, sin resignación, con optimismo.

También a todos los de la Universidad Camilo José Cela, por vuestra generosa comprensión y ayuda. No podría recordar todas las veces que os habéis interesado por el desarrollo de esta tesis. Tampoco las veces en las que habéis renunciado a otras tareas importantes para recibir valiosos consejos de vuestra parte. Gracias, de corazón, por toda vuestra ayuda.

A mis amigos Alfonso, Javi, Arturo y Rubén. Gracias por tantos años de amistad y por todos esos momentos que ayudan a seguir hacia adelante solo con recordarlos.

De igual modo, a mi amiga Mauri. Gracias por ofrecerme tu ayuda siempre que la he necesitado, gracias por compartir tu excelente conocimiento de forma tan humilde.

Gracias también a Sara, por acompañarme con tu interés en esta línea de investigación y por tus interesantísimas sugerencias e ideas que, sin duda, auguran en ti una prometedora investigadora.

A mi pareja, Louise, por compartir su vida conmigo. Tu afán de superación no tiene límites. Gracias por permitirme acceder a tu corazón. Todo cuanto me rodea es pequeño cuando se trata de ti. Tu inmensa generosidad ha sido crucial para llegar hasta aquí. Gracias por decorar los momentos difíciles con una sonrisa. Gracias por aparecer en mi vida.

A mis padres, porque les debo todo. El impulso para iniciar esta tesis hubiera sido imposible sin vuestra ayuda. Durante toda mi formación he sentido el privilegio de sentir vuestro apoyo muy cerca. Gracias por confiar en mí cuando el viento no sopla a nuestro favor, por concederme la oportunidad de equivocarme y el derecho a rectificar.

También a Lorena, por todo lo que representas para mí. Lo que humildemente pueda contribuir esta tesis tan solo es una pizca de tu inteligencia. La bondad que recogen tus consejos ha sido una importante fuente de inspiración y una valiosa pieza de este proceso.

Y a toda mi familia, por arroparme durante todo el camino. Muy especialmente a mi abuela Pepa. Sé muy bien que has sufrido en primera persona todas mis dificultades. Gracias por tu capacidad de empatizar conmigo y por la humildad con la que me has enseñado todo. Con certeza, te debo mucho tiempo.

A mi abuela Pepa

ÍNDICE GENERAL

ABREVIATURAS	ix
ÍNDICE DE TABLAS	xiii
ÍNDICE DE FIGURAS	xv
RESUMEN	xvii
ABSTRACT	xxi
1 INTRODUCCIÓN	3
2 MARCO TEÓRICO Y FORMAL	9
2.1 EL CONCEPTO DE TRABAJO Y EL LUGAR DE TRABAJO: CAMINO DE LA REINVENCIÓN	9
2.1.1 El trabajo: centralismo y definición	9
2.1.2 Fundamentos etimológicos y lingüísticos	9
2.1.3 Postulados teóricos tradicionales	10
2.1.3.1 El nacimiento de la sociología del trabajo y de las ocupaciones laborales ...	10
2.1.3.2 Evolución del trabajo y el empleo	10
2.1.3.3 Perspectiva económica y social	12
2.1.3.4 Perspectiva filosófica y del pensamiento humanístico	12
2.1.3.5 Perspectiva antropológica	14
2.1.3.6 Enfoques y contribuciones conceptuales adicionales	14
2.1.4 El concepto amplio de trabajo como punto de partida	16
2.2 LUGAR DE TRABAJO: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, TIPOS Y EVOLUCIÓN	17
2.2.1 Definición y tipología desde la organización del trabajo	17
2.2.2 Análisis y descripción de la estructura funcional del puesto de trabajo	21
2.2.3 Definición y tipos de organizaciones	22
2.2.4 Propiedades de los puestos de trabajo de oficina	22
2.2.5 Relación existente entre los tipos de organizaciones y los lugares de trabajo	23
2.2.6 Población activa: Jornada y régimen laborales	23
2.2.7 Retrospectiva y evolución	23
2.2.8 Datos censuales	25
2.3 EL ENTORNO LABORAL Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO	28
2.3.1 El entorno laboral	28
2.3.1.1 Análisis preliminar del entorno y de las organizaciones	28
2.3.1.2 Paradigma territorial-cultural sobre el bienestar en el lugar de trabajo	28

2.3.1.3 El entorno laboral en Europa	29
2.3.2 Los programas de promoción de actividad física y salud en el lugar de trabajo	30
2.3.2.1 La actividad física y la importancia de un estilo de vida saludable	30
2.3.2.2 Recomendaciones internacionales	32
2.3.2.3 Cambios sociales en la práctica de actividad física: barreras y demandas....	32
2.3.2.4 Marco de referencia sobre la gestión de la salud de los empleados	37
2.3.2.5 La planificación de los programas de promoción de la salud en las organizaciones: teorías y modelos de planificación.....	43
2.3.2.6 El lugar de trabajo: un nuevo desafío organizativo	52
2.4 LA EVALUACIÓN PROGRAMAS SOBRE EL TRABAJADOR Y LA ORGANIZACIÓN: EPIDEMIOLOGÍA, DETERMINANTES Y EVIDENCIA EXISTENTE	54
2.4.1 Epidemiología lesional en los puestos de trabajo de oficina	54
2.4.2 Un hipotético camino hacia el aminoramiento de los factores de riesgo	59
2.4.2.1 Justificación y propósito	59
2.4.2.2 Composición de los programas de promoción de la salud en las empresas: latencias y evidencias	60
2.4.3 Evidencia existente de los programas sobre la salud percibida	61
2.4.3.1 Salud física.....	62
2.4.3.2 Salud mental	63
2.4.4 La productividad y los costes de productividad	65
2.4.4.1 Contexto.....	65
2.4.4.2 Los costes en la productividad: los grandes olvidados en la literatura	66
2.4.4.3 Evidencia existente: mejora de los hábitos físicos, pero aumento de los costes	66
2.4.4.4 El absentismo y el presentismo laboral: la incidencia del mercado de trabajo	67
2.4.4.5 Evidencia general existente	68
2.4.5 La capacidad para el trabajo	69
2.4.6 Satisfacción en el trabajo	70
2.5 FISIOLÓGÍA Y FISIOPATOLOGÍA PROSTÁTICA.....	73
2.6 PROSTATITIS Y DOLOR PÉLVICO	73
2.6.1 Definición, causas y tipos	73
2.6.2 Diagnóstico, biomarcadores y principales tratamientos	75
2.6.3 El efecto de los condicionantes sociales: el lugar de trabajo presente	76

2.6.4	Evidencias en sujetos deportistas	76
2.6.5	El vacío de la literatura sobre la influencia de la actividad física en la prostatitis crónica y sus efectos en el lugar de trabajo	77
2.7	EN BÚSQUEDA DE PROGRAMAS EFICACES: EVOLUCIÓN, BARRERAS Y NECESIDADES	77
2.8	OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN	82
3	OBJETIVOS E HIPÓTESIS	85
3.1	OBJETIVOS	85
3.1.1	Objetivos generales	85
3.1.2	Objetivos específicos	85
3.2	HIPÓTESIS	86
4	MATERIAL Y MÉTODOS	89
4.1	ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES EUROPEAS	89
4.1.1	Estrategia de búsqueda e identificación de los estudios	89
4.1.2	Selección de estudios	89
4.1.2.1	Criterios de inclusión.....	89
4.1.2.2	Criterios de exclusión.....	90
4.1.3	Codificación de los estudios	90
4.1.4	Evaluación de la calidad metodológica	90
4.1.5	Cálculo del tamaño del efecto.....	91
4.2	ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD	92
4.2.1	Diseño del trabajo de campo	92
4.2.1.1	Descripción general.....	92
4.2.2	Metodología adoptada para la construcción de un modelo organizativo exploratorio	92
4.2.3	Modelo de planificación exploratoria propuesto	92
4.2.3.1	Aspectos previos	92
4.2.3.2	Fases adoptadas para su consecución	92
4.2.4	Selección de participantes.....	93
4.2.4.1	Diseño y composición de la muestra	93
4.2.4.2	Criterios de inclusión.....	93

4.2.4.3 Criterios de exclusión	93
4.2.4.4 Procedimiento para la selección de los sujetos	94
4.2.5 Composición de los grupos y temporalización.....	94
4.2.6 Diseño del programa de intervención	95
4.2.6.1 Intervención de ejercicio físico	95
4.2.6.2 Programa de formaciones en línea	105
4.2.7 Procedimiento de toma de datos y protocolo de experimentación	108
4.2.8 Variables e instrumentos utilizados	108
4.2.8.1 Variables psicológicas	108
4.2.8.2 Variables sobre la productividad y el rendimiento en el trabajo	109
4.2.8.3 Satisfacción laboral	112
4.2.8.4 Variables sobre la condición física	113
4.2.8.5 Variables físicas y antropométricas	116
4.2.8.6 Salud percibida.....	118
4.2.9 Análisis estadístico de los datos	121
4.3 ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA	122
4.3.1 Adquisición de la evidencia	122
4.3.2 Evaluación de calidad metodológica	122
4.3.3 Análisis cuantitativo	122
5 RESULTADOS	127
5.1 ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES EUROPEAS	127
5.1.1 Extracción de datos	127
5.1.2 Características de los estudios	128
5.1.3 Efectos de los programas a nivel general.....	137
5.1.4 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo	138
5.1.5 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada a través de cuestionario SQUASH y CSA	138
5.1.6 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el VO ₂ máx (ml/kg/min).....	139
5.1.7 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el peso (Kg)	140
5.1.8 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el perímetro de la cintura (cm) y porcentaje de grasa (%).....	141

5.1.9 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la presión sistólica (mm Hg)	142
5.1.10 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la presión diastólica (mm Hg)	143
5.1.11 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la salud percibida	144
5.1.12 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo laboral	144
5.2 ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD	145
5.2.1 Selección de los participantes	145
5.2.2 Características de la muestra	146
5.2.3 Muerte experimental: pérdidas de participantes y adherencia al programa	149
5.2.4 Respuestas del programa	149
5.2.5 Variables psicológicas.....	150
5.2.6 Variables sobre la productividad y el rendimiento en el trabajo.....	151
5.2.6.1 Capacidad para el trabajo	151
5.2.6.2 Pérdidas en la productividad relacionadas con la salud	152
5.2.7 Variables sobre la satisfacción en el trabajo	153
5.2.8 Variables sobre la condición física y medidas antropométricas	154
5.2.8.1 Nivel de condición física y capacidad aeróbica.....	155
5.2.8.2 Aptitud musculoesquelética	155
5.2.8.3 Aptitud motriz	156
5.2.8.4 Variables físicas y antropométricas	157
5.2.9 Variables relacionadas con la salud percibida	159
5.3 ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA	160
5.3.1 Síntesis de la evidencia.....	160
5.3.2 Evaluación de la calidad metodológica	161
5.3.3 Extracción y análisis de datos.....	162
5.3.4 Síntesis de los resultados	162
5.3.5 Estimaciones de efectos combinados de las medidas de resultado	165
5.3.5.1 Análisis de la comparación del índice de masa corporal (IMC)	165
5.3.5.2 Análisis de la calidad de vida en relación con el índice de masa corporal (IMC)	165

5.3.5.3	Análisis con relación a la incontinencia urinaria.....	166
6	DISCUSIÓN.....	169
6.1	ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES EUROPEAS	169
6.1.1	Los programas de actividad física y su influencia en el entorno laboral europeo	169
6.1.2	La asociación entre la variabilidad y una valoración objetiva de la influencia de la actividad física en las empresas europeas.....	170
6.1.3	Sobre la metodología empleada en el metaanálisis	171
6.2	ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD	172
6.2.1	Principales hallazgos sobre los objetivos	172
6.2.2	Descensos en los síntomas de la depresión y la ansiedad	173
6.2.3	Implicaciones sobre el rendimiento y la productividad	174
6.2.3.1	Singularidades y condicionantes en la capacidad para el trabajo	174
6.2.3.2	Los costes en la productividad basados en el presentismo y el absentismo	174
6.2.4	La satisfacción laboral	176
6.2.5	Cambios en las variables físicas y en la composición corporal	178
6.2.5.1	Fuerza resistencia	178
6.2.5.2	Porcentaje de grasa	179
6.2.6	Efectos sobre la salud física y mental percibida.....	180
6.2.7	Análisis comparativo de los hallazgos con las evidencias localizadas en Europa	181
6.3	ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA	183
6.3.1	La influencia de la actividad física sobre la prostatitis crónica: evidencias sobre la incontinencia urinaria	183
6.3.2	Heterogeneidad de los estudios incluidos en la revisión	184
7	CONCLUSIONES.....	189
7.1	CONCLUSIONES SOBRE EL PRIMER OBJETIVO	189
7.2	CONCLUSIONES SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO.....	189
7.3	CONCLUSIONES SOBRE EL TERCER OBJETIVO.....	190
8	LIMITACIONES DE LOS ESTUDIOS	193
8.1	LIMITACIONES SOBRE EL PRIMER OBJETIVO.....	193

8.2	LIMITACIONES SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO	193
8.3	LIMITACIONES SOBRE EL TERCER OBJETIVO	194
9	FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	197
10	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	201
11	ANEXOS.....	241
11.1	ANEXO 1: RESULTADOS DE LA ESCALA PEDro ESTUDIO 1.....	241
11.2	ANEXO 2: ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS DEL ESTUDIO 1.....	241
11.3	ANEXO 3: GUÍA PARA PARTICIPANTES DE PRODET	244
11.4	ANEXO 4: PROPIEDADES DEL ESPACIO	251
11.5	ANEXO 5: EJEMPLOS DE EJERCICIOS REALIZADOS ESTRUCTURA DE CARGAS DE PRODET	252
11.6	ANEXO 6: PROGRAMA DE FORMACIONES PRODET.....	263
11.7	ANEXO 7: RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO DEL ESTUDIO 2	283
11.8	ANEXO 8: RESULTADOS DE LA ESCALA PEDro ESTUDIO 3	287
11.9	ANEXO 9: INSTRUCCIONES PREVIAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIO 2	289
11.10	ANEXO 10: SPANISH CENTER FOR EPIDEMIOLOGIC STUDIES DEPRESSION SCALE (CES- D)	292
11.11	ANEXO 11: INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO (STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY, STAI).....	293
11.12	ANEXO 12: ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA EL TRABAJO	295
11.13	ANEXO 13: CUESTIONARIO SOBRE EL COSTE DE LA PRODUCTIVIDAD (iMTA PRODUCTIVITY COST).....	300
11.14	ANEXO 14: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26 J.L. MELIÁ (1998).....	311
11.15	ANEXO 15: CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 (VERSIÓN 2)	313
11.16	ANEXO 16: HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE VALORACIONES DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y ANTROPOMÉTRICAS.....	320
11.17	ANEXO 17: ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS DEL ESTUDIO 3 ...	321

ABREVIATURAS

ACSM	<i>American College of Sports Medicine</i>
AIE	Asociación Internacional de Ergonomía
AWHP	<i>Association for Worksite Health Promotion</i>
CDC	Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos
CEBM	<i>Oxford Center for Evidence-Based Medicine</i>
CES-D	<i>Centre for Epidemiologic Studies-Depression</i>
CIS	Centro de Investigaciones Sociológicas
CP/CPPS	Prostatitis crónica o dolor pélvico crónico
CSA	<i>Computer Science Application</i>
EFIP	<i>European Forum of Independent Professionals</i>
ENWHP	<i>European Network for Workplace Health Promotion</i>
EP	Enfermedades profesionales
EPA-UE	Encuesta de Población Activa de la Unión Europea
EPOC	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
EU-OSHA	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
FC	Frecuencia Cardíaca
HRR	Frecuencia Cardíaca de Reserva
IAWHP	<i>Association for Worksite Health Promotion</i>
IC	Intervalo de Confianza
ICP	Índice de Capacidad para el trabajo
IDARE	Inventario de Ansiedad Rasgo Estado
IMC	Índice de Masa Corporal
iMTA	<i>Institute for Medical Technology Assessment</i>
INE	Instituto Nacional de Estadística
iPCQ	<i>iMTA Productivity Cost Questionnaire</i>

ISAK	Sociedad Internacional Para el Avance de la Cineantropometría (ISAK)
NIDDK/NIH	<i>National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases</i>
NIOSH	<i>National Institute for Occupational Safety and Health</i>
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OHMS	<i>Occupational Safety and Health Management System Management Model</i>
OIT/ILO	Organización Internacional del Trabajo
PEDro	Escala de evaluación de la calidad metodológica
pH	Potencial de hidrógeno o medida de acidez de una disolución
PRECEDE	<i>Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational/Environmental Diagnosis and Evaluation</i>
PRISMA	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i>
PROCEED	<i>Policy, Regulatory, and Organizational Constructs in Educational and Environmental Development</i>
PRODET	Promoción de Ejercicio en el Trabajo
PSA	Antígeno prostático específico
PST	Promoción de la Salud en el Trabajo
PVC	Policloruro de vinilo
R.D.	Real Decreto
RCT/ECA	<i>Randomized Controlled Trial</i> (Ensayo Clínico Aleatorizado)
SDPC	Síndrome de dolor pélvico crónico
SF-36	Cuestionario de Salud Percibida
SQUASH	<i>Short Questionnaire to Assess Health enhancing Physical Activity</i>
TE	Tamaño del Efecto
UE	Unión Europea
VB3	Orina postmasaje prostático
VO₂ máx	Volumen de Oxígeno Máximo

WAI	<i>Work Ability Index</i>
WELCOA	<i>Wellness Council of America</i>
WHP	<i>Workplace Health Promotion</i>

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Conceptos de trabajo desde la teoría social	15
Tabla 2. Clasificación y características básicas de los puestos de trabajo en oficina	20
Tabla 3. Teorías de promoción de la salud: foco y rasgos distintivos.....	45
Tabla 4. Modelos de planificación de la promoción de la salud en el trabajo en el campo internacional.....	48
Tabla 5. Clasificación de la prostatitis según la clasificación de la NIDDK/NIH	75
Tabla 6. Programación de los objetivos mensuales de PRODET	97
Tabla 7. Recomendaciones de actividad física para la salud en sujetos sanos.....	97
Tabla 8. Tipo de sesión realizada, intensidad por % de HRR	105
Tabla 9. Programación mensual de envío de formaciones.....	106
Tabla 10. Descripción de las dimensiones del cuestionario S21/26 e interpretación de las puntuaciones	112
Tabla 11. Porcentaje de grasa baremado en mujeres y hombres	118
Tabla 12. Variables, instrumentos y referencias de las variables dependiente seleccionadas.....	119
Tabla 13. Características de los estudios	129
Tabla 14. Características, intervenciones y contenidos de los estudios incluidos en el metaanálisis.....	130
Tabla 15. Instrumentos, referencias y principales características de los instrumentos empleados en las intervenciones europeas	135
Tabla 16. Características de la muestra: datos demográficos y variables descriptivas de la muestra (media y desviación típica) o frecuencias; estadístico de contraste; valor de p para la comparación del grupo experimental con el grupo control	147
Tabla 17. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para las variables psicológicas observadas al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos	150
Tabla 18. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para el Índice de Capacidad para el Trabajo observado al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos	151
Tabla 19. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para los costes en la productividad (<i>iMTA Productivity Cost</i>) observado al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos	153
Tabla 20. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para la satisfacción en el trabajo y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos	154

Tabla 21. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para la condición física al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos	158
Tabla 22. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para la salud percibida al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos	160
Tabla 23. Análisis de los resultados obtenidos de los diferentes artículos seleccionados en la revisión.....	162

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Evolución del empleo categorizado por edad entre 1993 y 2016 en Europa (28) y España.....	25
Figura 2. Tasa de paro en España en el cuarto trimestre de 2014	26
Figura 3. Evolución de la población de empresas entre 2008 y 2018.....	27
Figura 4. Distribución del número de empresas por tamaño	27
Figura 5. Actividad física durante el día de la población española 1990-2005.....	35
Figura 6. Frecuencia de práctica de actividad física y deporte en Europa y España	35
Figura 7. Modelo circular basado en el ciclo de Deming	47
Figura 8. Modelo de promoción de la salud en las empresas de la OMS	48
Figura 9. Modelo de PST propuesto por el INSST	51
Figura 10. Pesos porcentuales de las zonas geográficas que ofrecen programas de promoción de la salud en el mundo	52
Figura 11. Programas implementados en Europa.....	53
Figura 12. Enfermedades profesionales por grupo de enfermedad y sexo en España entre 1990 y 2014.....	55
Figura 13. Evolución de las enfermedades profesionales según grupo de enfermedad en España entre 1990 y 2014	56
Figura 14. Evolución del porcentaje anual de las enfermedades profesionales según Evolución del porcentaje anual de las enfermedades profesionales según la antigüedad en el puesto de trabajo en España entre 1990 y 2014.....	56
Figura 15. Porcentaje anual de enfermedad profesional por sector de actividad en España entre 1990 y 2014	57
Figura 16. Distribución de las tasas de enfermedades profesionales causadas por agentes físicos en España entre 1990 y 2014.....	57
Figura 17. Empresas por estrato de asalariados y condición jurídica	58
Figura 18. Incidencia de enfermedades profesionales reconocidas en España durante el periodo 1995–2014 según el tamaño de la empresa.....	58
Figura 19. Proporción de la población con trastornos de salud mental y uso de sustancias, 2013	64
Figura 20. Descripción gráfica de una próstata inflamada	74
Figura 21. Algoritmo de decisión de participantes	95
Figura 22. Infográfico sobre la distribución de trabajo del programa de ejercicio	96
Figura 23. Sesión realizada, intensidad por % de HRR	104
Figura 24. Protocolo experimental del trabajo de campo	108
Figura 25. Clasificación del IMC. Adaptado de: OMS.....	117

Figura 26. Diagrama de flujo para la trayectoria de inclusión	128
Figura 27. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo (ICP-WAI).....	138
Figura 28. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por cuestionario SQUASH	139
Figura 29. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por el CSA	139
Figura 30. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el VO ₂ máx (ml/kg/min).....	140
Figura 31. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el peso (Kg)	141
Figura 32. Efectos de los programas de actividad física salud sobre perímetro de la cintura (cm)	142
Figura 33. Efectos de los programas de actividad física salud sobre el porcentaje de grasa (%).....	142
Figura 34. Efectos de los programas de actividad física salud sobre la presión sistólica (mm Hg)	143
Figura 35. Efectos de los programas de actividad física salud sobre la presión diastólica (mm Hg)	143
Figura 36. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la salud física y mental autopercibida	144
Figura 37. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo.	145
Figura 38. Diagrama de flujo de reclutamiento de participantes en el estudio	146
Figura 39. Resultados de la intensidad esperada y la intensidad percibida durante el desarrollo de las sesiones del grupo experimental	150
Figura 40. Diagrama de flujo explicativo de la revisión bibliográfica	161
Figura 41. Análisis de la comparación del índice de masa corporal (IMC).....	165
Figura 42. Análisis de la calidad de vida en relación con el índice de masa corporal (IMC)	166
Figura 43. Análisis de la comparación de la incontinencia urinaria	166
Figura 44. Análisis comparativo de las evidencias localizadas en Europa	182

RESUMEN

Introducción

Los efectos del ejercicio físico en el lugar de trabajo, así como los programas de promoción de la salud en diferentes entidades, han arrojado diferentes respuestas sobre los parámetros estudiados. A menudo estos parámetros se relacionan con la salud, si bien, existen vacíos de conocimiento sobre las aplicaciones de estos programas sobre la prostatitis crónica y su incidencia en las organizaciones. Asimismo, existe una necesidad de realizar intervenciones en Europa que justifiquen los beneficios asociados en el trabajo de oficina y, más concretamente, en España. El primer estudio tuvo por objetivos identificar los parámetros predominantes en los estudios realizados en Europa, examinar su heterogeneidad y determinar así sus efectos. Partiendo de este análisis, el segundo estudio pretendió evaluar los efectos de un programa de ejercicio físico supervisado basado en resistencia aeróbica y fuerza de 12 semanas de duración sobre distintos parámetros psicológicos, físicos, antropométricos y organizativos de interés en las empresas para arrojar una mayor evidencia empírica. La incidencia de la actividad física sobre distintas enfermedades crónicas ha sido evidenciada en la literatura, si bien, la prostatitis crónica se muestra latente en el lugar de trabajo y todavía no se conocen los efectos de la actividad física sobre la misma y sus posibles efectos sobre las empresas. El tercer estudio pretendió analizar la influencia de la actividad física en CP/CPPS, así como estudiar los efectos encontrados.

Material y métodos

En el primer estudio se identificaron estudios relevantes realizando búsquedas tanto electrónicas como manuales. Las búsquedas electrónicas se llevaron a cabo mediante el uso de varias bases de datos: *PubMed*, *Web of Science* y *Sport Discus*, siendo incluidos aquellos estudios realizados hasta junio de 2014. Se desarrollaron frases de búsqueda adaptadas a las bases de datos a las que nos dirigíamos empleando palabras clave: 1) *health promotion*; 2) *workplace*; 3) *physical activity*; 4) variables: absentismo, productividad, capacidad para el trabajo, salud; y 5) RCT. Seguidamente, se determinó la calidad metodológica de los estudios identificados. Para cada medida de resultado de interés, fue estimado un tamaño del efecto (TE) genérico sobre la base de los datos originales en el artículo, siguiendo el modelo propuesto Hedges en 1982 (Hedges, 1982) a través del programa *Effect Size determination Program* desarrollado por Wilson y Lipsey en el año 2001 (Wilson y Lipsey, 2001). El segundo estudio tuvo un diseño cuasiexperimental y se compuso de 67 sujetos ($N = 67$) y tuvo como objetivo analizar la incidencia de un programa de ejercicio físico aeróbico y de fuerza supervisado y grupal de 12 semanas de duración en el lugar de trabajo sobre la salud mental y física y en las variables relacionadas con el rendimiento y la productividad en el trabajo en 67 sujetos en edad de trabajar, trabajadores de oficina y declarados sedentarios ($N = 67$) de los cuales 33 fueron hombres ($N = 33$; 49,25%) y 34 fueron mujeres ($N = 34$; 50,75%). El supuesto de normalidad se comprobó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y el de igualdad de varianzas mediante la prueba de Levene. Para comparar las características del grupo experimental y control se realizaron pruebas U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas y Chi Cuadrado para las nominales. Como índices del tamaño del efecto se calculó $\eta^2 = z/(n-1)$. La interpretación de η^2 se basó en

los siguientes valores: $<0,06$ pequeño, $\geq 0,06$ hasta $<0,14$ medio y $\geq 0,14$ grande (Cohen, 1988). En el tercer estudio se realizó una búsqueda formal en las bases de datos *Scopus*, *PubMed*, *ScienceDirect*, *PEDro*, *The Cochrane Library*, *Dialnet* y *Scielo*, hasta junio de 2018 (siendo el último artículo empleado en este Metaanálisis publicado en marzo de 2018). Seguidamente se evaluó la calidad metodológica. Seguidamente, para cada medida de resultado de interés, fue estimado un tamaño del efecto (TE) genérico sobre la base de los datos originales en el artículo, siguiendo el modelo propuesto Hedges en 1982 (Hedges, 1982) a través del programa *Effect Size determination Program* desarrollado por Wilson y Lipsey en el año 2001 (Wilson y Lipsey, 2001).

Resultados

En el primer estudio, de 696 títulos analizados, 18 estudios cumplieron los criterios de inclusión. Se localizaron efectos pequeños de los programas sobre las variables en general (TE = 0,21; CI 95 % 0,07 a 0,35), así mismo, también fue pequeño el efecto de las intervenciones sobre algunas de las variables predominantes. Estos resultados sugieren una elevada variabilidad. Los estudios mostraron efectos significativos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo (TE = 0,21; IC 95 %, 0,06 a 0,36; P = 0,003), la adherencia a la actividad física medida a través del cuestionario SQUASH (TE = 0,22; IC 95 % 0,05 a 0,38), la presión sistólica (TE = 0,10; IC 95% 0,04-0,21; P = 0,002), la salud percibida de los participantes (TE = 0,18; IC 95% 0,08 a 0,28), sin embargo los efectos encontrados fueron pequeños y en algunos casos despreciables. No se observaron efectos significativos sobre las variables VO_2 máx, peso corporal, presión diastólica y absentismo laboral. En el segundo estudio, se observaron efectos significativos del programa sobre la dimensión de la capacidad mental para el trabajo ($Z = 2,36$; P = 0,019; $\eta^2 = 0,09$), la fuerza resistencia ($Z = 2,34$; P = 0,020; $\eta^2 = 0,08$), la pérdida del porcentaje de grasa ($Z = 2,44$; P = 0,015; $\eta^2 = 0,09$), potencia del tren inferior ($Z = 2,33$; P = 0,020; $\eta^2 = 0,08$). El programa también encontró efectos significativos sobre la salud física y mental percibida ($Z = 5,10$; P = 0,000; $\eta^2 = 0,39$ para la variable salud física; $Z = 3,18$; P = 0,001; $\eta^2 = 0,15$ para la variable salud mental; $Z = 4,83$; P = 0,000; $\eta^2 = 0,35$ para la variable de puntuaciones totales de la salud mental). No se observaron efectos sobre las variables depresión, ansiedad, capacidad para el trabajo, absentismo, presentismo, costes en la productividad y satisfacción laboral. En el tercer estudio se revisaron un total de 93 estudios, de los cuales se seleccionaron 10, con un posterior examen de su calidad metodológica mediante la escala PEDro. Se encontraron efectos significativos y grandes en el análisis entre los sujetos con y sin síntomas de prostatitis en la diferencia del pre al post en uno de los estudios (TE = 1,42; IC 95 %, 0,882-1,965). El análisis global de las intervenciones resultó significativo (TE = 0,11; IC 95%, 0,038 a 0,43; P = 0,0246).

Conclusiones

Los diferentes programas analizados en el primer estudio mostraron dificultades generalizadas para encontrar grandes efectos. La heterogeneidad de los estudios no proporcionó evidencia científica suficiente para una evaluación objetiva de los programas y un posterior diseño de intervenciones. El programa de ejercicio físico aeróbico y la fuerza realizada en grupo y supervisada en el lugar de trabajo, desarrollado durante 12 semanas, tuvo un impacto en la resistencia y la pérdida del porcentaje de

grasa en los sujetos de una empresa española cuyas ocupaciones se basaban en tareas sedentarias. Asimismo, el programa también afectó a la salud física y mental percibida de los sujetos, aunque los efectos fueron pequeños. De igual modo, todavía hay pocos estudios que determinen el efecto de la actividad física en CP / CPPS y no es posible proporcionar evidencia científica suficiente para evaluar su efectividad y el diseño posterior de las intervenciones en el lugar de trabajo.

Palabras clave: Actividad física; PST; Ejercicio físico; Prostatitis crónica; CP/CPPS; Empresas; Organización.

ABSTRACT

Introduction

Physical exercise in the workplace, as well as health promotion programs in several entities, have had different effects on the variables studied. These variables are often related to health, although there are knowledge gaps related to the applications of these programs on chronic prostatitis and their impact on the organizations. There is also a need to conduct interventions in Europe, more specifically in Spain, that justify the associated benefits in office work. The first study aimed to identify the predominant variables in the studies conducted in Europe, to examine their heterogeneity and to determine their effects. On the basis of such analysis, the second study looked into a 12-week supervised physical exercise program based on aerobic endurance and strength and aimed to evaluate its effects on different psychological, physical, anthropometric and organizational variables of interest in several companies, in order to bring more empirical evidence. Numerous research studies show evidence of the impact of physical activity on different chronic diseases; however, the effects of physical activity on chronic prostatitis, a disease that appears to be latent in the workplace, and the possible effects on the companies are still unknown. The third study aimed to analyze the influence of physical activity on CP/CPPS, as well as to study the resulting effects.

Methods

In the first study, relevant studies were identified through both electronic search as well as manual search. Electronic search was conducted through the use of several databases: PubMed, Web of Science, and Sport Discus, and including only those studies conducted before June 2014. Search phrases were created according to the database that was being addressed at the time, using key terms: 1) health promotion; 2) workplace; 3) physical activity; 4) variables: absenteeism, productivity, work ability, health; and 5) RCT. Thereupon, the methodological quality of such studies was rated. For each measurement of the results of interests, a generic effect size (ES) was estimated over the basis of the original data in the article, following the model proposed by Hedges in 1982 (Hedges, 1982) through the programme called *Effect Size determination Program*, developed by Wilson and Lipsey in 2001 (Wilson and Lipsey, 2001). The second study had a quasi-experimental design, it was composed of 67 subjects ($N = 67$) and looked into a 12-week group physical exercise program in the workplace, which was supervised and based on aerobic endurance and strength. The study aimed to evaluate its effects on mental and physical health and on the variables related to performance and work productivity. The 67 subjects were working-age individuals, office workers and deemed sedentary ($N = 67$). Among them, 33 were men ($N = 33$; 49.25%) and 34 were women ($N = 34$, 50.75%). The assumption of normality was proved through the Kolmogorov-Smirnov test and the equality of variances through Levene test. To compare the characteristics of the experimental and control group, we performed Mann-Whitney U tests for the quantitative variables and Chi-Square for the nominal variables. As effect size rates, we calculated $\eta^2 = z/(n-1)$. The interpretation of η^2 was based on the following values: <0.06 small, ≥ 0.06 to <0.14 medium and ≥ 0.14 big (Cohen, 1988). In the third study, a formal search was conducted in the following databases: Scopus, PubMed, ScienceDirect, PEDro, The Cochrane Library, Dialnet and

Scielo, including those studies conducted until June 2018 (the last article used in this meta-analysis was published in March 2018). Thereupon, the methodological quality of such studies was rated. Consecutively, for each measurement of the results of interests, a generic effect size (ES) was estimated over the basis of the original data in the article, following the model proposed by Hedges in 1982 (Hedges, 1982) through the programme called *Effect Size determination Program*, developed by Wilson and Lipsey in 2001 (Wilson and Lipsey, 2001).

Results

In the first study, among 696 studies analyzed, 18 studies met the inclusion criteria. We found small effects of the programs on the variables in general (ES = 0.21, CI 95% 0.07 to 0.35). Likewise, the effect of the interventions on some of the predominant variables was also small. These results suggest a high variability. The studies showed significant effects of the physical activity and health programs on work ability (ES = 0.21; CI 95%, 0.06 to 0.36, $P = 0.003$), on exercise adherence, measured through the SQUASH questionnaire (ES = 0.22, CI 95% 0.05 to 0.38), on systolic pressure (ES = 0.10; CI 95% 0.04-0.21; $P = 0.002$) and on the participants' perceived health (ES = 0.18, 95% CI 0.08 to 0.28). However, the effects found were small and in some cases insignificant. No significant effects were observed on the variables VO₂ max, body weight, diastolic pressure and work absenteeism.

In the second study, the program showed effects on mental factor of work ability ($Z = 2.36$, $P = 0.019$, $\eta^2 = 0.09$), strength resistance ($Z = 2.34$; $P = 0.020$, $\eta^2 = 0.08$), the loss of fat percentage ($Z = 2.44$, $P = 0.015$, $\eta^2 = 0.09$), lower train power ($Z = 2.33$, $P = 0.020$, $\eta^2 = 0.08$). The program also found significant effects on perceived physical and mental health ($Z = 5.10$, $P = 0.000$, $\eta^2 = 0.39$ for the physical health variable, $Z = 3.18$, $P = 0.001$, $\eta^2 = 0.15$ for the variable mental health, $Z = 4.83$, $P = 0.000$, $\eta^2 = 0.35$ for the variable of total scores of mental health). No effect was observed on the variables of depression, anxiety, work ability, absenteeism, presenteeism, productivity costs and job satisfaction. In the third study, a total of 93 studies were analyzed. Among them, 10 were selected, with a subsequent examination of their methodological quality using the PEDro scale. Significant and big effects were found in the analysis between subjects with and without prostatitis symptoms, found in the difference from pre to post in one of the studies (ES = 1.42, 95% CI, 0.882-1.965). The overall analysis of the interventions was significant (ES = 0.11, 95% CI, 0.038 to 0.43, $P = 0.0246$).

Conclusions

The different programs analyzed in the first study hardly showed great effects. The heterogeneity of the studies did not provide sufficient scientific evidence for an objective evaluation of the programs and a subsequent design of interventions. The 12-week supervised physical exercise program at the workplace, based on aerobic endurance and strength and conducted in a group, had an impact on the resistance and fat percentage loss in the workers of a Spanish company whose occupations were based on sedentary tasks. Likewise, the program also had an impact on the perceived physical and mental health of the subjects, although the effects were small. Similarly, there are still few studies that determine the effect of physical activity on CP/CPPS and

it is not possible to provide sufficient scientific evidence to evaluate its effectiveness and the subsequent design of interventions in the workplace. This variability could explain the finding of small effect sizes for the different dependent variables analyzed in our study.

Keywords: Physical activity; WHPP; Physical exercise; Chronic prostatitis; CP/CPPS; Companies; Organization.

INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN

La inactividad física es una de las causas más frecuentes del desarrollo de enfermedades crónicas en el mundo (González, Fuentes, y Márquez, 2017). Los hábitos de vida de la sociedad contemporánea confrontan con la salud de las personas y sobre otros parámetros organizacionales que inciden en el gasto sanitario de las organizaciones y de los territorios. La actividad física se ha mostrado como un motor importante para mitigar dichas incidencias (Bernaards, Bosmans, Hildebrandt, van Tulder, y Heymans, 2011; Gussenhoven, van Wier, Bosmans, Dekkers, y van Mechelen, 2013). En Europa cerca de un 46% de la población no realiza actividad física. En España, las cifras de practicantes se encuentran varadas desde finales de la década de los ochenta, en torno a un 45% de practicantes. Entre los principales argumentos de las personas para no realizar actividad física se encuentra la falta de tiempo, que en Europa llega hasta el 40%. Asimismo, un 50% de la población española practica actividad física en entornos informales, cerca de diez puntos superior a la tendencia europea. Esto es, que la práctica deportiva tiende a realizarse en espacios no convencionales, como en un parque o al aire libre (Breda et al., 2018; Comisión Europea, 2015).

A la vez que el trabajo ocupa un eje centra en nuestra sociedad, diversos factores sociales, entre los que se encuentran el desarrollo del sistema productivo y la escasez de empleo, indican que la mayor parte del tiempo la pasamos en el lugar de trabajo o realizando una ocupación no remunerada. Dichos elementos han sido señalados en la literatura científica desde principios del siglo XX (Jáuregui, Egea, y de la Puerta, 1998; Leighton y Brown, 2013). Las empresas, en función de los aspectos culturales y organizacionales de los países y los de las propias entidades, han procurado realizar intervenciones con el fin de mitigar los riesgos asociados a las pérdidas en la productividad y a la salud de los empleados, en tanto han sido considerados parámetros estrechamente relacionados (Renaud et al., 2008).

Fruto de estas necesidades, fueron justificadas determinadas latencias en la literatura. Las publicaciones existentes en la línea de investigación sobre promoción de la salud en el lugar de trabajo se han multiplicado en las últimas décadas, sin embargo, dadas las particularidades manifestadas en los textos recogidos en el trabajo de revisión previo, han sido identificadas fuertes evidencias en Norteamérica y menos y muy diversas en Europa (Conn, Hafdahl, Cooper, Brown, y Lusk, 2009; Rongen, Robroek, van Lenthe, y Burdorf, 2013). Ante la evidencia de las diferencias culturales entre los dos continentes, parecían visibilizarse mayores aplicaciones al contexto internacional y no tanto a los territorios y realidades aplicadas en organizaciones. Asimismo, los diferentes estudios que han revisado la literatura coinciden repetidamente en la necesidad de continuar realizando intervenciones a propósito del objeto de estudio, precisamente para encontrar los parámetros idóneos para el desarrollo de estos programas en el futuro (Conn et al., 2009; Kuoppala, Lamminpää, y Husman, 2008; Rongen et al., 2013).

Los modelos de planificación de la promoción de la salud en el trabajo se han mostrado tan dispares como los estudios contemplados en la literatura. Incluso empresas de una misma zona geográfica diseñan internamente los suyos propios, estableciendo así una mayor complejidad en la tarea de analizar cada uno de los modelos existentes (Chu et al., 2000). Dichos modelos, a su vez, no han sido observados en los programas de

promoción en distintas revisiones, lo cual, establece una mayor complejidad para establecer una valoración objetiva sobre su aplicación en el entorno laboral.

El mismo caso lo encontramos con las variables dependientes. Solamente clasificar programas de promoción de la salud aplicados a múltiples contextos u ocupaciones ya podría constituir, en sí mismo, un trabajo de investigación independiente. Asimismo, encontrar las variables incidentes en los programas sobre cada medida específica asociada a cada trabajo u ocupación parecen indicar que las líneas de investigación tienden a una búsqueda de homogeneidad y propósitos específicos de análisis y experimentación (Conn et al., 2009; Jiménez, Barriopedro, y Martínez del Castillo, 2014).

La presente tesis doctoral pretende realizar una contribución al objeto de estudio de la organización de programas de la actividad física y salud en las empresas. A pesar de que los diseños científicos que la componen varían, en la intención del autor subyace la idea de mirar la posible contribución al objeto de estudio desde una perspectiva organizativa.

Inicialmente se desarrolla un extenso marco teórico sobre el estado de la cuestión de la promoción de la salud en el trabajo, con un marcado acento hacia la actividad física como variable incidente en la mejora de determinados indicadores comunes a todas las empresas. Partiendo de un contexto internacional, en el marco teórico se pretenden justificar, desde la génesis de estos programas hasta su implantación sistemática en un heterogéneo mapa de entidades y ocupaciones, la importancia de su puesta en marcha en las empresas europeas y sus complejas variables organizativas. Más adelante, se aborda la posible influencia de la actividad física sobre la prostatitis crónica (CP/CPPS).

Para llevar a cabo el trabajo empírico de la presente tesis doctoral, se conformaron tres estudios surgidos de la evolución de un problema de investigación general y que después se ha ido adaptando a los propios hallazgos del proceso investigador. El primer estudio es un trabajo de revisión sistemática que emplea las técnicas de metaanálisis con el fin de determinar, dada la variabilidad de los programas, los efectos y las diferencias culturales de las organizaciones en los diferentes contextos y territorios, las variables predominantes en Europa, con una doble intención: la primera, para identificar los instrumentos a emplear en futuras intervenciones y comprender dicha heterogeneidad; la segunda, con el fin de establecer posibles vías de actuación para diseñar los programas de intervención más eficaces en el futuro.

El segundo estudio aborda un diseño cuasiexperimental que desarrolla un trabajo de campo específico en una empresa de la Comunidad Valenciana. Con la intención de fundamentar la intervención y contextualizar la zona geográfica elegida, no exenta de sus elementos culturales, organizativos y sociales inherentes, en el documento se procuran cifras adecuadas la población española y, más concretamente, en dicha Comunidad Autónoma. Durante el mencionado trabajo de campo se llevó a cabo un experimento de 12 semanas de duración con dos grupos pre y post-test. Fueron medidas diferentes variables dependientes en función de su presencia en la literatura, pero también en función del vacío de conocimiento existente. La elección de algunas de ellas por parte del autor, sugieren su utilización en futuras intervenciones o, al menos, existe la intención de homogeneizar los instrumentos empleados para operativizarlas con el

fin de diseñar los programas de intervención en el futuro que arrojen mejores efectos sobre los parámetros medidos en las personas y las organizaciones.

El tercer estudio pretende realizar una contribución original a la incidencia de la actividad física sobre una enfermedad como la CP/CPPS, planteándose en sí misma como un tratamiento complementario. La literatura científica apenas ha resaltado la influencia de la actividad física sobre la CP/CPPS o sus síntomas relativos, manifestando sus síntomas también en el lugar de trabajo, si bien su tratamiento en la literatura como enfermedad laboral ha permanecido latente. En el lugar de trabajo se pueden observarse los síntomas derivados de tal enfermedad, sobre todo si es sedentario (Itza, Teba, Zarza, Salinas, y Gomes, 2014). Las limitaciones propias para la composición muestral dificultaron acceder a una muestra específica que reuniera dichas patologías, si bien, dado el marcado carácter incipiente de CP/CPPS como objeto de interés de los programas de promoción de la salud en el trabajo, se llevó a cabo una nueva revisión sistemática empleando las técnicas de metaanálisis para encontrar posibles efectos en las intervenciones de actividad física sobre CP/CPPS.

MARCO TEÓRICO Y FORMAL

2 MARCO TEÓRICO Y FORMAL

2.1 EL CONCEPTO DE TRABAJO Y EL LUGAR DE TRABAJO: CAMINO DE LA REINVENCIÓN

2.1.1 El trabajo: centralismo y definición

El trabajo, referido ampliamente en la literatura como actividad laboral, representa un eje central de la sociedad moderna e industrializada. A la trascendencia de su concepción, marcada ampliamente por las circunstancias políticas, económicas y sociales de los distintos momentos históricos de su evolución, se ha de resaltar, asimismo, un creciente interés científico ante la aparición hoy de realidades inéditas en torno a su concepto y aplicación (Anzalone, 2015). Rieznik señaló en su monográfico sobre la visión antropológica del concepto de trabajo que el protagonismo actual del mismo se lo debemos a las tremendas transformaciones acontecidas durante el citado periodo tradicional (Rieznik, 2001).

2.1.2 Fundamentos etimológicos y lingüísticos

Desde un punto de vista etimológico, el trabajo proviene de la locución latina *tripàliare*, que se refiere a los tres postes con los que se inmovilizaba a los esclavos que se negaban a cumplir las órdenes impuestas (Esser Díaz y Rojas Malpica, 2006; Esser Díaz, Vásquez Antúnez, Couto, y Rojas, 2007). El origen etimológico del término ha sido también abordado por otros autores clásicos (Stroobants, 2005). Por su parte, la filósofa humanista Hannah Arendt profundiza en dichos fundamentos sobre las palabras trabajo y labor u obra, descubriendo en el significado de la raíz semántica de sendas palabras la pena y la desgracia (Arendt, Cruz, y Novales, 1993). Dichas referencias coinciden con las propuestas por Blanch (Blanch, 2003) tal como reflejan otros autores (Holm-Detlev Köhler y Artiles, 2007).

Asimismo, siguiendo a Albornoz (1998), existían tres palabras identificadas con lo que hoy en día concebimos como trabajo: labor, con una connotación volcada con la naturaleza y la propia supervivencia; poesis, en relación al trabajo artístico que no implica una supervivencia; y praxis, en referencia a la palabra y la política en la antigua polis (Albornoz, 1998).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo como el “conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos” (OIT, 2013, p. 13). La definición oficial, sin embargo, no guarda relación con la de Borgatta y Montgomery, quienes señalaron la diferenciación entre el trabajo remunerado y el doméstico, aludiendo también que la mayoría de los estudios sociológicos se refieren a una concepción del término desde la producción de bienes y la economía (Borgatta y Montgomery, 2000). A este respecto, diversos autores aluden la excesiva atención de la sociología hacia el trabajo remunerado frente al doméstico (Castillo, 1999b).

2.1.3 Postulados teóricos tradicionales

2.1.3.1 El nacimiento de la sociología del trabajo y de las ocupaciones laborales

Desde un punto de vista histórico, la sociología aplicada al trabajo hace su primera incursión en el siglo XIX, momento en el cual el trabajo fue concebido científicamente por las ciencias sociales desde múltiples disciplinas del conocimiento (De la Garza Toledo, 2000). Es por ello por lo que conviene estudiar el concepto desde cada una de ellas con el fin de comprender ontológicamente su nacimiento, naturaleza y *statu quo*.

Partiendo de las ideas de Hegel, en el contexto de la liberalización de los medios de producción, y durante la Revolución Industrial, Marx y Engels fueron dos exponentes verdaderamente notables de la considerada tradición clásica, cuyos postulados se asociaron estrictamente a los medios de producción y al capital (Marx, 1972). A este respecto, el reputado historiador Perry Anderson refirió que Marx extendió su teoría social, si bien la conceptualización de trabajo, inherente en su obra, se ha visto mermada por condicionantes ideológicos de la escuela del Marxismo (Anderson, 1979) tal como fue referido, de igual modo, por otros investigadores como Noguera (Noguera, 1998, 2000, 2002). En esta dirección, Noguera (1998, 2002) sustenta un excelente recorrido teórico acerca de la transformación que, en la teoría social, ha sufrido el trabajo como concepto. Partiendo del precitado autor acerca del concepto de trabajo, los cimientos teóricos existentes en la literatura han abordado conceptualmente el trabajo alejado de la concepción inicial de Marx, donde no han permanecido exentas ciertas intenciones ideológicas que han incentivado su conceptualización distante de las tradiciones auténticas de Marx (Noguera, 1996). Fruto de los intereses científicos de la época, a principios de los años cuarenta la sociología del trabajo comenzó a dividirse en dos: la sociología de la gestión y la sociología de las ocupaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociología del trabajo se divide en dos subcampos, la sociología de las organizaciones y la sociología de las ocupaciones (Barley, 1996; Lounsbury y Kaghan, 2001). Fruto de las transformaciones iniciadas a finales de los años sesenta, hoy en día la discusión académica parece centrarse en la centralidad del trabajo y en las acciones colectivas (Rieznik, 2001). Si bien, desde finales del siglo XX parece constituirse la idea de una sociología del trabajo que necesita una reformulación. En este sentido, Castillo se refiere a la sociología del trabajo como una disciplina que necesita una transformación, en aras lograr un mayor empeño en que las investigaciones se centren sobre una realidad social que represente a la mayoría y no únicamente al trabajo remunerado (Castillo, 1999a).

2.1.3.2 Evolución del trabajo y el empleo

En sus orígenes el trabajo fue concebido de forma planificada en la Época Neolítica, que introdujo el cultivo sistemático en el campo. Asimismo, no existía una diferenciación marcada entre el trabajo y el ocio (Holm-Detlev Köhler y Artiles, 2007). A este respecto, mientras que los griegos lo concebían como un acto de servidumbre, los Caldeos no abordaban las divisiones que en torno a las ocupaciones propuso Aristóteles.

La evolución del trabajo fue conviviendo igualmente en distintos escenarios evolutivos, siendo considerado un fin religioso para los hebreos, quienes lo empleaban para divulgar sus ambiciones religiosas y dirimir así sus pecados. Por su parte, la contribución histórica

de los Romanos fue desarrollar jurídicamente algunas fórmulas en torno a los servicios. Tal es el caso que los esclavos pueden guardar relación con el concepto de *arrendamiento de personas* (Arendt, 2012). Por su parte, en los siglos XV y XVI el trabajo fue considerado como un arma basada en la libertad del hombre, el cual podría considerar cambiar su propio destino en función del trabajo. Así, algunos autores como Köhler y Artiles sostienen que dicha concepción germinó el Marxismo.

Asimismo, Weber ya fundamentó la necesidad de invertir los ingresos ante la condición moral del mismo, coincidiendo con la legitimidad asociada al mismo en el periodo de la Ilustración (Holm-Detlev Köhler y Artiles, 2007). Sin embargo, no fue hasta la Revolución Industrial cuando comenzamos a distinguir los conceptos de trabajo y empleo. En este sentido, la remuneración asociada al trabajo vino acompañada de una personificación del *trabajador libre*, determinado por intereses capitalistas y de producción (Jaccard y Hernández, 1971). En este sentido, la Revolución Industrial supuso un punto de inflexión hacia una nueva concepción del trabajo y las libertades (Elliot, 1972).

La primera y segunda Revolución Industrial, tuvieron lugar originariamente en Inglaterra a finales del siglo XVIII (y posteriormente en algunos países centroeuropeos) y en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX en un contexto laboral en el que existían grandes jornadas laborales sin descansos ni días libres (Hobsbawm, 2010; Hudson, 2014; Pietsch, 1963). Raymond Carr (2001) señaló que la situación económica, los problemas demográficos y las bajas cotas de productividad motivadas por un pobre desarrollo industrial fueron los principales factores del fracaso de la Revolución Industrial en España.

Ambas revoluciones tuvieron grandes efectos sociales y en el trabajo, pues permitieron pasar de la producción hecha a mano por los trabajadores, a la producción de la gran industria basada en la mecanización del trabajo aportada por las máquinas movidas a vapor, y dando un paso definitivo en el modo de producción capitalista (Marx, 1984). Además, propició cambios sustanciales en el modo de organización del trabajo y en los trabajadores, dando origen a los sistemas conocidos como el Taylorismo y el Fordismo, que se complementan y refuerzan mutuamente (Filinich, 2016; Fusi, 2013).

El Taylorismo supuso con respecto a etapas históricas anteriores, la ruptura y la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, entre quien piensa (y toma las grandes decisiones) y quien ejecuta, quien lleva a cabo lo previamente planificado por otros (Winslow Taylor y Palazón, 1973). El llamado Fordismo (Coriat, 1982) aportó a partir de Ford, una gran automatización de la producción, mediante las líneas de montaje y las máquinas, logrando producciones estandarizadas y masivas, y donde los trabajadores no tienen que comprender y dominar todo el proceso productivo (como cuando eran artesanos o producían a mano), sino solamente ocupar su puesto en la cadena y realizar repetitivamente durante largas jornadas aquellas tareas que todavía no eran capaces de realizar las máquinas.

Todos estos cambios en el modo de organizar y realizar el trabajo, con largas jornadas de trabajo, sin apenas descanso, sin cuidar las condiciones higiénicas del entorno laboral, tuvieron además grandes repercusiones en la salud de los trabajadores (gran

parte de ellos mujeres y niños) y en un considerable alza de las enfermedades laborales (Espuny, 2005).

Pues bien, recientes investigaciones apuntan a que estamos viviendo una nueva revolución en el trabajo similar a la producida por la primera y segunda Revolución Industrial (Leighton y Brown, 2013; Maitland y Thomson, 2014; Nyati, 2014; Susskind y Susskind, 2015; Thompson, 2018).

2.1.3.3 Perspectiva económica y social

Con el nacimiento de la teoría social, Grint, propuso una primera perspectiva sobre la cual abordar el trabajo (Grint, 2005). La Hermenéutica es la primera de las perspectivas, la cual postula al trabajo como una realidad natural que satisface a los hombres. Por su parte, existe una perspectiva objetivista, sobre la cual el trabajo transforma la realidad de forma inconsciente (De la Garza Toledo, 2000; Weber, 2014). Al respecto, el pensamiento económico de Marx se centró en una extensa fundamentación acerca del capital a propósito del trabajo del hombre (Marx, 1984, 2015).

Su principal contrapartida teórica la encontró en Habermas, defensor de las interacciones sociales en el trabajo (Habermas, Muñiz, y Cotarelo, 1981). Si bien, Noguera expone que Habermas, en consecuencia, se posiciona defensor de un concepto de trabajo alejado de lo estético-expresivo (Noguera, 1996, 2000, 2002).

2.1.3.4 Perspectiva filosófica y del pensamiento humanístico

En torno al abordaje del concepto de trabajo desde un punto de vista filosófico, de igual modo existe una abundante documentación. Sobre la dimensión actual del trabajo surgen distintos interrogantes a los que referirse. Al respecto, una publicación notoria en castellano es la que plantea Anzalone, quien en su artículo titulado *Elementos para una perspectiva del trabajo* aborda algunas de las problemáticas actuales, entendiendo el trabajo como un fenómeno social sobre el cual beneficiarse como colectivo, en un mundo repleto de individualidades (Anzalone, 2015).

En Europa, los filósofos Max Scheller y Felice Battaglia fueron los más relevantes en el campo. Scheller (1997) se refiere al trabajo como una concepción liberadora del ser humano capaz de lograr una autorrealización, si bien separado de la moral intrínseca al trabajo que, con la evolución de las ocupaciones profesionales, se separó de la pureza de los fines relacionados con la propia actividad laboral. Asimismo, Battaglia (1950, 1951) supo diagnosticar con sumo rigor las carencias y problemáticas que el trabajo contuvo en la época, gracias a su obra *Filosofía del Lavoro* (Battaglia, 1950, 1951; Scheller, 1997). Otros autores, como Anzalone, refrendan estas posturas (Anzalone, 2015).

La concepción filosófica de Marx, contraria a los principios Hegelianos, fundamentaron lo que después se conoció como Materialismo Histórico, fruto de un pormenorizado análisis de la estructura económica y social de la época. Someramente, la filosofía de Marx se tradujo en que el hombre es libre y dueño de su propio sustento (Battaglia, 1950, 1951). Sin duda las contribuciones de Marx y Engels fueron mayúsculas en torno a la realización del hombre y el trabajo, sin embargo, diversos autores sostienen que sus principales fundamentos se refieren estrictamente a la política y a la economía, y que,

por tanto, el concepto de trabajo no es lo suficientemente estudiado en el plano ético y moral (Julia, 1982).

Nuevamente conviene referenciar la contribución de Castillo (Castillo, 1999a, 1999b) y la necesidad de reformular el interés hacia una nueva sociología del trabajo. En relación con su reformulación, todo parece indicar que las contribuciones históricas del Marxismo, entendido más en relación por la figura de Marx que por su escuela, han despertado un mayor interés dada la impactante trascendencia de la economía y su estructura en la actualidad actual.

Dadas las connotaciones liberalizadoras del trabajo, sujetas en las principales obras de los clásicos del pensamiento económico y filosófico en torno al trabajo (Battaglia, 1950; Castillo, 1999a; Habermas et al., 1981; Habermas, Redondo, y Garrido, 1984; Marx, 1984; Weber, 2009), la concepción del mismo como juego como bien inherente al mismo o su propia separación, fueron igualmente señalados. Este elemento, dado el campo que nos ocupa, adopta una especial relevancia para comprender las raíces humanas y filosóficas que, en una época relativamente reciente, en plena evolución del trabajo y de las ocupaciones, quedó conformado como un reseñable campo de investigación. Dichos pensamientos han conformado una base muy sólida a la hora de analizar el concepto de trabajo.

Sin embargo, otros autores han hecho alusión a la concepción del trabajo como esfuerzo (Anzalone, 2015). En esta dirección, el trabajo no se conforma como un escenario placentero, sino un esfuerzo con un componente peyorativo que implica obligación. Adriano Thigler se refirió a que el trabajo, aun siendo libre y voluntario, conlleva un agotamiento, mientras que el juego implica descanso (Tilgher, 1931). Si bien, Anzalone apunta que quedar mermado de actividad, a la vez, implicaría un sufrimiento (Anzalone, 2015).

Por su parte, Huizinga, en la clásica obra *Homo ludens* (publicada por primera vez en alemán, en Suiza, en 1944, fue la primera contribución formal que explicaba desde un punto de vista sociológico el juego y lo que implicaba en la sociedad) ya se refirió al juego como una forma de decorar las manifestaciones humanas. Así, Huizinga señala que el juego está presente en toda actividad humana, de un modo o de otro (Huizinga, 2012). En castellano, cabe destacar en la obra titulada *El origen deportivo del Estado*, de Ortega y Gasset (Ortega y Gasset, 1966). Dicha obra ha sido igualmente recogida por otros autores reconocidos como Anzalone o Cagigal (Anzalone, 2015; Cagigal, 1975). En dicha obra, Ortega y Gasset afirma que las formas de organización de la política tienen un origen deportivo, empleando el juego y el trabajo entendidos desde un fin en sí mismo. La relación entre el juego y el trabajo propuesta por el filósofo español coincidió con el análisis propuesto por Rensi, quien se refirió al juego como una actividad con un fin en sí mismo, sin embargo, alude, el trabajo posee unas motivaciones extrínsecas que el juego no preserva inherente a su razón de ser (Rensi, 1923). No obstante, autores como Battaglia (1951) y más recientemente Anzalone (2015), rechazan sendas posturas filosóficas, al entender el juego también con un fin externo, en lo que Battaglia denominó “el trabajo del juego” (Anzalone, 2015; Battaglia, 1951, pp. 173-175).

2.1.3.5 Perspectiva antropológica

Desde la ciencia de la antropología, entendiendo su objeto de estudio al ser humano y su propia condición, Freyssenet se refiere a que el trabajo no guarda una relación explícita con la propia condición humana. Rieznik, después, acuñó igualmente dicha concepción. En relación con el postulado anterior, Bidet señala la importancia del trabajo para explicar la concreción del hombre, Braverman coincide con Marx en tanto el ser humano, desde sus intenciones de supervivencia, se relaciona con la naturaleza de la que emana (Bidet, 1995; Braverman, 1978; Freyssenet, 1995; Marx, 1984, 2015; Rieznik, 2001). Dicha concepción, que fue señalada por Rieznik, marca una conceptualización moderna del trabajo, entendida como una excelente fundamentación de la relación del citado concepto con el ser humano. Sin embargo, el autor alerta sobre la necesidad de no confundir el tamaño de cerebro con las condiciones para trabajar del hombre (Rieznik, 2001).

La antropología ha creído durante muchos años dicha postura, si bien, paradójicamente, Stephen Jay en su contribución titulada *La postura hizo al hombre*, se refirió a que el tamaño del cerebro guarda una relación con el momento evolutivo en el cual el hombre se puso de pie (Gould, 1996). Hemos aquí una relación fundamental de la antropología con el trabajo, guardando una relación estrecha con la evolución física del hombre a la hora de ser considerado el trabajo un objeto de estudio de orden antropológico.

2.1.3.6 Enfoques y contribuciones conceptuales adicionales

Según Noguera (Noguera, 1996, 2000, 2002) el concepto de trabajo ha sido abordado ampliamente en la literatura científica, si bien desde la teoría social únicamente han sobresalido los análisis sobre las libertades humanas. Al respecto, señala, existen cuatro líneas teóricas que abordan la discusión del concepto de trabajo. Aunque la realización de un análisis exhaustivo de las mismas se aleja del objeto del presente trabajo de investigación, intencionadamente se presentan los rasgos diferenciales más sustanciales de las cuatro corrientes con la mera intención de estudiar el estado de la cuestión en torno al concepto del trabajo. Para ello se ha propuesto un método de investigación teórica, de método hermenéutico y crítico, a través de técnicas de revisión y análisis bibliográfico-documental.

En primer lugar, el enfoque valorización frente al desprecio en el trabajo, que plantea una dignificación de este o si por el contrario es una actividad con una clara connotación negativa o infame. En segundo lugar, podemos referirnos al concepto amplio o reducido del trabajo, siendo el primero una actividad contemplada con un fin en sí mismo, llegando a contemplar la autorrealización (Noguera, 2000, 2002).

En tercer lugar y siguiendo nuevamente a Noguera (2000, 2002), cuando hacemos referencia a un concepto más estrecho o reducido, el trabajo es considerado con un fin puramente instrumental, del cual no es posible extraer una autorrealización, más allá que la recompensa extrínseca en forma de dinero, bienes u otras formas de compensación. En cuarto lugar, existe otro enfoque basado en la teoría social del trabajo que enfrenta el productivismo frente al no productivismo. Si bien el concepto de productivismo adopta formas muy diversas, cabe destacar la utilización del trabajo

como un elemento impulsor de un fin económico, siendo referido en la vertiente contraria al productivismo cuando no persigue dichos fines (Noguera, 1998, 2000).

Por último, la centralidad del trabajo constituye otro eje fundamental digno de análisis. No haremos aquí un análisis profundo de las posturas teóricas en la que podríamos referenciar la centralidad del trabajo. Nuestro análisis no tiene otra intención que constatar en líneas generales los postulados teóricos y empíricos tradicionales con el fin de ilustrar la extendida visión amplia del concepto de trabajo, frente a una visión más reducida, inamovible y centralizada del mismo. En este sentido podemos referirnos a dicha centralidad cuando el ser humano realiza el trabajo como eje nuclear hacia el alcance del bienestar en su vida, entendido este por y para la obtención de beneficios económicos, estatus social y la dignificación de la persona.

Con el propósito de conducirnos a una mejor comprensión de las distintas posturas teóricas y de acuerdo con las contribuciones de Noguera (2002), es posible distinguir el pensamiento de los distintos autores recogidos en la literatura, en función de una concepción que asume una centralidad del trabajo, frente a la que no. Asimismo, el trabajo, en su concepto amplio o reducido, puede entenderse desde un enfoque productivista o no productivista. Los conceptos de trabajo señalados en el pensamiento social han sido recogidos por diferentes autores en función de su concepción, y se pueden observar recogidos en la Tabla 1 (Noguera, 2002, p. 149).

Tabla 1. Conceptos de trabajo desde la teoría social

Concepciones que abordan el trabajo	Concepto reducido		Concepto amplio	
	Productivista	No productivista	Productivista	No productivista
Asumen la centralidad normativa del trabajo	Adam Smith y economistas burgueses	“Primer” Gorz	Hegel	J. Elster
	Ética protestante y “ética” del trabajo burguesa		S. Brzozowski	W. Morris
	K. Kautsky		Ideología de la “alegría en el trabajo”	J. Ruskin
	A. Gramsci		E. Jünger	Ch. Fourier
	L. Althusser		Nacional-socialismo	T. Carlyle
	Marxismo soviético			L. Tolstoi
No asumen la centralidad normativa del trabajo	F. Engels	Griegos antiguos		K. Marx
		F. Nietzsche		T.W. Adorno
		P. Lafargue		“Primer” Marcuse
		F. Lukács		C. Castoriadis
		H. Arendt		A. Heller
		J. Habermas		G. Markus
		“último” Gorz		Van Parijs
		Marcuse “maduro”		Feminismo marxista

Nota. Adaptado de “El concepto de trabajo y la teoría social crítica”, de Noguera, J.A., 2002, *Papers: revista de sociología*, 68, p. 149.

Tal como ha sido señalado, el concepto de trabajo convive ampliamente con posturas amplias y reducidas. La literatura existente establece a menudo postulados complejos de definir sujetos a la visión crítica de los teóricos, que a su vez someten la innata complejidad del concepto a una constante revisión y actualización. Podemos extraer de determinadas posturas ideológicas cierta predilección sostenida en la visión tecnológica y centralizada sobre el futuro del trabajo, si bien entendiendo el concepto en un sentido más amplio, tal y como contemplan las clásicas y las más recientes discusiones teóricas (Anthony, 2014; Applebaum, 1992; Habermas et al., 1984; Marx, 1984; Noguera, 1996, 2000), posiblemente el concepto deba dirigirse en torno a una dimensión social, de autorrealización y no gobernada por los aspectos meramente económicos, distantes a menudo de toda compensación y realización humana (Noguera, 1996, 2000).

Si bien en la actualidad podríamos defender un concepto reducido productivista, desde un punto de vista teórico la propuesta que se desarrolla en el presente trabajo de investigación puede guardar relación con la idea de la autorrealización activa que supone el esfuerzo, sin embargo, conviene analizarlo en el contexto social y político en el que nos encontramos actualmente.

Por un lado, la evolución del trabajo, entendido como ocupación, ha dado lugar a nuevas y diversas actividades profesionales que en sí mismas confrontaban con la sociedad de la época analizada en los clásicos. Elementos como el ritmo de vida frenético, la consolidación del pluriempleo y la marcada centralización del trabajo, han facilitado la aparición de distintos fenómenos sociales que contribuyen a un estilo de vida negativo. Si bien, tal y como advierten Gorz o Habermas, parece inviable alcanzar la cota de bienestar y autorrealización ante la alienación (Gorz, 1997; Habermas et al., 1981; Habermas et al., 1984) citado en (Noguera, 1996, 2000).

Este conjunto de fenómenos sociales, entendidos como una forma de alienación contemporánea, bien podrían ser una respuesta lógica que avive un estilo de vida sedentario, una pérdida en la productividad laboral y la aparición, en consecuencia, de las ya denominadas enfermedades del siglo XXI (Bauer, Briss, Goodman, y Bowman, 2014; Bosch, Alfonso, y Bermejo, 2002; Gubler, 2002; Peltola, 2000). Asimismo, las pérdidas en la productividad parecen justificar una mayor incidencia de la ansiedad y una merma en la satisfacción laboral, traducidas en una posible baja laboral que, por regla general, supone un impacto económico para las personas y las organizaciones. Los factores que determinan estas relaciones se encuentran inducidos por los diferentes sociotipos basados en género, raza y contexto laboral (Perrucci y Banerjee, 2010).

2.1.4 El concepto amplio de trabajo como punto de partida

Dicho lo cual, siguiendo las contribuciones de Noguera, parece que la recuperación de una visión filohedonista y esteticista, en una vertiente moderada, aunque muy coincidente con Lafargue (1880) o Marcuse (1955), podría escenificar muy bien el concepto actual del trabajo en beneficio de la autorrealización de las personas y su bienestar (Lafargue, 1991; Marcuse, 1933) tal como han sostenido otros autores más recientemente (Noguera, 1996, 2000).

Si bien el enfoque productivista del trabajo se encuentra presente en la sociedad actual, esta concepción parece coexistir con la de un concepto amplio del trabajo, estético y hedonista, que busca alcanzar rentabilidades económicas en las organizaciones a través del bienestar de los empleados.

Otros autores señalan la importancia de concebir ampliamente la actividad laboral para estudiar todo modelo de empleo de carácter nacional, diferenciando, a su vez, el trabajo mercantil del doméstico (Recio y Banyuls, 2011). Con todo ello, en el marco del objeto de estudio que nos ocupa, el trabajo como concepto parece alejarse hoy de otro supuesto teórico que no se refiera al particular desde su concepto amplio. En esta dirección, de acuerdo con las observaciones de Noguera (1996, 2000) existe un dilatado fundamento para sostener el concepto amplio del trabajo como punto de partida hacia la organización contemporánea del trabajo, su propia centralidad y el crecimiento social (Noguera, 1996, 2000).

2.2 LUGAR DE TRABAJO: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS, TIPOS Y EVOLUCIÓN

2.2.1 Definición y tipología desde la organización del trabajo

Pese a los factores en común existentes, las definiciones sobre lugar de trabajo o centro de trabajo son amplias y diversas. Asimismo, parecen coexistir en una ambivalencia terminológica que conduce, finalmente, a una comprensión basada en la experiencia práctica y en la propia intuición. A pesar de ello, la diferencia terminológica propuesta por Franco Idárraga parece clarificadora, en tanto alude al centro de trabajo o empresa, entendida como organización, en tanto se constituye como un elemento nuclear de las relaciones laborales e interpersonales, siendo a su vez el lugar donde se le ha de conceder una importancia notoria a la salud de los trabajadores y a su seguridad. De igual modo, señala que el centro de trabajo debe impulsar en una medida muy superior las condiciones de trabajo y las propias medidas de seguridad, higiene y promoción de la salud y su prevención. En este sentido, en el ámbito organizativo podemos destacar diferentes tipos de organizaciones (Franco Idárraga, 1997).

A pesar de las similitudes que pueden extraerse de la empresa y del centro de trabajo, lo cierto es que la legislación vigente anuda muy bien la noción jurídica del término a fin de ser utilizado debidamente a efectos de derecho laboral, seguridad en el trabajo, prevención de riesgos, retribuciones y aspectos fiscales. Dichos factores ayudan de una forma más consistente a abordar legalmente la definición y a clarificar su utilización legal en función de las distintas situaciones en las que se precise emplear el concepto en términos legales.

Qué duda cabe pues que el centro de trabajo supone un eje neurálgico de cualquier empresa donde una persona o conjunto de personas realizan las actividades propias de la organización. La naturaleza de las funciones a desempeñar y las propias actividades de la empresa muestran, a su vez, una naturaleza organizativa con la que el centro ha de procurar dar una respuesta. Con vistas al citado concepto, el lugar de trabajo parece más referido a un espacio o área del centro de trabajo, considerado como emplazamiento, sitio, zona o punto, sobre el cual se asientan los centros de trabajo.

No obstante, la controversia terminológica vuelve a aparecer cuando la integración del concepto se contempla a la inversa, es decir, relacionado más con el puesto de trabajo y dentro del propio centro de trabajo. Sin embargo, ante la discusión teórica existente, finalmente los centros de trabajo se ajustan a las disposiciones normativas existentes en el territorio. Así pues, dadas las connotaciones legales inherentes en el término, la empleabilidad universal en el ámbito de actuación enmarcado en el presente trabajo de investigación, parece muy interesante utilizar el término jurídico-legal, que se definió en el Estatuto de los Trabajadores como “la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la Autoridad Laboral” (R.D. 1/1995, de 24 de marzo, 1995 y R.D. 2/2015, de 23 de octubre, p. 10). Dicho lo cual, un centro de trabajo en España únicamente podría ser constituido formalmente si, además de reunir los condicionantes físicos y productivos mencionados, también es reconocido como tal por la autoridad legal competente. Por otro lado, conviene hacer una distinción entre lugar de trabajo y puesto de trabajo, siendo los lugares de trabajo aquellos que albergan los puestos de trabajo.

La Ergonomía, definida por la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) como el “Conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona” (*International Ergonomics Association* [IEA], 2013), es la disciplina que más ampliamente ha estudiado sendos conceptos. Si bien no es objeto de la presente investigación realizar un análisis epistemológico del objeto de estudio de la Ergonomía, sirva su alusión para clarificar el posicionamiento que, en torno a los conceptos que nos ocupan, han sido contemplados internacionalmente y que pueden verse clarificados en otras obras internacionales (Carayon y Smith, 2000; Maestre, 2007).

En la dirección de continuar examinando terminológicamente los conceptos introducidos, el puesto de trabajo y el sistema de trabajo son, asimismo, dos conceptos ampliamente referidos en la literatura. Relativos a la obtención de unas condiciones óptimas de rendimiento, salud y productividad, los puestos de trabajo representan un elemento de capital importancia para los centros de trabajo, constituyéndose a sí mismos como la principal unidad de relación entre los trabajadores y las empresas (Franco Idárraga, 1997).

Al respecto, Maestre hace referencia al sistema de trabajo en torno a la coexistencia de un conjunto de elementos dispuestos de forma organizada en el lugar de trabajo. En esta dirección, diferencia entre equipo de trabajo y espacio de trabajo, siendo el primero de ellos el conjunto de herramientas necesarias para realizar las tareas propias de la actividad laboral; el segundo de ellos por su parte, referido al volumen de trabajo propio de dichas tareas. Siguiendo al autor, el puesto de trabajo alude a la disposición ya de los equipos y su distribución en el espacio y que este, a su vez, convive con el ambiente de trabajo (Maestre, 2007).

Por su parte, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, en España el puesto de trabajo bien puede hacer referencia tanto al espacio de trabajo como a las funciones propias de la actividad. Por su parte, parece existir un consenso en que los lugares de trabajo se encaminan a englobar los puestos de trabajo. En este sentido, son muy esclarecedoras las definiciones recogidas en el R.D. 486/1997, de 14 de abril sobre

las instalaciones y espacios asociados al puesto de trabajo (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 1997).

Considerando que la alusión a los lugares de trabajo viene aplicándose con soltura en distintos foros, concretamente en España el concepto que ha sido acuñado en términos legales ha sido el de centro de trabajo. La legislación vigente en nuestro país anuda muy bien la concepción jurídica del término a efectos de derecho laboral, seguridad, retribuciones y aspectos fiscales. Dichos factores contribuyen a abordar legalmente la definición y a clarificar su utilización legal (Montoya-Melger, 2006).

A la citada definición del Estatuto de los Trabajadores, conviene añadir la que propone en España el artículo 2.2. del R.D. 486/1997, que define lugar de trabajo como las “áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo” (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 1997, p. 2). Asimismo, incluyen: “servicios higiénicos y locales de descanso locales de primeros auxilios y comedores”, (...). Instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares” (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 1997, p. 2).

Dicho lo cual, un centro de trabajo en España únicamente podría ser constituido formalmente si, además de reunir los condicionantes físicos y productivos mencionados, también es reconocido como tal por la autoridad legal competente. Asimismo, los centros de trabajo pueden ser a su vez fijos o itinerantes (Pérez Bernat, 2014). Otros autores proponen una clasificación en función del tipo de trabajo desempeñado. En este sentido, la clasificación de estos depende estrechamente de la naturaleza de la actividad laboral a desempeñar o del propio puesto de trabajo. Desde un punto de vista normativo y considerando el precitado R.D., la norma regula los lugares de trabajo de nueva implantación o aquellos que se han estrenado antes del 23 de julio de 1997 o después de la citada fecha (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 1997).

Dentro de la clasificación referida, podemos destacar, en primer lugar, los equipamientos o espacios cuya razón de ser reside en la propia actividad laboral (lugar de trabajo y puesto de trabajo) así como otros equipamientos complementarios (salas de calderas, salas de máquinas, salas de electricidad, etc.) o auxiliares (vestuarios o una cafetería, por ejemplo), que en segundo lugar completarían lo que conocemos como instalación. Existen a su vez distintos tipos de centros de trabajo en oficina que los distintos autores han referido, principalmente, en función de la Normativa vigente o viceversa (Andersson Schaeffer, 2014; Hua, Loftness, Kraut, y Powell, 2010; Joroff, Porter, Feinberg, y Kukla, 2003). Si bien la clasificación se ajusta muy bien a una realidad legal socialmente construida, en los últimos años estamos inmersos en un proceso de transformación radical en lo que a la organización del trabajo se refiere. En este sentido, atendiendo a las propiedades básicas del propio lugar de trabajo y en función de la naturaleza de la propia actividad laboral, podemos destacar los siguientes lugares de trabajo en oficina (Tabla 2).

Tabla 2. Clasificación y características básicas de los puestos de trabajo en oficina

Clasificación	Características básicas	Referencias
Estándar o tradicional	Oficinas que establecen puestos de trabajo unitarios con equipos informatizados, a veces divididos por paneles	(Dourish, 2006)
<i>Coworking u open space</i>	Espacios abiertos con un diseño funcional que permite la relación horizontal con los miembros de la organización	(Gandini, 2015)
<i>Coliving</i>	Espacios establecidos como vivienda y lugar de trabajo en los cuales se establecen entornos colaborativos y de convivencia social y laboral en un mismo domicilio con otros inquilinos	(Davies, 2015)

Nota. Fuente: Elaboración propia (2018).

Partiendo de las contribuciones de Mintzberg a las estructuras organizativas y la teoría contingente para explicar el diseño organizativo basado en diseños adhocráticos (Mintzberg, 1979; Reimann, 1974), desde un enfoque tradicional, se han empezado a observar determinadas tendencias en las oficinas del futuro (Dourish, 2006), que han evolucionado a conceptos basados en el *coworking* o en espacios abiertos, hasta el propio domicilio. A este respecto, se han encontrado evidencias que fortalecen la idea de la flexibilidad laboral, si bien, parecen sentarse paradojas que dependen del contexto social, organizativo y cultural de las empresas, que se encuentra enmascarado en el sistema productivo actual. En consecuencia, el lugar de trabajo sigue siendo hoy muy recurrente para gran parte de la población (Gouliquer, 2000). En este sentido, dicha flexibilidad parece venir acompañada de una satisfacción de los empleados en lugares de trabajo flexibles, si bien, en consonancia con las observaciones de Goulinquer, parecen existir controversias en las opiniones entre trabajadores europeos (van der Voordt, 2004).

No es objeto de la presente tesis doctoral abordar un análisis sociológico sobre las estructuras organizativas inherentes al trabajo, si bien, antes de acometer con mayor especificidad los capítulos posteriores, conviene realizar una síntesis descriptiva de la organización del trabajo y de las ocupaciones. La organización del trabajo hace referencia de forma global al conjunto a la combinación eficaz de los recursos y estructuras que le son propias al trabajo, así pues, a continuación, nos referimos a la jornada laboral y a los regímenes laborales.

Parece lógico pensar que la clasificación de estos depende estrechamente de la naturaleza de la actividad laboral a desempeñar y de la propia empresa. Así, resulta oportuno referirse a la siguiente clasificación de los puestos de trabajo en función de los siguientes elementos sugeridos en la literatura (Fernández-Ríos, 1995; Promonet, 2018).

- El nivel de mecanización
- El número de empleados
- La cantidad de equipos del puesto de trabajo
- El nivel de especialización
- El desempeño de la movilidad

No obstante, es el trabajo en oficina y su estructura funcional el que ocupa el foco central de nuestra investigación.

2.2.2 Análisis y descripción de la estructura funcional del puesto de trabajo

Los estudios seminales de la organización de los puestos de trabajo se remontan a la era preindustrial, momento sobre el cual se planteó la necesidad de estudiar la estructuración del trabajo desde un enfoque científico. Desde entonces, numerosos autores sostienen la idea de realizar análisis sistemáticos y multidisciplinarios con el fin de dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno laboral y organizacional.

Siguiendo las contribuciones de Peretti, realizar una estructuración funcional del puesto de trabajo supone adentrarse en un proceso que permite conocer la utilidad del trabajo y reflejar sus componentes (materiales, organizacionales, ambientales) (Peretti, 1987). En la misma línea se encuentran autores como Carrel, Elbert y Hatfield (1995) o Dessler (1999) que se refieren a dicho análisis como un proceso en el que la dirección ha de observar sistemáticamente las tareas y las responsabilidades de los puestos dentro de una entidad (Carrel, Elbert, y Hatfield, 1995; Dessler, 1999).

La comunidad científica sostiene la importancia de definir muy bien el puesto de trabajo ante las actividades posteriores a desarrollar. Por su parte, entendiendo dicha estructura funcional como un proceso capaz de clasificar los puestos de trabajo, en sí mismo constituye la columna vertebral de la dirección y organización de los recursos humanos de cualquier compañía (Fernández-Ríos, 1995, 1999).

Si bien los distintos elementos de la estructura funcional pueden consultarse ampliamente en las obras seminales de Fernández-Ríos, en relación con la investigación que nos ocupa, resulta especialmente relevante dirigirnos a describir y analizar las ocupaciones laborales. Las contribuciones del citado autor en la teoría de las organizaciones supusieron un escenario clarificador a la hora de conceptualizar y desarrollar sistemáticamente un análisis de los términos asociados a la actividad laboral (Fernández-Ríos, 1995, 1999).

En torno a las ocupaciones laborales el trabajo clásico de Berger titulado *The human shape to work* (Berger, 1964), ya se refirió a las ocupaciones laborales determinando una primera clasificación. El libro señala cinco tipos de ocupaciones diferentes y aborda el problema del trabajo del momento. Las ocupaciones mostradas se centran en la construcción, porteros, ingenieros, técnicos, publicistas y hombres de negocios. No obstante, las características mostradas únicamente presentan un esquema subyacente amplio y todavía desordenado.

Las ocupaciones laborales se relacionan explícitamente con una actividad profesional, considerándola una profesión en el momento en que existe una regulación al respecto; es decir, todas aquellas ocupaciones no reguladas ni reservadas desde unas atribuciones laborales propias, no serían consideradas una profesión (Fernández-Ríos, 1995, 1999; R.D. 1837/2008, de 8 de noviembre, 2008). Otros autores pensadores de nuestro presente, como la videoartista y ensayista Hito Steyerl, han reflexionado en su ámbito sobre la precariedad que sugiere el término ocupación frente al de profesión, en tanto el primero se refiere a un trabajo no remunerado, sustentando que las personas

desarrollan unas tareas determinadas sin que se les compense económicamente por ello en beneficio del sistema y las empresas (Steyerl, 2017). Estas ideas igualmente han estado muy respaldadas por Nick Srnicek en su libro *Capitalismo de plataformas* editado en castellano por la editorial argentina Caja Negra, y en el que reflexiona sobre los nuevos modelos productivos y los atributos ocultos de la nueva organización del trabajo y la precarización en beneficio del capital de las grandes empresas (Srnicek, 2018). A pesar de que la teoría de la organización haya puesto el foco en las estructuras directivas de las organizaciones y las ocupaciones laborales por separado, recientes investigaciones señalan que ambas pueden coexistir dando forma a nuevas organizaciones sociales del trabajo y de las ocupaciones (Lounsbury y Kaghan, 2001).

2.2.3 Definición y tipos de organizaciones

En vista de la interrelación de los conceptos, en la aplicación, organizaciones y empresas pueden ser consideradas desde una misma unidad terminológica, si lo que queremos es hacer referencia al término organización como entidad o institución. En este sentido, existen una serie de características que les son propias a las empresas. Robbins, Coulter, Staines y Hernández refieren organización como un acuerdo de personas para alcanzar un fin determinado, para lo cual entienden necesaria la existencia de una estructura y personas que la compongan (Robbins, Coulter, Staines, y Hernández, 1996). Así, las distintas concepciones teóricas de las organizaciones coinciden plenamente en la importancia de las personas como el agente con mayor trascendencia en las mismas (Eraut, 2007; Hua, 2007; Maestre, 2007; Maier, 2009; Rich, Bateman, Esain, Massey, y Samuel, 2006).

No obstante, las organizaciones pueden clasificarse en función de su forma jurídica e intereses mercantiles; asimismo, podemos identificar microempresas, pequeñas, medianas y grandes organizaciones, con o sin ánimo de lucro, de titularidad pública o privada, según su sector de actividad y ámbito geográfico (Aguirre, Tous, y Castillo, 1999). Al respecto, podemos considerar la empresa como la unidad de relación fundamental entre las personas y los agentes externos de la organización; además categorizan dichas relaciones en función de los aspectos ambientales (Ritsila, 1999).

2.2.4 Propiedades de los puestos de trabajo de oficina

Por las propiedades inherentes al puesto de trabajo y la propia ocupación, los puestos de trabajo pueden desempeñarse siguiendo un esfuerzo físico o bien poseer connotaciones hacia el trabajo sedentario. Asimismo, como veremos más adelante, para unas y otras existen una serie de aspectos a considerar, con sus riesgos asociados (Díaz, 2009).

Los puestos de trabajo en oficina están acompañados de un aumento en los riesgos vinculados al estrés y los trastornos musculoesqueléticos, si bien, aquellos aspectos ergonómicos que permitan diseñar adecuadamente los puestos de trabajo serán claves en el desempeño posterior de las personas y las organizaciones (Guillén Fonseca, 2006; Hackman, 1980; Hansen, 1993; Haynes, 2007; Leadon, 2015).

2.2.5 Relación existente entre los tipos de organizaciones y los lugares de trabajo

El diseño de lugares de trabajo atractivos para los fines de la organización hace tiempo que dejó de ser un objeto pendiente en los foros científicos de discusión (Levin, 2005; Méndez, 1995; Misuraca, 2013). Investigaciones recientes apuntan que los lugares de trabajo guardan una estrecha relación con el tipo y la cultura de las organizaciones (Chapman, Jones, y Gray, 2015; Clements-Croome, 2006).

Asimismo, los procesos de transformación de las empresas, con la finalidad de hacerse más competitivas, precisan continuamente atender a una evolución constante y adaptativa del entorno y los recursos (Pulakos, Arad, Donovan, y Plamondon, 2000).

2.2.6 Población activa: Jornada y régimen laborales

Desde un punto de vista de la investigación social, la población activa es aquella que se encuentra legalmente reconocida en uno de los regímenes laborales vigentes y en edad de trabajar (entre los 16 y los 64 años) (Sáinz, 1993). Si bien, la edad de jubilación puede verse modificada a tenor de las políticas del momento. Por su parte, las ocupaciones laborales requieren de una organización horaria que permita ejecutar debidamente las acciones propias del puesto de trabajo. La jornada laboral es concebida etimológicamente por “día” (Cabanellas, 1974) y como tal, la jornada de trabajo es el tiempo que dedica una persona a su trabajo a lo largo de un día. Desde sus orígenes, el trabajador ha tenido que dedicar sus esfuerzos durante dicha jornada en beneficio de la entidad contratista.

Al respecto, el derecho del trabajo es la disciplina encargada de su estudio y organización. Asimismo, los consensos existentes en medicina del trabajo señalan la necesidad de organizar la duración de la jornada de trabajo de una forma apropiada, sin excesos, para preservar la salud de los empleados, así como para garantizar un rendimiento y productividad óptimos (Haro-García, Sánchez-Román, Juárez-Pérez, y Larios-Díaz, 2007). La concepción jurídica por la cual existe una relación de trabajo entre el empleado y la empresa, por su parte, viene determinada por el régimen laboral, que queda dividido en dos posibles opciones: trabajo por cuenta propia (autónomos o empresarios) o por cuenta ajena (en condición de asalariado).

2.2.7 Retrospectiva y evolución

El ser humano cambia constantemente su relación con el entorno y su forma de comprender la realidad laboral y el ritmo de aceleración y adaptación a dicho proceso ha sido muy reseñable en las últimas décadas (Antunes, 1999; Becker, 1970; Casey, 2013). Desde un punto de vista organizacional del trabajo, han surgido nuevas formas de comunicación y de organización, nuevas funciones en las compañías, nuevos modelos de negocio y de desarrollo del talento que han irrumpido de forma silenciosa en los avatares de la organización del trabajo tradicional (Castillo, 2007; Clements-Croome, 2006; Eraut, 2007; Harden y Lynn, 2006). A su vez, la Normativa existente ha ido componiendo sus formas y estructuras legales no solo a las voluntades y estrategias políticas, sino también de forma muy significativa a las demandas sociales y empresariales acaecidas en Europa y, más concretamente, en España.

Fruto del proceso de transformación social y laboral que estamos viviendo en las últimas décadas, los seres humanos han tratado de encontrar alternativas a la realidad de su entorno (Chapman et al., 2015; Díaz-Foncea y Marcuello, 2014; Dumazedier, 2000; Fabbri, 2015; Susskind y Susskind, 2015; Todaro y Yáñez, 2004), lo cual explica muy bien que los centros de trabajo vienen influidos claramente por la propia naturaleza de la actividad laboral a desarrollar y sus necesidades (Hua, Loftness, Heerwagen, y Powell, 2011; Hua et al., 2010).

De igual modo, en los últimos años hemos asistido a una evolución social que se ha visto igualmente traducida, especialmente en Europa, a una concepción del centro de trabajo que ha introducido conceptos novedosos y que, desde una perspectiva social y legislativa, todavía se muestran incipientes en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE). Algunos de estos términos son *freelance*, *coworking*, *open spaces* y, en castellano, palabras o expresiones como los *neoficios*, que guardan un componente colaborativo fuerte y que contemplan profesiones hasta hace poco tiempo inexistentes, como *youtuber*, *copywriter*, *networker* o *trafficker*, que, sin duda, forman parte de este nuevo paradigma ocupacional existente en el mercado de trabajo, ajeno a compromisos de largo plazo con las estructuras tradicionales de las organizaciones, entendiéndolas ajenas al presente y futuro inmediato del trabajo que se extiende en la práctica desde su concepto amplio (Noguera, 1996, 2000) y volcadas a las sociedades digitales, en sectores muy específicos de la población y con un perfil muy orientado a los nuevos contextos del trabajo contemporáneo (Delgado, 2018). También, han aparecido términos como el de oficinas activas que, más allá de representar un fin en sí mismas, parecen explicar muy bien la realidad de un buen número de profesionales (Hua, 2007; Méndez, 1995; Wynn, 2015). Sobre el particular, Fabbri señaló que estos incipientes escenarios se ajustan a una nueva realidad social y laboral sin precedentes (Fabbri, 2015).

Dichos elementos distintivos de la nueva realidad en la organización del trabajo parecen haber aterrizado en el mercado, fundamentalmente, por dos motivos: el primero de ellos tiene que ver con el propio deseo del trabajador; el segundo hace referencia a la influencia política, social y económica del momento, sin menoscabo de la realidad cultural presente en los distintos territorios. En referencia al primer motivo, según un estudio de asociación *Freelancers Union* y la plataforma *Elance*, en Estados Unidos, un 34% de la población ya trabaja por cuenta propia, entre otras cosas, con objeto de elegir sus actividades en función de sus propias aspiraciones y proyectos profesionales, es decir, sobre aquello que les motiva (Freelancers Union & Elance-oDesk, 2012). Según el estudio sobre la economía *freelance* publicado en 2012 por la *European Forum of Independent Professionals* (EFIP), el número de trabajadores por cuenta propia ha crecido considerablemente en Europa, siendo Holanda (93%) y Francia (95%) claros ejemplos de este crecimiento (Leighton y Brown, 2013). Dichos postulados parecen coincidir con los supuestos teóricos y la propia realidad señaladas por la sociología de las ocupaciones contemporánea en lo que a la fragmentación y descentralización del trabajo se refiere (Caplow, 1954; Fox, 1971; Howard, 1996; Hua et al., 2010; Ritzer, 1989; Watson, 2011).

Igualmente, el aumento feroz de la competencia tecnológica y financiera de las empresas, sobre todo las categorizadas como grandes empresas, han de reunir a los

mejores equipos talentosos para así aumentar sus probabilidades de éxito en su sector o ámbito de actuación (Florida, 2002). Dicho lo cual, numerosas empresas están escuchando, a la inversa quizá de lo acontecido tradicionalmente en el mercado de trabajo, qué es lo que quieren los empleados. En dicha investigación, fue el Profesor Lahera de la Universidad Complutense de Madrid, quien discutió rigurosamente en España la incidencia de la participación laboral sobre la motivación del trabajador y los propios intereses de las empresas (Sánchez, 2004).

Asimismo, investigaciones recientes señalan que los trabajadores más talentosos valoran, entre otras cuestiones técnicas y organizativas, el bienestar en su lugar de trabajo (Nyati, 2014; Shain y Kramer, 2004). A tenor de sus expectativas parece lógico pensar que una organización o centro de trabajo capaz de satisfacer su demanda, será una empresa más competitiva; de igual modo, una empresa competitiva, será a su vez aquella que cuide de su activo más importante: las personas que componen su organización.

El segundo de los motivos, referido al propio ecosistema político, económico, social y cultural en el que se desenvuelven las personas, reviste a su vez nuevas necesidades y, en consecuencia, nuevos entornos, centros y lugares de trabajo fruto de una naturaleza diferente o sencillamente evolucionada. En definitiva, los empleados o las personas que componen la mano productiva de los centros de trabajo, asimismo, se ven abocadas por deseo o por imposición, a una realidad desconocida en esencia, pero atractiva y persuasiva por sí sola en la praxis profesional (Susskind y Susskind, 2015).

2.2.8 Datos censuales

Siguiendo los datos ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en términos porcentuales, el 58,7% de la población pertenecía a la ocupación activa en el año 2016, dos puntos por debajo que en 2014, mayormente copado por los hombres, que representan el 71,7% frente al 46 % de las mujeres (OIT, 2014, 2016a). Por su parte, en Europa la Encuesta de Población Activa de la Unión Europea (EPA-UE) mostró en 2016 una tasa de empleo del 71,1 %, un punto por encima que los valores de 2015. Por su parte, en 2014 el total de trabajadores activos se situó en un 69,2 % de la población, siendo estos un 75% hombres y un 63,5% mujeres (Eurostat, 2014). La Figura 1 muestra la evolución del empleo en Europa y España desde el año 1993 hasta 2016 por edades.

Figura 1. Evolución del empleo categorizado por edad entre 1993 y 2016 en Europa (28) y España

Nota. Recuperado de "Employment Statistics", Eurostat, 16 de mayo, 2017. Recuperado de https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics#searchInput

Por su parte, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en España había de media anual 18,34 millones de trabajadores en 2016 (58,95%), de los cuales el 39,2 % trabajaba en pequeñas empresas, porcentaje que descendió en torno al 1% respecto a 2015. El cuarto trimestre de 2015 marcó una tasa de ocupación del 59,43%, ligeramente por debajo del 59,77% de 2014. En este año, la tasa de actividad de los hombres fue del 65,95% frente al 53,90% de las mujeres. De igual modo, cabe señalar que una de las regiones que experimentó una de las mayores bajadas del paro el cuarto trimestre de 2014 con respecto al anterior se dio en la Comunidad Valenciana (44.700). En el momento del comienzo de la investigación, la tasa de paro se situó en España en el 23,70% de acuerdo con los datos detallados en la Figura 2 (INE, 2014, p. 25).

Figura 2. Tasa de paro en España en el cuarto trimestre de 2014

Nota. Recuperado de “Encuesta de Población Activa (EPA). Cuarto trimestre de 2014”, de Instituto Nacional de Estadística [INE], p. 25.

La ocupación más destacada en Europa guarda relación el sector servicios, que en 2016 representaba el 9,5% de la población activa, donde un 14,2 % presentó un contrato bajo una duración determinada (Eurostat, 2014; OIT, 2016b). Asimismo, se situó la jornada laboral en una media de 37 horas en España. Estos hábitos marcan una tendencia similar en otros países de nuestro entorno, sin embargo, ante las diversas formas de organización del trabajo en cada país y su incidencia sobre los hábitos de vida de los ciudadanos, parece relevante considerar el contexto geográfico, cultural y social en cualquier escenario vinculado con el entorno laboral.

En España, en el 15,31% de la población es ocupada a tiempo parcial en 2016, que descendió 0,7 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2014, siendo en sendos años el sector servicios el más destacado (INE, 2014, 2016). La Figura 3 muestra que España contaba en 2014 con 3.119.310 empresas y en 2018 aumentó un 6,59 % situándose en 3.337.646 (INE, 2018, p. 1).

Figura 3. Evolución de la población de empresas entre 2008 y 2018

Nota. Recuperado de "Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España", de Instituto Nacional de Estadística [INE], 2018, p. 1, Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

Asimismo, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el mismo año 2018 ofreció la distribución del número de empresas por tamaño. La mayor parte de la actividad empresarial se situó en el trabajo autónomo, con un 53,9 % de la representación, seguidos de las microempresas, que contaban con una cifra de 1 a 9 empleados, con un 39% de la representación, tal como señala la Figura 4 (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2018, p. 2).

Figura 4. Distribución del número de empresas por tamaño

Nota. Recuperado de "Cifras PYME", de Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, 2018, p. 2, Madrid: Ministerio de Industria, Economía y Competitividad.

2.3 EL ENTORNO LABORAL Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO

2.3.1 El entorno laboral

2.3.1.1 Análisis preliminar del entorno y de las organizaciones

Con vista en la redefinición existente sobre el concepto de trabajo y los datos ocupacionales más recientes, es posible deducir que en las últimas décadas hemos asistido a un cambio de políticas y a un desarrollo del mercado que han planteado nuevas concepciones a fin de favorecer la productividad de las organizaciones. La enorme redefinición que el trabajo comenzó a experimentar a partir de la Revolución Industrial, inició una evolución sin precedentes en la concepción y posterior interpretación del entorno laboral (Brown, Bryson, Forth, y Whitfield, 2009; Bryson, Forth, y Laroche, 2011).

Por su parte, el comportamiento de las organizaciones ha sido un tema recurrente en la literatura (Greenberg y Baron, 2000). A tenor de los comportamientos y ejes estratégicos actuales, hace ya tiempo que las organizaciones han buscado métodos para lograr alcanzar las citadas cotas de competitividad en el mercado.

El propio entorno se muestra actualmente versátil, flexible y para según qué sectores y ocupaciones, imprevisible. Tal es el caso que diferentes autores refieren que el entorno laboral experimenta un momento repleto de oportunidades, pero también de incertidumbres. La aparición de Internet, los nuevos canales de comunicación y los debates actuales sociales y políticos en torno al lugar de trabajo, dan paso a un entorno cada vez más diversificado y cambiante. En vista de los datos expuestos con anterioridad, es posible deducir la gran masa de empleados que, dentro del sector servicios o no, desarrollan sus actividades laborales en puestos de trabajo en oficina, cuyas demandas físicas e intelectuales han sido objeto de estudio de la Ergonomía y otras disciplinas afines desde hace décadas (Leighton y Brown, 2013; Maitland y Thomson, 2014).

2.3.1.2 Paradigma territorial-cultural sobre el bienestar en el lugar de trabajo

No resulta novedoso referenciar que, culturalmente, existen diferencias entre la UE y otros continentes. En el campo que nos ocupa, como veremos más adelante, son los países americanos, más concretamente Estados Unidos, quienes vieron florecer un campo incipiente en la salud ocupacional: el del *corporate wellness* (Eddy y Kahler, 1992).

De la literatura científica parece desprenderse un cierto consenso sobre la necesidad de conocer e interpretar muy bien las culturas existentes en los distintos entornos, pues resultan evidentes cuando estudiamos la génesis y la evolución política y social de las distintas zonas geográficas y la organización del trabajo existente en estas (Bru Purón, 1994; Torcal y Magalhaes, 2010), no obstante resulta paradójico como a pesar de ello es posible localizar intervenciones realizadas que parecen desprenderse de las raíces del entorno, centrando el foco con aparente acierto sobre el enfoque científico de los programas (Pronk, 2009b).

Un gran número de programas de promoción de la salud laboral los encontramos en Estados Unidos, sin embargo, generalmente los programas estadounidenses se centran en la transformación de la conducta individual, en detrimento de propuestas que conduzcan a una construcción de ambientes de trabajo que promuevan la salud. En esta dirección, parece lógico que los programas estadounidenses puedan resultar organizativamente ineficientes, además de socialmente cuestionados desde una perspectiva europea, dadas las diferencias organizativas y culturales propias de entornos de trabajo socialmente diferentes (Guazzi et al., 2014). En esta dirección, distintos autores sostienen el propósito de crear comunidades saludables, tanto en Estados Unidos, como en el resto de los territorios donde se implementan los programas (Fertman, 2015; Kickbusch y Payne, 2003).

La literatura sobre el particular es amplia y diversa, no obstante, parece constituirse un paradigma territorial-cultural que, en su conjunto, parece influir sobremanera sobre el éxito de los programas de salud corporativos y que todavía parece sin resolver. Tal es el caso, que incluso sobre la UE existen diferentes sistemas políticos y culturales que condicionan el comportamiento de las personas a la vez que plantean una mayor complejidad del entorno (Torcal y Magalhaes, 2010).

Asimismo, la idea de bienestar en el lugar de trabajo posee diferentes significados a través de las empresas y la UE. Por su parte, no existen estudios amplios de origen europeo que estudien con cierta exactitud el impacto global que producen (Guazzi et al., 2014).

2.3.1.3 El entorno laboral en Europa

El Tratado de Roma fue, en 1957 y tras la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la UE. De acuerdo con Pérez Bustamante (2012) se pretendió crear un sistema que comprendiera a más de una nación cara a las acciones políticas y económicas futuras (Pérez Bustamante, 2012).

Los Estados miembros que fundaron la UE fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Asimismo, el Tratado de Maastricht, en 1992, estableció acciones vinculadas con la creación de una moneda común y también en el desarrollo de las políticas interior y exterior, así como abordar el campo de la justicia (Unión Europea, 1992). En esta dirección, la UE se encuentra conformada por 28 países (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2012).

Los programas desarrollados por la UE alcanzan un amplio foco, como distintas ayudas a las pequeñas y medianas empresas, además de la moneda única (Unión Europea, 1992). No obstante, con arreglo a las observaciones de Taylor-Gooby (2001) han existido y existen cambios importantes en políticas que promueven el bienestar de la ciudadanía (Taylor-Gooby, 2001).

Las políticas que han promovido el bienestar han aparecido, a su vez, acompañadas de propuestas de índole macroeconómico. Por este motivo, siguiendo a Moreno (2004), han nacido riesgos sociales sobre la conciliación familiar, reformas laborales y cambios del mercado de trabajo en su conjunto (Moreno, 2004).

El continente europeo está sufriendo una de las más grandes crisis económicas y sociales de su historia. A este respecto, la literatura científica sobre el particular se ha ido ampliando en los últimos años. Siguiendo a Lallement (2011) y Scarpetta, Sonnet y Manfredi (2010), Lasheras y Pérez (2012) establecen:

La variabilidad de realidades nacionales e, incluso, intranacionales en aspectos como la división del trabajo, la diversidad de estructuras productivas y las políticas e instituciones impide hacer interpretaciones simples sobre los impactos de la crisis en el mercado laboral europeo. Sin embargo, el espectacular crecimiento de las tasas de desempleo monopoliza los análisis sobre el impacto social de la crisis. (p. 20).

Un indicador importante sobre el empleo en Europa es la productividad laboral. Existen razones científicas que sostienen que aquellos países que trabajan una menor carga horaria, generalmente la productividad observada en los datos es mayor. En esta dirección, Rodríguez Prada (2004) señala una generalidad relativa a que los europeos trabajan más horas que los estadounidenses y que, por ello, resultan menos productivos que los norteamericanos (Rodríguez Prada, 2004).

Por su parte, en un interesante estudio realizado por Benavides, Benach y Román en 1999 ya sugirieron el efecto particular que, sobre la salud percibida, podría desempeñar el tipo de empleo desarrollado. Asimismo, la relación que guardan estos hallazgos con el absentismo laboral y los costes económicos de las empresas ha de considerarse (Benavides, Benach, y Román, 1999).

2.3.2 Los programas de promoción de actividad física y salud en el lugar de trabajo

2.3.2.1 La actividad física y la importancia de un estilo de vida saludable

Desde 1948, la OMS define salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1998, p. 10). Por su parte, actividad física no es lo mismo que decir ejercicio físico o *fitness* físico (Jiménez Gutierrez y García López, 2012). Para una correcta aclaración de los conceptos, dada la abundante literatura existente que sobre nuestro objeto de estudio se dirime en Estados Unidos y, presuponiendo su influencia sobre los países europeos, se han tenido en cuenta las definiciones del informe de búsqueda general de la *Actividad Física y Salud* de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2014).

Podemos definir actividad física como todo movimiento musculoesquelético que emplea un gasto energético superior al que sucede en reposo; el ejercicio como la actividad física planificada, estructurada y programada para desarrollar la condición física; y, por último, la condición física como el desarrollo de las características propias de la actividad física (Jiménez Gutierrez y García López, 2012). A este respecto, las empresas que incorporan programas de promoción de la salud emplean indistintamente los términos actividad física, ejercicio físico y actividad deportiva. En el marco de nuestro objeto de estudio, conviene referir críticamente la múltiple conceptualización del término actividad física, que aun encontrándose estructurada y planificada para alcanzar una mejora de la condición física, no siempre el término ejercicio físico aparece

referido. Asimismo, cuando se trata de analizar la frecuencia con la que las personas se mueven para estudiar las demandas existentes en diferentes poblaciones, es contemplado el término actividad física (Martínez del Castillo, Moscoso Sánchez, Martín Rodríguez, Jiménez-Beatty, y del Hierro, 2016). En nuestro caso, nos referiremos al ejercicio físico cuando existe un programa estructurado y pautado de acuerdo con la definición ofrecida por Jiménez Gutiérrez y García López (2012).

En la sociedad actual, la inactividad física se constituye como uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas graves (González et al., 2017; Kuijpers, Groen, Aaronson, y van Harten, 2013; Pedersen y Saltin, 2015). A pesar de lo mucho que conocemos sobre los efectos que la actividad física presenta para la salud pública (Ainsworth et al., 2000; Haskell et al., 2007) el reciente Eurobarómetro sobre Deporte y Actividad Física desarrollado refleja que la media europea de inactividad de los ciudadanos es del 42% (37% de hombres, 47% de mujeres) (Comisión Europea, 2014).

Asimismo, siguiendo a Pérez (2005), se advierten las dificultades de progresar en el plano económico y social de la vida, si la población no puede abordar los retos que va manifestando la propia evolución de la sociedad, precisamente, porque la población no presenta buena salud. Ante esta situación, parecen lógicas las observaciones de Costa (2009), quien aboga por un cambio de concepción respecto a la tradicional conceptualización de la salud, en tanto se refiere a que la salud es algo que hoy en día, además de preservar, hay que desarrollar (Costa, 2009).

En el caso de España destaca el trabajo de Wojtek Jan Chodzko-Zajko, Schwingel, y Romo-Pérez (2012) que concluyó advirtiendo sobre la baja práctica de actividad física de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se observan en las zonas más envejecidas e, incluso, en la infancia o la adolescencia. Dichas conclusiones contrastan con las investigaciones que soportan los enormes beneficios de la actividad física y el ejercicio sobre la salud (Morris, Heady, Raffle, Roberts, y Parks, 1953; Powell, Thompson, Caspersen, y Kendrick, 1987; Speck, Courneya, Masse, Duval, y Schmitz, 2010).

Si bien, para estudiar apropiadamente los orígenes del interés científico en la actividad física en el contexto laboral, conviene remontarse a principios de los años cincuenta. En aquella década, hubo un pronunciado interés por parte de la comunidad científica en estudiar el infarto de miocardio. En esta dirección, uno de los trabajos epidemiológicos más incipientes que en este contexto analizó los efectos de la actividad física en una ocupación laboral puede localizarse en 1958, según el cual, el médico británico Jeremy Morris observó los posibles efectos que una ocupación laboral activa podría ejercer sobre la salud cardiovascular. Para llevarlo a cabo, diseñó un estudio epidemiológico en el que examinó a los conductores y a los revisores de los billetes de la compañía municipal de autobuses de Londres. Los autobuses, que eran de dos plantas, obligaban a los revisores a estar en movimiento durante toda su jornada de trabajo, cuestión que no sucedía con los conductores. El estudio observó que la actividad física ocupacional que realizaban los revisores suponía una protección frente a las enfermedades cardiovasculares (Morris y Crawford, 1958). A partir de este estudio pionero, la comunidad científica se planteó el poder de la actividad física en la prevención y el tratamiento de distintas enfermedades. Así, numerosas investigaciones han procurado

dar respuesta a estas relaciones causales, estableciendo así a la actividad física como un factor coadyuvante a los tratamientos farmacológicos tradicionales (Pedersen y Saltin, 2015).

2.3.2.2 Recomendaciones internacionales

Siguiendo las recomendaciones oficiales de la OMS, internacionalmente reconocidas por la comunidad científica y profesional, para una población adulta con edades comprendidas entre 18 y 64 años, conviene que realicen actividad física aeróbica, de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. Asimismo, que durante dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares. No obstante, diversas investigaciones han analizado el grado de conformidad de algunos territorios con dichas recomendaciones (OMS, 2010).

Por su parte, las recomendaciones propuestas por la *American College of Sports Medicine* (ACSM) recomiendan que un adulto en óptimas condiciones de salud realice como mínimo 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada cada semana, si bien naturalmente en función del ejercicio a desarrollar (cardiorrespiratorio, fuerza, flexibilidad o aspectos neuromotores) se proponen consejos más específicos (ACSM, 2013; Blair, LaMonte, y Nichaman, 2004).

2.3.2.3 Cambios sociales en la práctica de actividad física: barreras y demandas

Razones para el crecimiento de la demanda

Siguiendo a Martínez del Castillo et al. (2016) la literatura científica se han identificado tres tipos de demandas asociadas a la práctica de actividad física, ejercicio y deporte: demanda establecida, la cual hace referencia al número de personas que practican actividad física y que ven cumplidas sus expectativas a tenor de la oferta existente; demanda latente, en referencia a aquellas personas que desearían practicar, sin embargo por algún motivo (social, económico, de género, etc.) no pueden; y, por último, demanda ausente, que representaría a aquellas personas que no practican y que tampoco desean practicar actividad física.

Motivada por los diversos factores sociales, políticos y culturales que la sociedad ha experimentado en las últimas décadas, la actividad física ha sufrido una transformación que ha venido acompañando, en paralelo, a los citados cambios acaecidos. A partir de los años sesenta, en buena parte de Europa y, de forma más específica, en España, se experimentó un crecimiento en el número de practicantes. Tal es el caso que la tasa de practicantes pasó en España de un 12% hasta principios de los años setenta, cuyos practicantes poseían una cómoda posición social y económica (Martínez del Castillo et al., 2016). A principios de los años ochenta, con la instauración del régimen democrático en España, la oferta de actividad física se fue haciendo cada vez más accesible a la población, incrementándose la oferta de actividades y el número de instalaciones deportivas (Martínez del Castillo, Puig, Boix, y Millet, 1993).

Cabe señalar aquí que, en España, el nacimiento del Estado democrático y el desarrollo económico motivado por el nacimiento de la Constitución Española de 1978 sufrió una evolución más alargada en el tiempo que los cambios experimentados en otros países

vecinos. Dichos factores concuerdan con el proceso de heterogeneización de la práctica deportiva (Durán, 1995; Puig y Martínez del Castillo, 1985) no obstante, cabe señalar la obra de Cagigal titulada *El deporte en la sociedad actual* (Cagigal, 1975) donde se señalaron el deporte praxis y el deporte espectáculo.

En dicha obra, el fenómeno deportivo ya fue indicado como un gran foco de entusiasmo para los españoles, si bien, siguiendo al citado autor, parece que las premoniciones de la precitada obra se han hecho realidad en nuestro tiempo, pues hoy el deporte ha cobrado más protagonismo en España desde la perspectiva del espectáculo, en detrimento de la praxis. La evidencia de lo anterior queda patente en investigaciones sociales recientes; en ellas se señalan que el crecimiento de personas practicantes se ha detenido en España, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países vecinos de la UE, cuyos habitantes practican más actividad física que los españoles, haciéndose más notable el deporte praxis en estos países (Comisión Europea, 2015).

Motivos del descenso de practicantes y barreras de acceso a la práctica de actividad física

La crisis económica vivida en Europa y su influencia en España, han incidido sobre el estancamiento y el descenso del número de practicantes en determinadas zonas (Martínez del Castillo et al., 2016). A su vez han existido distintas barreras de práctica en función de la edad, el género y la condición social de las personas. Dichas barreras han afectado principalmente a las mujeres y a las personas adultas y mayores. Investigaciones recientes evidencian la demanda latente existente en ambos colectivos (Martínez del Castillo, Jiménez Beatty, et al., 2007; Martínez del Castillo, Martín Rodríguez, Hierro Pinés, Jiménez-Beatty Navarro, y González Rivera, 2008).

La demanda establecida de practicantes en Europa se situó en 2014 en un 45% de los cuales, el 42% señalan como primer motivo para no practicar que no tienen tiempo (Comisión Europea, 2014). Dichos indicadores coinciden con los estudios recientes en España, que señalan un nivel de practicantes en torno al 50% de la población a partir del año 2000. Asimismo, el principal argumento para no realizar actividad física en España es la falta de tiempo (Ferrando y Goig, 2011). A pesar de que otros países en Europa poseen indicadores de práctica regular muy interesantes, sobre todo en los países nórdicos (el 70% en Suecia, el 68% en Dinamarca y el 66% en Finlandia); resulta lógico entonces que dichos países posean una tasa de sedentarismo muy por debajo que la existente en España: el 6% de la tasa en Suecia y al 7% en Finlandia contrastan de forma verdaderamente notable con el 42% en España.

Otros estudios identificaron las barreras de acceso a la práctica de actividad física dividiéndolas en función de la edad, la clase social y el género. En este sentido, el principal motivo que las personas mayores y adultas que no realizan actividad física, el principal motivo para la constatación de una barrera de práctica es la falta de tiempo y el horario (Martínez del Castillo et al., 2008).

Desde un punto de vista sociológico, en 1978 Bourdieu determinó en función del tipo de ocupación, aspectos familiares y el nivel educativo el estudio de la clase social. Al respecto, investigaciones recientes señalan que a mejores condiciones laborales y una

mayor estabilidad, mejores niveles de práctica físico-deportiva (Bourdieu, 1978; 2007). Dichos datos recientes concuerdan con las observaciones de Sánchez y Moscoso (2014) acerca de las confirmaciones que el estructuralismo señalado por Bordieu ha incidido sobre la práctica de actividad física (García y Moscoso-Sánchez, 2015). Por tanto, estas nuevas demandas de práctica han planteado recientemente algunos retos organizativos a los que atender. A tenor de dicha situación, parece que el ejercicio físico en el lugar de trabajo puede ser una solución apropiada. Dichos argumentos se encuentran en consonancia con las observaciones de distintos autores (Martínez del Castillo et al., 2016).

Incidencia de las transformaciones sociales y culturales: una nueva concepción del lugar de trabajo

La transformación que está experimentando el trabajo (Levin, 2005; Susskind y Susskind, 2015; Todaro y Yáñez, 2004; Vithayathawornwong, Danko, y Tolbert, 2003) y los cambios que están aconteciendo en torno a las jornadas laborales y la utilización del tiempo libre vienen influidas por las consecuencias sociales, políticas y culturales experimentadas en los territorios (Ritzer, 1989; Watson, 2011; Womack, 2006).

De acuerdo con Martínez del Castillo et al. (2016), la concepción del tiempo libre y del ocio han cambiado en las últimas décadas. Históricamente el tiempo libre viene representando la antítesis a las ocupaciones laborales productivas, sin embargo, el ocio a veces viene a ocupar nuestro tiempo libre. Pues bien, investigaciones recientes sostienen que el tiempo libre haya sido ocupado hoy en día por otras acciones no necesariamente ociosas. Sobre dichos factores han influido el crecimiento de la burocracia, el cambio del modelo económico y el modelo organizativo del trabajo, dirigido a la realización de menores esfuerzos físicos y llevando, a su vez, al crecimiento de los denominados trabajadores de cuello blanco, en detrimento de los de cuello azul, evidencian la progresiva pérdida del esfuerzo físico en el lugar de trabajo, dando pie a la aparición de otras ocupaciones más sedentarias.

En este sentido, ya en el año 2005 aproximadamente el 30% de la población pasa su jornada en posición de sedestación o bipedestación, aunque sin realizar desplazamientos o esfuerzos. Considerando los indicadores de práctica, el estilo de vida actual predominante tiende a pasar buena parte de la jornada sin apenas esfuerzos o actividad física por parte de la población española, conformándose así un progresivo estilo de vida sedentario (Ferrando y Goig, 2011; Martínez del Castillo et al., 2016, p. 89) tal como se observa en la Figura 5.

Figura 5. Actividad física durante el día de la población española 1990-2005

Adaptado de “Cambios sociales y cambios en las prácticas y demandas de actividad física y deporte: 1966-2016. Nuevos retos organizativos”, en INEF, 50 años, de Martínez del Castillo, J., Martín Rodríguez, M., Jiménez-Beatty, J.E., y Del Hierro, D., 2016, p. 89. Madrid, España: INEF.

La tendencia a permanecer sentado también ha sido observada en Europa. Así, el Eurobarómetro Especial sobre actividad física y deporte publicado en 2015 realizó 27.919 entrevistas en Europa y 1013 en España. Además de los precitados datos sobre la práctica deportiva y los espacios de práctica, el 43% de la población europea informó pasar el tiempo sentado hasta ocho horas y media diarias, lo que supone dos puntos porcentuales por encima de la franja temporal comprendida entre los años 2002 y 2013. España, aunque dio paso a un ligero descenso, viéndose reducido el dato de un 20% del año 2013 a un 17% en 2015, lo cierto es que la progresiva tendencia a la inactividad física y un descenso en los esfuerzos físicos en la vida diaria de las personas parecen ajustarse a lo observado por Martínez del Castillo et al. (2016) hasta el año 2005. La Figura 6 (Comisión Europea, 2014, p. 6) muestra las tendencias de práctica de actividad física y deporte recogidas en el citado Eurobarómetro.

Figura 6. Frecuencia de práctica de actividad física y deporte en Europa y España

Nota. Adaptado de “Special Eurobarometer 412 ‘Sport and physical activity’” Report, de Comisión Europea, Directorate-General for Education and Culture and co-ordinated by Directorate-General for Communication, 2014, p. 6. Brussels: European Commission.

En esta dirección, a partir de las recientes evidencias de González et al. (2017) y Kääriä, Laksonen, Rahkonen, Lahelma y Leino-Arjas (2012) sobre la incidencia de la actividad física sobre la salud y considerando la jornada laboral instituida en España y los países de su entorno, parece lógico establecer la idoneidad del lugar de trabajo cuando se trata de generar hábitos de salud y bienestar en la población. Asimismo, en Europa existen cerca de un 55% de no practicantes en edad de trabajar. Esta cifra es muy similar a la obtenida en España. De igual modo, un 56% en Europa frente a un 37% en España de los trabajadores de cuello blanco, informaron no practicar actividad física nunca o raramente, justificando la ausencia de tiempo una de sus principales barreras.

Sin embargo, esta cifra parece todavía más preocupante en los trabajos por cuenta propia, a menudo influidos por hábitos de vida estresantes que en España se encuentran siete puntos por encima de lo observado en Europa, cuya presencia es el 49%. De acuerdo con estas cifras, el perfil de no practicante contemplado en Europa parece representar en mayor medida a los empleados que pasan la mayor parte de su jornada laboral sentados o sin realizar esfuerzos físicos, con grandes ocupaciones en el trabajo y con poco o nulo tiempo destinado para el ocio y los beneficios de la actividad física (Comisión Europea, 2015; González et al., 2017; Kääriä, Laaksonen, Rahkonen, Lahelma, y Leino-Arjas, 2012). Si bien, Martínez del Castillo et al. (2016) ya advirtieron de lo escasamente reconocido que se encuentra la práctica deportiva entre los españoles y que sería oportuno continuar explorando las posibles demandas para conformar nuevos entornos de práctica. A este respecto, el lugar de trabajo podría constituir un buen escenario.

Pese a ello, a la cultura del bienestar que parece comenzar a arraigarse en los centros de trabajo, los trabajadores talentosos buscan una mayor conciliación laboral (Dolan y Raich, 2010) este y otros factores tuvieron su nacimiento en Estados Unidos, constituyéndose en Europa de forma muy similar, algún tiempo después (Fertman, 2015). Tal y como exponíamos anteriormente, al igual que los centros de trabajo siguen una adaptación cultural en función de la naturaleza y las necesidades de los empleados, igualmente los recursos asociados a dicha transformación han de verse modificados.

En el ámbito internacional existen empresas que ya contemplan instalaciones deportivas que incorporan espacios convencionales y no convencionales de práctica (Martínez del Castillo et al., 1993) que persiguen la realización de ejercicio físico o la práctica de algún deporte, entendiendo dichas actividades como agentes que facilitan el desarrollo de la salud y la atracción del talento.

Asimismo, la proliferación de nuevas actividades de *fitness* y la propia versatilidad de los centros de trabajo, la mayoría de ellos de nueva creación, y las propias organizaciones, ya incorporan incluso salas para la realización de actividades funcionales u otras actividades físicas y cognitivas dedicadas a un cliente interno cada vez más formado y exigente (García-Ferrando y Llopis, 2011; Martínez del Castillo, 2014).

Por otra parte, aquellos lugares de trabajo considerados anteriores al R.D. 486/1997 citado con anterioridad, han de realizar todavía una mayor inversión para dotar de recursos y espacios para de ver satisfechas las demandas (R.D. 486/1997, de 14 de abril, 1997). No obstante, ya sea a través del enfoque tradicional o contemporáneo de las

distintas entidades, es posible presuponer un consenso claro sobre la tendencia de preservar y desarrollar la salud de los empleados con la finalidad de alcanzar una salud organizacional fuerte y competitiva en el mercado.

En los apartados anteriores se ha tratado de evidenciar la evolución de los practicantes y sus motivos de práctica de actividad física. En relación con la evidencia actual existente, resulta verosímil que el sistema deportivo haya ido evolucionando, tal y como ha sido señalado en Europa y España, hacia una concepción más abierta, donde conviven ofertas desde una perspectiva pública o privada (García-Ferrando y Llopis, 2011). Asimismo, en el entorno de trabajo se han venido desarrollando unos hábitos de la población propiciados por la centralidad del trabajo en la sociedad actual. En vista de la marcada evolución de las demandas y las tasas de práctica, empujadas por circunstancias sociales y laborales del momento, las organizaciones comenzaron a prestar atención al nacimiento de nuevos servicios para satisfacer las demandas recientes acontecidas en los países industrializados. Dicha asociación de factores ha venido conformando un crecimiento de servicios en las organizaciones de forma paralela hacia un objetivo común, la salud de los empleados. Si bien, debemos atribuir dicho crecimiento a una génesis multifactorial (Goetzel, 2005).

Por un lado, las demandas sociales del momento fruto de las condiciones sociales, políticas y económicas del momento; por otro, la heterogeneidad de las demandas hacia la práctica de actividad física y, finalmente, los hábitos de vida de las personas fruto de las sociedades modernas industrializadas que, copadas por unas condiciones laborales negativas para la mayoría de la población ejemplifican fielmente la centralización del trabajo en la sociedad actual (Anthony, 2014; Cornfield y Hodson, 2002; Noguera, 1998, 2000, 2002; Watson, 2011). El señalado concepto más amplio de trabajo ofrece un camino que concuerda con el fenómeno de una sociedad más abierta, al igual que los sistemas deportivos.

Paralelamente, el origen lucrativo de las actividades de las organizaciones empresariales, unido a un incremento progresivo de la seguridad propias de actividades laborales peligrosas, han facilitado la creación de condiciones de trabajo que han ido construyendo un ambiente de trabajo cada vez más centrado en la salud de las personas, cuya concepción de la salud ha ido evolucionando desde un mantenimiento de la salud, hacia su prevención y desarrollo. En vista de la conformación de esta realidad de origen multifactorial, pues bien, todos estos aspectos guardan una relación estrecha con la evolución histórica de la salud ocupacional que ha ido evolucionando en paralelo, pero de forma muy relacionada (Fertman, 2015).

2.3.2.4 Marco de referencia sobre la gestión de la salud de los empleados

Antecedentes históricos: el nacimiento de la salud ocupacional

Los hitos señalados en el marco teórico previo se encuentran estrechamente relacionados con una evolución que ha respondido, tal y como ya ha sido señalado, con la evolución del trabajo y los lugares de trabajo. Algunos autores como Kickbusch y Payne ya señalaron la revolucionaria transformación que el lugar de trabajo ha sufrido en torno a la concepción de la salud (Kickbusch y Payne, 2003). Partiendo de la literatura previamente citada, el Profesor Carl I. Fertman estructuró en su obra *Work Health*

Promotion Programs la promoción de la salud en el lugar de trabajo en tres fases (Fertman, 2015), cuyos planteamientos coinciden evolutivamente en el marco temporal propuesto unos años antes por Whitmer (2009). Siguiendo a los citados autores, el resumen histórico y evolutivo de la promoción de la salud en los lugares de trabajo puede constituirse en torno a tres fases que comprenden desde el año 1900 hasta 1950; una segunda fase que oscila entre 1950 y 1970; y una última a partir de la década de los noventa.

En esta dirección, resulta interesante especificar que cuando se alude a lugar de trabajo y promoción de la salud, en realidad nos estamos refiriendo a la génesis y posterior evolución de los departamentos de prevención, salud ocupacional o de denominación similar, que hoy en día existen en buena parte de las organizaciones empresariales.

Los departamentos de prevención y promoción de la salud en las organizaciones

La prevención (o protección) referida a los riesgos laborales, persigue un objetivo claro: el descenso de los riesgos o los peligros (Díaz, 2009). Siguiendo las contribuciones propuestas por Díaz Cortés desde el campo académico y profesional de la prevención de riesgos laborales, el riesgo es la probabilidad de que un evento o peligro desencadene un daño cuantificable o no (Díaz, 2009). Por otro lado, partiendo del concepto de salud internacionalmente reconocido por la OMS, otros autores como Díaz Zazo se han referido recientemente al concepto de prevención como una medida de intervención en salud antes de que la misma desaparezca (Díaz Zazo, 2015).

En el plano legislativo, en cambio, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define riesgo laboral como “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo” (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 1995, p. 6). De nuevo es posible contemplar de forma implícita en el término la cuantificación necesaria en aras de prevenir los citados riesgos.

La literatura contempla, a su vez, una tipología característica de los riesgos, generalmente motivados por las condiciones del trabajo en torno a agentes físicos, químicos, sociales-humanos y dentro de estos, los psicosociales (Chinchilla, 2002; Díaz Zazo, 2015; Hurtado de Mendoza, 2013).

En vista de los antecedentes históricos, el proceso de transformación de la salud ocupacional hacia una gestión de la salud poblacional se ha hecho cada vez más evidente desde la década de los años 70 (Whitmer, 2009). El foco de interés inicial de las organizaciones estuvo centrado en la gestión de los riesgos asociados a una determinada ocupación o en las propias enfermedades que podrían derivarse de la misma, es decir, a la protección de los empleados. Tal es el caso, que lo que la literatura científica conoce como centros de salud ocupacionales. Más concretamente, en España, reconoce estas funciones en el marco del ejercicio profesional de la medicina del trabajo, representa un fenómeno reciente. A propósito de la incursión de dicha especialidad en España, el Profesor Díaz-Franco trazó en un artículo breve en extensión, pero no en contenido, una excelente revisión descriptiva sobre la evolución de la medicina del trabajo en España para precisar el nacimiento legislativo de la figura facultativa en el trabajo en nuestro país (Díaz-Franco, 2002).

Siguiendo con la evolución referente a los citados departamentos, para estudiar sus orígenes hemos de remontarnos al siglo XIX, momento en el cual en Estados Unidos la mayor parte de las compañías se dedicaban a la construcción vías de ferrocarril y a la minería. Teniendo en cuenta las condiciones sociales y el desarrollo tecnológico de la época, para dichas actividades laborales implícitamente es posible contemplar ocupaciones físicamente activas e incluso peligrosas. Diversas investigaciones sostienen las elevadas cifras de muertes que los riesgos se asociaron a dichas ocupaciones.

Al respecto, Fertman refiere la titulada *National Safety Council* para señalar que en 1912 el número de muertes asociadas por lesiones propias del trabajo fueron entre 18.000 y 21.000 personas (Fertman, 2015). Los altos niveles de riesgo para la salud y sus costes asociados condujeron a las empresas a instaurar puestos de atención primaria permanentes en estos lugares de trabajo. Asimismo, dada la variedad de estas, comenzó a gestarse una concepción más amplia y multidisciplinar de los riesgos, entrando a denominarse higiene industrial y salud los departamentos encargados de la salud ocupacional de los empleados. Entrado ya el siglo XX, comenzaron a realizarse los primeros chequeos periódicos (Whitmer, 2009).

Entre los años 1950 y 1970, progresivamente se fueron incorporando los médicos especialistas dentro del organigrama interno de las empresas. Con la llegada de este nuevo modelo, los reportes clínicos ya pasaban a los mandos directivos de la organización, quienes comenzaron a interpretarlos desde una perspectiva empresarial, sobre todo en torno al retorno de los costes, lo que suponen ya las primeras contribuciones sobre los retornos de la inversión en prevención anteriores a la década de los noventa (Caroll, Lipartito, Post, y Werhana, 2012).

Diversos autores sostienen que la salud ocupacional supone un punto de partida muy habitual, sobre el cual las organizaciones venían desarrollando guías de prevención de riesgos, aunque la gestión de los riesgos únicamente supone un 25% de los costes vinculados al cuidado de la salud en el trabajo frente al 75% de los costes restantes, ya derivados a la gestión médica y, en mayor medida, a la gestión del cuidado popular de la salud basados en la prevención, costes farmacéuticos, dentistas y la atención primaria (Fabius y Glave, 2009).

Otros autores como Fabius y Frazee también categorizaron los servicios asociados al bienestar y la promoción de la salud en la empresa (Fabius y Frazee, 2009), fraguándose así la tendencia de externalización de servicios que las organizaciones han experimentado al respecto desde principios de la década de los ochenta.

La concepción de la salud en las organizaciones: distintas raíces, un mismo punto de partida

Desde un momento histórico más reciente, existen investigaciones que soportan la importancia de los costes que pueden generarse fruto de estilos de vida insalubres y la falta de actividad física (Dallat, 2013; Holtermann et al., 2010; Proper et al., 2004). Además, la actual situación coyuntural de crisis económica que atraviesa Europa favorece la necesidad de promover políticas de intervención en salud pública. Dadas las diferentes concepciones culturales que pueden dirimirse de la comparativa entre

Estados Unidos y Europa, no es posible establecer un análisis paralelo en torno al nacimiento de la nueva concepción de la salud ocupacional, precisamente porque los modelos sanitarios son francamente distintos. En Estados Unidos, por ejemplo, el modelo sanitario está basado en primas de seguros o en contrataciones de los servicios sanitarios privados; en España, concretamente, coexiste un modelo universal y gratuito.

Parece existir un consenso en torno a que los costes asociados a los programas tradicionales de tratamientos ocupacionales han dado paso a una tendencia global en el cual las organizaciones desarrollan la prevención. Dicho propósito tuvo la concepción empresarial más centrada en reducir los costes asociados a los programas de tratamiento convencionales. Asimismo, la familia y la creación de estilos de vida saludables, en comunidad, nos permiten estudiar, a pesar de las citadas diferencias, el nacimiento de la salud ocupacional moderna, si bien en épocas distintas y por factores distintos en Estados Unidos (Fabius y Glave, 2009).

La importancia de dirigirse al trabajo de oficina

Ante la necesidad de integrar la actividad física dentro de la vida diaria de las personas, se han venido realizando en Europa diferentes programas de promoción de la actividad física y la salud dentro de múltiples poblaciones con el objetivo de mejorar los indicadores relacionados con la salud y la economía (Comisión Europea, 2014). Un núcleo de especial relevancia lo constituyen los trabajadores de las organizaciones y entidades, tanto públicas como privadas.

En vista de la última encuesta de hábitos deportivos de los españoles, España no se encuentra en los puestos de cabeza respecto a la práctica deportiva con respecto a la situación de otros países europeos, como Finlandia, que cuenta con más de un 70 % de práctica deportiva, con todo lo que ello supone (García-Ferrando y Llopis, 2011). Volviendo al caso de España, el 63 % de los españoles que no practican actividad física de manera regular, es por causa de falta de tiempo. Curiosamente, uno de los lugares donde más tiempo pasan su tiempo es en el puesto de trabajo (Rodríguez Prada, 2004). Es por ello por lo que parece interesante incluir la actividad física dentro de la jornada laboral.

Teniendo en cuenta los datos censuales, tendentes a una buena representación del sector servicios y sedentarios en puestos de oficina, a su vez, la evidencia empírica reciente detalla con un elevado nivel de precisión los diferentes factores de riesgo asociados a los puestos de trabajo que implican tareas más sedentarias (Heiss et al., 2008; Mayhew, 2001; Prince, Saunders, Gresty, y Reid, 2014; Rothman, 2000). Al respecto, la comunidad científica ha centrado sus esfuerzos en examinar y divulgar los riesgos existentes, así como favorecer distintos mecanismos para su prevención y tratamiento. A su vez, la literatura parece converger sobre los riesgos más característicos propios del trabajo en oficina (Chinchilla, 2002; Muñoz Poblete y Vanegas López, 2012).

Un empleado que no preserva una buena salud es un empleado que potencialmente tendrá una baja laboral y, en consecuencia, ocasionará un impacto económico sobre la organización. Este concepto es lo que se conoce como absentismo laboral (Bertera,

1990). Asimismo, otro concepto destacado es el del presentismo, que alude a los trabajadores que, aun no preservando una salud óptima para el desarrollo de sus funciones, asisten regularmente a su puesto de trabajo a pesar de estar enfermos (Johns, 2010). Si bien dichos conceptos serán abordados más adelante en el presente trabajo de investigación, conviene señalarlos brevemente en este punto para comprender la trascendencia que tienen los factores de riesgo sobre la salud. De igual modo, resulta interesante conocerlos aquí para deducir también un impacto en cadena que dichos riesgos pueden ocasionar sobre los factores organizativos y económicos en el lugar de trabajo. La mayoría de las bajas laborales se producen por accidentes de trabajo, si bien los trastornos musculoesqueléticos y de forma más incipiente, el estrés laboral, copan las enfermedades laborales más frecuentes.

Al hilo de los riesgos asociados y su impacto sobre las personas y las organizaciones, la literatura científica nos muestra algunas de las organizaciones de promoción de la salud dentro del contexto laboral europeo (Guazzi et al., 2014). Entre ellas destacan la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), una organización pública de carácter administrativo que opera desde las instituciones europeas para promover un entorno laboral más seguro y sano. En esta dirección, en un reciente informe publicado en prensa, EU-OSHA estima que los costes de los accidentes laborales y las lesiones propias del trabajo cuestan de forma global 476 billones de euros cada año (EU-OSHA, 2017). Entre los sectores profesionales más afectados en España, son los servicios administrativos aquellos ocupan una posición destacada en torno a los trastornos osteoarticulares, estipulados como una de las primeras causas de lesión, incidiendo para esta ocupación un 50,9% frente al 55,4% de otros servicios como la construcción (Villar, 2014). También los puestos de trabajo en oficina ocasionan enfermedades a largo plazo propias de un estilo de vida sedentario (Fornias, Lopes, Rey-López, Matsudo, y do Carmo Luiz, 2014; Proper, Singh, Van Mechelen, y Chinapaw, 2011; Schulte et al., 2007).

Otras investigaciones concluyen que los programas de promoción de la salud en las empresas pueden mejorar la salud general (Hutchinson y Wilson, 2012). De manera que otras revisiones han recogido las evidencias sobre otros parámetros como el incremento de la actividad física, la reducción de grasa corporal, los beneficios en la dieta, la mejora de la productividad y la capacidad para el trabajo, así como la reducción del absentismo laboral (Conn et al., 2009; Proper et al., 2003; Proper, Staal, Hildebrandt, van der Beek, y van Mechelen, 2002).

Así pues, la comunidad científica refiere que la práctica de actividad física regular proporcionará beneficios mayores sobre las personas y la prevención de los riesgos en las organizaciones (Blair et al., 2010). Sin embargo, este hecho no permanece aislado, trayendo consigo consecuencias sobre la salud de las personas y también sobre el gasto público en materia sanitaria. En referencia a ello, diversos estudios avalan la influencia de la promoción de la actividad física sobre el gasto público en salud. En algunos casos, se ha demostrado que la asistencia regular a centros de actividad física dos o tres veces por semana, favorece un mayor ahorro en el gasto sanitario (Ackermann et al., 2008).

El lugar de trabajo es considerado como un entorno apropiado para promoción de la actividad física y la salud debido a la posibilidad de llegar a un gran número de población

y por la cantidad de tiempo que las personas pasan en el trabajo (Hutchinson y Wilson, 2012). Además, la inactividad física y un estilo de vida insalubre, podría traer efectos negativos no sólo para la salud, sino también para el desempeño laboral de los empleados de las organizaciones (Schmier, Jones, y Halpern, 2006). Por otro lado, diversas investigaciones se refieren a los beneficios sobre la salud, organizativos y psicosociales que la práctica de actividad física puede desarrollar en el lugar de trabajo (Conn et al., 2009).

Al respecto, los debates actuales en torno a la flexibilización de la jornada laboral, el teletrabajo y la propia conciliación laboral y familiar copan la realidad actual de las políticas laborales de nuestro entorno (Hurtado de Mendoza, 2013). Tal es el caso, que algunas investigaciones sugieren que realizar actividad física en el lugar de trabajo, dentro de la oficina o en una instalación cercana, pero dentro de la jornada laboral en cualquiera de sus formas y dimensiones, podría facilitar el ahorro de tiempo necesario para cumplir con las demandas actuales en torno a la conciliación (Marshall, 2004). Además, la implementación de la actividad física en el lugar del trabajo podría facilitar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de actividad física además de incidir sobre la reducción del estrés laboral (Kouvonen et al., 2012); el *burnout* o el síndrome del trabajador quemado, propio de la concepción contemporánea del trabajo, las organizaciones y el entorno laboral actual (Toker y Biron, 2012).

La empresa saludable: primeros pasos institucionales y situación actual

Las estructuras públicas y privadas con interlocución válida entre los estamentos políticos y las organizaciones empresariales tuvieron un nacimiento reciente. Desde un punto de vista público, el CDC y la EU-OSHA, han sido los principales observatorios encargados de promulgar las políticas propias en materia de promoción de la salud laboral. En España, destaca el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

En este sentido, fruto de la colaboración público-privada y de los avances sociales y científicos del campo, el concepto de empresa saludable comenzó a instaurarse institucionalmente en Estados Unidos a través de la creación en 1970 del *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH); también, en 1974 se fundó la *Association for Worksite Health Promotion* (AWHP). Asimismo, respaldados por la OMS, nacieron *Health Canada* y *The Canadian Public Health Association* a finales de los ochenta. En 1996 nació en Europa la *European Network for Workplace Health Promotion* (ENWHP), constituyéndose en el año 1997 la Declaración de Luxemburgo, cuyo consenso dilucidó un marco de buenas prácticas sobre el cual las empresas podían acreditar sus buenas prácticas en torno a la buena gestión de la salud de sus empleados (OMS, 1997a; Whitmer, 2009). Parece previsible pues que ante la demanda nacieran, posteriormente, otras entidades encargadas de premiar a aquellos centros de trabajo ejemplares en la materia. Un buen ejemplo de ello es el nacimiento del premio *Best Place to Work®* u otros de índole nacional de otras empresas privadas (Fulmer, Gerhart, y Scott, 2003).

Dilucidar los factores que conllevaron al nacimiento temporal de una asociación en Europa representa un objeto de estudio independiente a esta tesis doctoral, si bien

parece evidente que las condiciones sociales y culturales de las distintas áreas geográficas parecen haber incidido de forma notable en la construcción del todavía incipiente campo científico y profesional que nos ocupa. Ya en el año 2000, nació el grupo de interés promovido por la ACSM sobre la promoción de la salud en el trabajo, transformándose más adelante en lo que hoy conocemos como la *Association for Worksite Health Promotion* (IAWHP), entidad afiliada a la ACSM. Las distintas contribuciones de las citadas entidades al campo académico y profesional han servido para conformar un marco de referencia hacia la promoción de la salud laboral entre los empleados de las organizaciones, sin embargo, los programas que se han venido desarrollando en Europa respondían a los diseños seminales promulgados en anteriores investigaciones e intervenciones internacionales, donde poco o nada reseñan la incidencia cultural de los mismos (Pronk, 2009b).

En este sentido, las aportaciones de Fertman muestran las contribuciones de cada organismo público o privado, obviamente condicionados por los factores políticos y culturales que influyen en los modelos de planificación propuestos (Fertman, 2015). Solo por el marco temporal de constitución, parece evidente que no se ha ido al mismo ritmo de crecimiento y desarrollo que en otros países donde ha proliferado un desarrollo en torno a este ámbito (Jiménez et al., 2014).

Foco de atención y características de las grandes, pequeñas y medianas empresas en torno a la promoción de la salud

Históricamente son las pequeñas con un mayor número de empleados aquellas que han trabajado de una forma más consistente en la promoción de la salud de sus empleados. Si bien en los entornos más rurales es más habitual localizar empresas más pequeñas. La concentración de riqueza en términos económicos se encuentra más localizada en las grandes urbes, asimismo, las empresas que poseen un mayor número de ingresos por regla general son las que realizan una mayor inversión en la promoción de la salud de sus empleados. No obstante, existen excepciones localizadas en la literatura. Aun así, independientemente del área geográfica a la que nos dirijamos, el foco atencional que las organizaciones han destinado a la promoción de la salud ha venido claramente condicionado por los recursos, la política de empresa y las propias necesidades de esta.

2.3.2.5 La planificación de los programas de promoción de la salud en las organizaciones: teorías y modelos de planificación

Definición y características básicas de la planificación

La planificación consiste en diseñar un conjunto de acciones con el fin de prever las situaciones que sucederán en una organización. Si bien, antes de abordar la planificación, conviene detenerse en la persona como elemento fundamental en las organizaciones. Los recursos son los activos vinculados a las organizaciones, tanto tangibles como intangibles, que contribuyen a la obtención de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Estos pueden ser físicos, organizativos o humanos. Por su parte, los recursos humanos son las personas que trabajan y desarrollan su actividad laboral en los distintos tipos de organizaciones (Cabrera y Bonache 2004). El

término de recursos humanos implica, siguiendo a Fernández-Ríos (1999) tener un conocimiento y unas capacidades asociadas a unos compromisos de los trabajadores en una entidad.

De acuerdo con Fertman (2015) en la fase de planificación de un programa en el lugar de trabajo hemos de gestionar un gran número de elementos, incluyendo:

- La participación de los agentes implicados
- El tiempo
- El dinero y otros recursos
- La extracción de datos y su interpretación
- Consideración del rol de la promoción de la salud, las teorías y sus modelos
- La toma de decisiones
- Planificar los instrumentos de medición (p. 49).

Asimismo, tal como planteó Chenoweth (1987) la guía para una correcta planificación consiste en cinco distintivos interrelacionados en distintas fases:

- “Identificar los problemas de salud
- Conocer los intereses de los trabajadores
- Planificar el programa
- Promover e implementar el programa
- Evaluar el programa y plantear la perspectiva de futuro” (p. 45).

Podemos definir la promoción de la salud en el lugar de trabajo o salud laboral como el conjunto de acciones dirigidas a la salud física y mental y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo. Así, la Declaración de Luxemburgo se refiere a la promoción de la salud en el lugar de trabajo como una forma de unir fuerzas por parte de los agentes empleadores, los trabajadores y la sociedad en su conjunto con la finalidad de favorecer la salud y el bienestar en el trabajo (OMS, 1997b). Por su parte, Pronk (2009) se refiere a la gestión de la salud de una población como un proceso estratégico y también operativo con la intención de mejorar los parámetros de salud de un grupo de personas asociadas en colectivo para la mejora de una empresa u organización (Pronk, 2009a).

Dentro de este contexto, en la promoción de la salud en el trabajo existen teorías contrastadas que permiten contextualizar debidamente las acciones de intervención. El rol de seleccionar una teoría en la que basar las intervenciones de promoción de la salud en el lugar de trabajo reside en proveer una guía para estudiar problemas y desarrollar así las soluciones apropiadas de intervención y evaluación. Fertman (2015) se refirió a las ventajas de aplicar teorías específicas sobre la promoción de la salud señalando la importante ayuda que una teoría puede proporcionar para dar explicación a

determinados comportamientos en las organizaciones orientados a la salud (Fertman, 2015).

Teorías de promoción de la salud y enfoques de aplicación

Fertman (2015) partió de las distintas teorías que el *National Cancer Institute* de Estados Unidos empleó para la aplicación de sus programas de promoción de la salud. A este respecto, propuso una adaptación de estas y las distingue de acuerdo con tres niveles: niveles individuales, niveles interpersonales y niveles organizacionales. Los rasgos distintivos de todas ellas se relacionan con el foco de actuación del programa de promoción de la salud en vista de aplicarlo con una población determinada y con un fin destinado a la consecución de unos objetivos y unos resultados en un marco temporal específico. El precitado autor recoge, en su obra *Workplace health promotion programs: Planning, Implementation and Evaluation*, un completo resumen de las teorías con la intención de ilustrar su importancia para fundamentar los métodos, técnicas e instrumentos a emplear a la hora de implementar un programa integral de promoción de la salud en el lugar de trabajo. La Tabla 3 muestra los rasgos distintivos de las teorías clasificadas en las citadas dimensiones y los focos sobre los que se aplican (Fertman, 2015, pp. 38-39).

Tabla 3. Teorías de promoción de la salud: foco y rasgos distintivos

	Teoría	Foco	Rasgos distintivos
Nivel individual	Modelo de creencias de la salud	Percepciones individuales del problema de salud, los beneficios de los tratamientos y mecanismos de actuación	Percepciones de la susceptibilidad, la severidad, beneficios, barreras, señales para la acción y eficacia
	Teoría del comportamiento planificado	Actitudes hacia un comportamiento, percepciones de normas y creencias acerca de la facilidad o dificultad de cambiar	Intención de comportamiento, actitud hacia el comportamiento, normas subjetivas, control conductual percibido
	Modelo transteórico	Motivación y disposición para cambiar un comportamiento problemático a lo largo del tiempo	Etapas de intercambio Procesos de cambio, alcance decisional, autoeficacia, tentación
Nivel interpersonal	Enfoque del proceso de acción en salud	Modelo autorregulador para incluir intención y comportamiento	Percepciones de riesgo, expectativas de resultados, autoeficacia (acción, mantenimiento y recuperación)
	Teoría cognitiva social	Factores personales, factores ambientales y comportamiento humano	Expectativas de comportamiento, autoeficacia, aprendizaje observacional, refuerzos

Teoría	Foco	Rasgos distintivos
Red social	Influencias sociales en la salud y el comportamiento	Apoyo emocional, recursos y soportes informativos
Teoría de la comunicación	Cómo los diferentes tipos de comunicación afectan a nuestro comportamiento	Configuración de la agenda de los medios, configuración de la agenda pública, configuración de la agenda política, identificación del problema
Nivel lugar de trabajo	Difusión de innovaciones	Complejidad
	Movilización de comunidades	Planificación en dinamización de comunidades

Nota. Adaptado de “Workplace Health Promotion Programs: Planning, Implementation, and Evaluation”, de Fertman, C.I., 2015, pp. 38-39, San Francisco, United States: Jossey-Bass: John Wiley & Sons. Copyright © 2015.

Siguiendo nuevamente las ideas de Fertman (2015), una teoría apropiada o combinación de teorías tendrá en cuenta múltiples factores que pueden incluir en los comportamientos orientados a la salud. Por ejemplo, teorías basadas en la movilización de comunidades parecen interesantes en proyectos de dinamización en entornos colectivos o la encargada de difundir innovaciones, cuyo principal propósito es fundamentar el paradigma de funcionamiento de los planes, programas, proyectos y acciones novedosas en una organización. Pese a ello, conviene señalar que la idoneidad de emplear unas u otras se adecúa al contexto al que se dirigen (Fertman, 2015). Asimismo, independientemente del área geográfica a la que nos dirijamos, con sus consecuentes factores antropológicos y culturas organizativas, la literatura ha fundamentado otros modelos que hacen todavía más compleja la capacidad de selección de uno u otro. Incluso las diferentes consultoras de salud proponen sus propios modelos, tipificándolos como exitosos, aunque con escasa o nula base empírica, dificultando así la elección de un modelo universal (Chu et al., 2000; Fertman, 2015; Goetzl, 2005).

Modelos de planificación de programas de promoción de la salud en el trabajo

La OMS ha propuesto un modelo que representa los rasgos esenciales de buena parte de los modelos reseñados en la literatura. La elección de uno u otro está sujeta a la política de la propia organización y al criterio de las personas encargadas de dirigir el proceso de planificación, implementación y evaluación de los programas. La mayoría de los modelos propuestos en la literatura internacional se basan en el Ciclo de Deming propuesto inicialmente por Shewhart (1924) (Deming, 1989). El ciclo plantea un eje circular basado en la mejora continua que va desde la identificación de un problema hasta la generación de soluciones y su propia evaluación. En el ciclo se exponen seis

pasos desde que se identifica el problema (Paso 1) hasta que se evalúa la solución (Paso 6). Para alcanzar este último punto, previamente se han tenido que suceder unos procesos internos en la tarea, cuya conclusión unitaria ha de llevar a la conclusión global, que, nuevamente, volvería a iniciar el proceso, aunque, ya con las mejoras incorporadas sobre la acción o conjunto de acciones sobre las que se aplica. Los citados mecanismos, representativos de la base teórica del modelo, pueden observarse caracterizados en la Figura 7 (Alcón, Chávez, Gómez y Nardi, 1993, p. 9).

Figura 7. Modelo circular basado en el ciclo de Deming

Adaptado de "El concepto de calidad total adaptado a un centro de información", de Alcón, S., Chávez, A.T., Gómez, N., y Nardi, A.M., 1993, p. 9, En Cuarto Encuentro para la Integración de Bibliotecas y Centros de Documentación de las Fuerzas Armadas., Buenos Aires, 7- 8 October 1993. (*Unpublished*) [Conference paper].

Algunos de los modelos organizativos más notorios, han sido los modelos de organización comunitaria americanos (Fertman, 2015), así como otros modelos clínicos rurales para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, en el campo de las organizaciones se han venido implementando modelos de planificación específicos que fomentan la salud en el lugar de trabajo. Uno de los más conocidos es el propuesto por la OMS, que establece un proceso de mejora continua que parte de una fase de planificación y que, progresivamente, va incorporando la priorización de tareas, la consecución de dichas tareas y la reevaluación del modelo. De igual modo, los ejes centrales sobre los que incide el modelo parten, de forma integrada, de un ambiente físico, los recursos, la involucración de las empresas de la comunidad y los entornos psicosociales propios de las mismas. El compromiso de liderazgo basado en la ética, los valores y la participación de los trabajadores se encuentran en el eje central del modelo recogido en la Figura 8 (OMS, 2010b, p. 12).

Figura 8. Modelo de promoción de la salud en las empresas de la OMS

Nota. Recuperado de “Entornos Laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS. Contextualización, prácticas y literatura de apoyo”, por Organización Mundial de la Salud, 2010, p. 12, Washington, United States: WHO.

El citado modelo de la OMS promueve un carácter integrador en torno a cuatro áreas distinguidas, que confluyen en el centro cultural de las organizaciones. Sin embargo, partiendo de la anterior concepción circular, seguidamente se recogen los modelos de planificación de los programas de promoción de la salud y destacados en la literatura y sus principales características. Sirva una apreciación de los mismos, para estudiar la enorme heterogeneidad existente citada en la literatura (Chu et al., 2000) (Tabla 4).

Tabla 4. Modelos de planificación de la promoción de la salud en el trabajo en el campo internacional

Modelo	Autores o instituciones	Principales características
Modelos de planificación de la promoción de la salud en el trabajo con base institucional en Estados Unidos		
Modelo <i>PRECEDE-PROCEED</i>	(Green, Kreuter, Deeds, Partridge, y Bartlett, 1980)	El modelo <i>PRECEDE-PROCEED</i> es una estructura integral para evaluar las necesidades de salud para diseñar, implementar y evaluar la promoción de la salud y otros programas de salud pública para satisfacer esas necesidades

Modelo	Autores o instituciones	Principales características
Centro de Control y Prevención de Enfermedades	<i>(Centers for Disease Control and Prevention Workplace Health Model – CDC MODEL)</i>	Consta de una definición de los riesgos de la salud de los empleados y un proceso planificado que desarrolla los componentes de la salud en el lugar de trabajo
Modelo <i>Wellness Council of America Focus on Small Business</i>	WELCOA	WELCOA es una organización de asociados que ha desarrollado un modelo de planificación sistemático que recoge en siete aspectos las necesidades de las pequeñas y medianas empresas
Modelo <i>SafeWell</i>	<i>Harvard School of Public Health Center for Work, Health and Well-Being</i>	El modelo incluye mecanismos para la toma de decisión, planificación de los programas, implementación y evaluación para la mejora de la salud del trabajador
Modelos de planificación de la promoción de la salud en el trabajo internacionales e institucionales		
Modelo de promoción de la salud en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)	OMS	Se trata de un modelo de referencia cuya aplicación puede ser versátil en gran parte de las organizaciones, independientemente de su tamaño
Modelo de planificación europeo – <i>European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP)</i>	ENWHP	Promueve el desarrollo del programa seguido de una evaluación final
<i>The Occupational Safety and Health Management System Management Model (OSHM)</i>	OSHM	Desarrolla un modelo integral dirigido a organizaciones y comunidades con una base diagnóstica y una evaluación posterior
Modelos de planificación referentes expuestos por la comunidad científica		

Modelo	Autores o instituciones	Principales características
Modelo de planificación propuesto por David Chenoweth (1987)	(Chenoweth, 1987)	David Chenoweth fue uno de los pioneros en la teoría de la planificación de la salud en el trabajo. Su primera obra titulada <i>Planning health promotion at the workplace</i> supuso un punto de partida sólido y basado en evidencias empíricas hasta 1987
Modelo de planificación de Carolyn Cox Ed. (2003)	(Cox, 2003) ACSM	Establece que las necesidades de los programas efectivos incluyen los siguientes elementos esenciales: establecimiento de necesidades y evaluaciones; revisión de las intervenciones más efectivas; prevención de recaídas y el desarrollo de una cultura del bienestar
Modelo de planificación propuesto por Nicolas Pronk. Ed. (2009)	(Pronk, 2009a) ACSM	Sugiere emplear distintas herramientas y estrategias con el fin de alcanzar la efectividad de los programas
Modelo de planificación propuesto por Carl I. Fertman (2015)	(Fertman, 2015)	Fertman basa su modelo de planificación en tres fases: planificar, implementar y evaluar. Asimismo, incorpora seis pasos: identificar las partes del programa, diagnosticar la información, identificar problemas para establecer objetivos, identificar los niveles de actuación, identificar el enfoque, la teoría y el mejor modelo teórico y, finalmente, aplicarlo
Otros modelos germinales		
Modelo propuesto por O'Donnell (1994)	(O'Donnell, 1992)	O'Donnell fue uno de los pioneros en publicar obras en relación con la promoción de la salud en el trabajo que abordó el concepto de planificación

Modelo	Autores o instituciones	Principales características
Modelo <i>Workplace Wellness</i> (Grant y Brisbin, 1992)	(Grant C y Brisbin R, 1992)	En su obra titulada <i>Workplace Wellness: the key to higher productivity and lower health costs</i> , arrojan ideas y diseños de las oficinas incorporando gimnasios y planos para su diseño en oficinas. En el año 1992, España todavía no contaba con ello
Modelo <i>Well Now</i> (Eddy y Kahler, 1992)	(Eddy y Kahler, 1992)	Uno de los primeros programas que se implementaron basado en componentes integrales

Nota. Fuente: Elaboración propia (2018).

En España, el INNST ha promovido la utilización de un modelo que parte teóricamente del propuesto por la ENWHP y la Declaración de Luxemburgo, donde, al igual que en modelos anteriores, de nuevo el liderazgo, la participación y la adecuada comprensión de la cultura corporativa, se conforman como elementos esenciales de la PST orientados a los resultados esperados (Figura 9).

Figura 9. Modelo de PST propuesto por el INSST

Nota. Recuperado de “Modelo Europeo de referencia para la PST”, de European Network for Workplace Health Promotion, traducido por Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 24 de noviembre, 2017. Recuperado de www.insht.es/portal/site/PromocionSalud

A su vez, han destacado otros modelos basados en certificaciones, documentos de buenas prácticas, como la Certificación Empresa Saludable, de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) (Sanchez-Toledo Ledesma, 2012) u otras certificaciones privadas. La existencia de tal variedad normativa y procedimental no parece clarificar un modelo eficaz capaz de enfrentarse a la particularidades organizativas, culturales y sociales de las organizaciones. Esta situación, a su vez,

establece un estado de la cuestión interesante teóricamente, pero heterogéneo en lo que a la disparidad de modelos se refiere, pese a que estos modelos reúnen determinados puntos en común (Chu, Koh, Moy, y Müller-Riemenschneider, 2014; Renaud et al., 2008).

2.3.2.6 El lugar de trabajo: un nuevo desafío organizativo

El lugar de trabajo, en tanto ocupa un eje central en la sociedad contemporánea, ha quedado conformado, pues, como un entorno fructífero y eficaz para alcanzar unos hábitos de vida saludable. Dada la centralidad del trabajo en nuestra sociedad contemporánea, los hábitos saludables y su promoción han guardado una estrecha relación con las demandas sociales. Más concretamente, según Thompson en el estudio sobre tendencias internacionales del *fitness* publicado por la ACSM, se identificaron las nuevas tendencias más destacadas de la citada industria. Desde entonces, la promoción de la salud en el lugar de trabajo ya aparecía en la posición número 14 en una clasificación de 20 actividades que, si bien es cierto que no se encuentran implícitas en el lugar de trabajo, es posible que las actividades de promoción de la salud en el entorno laboral incorporen alguna actividad exitosa tipificada como tendencia en el citado estudio (Thompson, 2018). En un informe publicado en castellano editado en 2015 por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el periodista Javier Reyero ilustra una distribución de los programas que ofrecen programas de *wellness* o bienestar corporativo en el mundo (Reyero, 2015, p. 131). A este respecto, es posible visibilizar el peso representativo de Norteamérica, que recoge un 79% de los programas de *wellness* corporativo mundiales, seguidos de Australia (47%) y, después, Latinoamérica, Europa y Asia (46%). El continente en el que existen menores representaciones de los programas es África, con un 38% (Figura 10).

Figura 10. Pesos porcentuales de las zonas geográficas que ofrecen programas de promoción de la salud en el mundo

Nota. Adaptado de “Empresas activas, empresas sanas. Beneficios de la actividad física en el entorno laboral”, de Reyero, J., 2015, p. 131, Madrid, España: CEOE. Fernández, M.A., [infografía], ABC.

Asimismo, Reyero también señala los componentes de los programas más recurrentes en Europa. Así, aquellos programas basados en políticas vacacionales u horarios de trabajo flexibles representan entre el 66 y el 69% de los programas implementados por las organizaciones europeas. Por su parte, el 40% de las iniciativas emplean gimnasios o centros de *fitness* y únicamente el 33% de los programas ofrecen servicios médicos en el lugar de trabajo, tal como muestra la Figura 11 (Reyero, 2015, p. 131).

Figura 11. Programas implementados en Europa

Nota. Adaptado de “Empresas activas, empresas sanas. Beneficios de la actividad física en el entorno laboral”, de Reyero, J., 2015, p. 131, Madrid, España: CEOE. Fernández, M.A., [infografía], ABC.

Es importante destacar la reciente aparición de literatura científica en torno a la organización y planificación de dichas actividades en el entorno laboral. España, a su vez, es un reflejo de lo que han sido el resto de los países en el plano internacional. Progresivamente han ido apareciendo informes de diferentes organismos, si bien se muestran buenas prácticas que, si bien parecen interesantes, no parecen concluir una adaptación real al contexto (CSD, 2010; INSST, 2017; Reyero, 2015; School, 2013). De igual modo, el gobierno también ha participado con diferentes iniciativas de promoción (CSD, 2010; Paris, Franco, y París, 2012), aunque han permanecido inertes en buena parte de las empresas españolas.

Aunque han aparecido publicaciones que han abordado el objeto de nuestra investigación, lo cierto es que la literatura científica existente arroja un estado de la cuestión que invita a la realización de intervenciones rigurosas, localizar las variables que permitan encontrar los efectos específicos y establecer los componentes apropiados de los programas. Asimismo, la experiencia de las empresas y las organizaciones en el campo es todavía escaso y reducido, si bien el creciente interés de las organizaciones por la salud de las personas como principal capital ha facilitado un campo incipiente para el campo de conocimiento de la sociología y, más concretamente para el objeto de estudio que nos ocupa, el campo de conocimiento de la organización de la actividad física y del deporte.

2.4 LA EVALUACIÓN PROGRAMAS SOBRE EL TRABAJADOR Y LA ORGANIZACIÓN: EPIDEMIOLOGÍA, DETERMINANTES Y EVIDENCIA EXISTENTE

2.4.1 Epidemiología lesional en los puestos de trabajo de oficina

Una ocupación laboral sedentaria guarda relación con las denominadas enfermedades del siglo XXI, como podrían ser la diabetes o la depresión; e incluso síndromes diagnosticados, como el síndrome metabólico (Lemon et al., 2009; Varo, Martínez, y Martínez-Gonzalez, 2003).

Una reciente revisión sobre las enfermedades de origen laboral en España, mostró en el año 2006 que la mayoría de las enfermedades predominantes vinculadas a trabajos de oficina fueron osteomusculares (49,1%), seguido del estrés, depresión o ansiedad (14,7%) en hombres y de 48,6 y 16,8 % en mujeres (García y Gadea, 2008). En un estudio reciente se estableció una prevalencia de trastornos psiquiátricos asociados a personas con dolor crónico, extendiéndose en un 31%, más concretamente, un 12% de los pacientes sufría ansiedad (Reme, Tangen, Moe, y Eriksen, 2011). Parece lógico pensar que, en el plano internacional, los datos han venido propiciados por los diferentes contextos y realidades empresariales. Un estudio reciente que aglutinó a 5277 personas, de las cuales el 80% fueron mujeres, los trastornos musculoesqueléticos crónicos en el cuello tuvieron una incidencia de un 15% en mujeres y un 9% en hombres. Estos datos estuvieron fuertemente relacionados con dificultades para conciliar el sueño y un elevado índice de masa corporal, sobre todo en mujeres (Kääriä et al., 2012).

De acuerdo con la literatura existente en las bases legislativas, algunas derogadas (R.D. 1995/1978, de 12 de mayo, 1978), García Gómez, Castañeda López, Herrador Ortiz, López Menduiña, Montoya Martínez y Álvarez Maeztu (2017), en su informe recogido en el Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, señalan que las enfermedades profesionales (EP) se clasificaban en los siguientes grupos:

- Producidas por agentes químicos
- Por inhalación de sustancias
- Infecciosas o parasitarias
- Producidas por agentes físicos
- Enfermedades sistemáticas
- Agentes o sustancias no comprendidas en otros apartados (p. 25).

No obstante, la nueva norma en vigor desde 2006 (R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, 2006) explicita los “agentes biológicos” (Grupo 3) y, en el Grupo 6, “las (...) causadas por agentes carcinogénicos” (p. 6).

Pues bien, de acuerdo con el precitado informe, si analizamos la evolución de dichas enfermedades en España, de las producidas por los agentes físicos, motivados por discapacidades auditivas, exposiciones ópticas y problemas causados por vibración, vemos que los datos señalados con anterioridad guardan una estrecha relación en su evolución con los agentes físicos que las provocan recogidos en la Figura 12 (García Gómez, et al., 2017, p. 39).

Figura 12. Enfermedades profesionales por grupo de enfermedad y sexo en España entre 1990 y 2014

Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez Maeztu, E., 2017, p. 39. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Más concretamente, las enfermedades ocasionadas por factores físicos, según los datos que ofrece el citado informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pertenecen en un 94% de los casos a aquellas que afectan al aparato locomotor, seguido de problemas osteoarticulares (García Gómez et al., 2016) siendo estos, hasta en un 83,1%, principalmente declarados en mujeres. En los hombres, igualmente esta tendencia fue corroborada en el informe en un 89% de los casos. Los aspectos físicos más reseñables en una oficina guardan relación con la ergonomía ambiental. Así, la acústica, el confort térmico y la fatiga visual se constituyen como físicos destacables del trabajo en oficinas.

Por su parte, existen crecientes evidencias que señalan la relación entre los factores físicos y la aparición de los trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos se conforman como una consecuencia de los factores físicos y organizativos en las empresas. Asimismo, los trastornos musculoesqueléticos derivados de estas situaciones son la manipulación manual de cargas, una mala higiene postural, movimientos repetitivos, vibraciones, escasa iluminación, posturas estáticas prolongadas y altos ritmos de trabajo. Estos riesgos parecen correlacionarse con otros factores de riesgo psicosocial, como el estrés o la insatisfacción laboral (Navidian, Saber, Rezvani Amin, y Kianian, 2014; Ohta, Takigami, y Ikeda, 2007; Varekamp, Verbeek, de Boer, y van Dijk, 2011). La evolución hasta el año 2013 puede observarse en la Figura 13 (García Gómez, et al., 2017, p. 41).

Figura 13. Evolución de las enfermedades profesionales según grupo de enfermedad en España entre 1990 y 2014

Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez Maeztu, E., 2017, p. 41. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

De igual modo se observa una tendencia creciente a partir del año 2007 por encima de los 10 años de antigüedad en la empresa en la Figura 14 (García Gómez, et al, 2017, p. 44).

Figura 14. Evolución del porcentaje anual de las enfermedades profesionales según la antigüedad en el puesto de trabajo en España entre 1990 y 2014

Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez Maeztu, E., 2017, p. 44. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por sector de actividad, en este informe igualmente se muestra un punto de inflexión con relación al sector de actividad, observándose a principios de 2012 un crecimiento del sector servicios, en detrimento de la industria. En vista de la literatura existente, los datos sugieren una mayor presencia de exposición a las enfermedades propiciadas por los hábitos de vida vinculados a las tareas de oficina detallados en la Figura 15 (García Gómez, et al., 2017, p. 49).

Figura 15. Porcentaje anual de enfermedad profesional por sector de actividad en España entre 1990 y 2014

Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez Maeztu, E., 2017, p. 49. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La Figura 16 muestra una distribución de las tasas de enfermedades profesionales en España. Más concretamente, la Comunidad Valenciana registró en este periodo una tasa moderada de entre 38,37 y 94,82 nuevos casos por cada cien mil trabajadores, oscilante hasta en 30,9 nuevos casos de otras regiones como buena parte de Andalucía, Castilla y León y Galicia, aunque con una menor tasa de enfermedades profesionales que otras Comunidades Autónomas como la zona norte de España, más concretamente, la Comunidad Foral de Navarra, el País Vasco y Asturias, dados los sectores industriales y mineros propiciados de su industria, el riesgo sigue siendo alto (García Gómez, et al., 2017, p. 89).

Figura 16. Distribución de las tasas de enfermedades profesionales causadas por agentes físicos en España entre 1990 y 2014

Recuperado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Álvarez Maeztu, E., 2017, p. 89. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Estos datos son igualmente contrastables con la literatura científica internacional (Fertman, 2015). A tenor de esta información, todo parece indicar que la promoción de la salud se construye con base en una raíz cultural centrada en el músculo productivo de un país. En el caso de España, dada la significativa distribución de las tareas administrativas por parte de las Comunidades Autónomas, es posible vislumbrar no solamente una realidad plural y diversa, sino enormemente heterogénea.

En este sentido, parece lógico que los programas de promoción de la salud en las organizaciones, si bien parten de una matriz esencial común a todos los países, como es la prevención de las enfermedades y la mitigación de los riesgos y el peligro ante determinadas actividades laborales, lo cierto es que las particularidades del contexto, entendiéndolo desde la complejidad del entorno, el ambiente y los recursos económicos disponibles, propicia que ha de atenderse a cada caso particular en vista de ofrecer programas específicos de intervención en la promoción de la salud en el trabajo. No obstante, la evidencia encontrada sugiere que estos partan de una homogeneidad en su planificación con el fin de unificar criterios y contrastar los resultados sobre su impacto y viabilidad en los diferentes contextos empresariales y geográficos.

De igual modo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España había 3.346 organizaciones entre 200 y 499 empleados asalariados. Significativamente superior en número que sus homónimas por encima de 500 y hasta 5000 o más empleados, independientemente de su condición jurídica (INE, 2015) (Figura 17).

	Total 2014
De 200 a 499	3.346
De 500 a 999	942
De 1000 a 4999	646
De 5000 o más asalariados	103

Figura 17. Empresas por estrato de asalariados y condición jurídica

Nota. Adaptado de “Salarios, ingresos y cohesión social”, de Instituto Nacional de Estadística (INE). 02 de febrero, 2015, recuperado de <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10885>

Con estas cifras, la evolución del número de enfermedades profesionales en España en las empresas de entre 50 a 294 trabajadores experimentó una incidencia de 227,8, muy superior a las pequeñas empresas o *micropymes* (considerada entre 1 y 5 trabajadores), cuya incidencia no superó los 81,9 nuevos casos, o el 85,2 de las organizaciones por encima de 500 trabajadores. La Figura 18 muestra la mencionada incidencia (García Gómez, et al., 2017, p. 181).

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 a 5 trabajadores	26,7	29,9	33,7	40,7	52,1	56,5	68,3	74,8	91,3	104,6	103,8	70,3	58,6	72,6	72,0	67,5	78,6	75,2	82,5	81,9
6 a 49 trabajadores	54,1	66,2	73,8	91,7	108,0	132,6	155,7	166,4	192,2	222,4	218,3	154,4	129,9	158,4	151,7	141,2	151,0	162,1	157,9	166,6
50 a 249 trabajadores	109,5	126,8	134,7	175,0	216,3	247,2	256,7	266,4	307,6	335,8	342,9	244,8	189,8	222,4	207,1	216,4	225,9	232,9	229,0	227,8
250 a 500 trabajadores	84,1	93,7	124,5	145,3	234,9	255,7	285,5	306,7	296,5	326,1	298,4	238,2	196,7	218,6	210,9	202,5	229,4	205,7	229,1	209,6
500 y más trabajadores	30,9	39,7	51,2	67,0	91,6	112,3	135,7	150,8	126,4	79,6	77,4	78,5	60,5	70,0	65,8	64,3	75,5	71,7	78,7	85,2

Figura 18. Incidencia de enfermedades profesionales reconocidas en España durante el periodo 1995–2014 según el tamaño de la empresa

Adaptado de “Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014)” de García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduina, P., y Álvarez Maeztu, E., 2017, p. 181. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En la Comunidad Valenciana el crecimiento de dicha incidencia de enfermedades reconocidas se incrementó abruptamente en 36,5/10⁵ más con respecto al año 2013, siendo la segunda comunidad autónoma con un crecimiento de la incidencia de enfermedades profesionales con respecto al año anterior, solo por detrás de La Rioja, que experimentó en este mismo marco temporal un crecimiento 56/10⁵. Dicho crecimiento, de manera menos pronunciada, se vio reflejado en Aragón (10/10⁵), Galicia (12,3/10⁵) y se mostró estable en el resto de las Comunidades Autónomas.

En un estudio elaborado por la Universidad de Reims (Francia), los investigadores encontraron una estrecha relación de los factores vinculados con la ocupación laboral con el desarrollo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). La actividad física, para esta enfermedad predominante en Europa se mostró protectora (OR = 0,7) (Kraïm-Leleu, Lesage, Drame, Lebargy, y Deschamps, 2016). De igual modo, otras enfermedades físicas han guardado relación con los trastornos musculoesqueléticos. Diversos estudios apuntan a la relación que la prostatitis crónica manifiesta con el dolor pélvico y su incidencia sobre la ansiedad y la depresión de los pacientes (Anderson, 2004; Tripp, Crawford, y Nickel, 2017).

Cabe señalar igualmente la importancia que muestran estas relaciones, pues en el origen físico y clínico de las enfermedades, se desencadenan complejos estados de salud que afectan a los factores físicos y mentales de los pacientes. Otras investigaciones refieren que el lugar de trabajo puede ser un entorno que afecta al estilo de vida de los pacientes afectados de prostatitis crónica, pero no el único (Wang et al., 2016). La actividad física en niveles elevados, parece incidir en la reducción del dolor pélvico y su relación con la prostatitis crónica (Ran Zhang, Andrea K Chomistek, et al., 2015).

En el plano ocupacional, determinadas ocupaciones laborales parecen construir una hipótesis para el desarrollo de otras enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico y la diabetes, si bien, estas asociaciones todavía no se muestran de forma confirmatoria (Wang, Armstrong, Cairns, Key, y Travis, 2011). Concretamente, la prostatitis crónica, como después observaremos, si bien no ha sido entendida como un problema de salud pública, muestra, a su vez, un claro ejemplo de la complejidad de establecer programas específicos de ejercicio físico y que estos pueden venir determinados por las políticas sanitarias del entorno. Por ejemplo, a pesar de su epidemiología, donde en América, Asia y Europa entre un 2 y un 10% de los adultos presentan síntomas, estos pueden confundirse con otras enfermedades (Jiménez-Cruz y Broseta-Rico, 2005).

Por su parte, la enfermedad se muestra con arreglo a una gran variedad de síntomas (Schaeffer, 2008) y hoy en día, unido al estilo de vida, parecen estimar que los problemas de próstata, pero también cardiopatías, cáncer de mama y diabetes, seguirán creciendo entre la población en edad de trabajar (Crawford, Graveling, Cowie, y Dixon, 2010).

2.4.2 Un hipotético camino hacia el aminoramiento de los factores de riesgo

2.4.2.1 Justificación y propósito

La literatura científica reciente sigue mostrando la prevalencia de enfermedades vinculadas con los puestos de trabajo en oficina, lo cual parece evidenciar la necesidad

de localizar los mejores protocolos preventivos y de tratamiento. No obstante, las intervenciones no parecen sencillas. Los puestos de trabajo en oficina presentan una situación diversa con relación a las funciones a realizar en el trabajo. Además de la complejidad que en sí mismo viene dado por el tipo de trabajo y el contexto general de la organización, a menudo los problemas físicos muestran una estrecha relación con problemas mentales. Estos problemas, a menudo vienen influidos por el contexto laboral y psicosocial (Crawford et al., 2010; Heath et al., 2012; Tripp et al., 2017; Ran Zhang, Andrea K Chomistek, et al., 2015). De igual modo, a menudo aparecen sintomatologías que, si bien pueden asociarse a enfermedades descritas y propias del sedentarismo, otras, como la prostatitis crónica, esconde sus síntomas o pueden confundirse con dolor crónico. Dados los supuestos beneficios de los programas de promoción de la salud en las organizaciones, los distintos sellos, certificaciones y políticas laborales han acogido, también en Europa, diferentes medidas de intervención.

Con el fin de establecer un marco teórico amplio, se han expuesto ya algunos de los aspectos más relevantes acerca de la planificación e implementación de los programas de intervención. Sin embargo, ante la disparidad de las enfermedades predominantes y la ya conocida influencia del ejercicio físico en sobre su abordaje clínico (Pedersen y Saltin, 2015), hemos decidido poner el foco en las enfermedades que, dada su complejidad, permitía ilustrar teóricamente la problemática clínica existente a la hora de implementar programas de ejercicio físico en el lugar de trabajo sobre diferentes enfermedades.

Nuestro interés en este capítulo breve posee tres fases claramente diferenciadas: en primer lugar, justificar el marco de estudio incipiente en el objeto de estudio; en segundo lugar, reflexionar sobre la dificultad de encontrar los parámetros que puedan incidir sobre el tratamiento de enfermedades complejas clínicamente, como la prostatitis crónica y, por último, desarrollar la línea de investigación hacia el descubrimiento de la prostatitis crónica como enfermedad laboral y sus hipotéticos protocolos de tratamiento empleando la actividad física como mecanismo coadyuvante a los tratamientos farmacológicos. En todo caso, nuestro propósito pretende abarcar la compleja fenomenología del tratamiento y la prevención de las enfermedades en el lugar de trabajo. Es por ello que se hace preciso intervenir de forma apropiada desde la promoción de la salud en las organizaciones (Benavides et al., 2008). Por ejemplo, para el tratamiento de la CP/CPPS, se hace difícil generalizar el programa a implantar y evidencian la importancia de establecer un marco de planificación apropiado en los programas de promoción de la salud en las empresas, sobre todo en la fase de diagnóstico.

2.4.2.2 Composición de los programas de promoción de la salud en las empresas: latencias y evidencias

La literatura científica se ha hecho cargo de diferentes casos vinculados a las enfermedades ocupacionales, constituyendo la actividad física como un elemento coadyuvante a los tratamientos convencionales, contribuyendo así a una reducción en los riesgos derivados del trabajo (Heath et al., 2012; Kuijpers et al., 2013; Li y Siegrist, 2012). No obstante, la enorme heterogeneidad existente de los programas y las enfermedades, sobre los que inciden los distintos factores sociales, culturales y

organizacionales, hace complicado establecer un foco de actuación homogéneo (Rongen et al., 2013).

Por su parte, Sorensen y Quintiliani (2009) mostraron una revisión actualizada en la que se recogía una evidencia contrastada de los programas que empleaban diferentes componentes (no solamente actividad física, sino aspectos nutricionales, prevención de la salud, factores de riesgo en enfermedades, etc.) que mostraron fuertes evidencias sobre parámetros antropométricos y físicos, más concretamente, sobre la pérdida de peso, tensión arterial y reducción del colesterol; incremento de los hábitos de la actividad física y adherencia a hábitos de vida saludables, satisfacción y bienestar, reducción de la mortalidad y otros parámetros organizacionales, como la reducción del absentismo y los accidentes, el retorno de las inversiones de los programas y la reducción de los costes por enfermedad.

De igual manera que la literatura muestra fuertes evidencias por estos programas multicomponente, todavía muestra latencias o vacíos de conocimiento empleando como vehículo del programa exclusivamente la actividad física. Precisamente diversos autores sobre parámetros antropométricos y físicos, como en la promoción de hábitos de salud, la reducción del estrés en el trabajo o un fuerte decrecimiento de los factores de riesgo en el trabajo, además de fuertes retornos de la inversión (Shepard, 1996; Dishman et al., 1998 y Proper et al., 2002). Otros estudios se han encargado de realizar de forma metaanalítica una revisión crítica de los aspectos clave que ha de reunir el programa de intervención. A este respecto, todo parece indicar que los parámetros organizacionales y psicosociales a tratar en los programas de promoción de la salud, considerados integrales, parecen establecerse causalmente con la salud de los empleados con base en unos factores clave (Goetzel y Ozminkowski, 2008).

A menudo los programas muestran interesantes retornos, pero grandes inversiones (Gussenhoven et al., 2013). Asimismo, numerosos estudios de la literatura deciden emplear instrumentos de medición de la salud debidamente validados (Alonso, Prieto, y Antó, 1995; Brazier et al., 1992). Establecer indicadores de salud global o salud percibida, puede ayudar a homogeneizar los protocolos de intervención, si bien, serán determinantes los instrumentos a elegir y su nivel de confiabilidad y validez, además de establecer los mejores recursos para una mejor respuesta clínica de los tratamientos, ayudados también a la actividad física supervisada por profesionales interdisciplinarios, en comunión con los agentes sanitarios.

2.4.3 Evidencia existente de los programas sobre la salud percibida

La salud percibida se ha conformado como una variable apropiada para conocer el estado de salud de una persona. Sin embargo, las observaciones médicas pueden ser diferentes a las que realiza de forma interna una persona sobre su salud. Diversos estudios han argumentado la importancia que tendría conocer ambos enfoques, no obstante, si bien focalizar la evaluación de la salud sobre una perspectiva externa puede arrojar una visión demasiado lejana del paciente, también es cierto que no parecen coincidir las decisiones que adoptan los especialistas en salud con relación a la percepción de los pacientes (Kleinman, 1988, 1997; Sen, 2002). A menudo, la percepción de la salud ha estado relacionada con la calidad de vida de las personas (Alonso, 2000).

Se han encontrado revisiones sistemáticas que incorporan técnicas de metaanálisis para determinar la eficacia de diferentes instrumentos que miden la salud percibida (Herdman, Fox-Rushby, y Badia, 1997; Leysen et al., 2015).

Uno de los instrumentos más relevantes es el cuestionario SF-36, que determina, bien en una versión larga (36 preguntas) o corta (12 preguntas) la percepción de la salud física y mental (Ware Jr y Sherbourne, 1992). La literatura científica señala fuertes evidencias con relación a la actividad física sobre la calidad de vida de los sujetos adultos en diferentes condiciones: programas de recuperación cardiaca (Jette y Downing, 1994) y empleando ejercicios de diversa intensidad, o específicos, como el Tai Chi (Wang, Taylor, Pearl, y Chang, 2004).

En el lugar de trabajo, también parecen encontrarse asociaciones interesantes. En un estudio realizado con empleados del sector del acero, se realizó un programa educativo con el fin de analizar si incidía sobre la calidad de vida. Se encontraron mejoras en algunos aspectos de la calidad de vida de los trabajadores, aunque no de forma significativa (Santos, Bredemeier, Rosa, Amantéa, y Xavier, 2011).

2.4.3.1 Salud física

Condición física: parámetros físicos y fisiológicos

Se han encontrado asociaciones con otros factores físicos, como la pérdida de peso, el IMC y la condición física en general. Con el fin de evaluar si un programa de ejercicio físico corporativo verdaderamente incidía sobre las personas inactivas, un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de Sídney trataron de determinar el impacto sobre diversos parámetros. Sus resultados arrojan que tras cuatro meses de seguimiento hubo reducciones en las medidas antropométricas peso y perímetro de cintura, si bien no resultaron estadísticamente significativas (Macniven, Engelen, Kacen, y Bauman, 2015).

Por el contrario, estos datos contrastan con otros hallazgos que han establecido otros estudios recientes, que han alcanzado mejoras significativas en la calidad de vida y también sobre otros indicadores físicos y mentales (Harding, Freak-Poli, Backholer, y Peeters, 2013; Martin, Sanderson, y Cocker, 2009). Diversos estudios también han hallado efectos sobre el VO₂ máx y otros parámetros físicos (Atlantis, Chow, Kirby, y Fiatarone Singh, 2006; Blair, Piserchia, Wilbur, y Crowder, 1986), si bien, la disparidad de los resultados sugieren que el tipo de programa y el lugar de trabajo son elementos que, con arreglo a la literatura existente, no permiten establecer una homogenización de los protocolos y establecer una generalización de los resultados.

Ante dicha variabilidad, todo parece indicar que no todos los estudios han podido controlar la actividad física de los sujetos fuera del lugar de trabajo (Macniven et al., 2015). En este sentido, cabe esperar determinar que los programas de intervención han de adaptarse a las circunstancias organizacionales de las empresas españolas.

La efectividad de los programas de actividad física: prevención y efectos

La actividad física moderada y acumulada al menos en 60 minutos semanales se posicionó como un predictor en la calidad de vida de los sujetos adultos sedentarios (Acree et al., 2006). Otros autores han hallado evidencias relevantes en las que un programa de fuerza puede ayudar a disminuir los problemas físicos en adultos mayores, donde se han sugerido el empleo de instrumentos apropiados y enfoques de intervención multidisciplinarios (Liu y Latham, 2011).

A pesar de que los programas de ejercicio físico pueden conformar una mejora para la adherencia a la actividad física, en una revisión sistemática con metaanálisis reciente se hallaron que los programas de actividad física, en general, tienen efectos pequeños sobre la adherencia, si bien, las más efectivas se mostraron en los casos en los que los programas se dirigieron expresamente a mejorar el estilo de vida, así como los programas de caminar, por delante de otros fueron lo más efectivos (Abraham y Graham-Rowe, 2009).

En una revisión metaanalítica se encontraron que los sujetos con mejor capacidad aeróbica, presentaban una respuesta al estrés psicosocial significativamente más reducida el grupo control (Crews y Landers, 1987). De igual modo, la presencia de un mayor estrés guarda una relación con la activación del sistema nervioso, a menudo motivado por la presencia de enfermedades que lo activan como la hipertensión o determinadas enfermedades crónicas (Landers, 1994).

A tenor de los resultados, parece verosímil atender a la organización de los programas de ejercicio físico en Europa desde un enfoque apropiado, homogéneo y capaz de adaptarse al contexto y, más específicamente, al tipo de trabajo y sus funcionalidades. En este sentido, intuimos que la fase de diagnóstico será un aspecto esencial.

2.4.3.2 Salud mental

Depresión, ansiedad y estrés en el lugar de trabajo

La depresión, la ansiedad y el estrés son importantes problemas de salud pública. El lugar de trabajo se ha considerado como un lugar importante para el desarrollo de intervenciones específicas (Mingote Adán, Pino Cuadrado, Sánchez Alaejos, Gálvez Herrero, y Gutiérrez García, 2011; Tan et al., 2014). Asimismo, las complejas realidades asociadas a cada lugar de trabajo han dado lugar a la aparición, incluso, de otros parámetros determinantes del estado de salud mental y físico de los trabajadores, como el síndrome del burnout o del trabajador quemado (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005). Si bien, una de las primeras obras rigurosas que abordó el estado de la cuestión con relación al estrés fue la propuesta por el médico Hans Selye, quien en 1956 estableció un marco de discusión acerca de esta nueva situación mental a explorar, estrechamente relacionada con la depresión (Selye, 1956). Desde entonces y según los datos epidemiológicos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, se calcula que más de 300 millones de personas en el plano internacional padecen depresión, siendo más padecida en mujeres que en hombres. Asimismo, se calcula que la depresión es una

de las mayores causas de morbilidad en el mundo (OMS, 2001). Entre el 15 y el 20% de las personas del mundo, esto es, 1 de cada 6 personas, sufre un trastorno mental (Figura 19).

Figura 19. Proporción de la población con trastornos de salud mental y uso de sustancias, 2013

Nota. Recuperado de “Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016)”, de Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 11 de abril, 2018. Recuperado de <http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool>

La depresión, a su vez, es consecuencia de múltiples factores: físicos, sociales y psicológicos. En Europa, los datos de prevalencia de la depresión ha sido del 6,9% (Wittchen et al., 2011). En España, los datos de prevalencia se muestran fluctuantes, siendo estos muy difíciles de comparar, aunque se han observado igualmente las tendencias de género a favor de la mujer (Cardila et al., 2015). A este respecto, en el estudio de Ayuso-Mateos et al. se encontraron prevalencias en la población española de 2,6 % en mujeres, siendo en los hombres una décima inferior a esta puntuación (Ayuso-Mateos et al., 2001). Entre los diversos tratamientos correctivos y preventivos localizados, se encuentra la actividad física (Mammen y Faulkner, 2013; Martin et al., 2009; Strawbridge, Deleger, Roberts, y Kaplan, 2002; Ströhle, 2009).

La cantidad de actividad física y su relación con la calidad de vida y la depresión han sido analizadas. En un estudio con personas adultas, se mostraron correlaciones en la salud general con el tiempo total de la actividad y la salud mental (Salguero, Martínez-García, Molinero, y Márquez, 2011).

De igual modo, este y otros estudios mostraron mejoría de los trastornos depresivos, no obstante, la efectividad de las intervenciones se muestra en una gran variedad de programas. El quid de dicha efectividad se debe a la precisión de la intervención sobre la salud mental, sin embargo, los efectos encontrados todavía son pequeños (Martin et al., 2009).

Otros estudios han manifestado una mayor evidencia. En un reciente trabajo de metaanálisis se concluyó que la actividad física y, más concretamente, los programas de yoga, favorecen significativamente una mejora de la salud mental, así como en trastornos depresivos y la ansiedad, no siendo estos concluyentes sobre el alivio del estrés (Chu et al., 2014). Si bien, también han arrojado una fuerte evidencia otras terapias como las terapias cognitivas conductuales (Tan et al., 2014).

Incidencia de la salud sobre parámetros psicosociales, mentales y organizacionales

La mayoría de los estudios sugieren una gran variabilidad de intervenciones, parámetros y efectos de los programas. Además, intuimos que los factores organizacionales y contextuales de las empresas pueden incidir de forma relevante a la obtención de los resultados. Existen evidencias que los aumentos de los niveles de depresión se encuentran asociados a una calidad de vida deteriorada (Yohannes, Doherty, Bundy, y Yalfani, 2010).

La calidad de vida deteriorada, a su vez, puede provocar efectos sobre el rendimiento en el trabajo y la organización, si bien, de igual modo los efectos se han mostrado moderados. Asimismo, los estudios parecen sugerir la realización de estudios longitudinales que contribuyan a establecer evidencias confirmatorias (Ford, Cerasoli, Higgins, y Decesare, 2011; Renee Baptiste, 2008). A menudo, los instrumentos no se encuentran validados para tales poblaciones, y parece existir un maremágnum llamativo con relación a los indicadores de medida de la salud, confrontando a especialistas y arrojando una evidencia múltiple y variada (Kleinman, 1988, 1997; Sen, 2002). En todo caso, el ejercicio físico se ha mostrado incidente sobre la condición física, la salud autopercebida y la capacidad para el trabajo, si bien algunos estudios requieren de su evaluación metodológica pues, a pesar de seguir un diseño longitudinal y con beneficios tras cinco años de seguimiento, lo cierto es que todavía se localizan estudios con tamaños muestrales muy reducidos (Pohjonen y Ranta, 2001).

A pesar de la variabilidad existente, apenas se han realizado estudios en Europa que demuestren una fuerte evidencia de los programas y los contenidos de estos. De igual modo, hasta la fecha todavía no es posible localizar posicionamientos sólidos con relación a las intervenciones y los criterios de calidad considerando el contexto europeo (Malik, Blake, y Suggs, 2014).

2.4.4 La productividad y los costes de productividad

2.4.4.1 Contexto

Desde un enfoque productivista e integrado, la productividad es un indicador claro a la hora de estudiar la participación de los trabajadores o las políticas de bienestar en las organizaciones (O'Donnell, 2002; Sánchez, 2004). La productividad establece una relación entre la cantidad y la calidad en el trabajo relativa a la inversión de capital en forma de recursos humanos y materiales, encontrándose relacionada con el absentismo y el rendimiento en el trabajo (Shephard, 1995). La literatura científica muestra sólidas evidencias de los programas de promoción de la salud en las empresas, si bien, estos han de estar bien orientados (Goetzel y Ozminkowski, 2008).

La teoría muestra una lógica que tiende a una deducción fisiológica. Así, Shepard (1995) señaló que, en función del tipo de trabajo, los mecanismos fisiológicos se activaban e incidían sobre el poder aeróbico, la fuerza muscular y la tolerancia al calor. Asimismo, la tolerancia al ejercicio no es la misma en atletas que en trabajadores, si bien, parece existir una evidencia contrastada de los efectos que los mecanismos fisiológicos mejorados en el puesto de trabajo, confieren a la condición física y, por ende, a una mejora en la productividad (Shephard, 1995). De igual modo, hace tiempo que sido evidenciado que los trabajos aburridos, manifiestan una baja productividad, manifestando una fuerte relación del componente mental con respecto a la productividad (Martens, 1974).

Asimismo, los datos derivados de una mala salud a menudo incurren en costes asociados al gasto sanitario, bajas laborales y compensaciones para los trabajadores, con la consecuente disminución de la productividad en el trabajo (Goetzel, 2005; Goetzel y Ozminkowski, 2008; Shikdar y Sawaqed, 2003). El estudio de los costes en la productividad han sido señalados por la literatura científica como un elemento clave que demandan los empleadores (Goetzel y Ozminkowski, 2008). De la misma manera, investigaciones recientes también coinciden con la necesidad de seguir reuniendo evidencias empíricas con relación a la eficacia de los programas, su diseño y ejecución, en vista de arrojar conclusiones firmes sobre objeto de estudio (Conn et al., 2009; Goetzel y Ozminkowski, 2008; Rongen et al., 2013). En vista de reducir los costes asociados al absentismo laboral, además de disminuir las pérdidas de productividad asociadas en la salud, los empleadores se han interesado cada vez más en los programas de promoción de la salud en el trabajo. Si bien, los componentes de los mismos, han venido caracterizándose por una enorme heterogeneidad (Rongen et al., 2013).

2.4.4.2 Los costes en la productividad: los grandes olvidados en la literatura

Así, las pérdidas de productividad suponen una mayor tasa de presentismo, no obstante, la literatura científica parece seguir en busca de la incidencia de estos programas y sus componentes de éxito (Aldana, 2001; Chapman, 2003). Parece que la clave consiste en reducir los factores de riesgo asociados al lugar de trabajo, no obstante, numerosos empleadores se muestran todavía incrédulos ante la efectividad de los programas (Goetzel, 2001; Goetzel y Ozminkowski, 2008). La literatura científica ofrece, a su vez, un conjunto amplio y heterogéneo de intervenciones, si bien, muchas de ellas, además de ser investigaciones seccionales, no se encuentran fuertemente influidas por los aspectos organizacionales y contextuales propios de las empresas europeas (Guazzi et al., 2014). De la misma manera, en España, los estudios se siguen mostrando insuficientes (Puig-Ribera, McKenna, Gilson, y Brown, 2008).

2.4.4.3 Evidencia existente: mejora de los hábitos físicos, pero aumento de los costes

En vista de los resultados de los estudios más relevantes, se han hallado efectos de los programas que incluyen actividad física, si bien, habitualmente los costes tendieron también a elevarse (Gussenhoven et al., 2013). Los retornos de las inversiones no resultan sencillos de obtener y se han de tener en cuenta múltiples factores. En este sentido, las pérdidas en la productividad pueden contribuir de forma significativa a estudiar dichos costes (Bouwman et al., 2015).

La evidencia científica todavía no clarifica los instrumentos a emplear, si bien, ya se han realizado revisiones científicas sólidas. En 2012 se publicó en la revista *PharmacoEconomics* la primera revisión que abordaba de forma consistente y sistemática, la eficacia de los instrumentos de pérdida de productividad en el trabajo relacionados con la salud. En dicho estudio, se planteó un vacío de conocimiento con relación a ofrecer futuras herramientas que permitieran controlar mejor esta variable. Poco después apareció publicado el instrumento sobre los costes en la productividad, propuesto por el *Institute for Medical Technology Assessment* (iMTA), de la Universidad de Rotterdam (Bouwman et al., 2015).

El empleo de buenos instrumentos que permitan medir los costes en la productividad puede contribuir a arrojar una mayor evidencia científica, no solamente para el control de los programas, sino para establecer un avance en las relaciones con los empleadores y fortalecer así su confianza en los programas de promoción de la salud en las empresas. Sin embargo, dada su complejidad, se han evidenciado problemas de medida y cantidad de parámetros interferentes que establecen la productividad una medida compleja en los programas de salud en el trabajo (Shephard, 1995).

2.4.4.4 El absentismo y el presentismo laboral: la incidencia del mercado de trabajo

El absentismo es una variable económica que es considerada en la investigación en promoción de la salud. El efecto de la promoción de la salud en las empresas ha sido estudiado en diferentes entornos y colectivos empresariales. A principios de la década de los noventa, los estudios apuntaban a que las personas con mayores niveles de condición física, tenían unos rangos de diferencia en absentismo de entre 0,28 y 2 días por año (Baun, 1995a). Además, la fatiga y el estrés se han mostrado predictores de un mayor absentismo en el trabajo (Mohren, Swaen, Kant, Schayck, y Galama, 2005).

Hoy parece prevalecer la cuestión de encontrar los parámetros que inciden en una relación causal entre la promoción de la salud en las empresas y el absentismo. Porwoll (1980) se refiere al absentismo como la cantidad numérica de días que una persona perdió de actividad laboral motivado por una lesión concreta o pérdida de capacidad (Porwoll, 1980), si bien, este planteamiento no incluyó al número de días por embarazo, problemas familiares o revisiones médicas (Baun, 1995b).

Siguiendo las ideas de Baun (1995b), las causas predominantes del absentismo se deben a la edad, las características actitudinales (en la medida en la que existe una mayor cohesión o satisfacción laboral, el absentismo se muestra menor) y, por último, las características organizacionales, donde se ha podido identificar que, por ejemplo, en organizaciones industriales el absentismo es mayor respecto a otro tipo de trabajo (Baun, 1995b).

Los trabajos seminales de Cox, Shepard y Corey (1981, 1987) mostraron la eficacia de los programas de *fitness* en las organizaciones, si bien, únicamente se han mostrado fuertes evidencias en los programas de rehabilitación, más concretamente, en programas de rehabilitación cardíaca (Steinhardt, Greenhow, y Stewart, 1991).

De igual modo, la incidencia de la actividad física sobre el absentismo se ha visto más pronunciada en mujeres (Tucker, Aldana, y Friedman, 1990). Sin embargo, todavía sigue

latente la cuestión de conocer si los programas de actividad física en el lugar de trabajo pueden procurar una mejora en los hábitos de los empleados y reducir los niveles de absentismo (Baun, 1995b). Partiendo de los estudios incipientes, se sentaron los precedentes de la línea de investigación acerca de estos parámetros, con respecto a tres factores fundamentales: primero, la necesidad de establecer mejores instrumentos que se cercioraran de indicadores de medida más estables; segundo: la realización de trabajos longitudinales y, tercero: estudiar los factores vinculados con el absentismo en función del tipo de trabajo, organización, género y edad (Baun, 1995b).

El presentismo, asimismo, se encuentra relacionado con la pérdida de productividad (Goetzel y Ozminkowski, 2008). El presentismo consiste en la asistencia al trabajo para realizar las funciones propias del puesto, aun considerándose (interna o externamente) no apto para realizarlo en plenas condiciones físicas y mentales. En vista de la crisis económica reciente, numerosos empleados han temido por perder su puesto de trabajo (Lallement, 2011). En vista de esta compleja realidad social, se ha podido observar un incremento del presentismo en las organizaciones (Lack, 2011; Munro, 2007). Ello ha propiciado un aumento de los costes de la productividad y, probablemente, un descenso del efecto de los programas de promoción de la salud en el trabajo.

En este sentido, el presentismo se ha considerado una variable relativamente reciente en la literatura. Este aspecto le ha conformado como una variable de especial interés. Entre sus diferentes causas de su aparición en las organizaciones, se han identificado aspectos relacionados con el estilo de vida y otros factores de riesgo, como la obesidad o la falta de ejercicio (Cancelliere, Cassidy, Ammendolia, y Côté, 2011).

Asimismo, cabe distinguir entre dos tipos de absentismo: absentismo a corto plazo y absentismo a largo plazo. Las distinciones poseen unas connotaciones claras aceptadas por la comunidad científica, siendo el absentismo a corto plazo menor a 20 días y absentismo a largo plazo igual o mayor a 20 días (Bouwman et al., 2015).

2.4.4.5 Evidencia general existente

La literatura científica muestra, a su vez, estudios de revisión que establecen evidencias de los programas de actividad física sobre la reducción del absentismo y el incremento de la productividad. Muchas de ellas han sido recogidas en la obra de Pronk (2009). En una revisión sistemática de Shepard (1996) se incluyeron 52 estudios entre 1972 y 1994 que localizaron evidencias en la mejora del Índice de Masa Corporal, el porcentaje de grasa, la presión sanguínea, la reducción del colesterol, la adherencia a la actividad física, reducción del consumo de tabaco, el incremento de la satisfacción laboral y la reducción del absentismo (Shepard, 1996). En la revisión propuesta por Proper et al. en 2002, se incluyeron 8 estudios publicados entre 1981 y 1999 que mostraron eficacia de las intervenciones de actividad física en el incremento de actividad física, el incremento de la satisfacción laboral y la reducción del absentismo laboral (Proper et al., 2002).

Estas evidencias han sido igualmente corroboradas por la revisión reciente de Matson-Koffman et al. que en 2005 incluyó 18 estudios entre 1991 y 2001 en el que incluía, además de la actividad física, intervenciones de nutrición. Las evidencias encontradas fueron también grandes con relación a los parámetros físicos y antropométricos: pérdida de peso, porcentaje de grasa, reducción de la presión sanguínea, colesterol y

hábitos nutricionales (Matson-Koffman, Brownstein, Neiner, y Greaney, 2005). Si bien, en esta revisión no se hallaron mejoras en el absentismo y en el incremento de la productividad.

En la revisión propuesta por Engbers et al. en 2005, fueron analizados 13 estudios entre 1987 y 2002 e igualmente localizaron efectos sobre la pérdida de peso, el porcentaje de grasa, una reducción en la presión sanguínea y el colesterol. Sin embargo, no halló efectos sobre la reducción del índice de masa corporal. De igual modo, favoreció un incremento de la actividad física y de los sujetos y una mejora de los hábitos nutricionales (Engbers, van Poppel, Chin A Paw, y van Mechelen, 2005). En todo caso, en ambas revisiones no se encontraron retornos de la inversión grandes, lo cual aviva la hipótesis de que los programas que alcanzan mejores efectos también requieren de importantes intervenciones.

En otra revisión que tuvo en cuenta programas multicomponente llevada a cabo con 47 estudios incluidos entre 1984 y 2000, los efectos se encontraron sobre otros parámetros, sobre todo en la promoción de hábitos saludables y la reducción del absentismo (Heaney y Goetzel, 1997). En este sentido, para esta última variable, la literatura científica parece coincidir en que la reducción del absentismo requiere de programas multicomponentes. En este sentido, la serie publicada de cuatro revisiones llevadas a cabo por Pelletier en 1996, 1999, 2001 y 2005 analizaron en su conjunto a 57 intervenciones multicomponentes que localizaron fuertes evidencias en la reducción del absentismo, las causas de discapacidad para el trabajo e incluso identificaron retornos positivos de la inversión (Pelletier, 1993, 1999, 2001; Pelletier, 2005). No obstante, revisiones recientes sugieren latencias en el campo de conocimiento que los programas de actividad física presentan sobre determinados parámetros organizacionales (Malik et al., 2014). En vista de la literatura existente, poner a examen dichas variables se constituye como un campo en sí mismo de especial interés científico.

2.4.5 La capacidad para el trabajo

El rendimiento en el trabajo se encuentra relacionado con la capacidad para el trabajo. La capacidad para el trabajo está estrechamente relacionada con la salud de los empleados (Ilmarinen, 2009). La capacidad para el trabajo se definió en 1981 por un grupo de investigadores fineses con arreglo a dar respuesta a la pregunta de qué tan bueno es el trabajador ahora y en el futuro con respecto a su salud, el trabajo y las exigencias mentales (Ilmarinen, Tuomi, y Seitsamo, 2005). A menudo, estas medidas se toman específicamente a través de la utilización de cuestionarios de capacidad autopercebida por el empleado. Uno de los más conocidos es el *Work Ability Index* (WAI) (De Zwart, Frings-Dresen, y Van Duivenbooden, 2002; Ilmarinen, 2009). Uno de los primeros estudios localizados en la literatura, es el propuesto por Manguroff et al. en 1960, donde se identificaron mayores rendimiento en tareas profesionales, precisamente en Sofia (Bulgaria) (Manguroff, Channe, y Georgieff, 1960).

Desde entonces, se han venido realizando interesantes contribuciones en la década de los noventa (Haskell, 1989; Howard y Mikalachki, 1979). En 1987, Shepard et al. hallaron diferencias significativas entre ambos géneros en la capacidad física del trabajo comparando a hombres y mujeres en un cicloergómetro en condiciones hipóxicas. Esta

evidencia empírica sugiere que las mujeres pueden poseer un menor desempeño físico en tareas laborales de resistencia (Shephard, Vandewalle, Bouhlef, y Monod, 1988).

A pesar de la existencia de los estudios longitudinales como *Live for Life*®, programa desarrollado por la compañía *Johnson and Johnson* (Wilbur, 1983) el estado de la cuestión actual sugiere evidencias con respecto a las correlaciones de lo que informa un sujeto y lo que no. El citado programa realizó un programa de seguimiento con once mil participantes a lo largo de dos años, y fue muy efectivo especialmente en fumadores con riesgo de enfermedad coronaria. En este sentido, en un reciente artículo publicado en la *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, se estableció que incluso empleando una sola pregunta general, sería posible determinar la capacidad para el trabajo actual de las mujeres en periodos de baja prolongados (Ahlstrom, Grimby-Ekman, Hagberg, y Dellve, 2010). Así pues, parecen existir fuertes evidencias con relación a la capacidad para el trabajo y sus unidades de medida. No obstante, diversos autores continúan hoy insistiendo en la necesidad de seguir realizando estudios que aumenten la evidencia científica existente (Ilmarinen, 2009; Ilmarinen y Rantanen, 1999; Puig-Ribera et al., 2008; Shephard, 1995).

La relación de la salud con el rendimiento también ha sido estudiada con relación a la capacidad para el trabajo y el área geográfica en la que se encuentra regulada la protección laboral de los trabajadores. A este respecto, Prins (2013) señaló que existe una brecha importante entre los diferentes países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en relación con la dependencia de las bajas por incapacidad, alertando de esta problemática en el momento en el que las enfermedades mentales en crecimiento copan la mayor parte de las empresas europeas. En este sentido, mejorar los indicadores de capacidad para el trabajo puede ser relevante para prevenir estas situaciones y mejorar la igualdad en las empresas (Prins, 2013).

Por su parte, el ejercicio físico ha mostrado evidencia sobre los índices de capacidad para el trabajo, si bien, estos beneficios parecen estar también asociados a las características individuales, el estilo de vida, la falta de actividad física vigorosa y las demandas en el trabajo (van den Berg, Elders, de Zwart, y Burdorf, 2008). En este sentido, parece necesario conocer los parámetros que permitan estudiar la capacidad para el trabajo y sus relaciones causales en las empresas europeas.

2.4.6 Satisfacción en el trabajo

La satisfacción laboral ha sido una variable de capital importancia estudiada desde un punto de vista empresarial (Smeds, 1994). Asimismo, la literatura científica sugiere una relación entre la satisfacción laboral y el desempeño en el trabajo (Halkos y Bousinakos, 2010). Existen evidencias sobre los efectos del ejercicio físico y su relación con las enfermedades mentales y la depresión. Una menor depresión está correlacionada con una mayor satisfacción laboral, con lo cual, ejercicio físico parece constituirse como una variable principal de interés para las empresas y las organizaciones.

Uno de los primeros investigadores que abordó seccionalmente el campo de la satisfacción laboral fue el británico Robert Hoppock, quien determinó en 1935 la

satisfacción laboral a 309 empleados en función de algunos determinantes como la edad y el estatus social (entre otras), pero una muy relevante fue la fatiga (Hoppock, 1935). En la obra de Locke (1976), titulada la *The nature and causes of job satisfaction* se abordó el primer marco teórico serio del campo, ilustrando esencialmente la importancia de las condiciones de trabajo para alcanzar altas cotas de satisfacción laboral (Locke, 1976).

Con todo ello, cabe preguntarse si la satisfacción en el trabajo parece ser una variable que pudiera ser reforzada gracias al ejercicio físico. Existen evidencias que sugieren que los programas de bienestar laboral disminuyen los problemas mentales que en el trabajo pudieran derivarse en una insatisfacción laboral (Tan et al., 2014). Otros investigadores, a su vez, han sugerido examinar el impacto de las intervenciones sobre la satisfacción laboral (Conn et al., 2009).

De igual modo, el mercado de trabajo se enfrenta en la actualidad a un paradigma vinculado con la satisfacción laboral. Así, cada vez más empresas se están sumando a la cultura del bienestar, precisamente ante la atracción de los talentos. Estudios seminales que prueban esta evidencia podemos localizarlos en Baun et al. 1986 y en Rudman (1987), que argumentaron la imagen corporativa de las empresas alrededor del *fitness* (Baun, Bernacki, y Tsai, 1986; Rudman, 1987).

A pesar de la existencia de pocos estudios serios, se han arrojado evidencias significativas del ejercicio físico con relación a la satisfacción laboral; en este sentido, todavía los efectos se muestran pequeños desde la década de los ochenta, y no necesariamente han guardado una relación exclusiva con el ejercicio físico (Ohta et al., 2007; Rudman, 1987). Asimismo, parece no existir una evidencia clara en los estudios recientes de revisión que muestren un tratamiento sistemático de esta variable a través del ejercicio físico, y mucho menos en Europa (Conn et al., 2009; Proper et al., 2003; Rongen et al., 2013). De la misma manera, la literatura científica reciente advierte de la correlación existente entre la calidad laboral de los trabajadores y la satisfacción en el trabajo. En este sentido, el apoyo de la dirección de la empresa o los gerentes parece conformarse como un aspecto prioritario para mejorar dicha satisfacción (Navidian et al., 2014).

Selye se refiere al grado de satisfacción como un proceso cognitivo y emocional en función de si se da un marco de satisfacción o desagrado, respectivamente. En este sentido, la forma en la que se percibe la situación es clave a la hora de aumentar la satisfacción laboral (Selye, 1956). En este sentido, la satisfacción laboral parece guardar una relación con el estrés (Oden, Crouse, y Reynolds, 1989).

A su vez, el ejercicio físico aeróbico contribuye a disminuir el estrés. El desarrollo de un programa de ejercicio físico aeróbico puede contribuir a aumentar el confort que, en definitiva, podría conducir a un sujeto a un aumento de la satisfacción laboral, incluso, cuando existen factores estresantes desde un plano psicosocial (Hamer, Taylor, y Steptoe, 2006; Long y Stavel, 1995; Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz, y Salazar, 1991).

Si bien, parece existir controversia con los instrumentos que se han empleado en intervenciones seminales que, habitualmente, han venido empleando el instrumento

job satisfaction index (Smith, 1969). De acuerdo con Shepard (1995) los cuestionarios empleados podrían no reunir suficiente sensibilidad para detectar las posibles ganancias en satisfacción laboral derivadas del programa (Shephard, 1995). En 1978 se llevó a cabo una de las primeras revisiones exhaustivas de los instrumentos de medición de la satisfacción laboral, estableciendo que los modelos disyuntivos o conjuntivos, junto con los de satisfacción lineal, predicen fielmente la satisfacción laboral (Aldag y Brief, 1978).

En castellano, la unidad de investigación en psicometría de la Universidad de Valencia ha realizado importantes contribuciones en la conformación de instrumentos válidos y fiables en la satisfacción laboral. Así, el concepto de satisfacción laboral se ha de abordar desde la Psicología de la Seguridad. A este respecto, Meliá et al. desarrollaron en 1999 una revisión de la teoría en Psicología de la Seguridad. Entre sus principales conclusiones se encontró el gran recorrido que todavía habría de realizar la disciplina (Meliá Navarro, 1999). Poco después, el grupo inició un desarrollo en castellano de una batería de instrumentos que han venido empleando las empresas. Uno de ellos, es el S21/26 (Meliá et al., 1990). El instrumento se conformó como una escisión de otros instrumentos desarrollados inicialmente por el mismo equipo desde finales de la década de los ochenta (Meliá y Peiró, 1988a, 1988b). Desde entonces, diversas investigaciones han justificado su idoneidad en las organizaciones. Investigaciones recientes lo han establecido como un instrumento muy indicado para trabajadores de oficina (Domínguez-Lara, Calderón, y Arroyo, 2016). De igual modo, la mujer ha cobrado un protagonismo notorio en su incursión al trabajo a lo largo del siglo XX (Aguirre Zubiaurre y Martínez Díaz, 2006). Se han conocido los beneficios de la mujer en esta presencia, si bien, los beneficios que el ejercicio físico puede conllevar en la realidad empresarial española todavía permanece latente (Martínez del Castillo et al., 2008).

En un estudio realizado con 533 oficiales de policía en el Reino Unido, no se encontraron relaciones entre el ejercicio y la satisfacción laboral o el bienestar (Kirkcaldy, Cooper, Shephard, y Brown, 1994). En otro estudio, se logró una reducción significativa la ansiedad post ejercicio tras ocho semanas de intervención de ejercicio físico aeróbico, si bien, tras este tiempo no se encontraron mejoras en la satisfacción laboral (Altchiler y Motta, 1994).

Investigaciones recientes señalan los beneficios de realizar un programa de ejercicio físico supervisado, controlado y sistemático sobre la satisfacción laboral, si bien, insisten todavía en conocer las variables que inciden en la relación causal con la satisfacción laboral (de Miguel Calvo, Gallo, De las Mozas Majano, y López, 2011). Estos datos en España coinciden con investigaciones previas que fundamentan la importancia de llevar a cabo estas intervenciones en el lugar de trabajo (Wattles y Harris, 2003).

A pesar de las investigaciones realizadas a propósito del objeto de estudio, parece constituirse cierta variabilidad en los programas y los efectos de estos. Intuimos que estos elementos pueden deberse a los recursos, si bien, el complejo mercado de trabajo, así como las voluntades de los gerentes, puede ser determinante a la hora de establecer un programa de actividad física en el trabajo que procure mejorar los efectos. En este sentido, lo cierto es que todavía prevalece la necesidad de realizar investigaciones más profundas al respecto en las organizaciones europeas.

2.5 FISIOLÓGÍA Y FISIOPATOLOGÍA PROSTÁTICA

La próstata es una glándula exocrina ubicada por debajo de la vejiga urinaria masculina, cuyo peso se encuentra alrededor de 20 g. Se encuentra atravesada por la uretra en su parte central en la que se encuentra el esfínter preprostático, el cuál evita la eyaculación retrógrada y mantiene el tono uretral, y por el conducto eyaculador proveniente de la vesícula seminal. Recibe inervación simpática adrenérgica, predominando receptores alfa 1 adrenérgicos, encargados de mantener el tono del esfínter liso. A su vez, la inervación parasimpática está directamente relacionada con las funciones secretoras y tienen una influencia sobre la uretra y el paso de orina por la misma (Hermabessière y Taillandier, 2002).

Las principales funciones de la próstata son la secreción de líquido prostático y su influencia sobre el mecanismo miccional. El líquido prostático es un componente destacado del líquido seminal y compone aproximadamente el 30% del mismo. Asimismo, modifica el potencial de hidrógeno (pH), influyendo sobre su viscosidad y así mejorando la movilidad y penetración de los espermatozoides. Respecto a la micción, no se puede demostrar una relación directa respecto a la continencia, pero sí que tiene un papel activo sobre la resistencia al paso de la orina (Hermabessière y Taillandier, 2002).

Siguiendo a Rodríguez-López, Baluja-Conde y Bermúdez Velásquez (2007) dentro de las patologías más comunes de próstata pueden encontrarse las detalladas a continuación:

- Hiperplasia benigna de próstata, relacionada con la edad avanzada y las alteraciones hormonales
- Cáncer de próstata
- Prostatitis

La sintomatología asociada a la próstata ha sido contemplada desde la inflamación prostática, si bien, etiológicamente se manifiesta como un conjunto de afecciones de compleja valoración clínica y tratamiento, no existiendo la prostatitis siempre que se presenta una inflamación.

2.6 PROSTATITIS Y DOLOR PÉLVICO

2.6.1 Definición, causas y tipos

La prostatitis es un conjunto de afecciones inflamatorias de etiología infecciosa o desconocida. Sin embargo, a pesar de estar asociada clínicamente a una inflamación, la existencia de la inflamación de la glándula prostática no necesariamente se ha de significar prostatitis (Roberts, Lieber, Bostwick, y Jacobsen, 1997). Afecta aproximadamente al 9% de los varones menores de 50 años, aunque su frecuencia aumenta con la edad. La presencia de las glándulas de Skene en las mujeres, histológicamente, cumplen funciones similares en los hombres, en tanto estas son secretoras y también pueden incurrir en procesos inflamatorios (Szell, Goldstein, Komisaruk, y Goldstein, 2016). Si bien, los varones, en aproximadamente un 50%, tendrán un cuadro de prostatitis a lo largo de su vida (López Larrayoz et al., 2017). La prostatitis se ha clasificado a lo largo de los años en cuatro tipos clínicos: prostatitis

bacteriana aguda, prostatitis crónica bacteriana, prostatitis bacteriana o no bacteriana y, por último, prostatodinia (Drach, Fair, Meares, y Stamey, 1978; Meares, 1968).

Si bien, son las patologías crónicas no infecciosas las que suponen un 85% de las prostatitis debido a la dificultad de establecer una diferencia clara del origen bacteriano o no de la propia patología (Roberts et al., 1997). Su etiología es desconocida, precisamente ante la disparidad de diagnósticos y las dificultades para acceder físicamente a la glándula y establecer juicios clínicos claros, aunque se proponen reacciones autoinmunes, alteraciones de la musculatura pélvicas o alteraciones del sistema nervioso simpático como posibles causas (López Larrayoz et al., 2017; Veiga, Fernández, Malfeito, y Casiano, 2006).

En la Figura 20 se muestra representación gráfica sobre la inflamación de la próstata.

Figura 20. Descripción gráfica de una próstata inflamada

Recuperado de "Infección del tracto urinario en el varón joven" de Cuesta Pérez-Camino A., Crespo González, S., Pérez Bol, R., Velázquez Álvarez, J., Augusto Rendo, B., 2015, p. 1, XII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, A Coruña, Palexco.

La prostatitis crónica o dolor pélvico crónico (CP/CPPS) es uno de los diagnósticos más comunes en las consultas ambulatorias de Urología, con una elevada prevalencia entre los varones mayores de 40 años (Irwin et al., 2009). En vista de la condición multifactorial del CP/CPPS, la literatura científica no ha establecido un consenso que aborde una definición global y aceptada internacionalmente del propio término. Se trata, por tanto, de un conjunto heterogéneo de enfermedades, de causa muchas veces desconocida (90-95% de los casos) y aunque sí está bien definida en el resto de los casos la etiología bacteriana (5%-10% de los casos) (Heras-Cañas et al., 2016; Jiménez-Pacheco, Jiménez-Pacheco, y Roldán-López, 2016; Vicari et al., 2014). La sintomatología asociada a la prostatitis es una sensación de pesadez o dolor en la región pélvica. Asimismo, la infección urinaria, disuria y alta frecuencia miccional, resultan dolorosos, irritativos y obstructivos referidos al tracto génito-urinario y al periné del varón, acompañados o no de disfunción sexual (Heras-Cañas et al., 2016; Jiménez-Pacheco et al., 2016; Vicari et al., 2014).

El *National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases* (NIDDK/NIH) clasifica la CP/CPPS como una prostatitis de categoría III (Litwin et al., 1999). Estos pacientes, usualmente ven afectada de modo sustancial su calidad de vida (Tabla 5).

Tabla 5. Clasificación de la prostatitis según la clasificación de la NIDDK/NIH

Subtipo	Descripción
I	Prostatitis aguda bacteriana
II	Prostatitis crónica bacteriana
III	Síndrome de dolor pélvico crónico (CP/CPPS)
III A	SDPC inflamatorio: leucocitos en secreción prostática espontánea/orina postmasaje prostático (VB3)/semen
III B	SDPC no-inflamatorio: no leucocitos en secreción prostática espontánea/orina postmasaje prostático (VB3)/semen
IV	Prostatitis inflamatoria asintomática (prostatitis histológica)

Nota. Adaptado de “The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index: Development and Validation of a New Outcome Measure”, de Litwin, M., McNautgton, M., Fowler, F., Nickel, J., Calhoun, E., Pontari, M., Alexander, R.B., Farrat, J.T., O’Leary, M., 1999, *Journal of Urology*, 162(2):369-75.

2.6.2 Diagnóstico, biomarcadores y principales tratamientos

Para su diagnóstico es importante la realización de una historia clínica completa, cultivo de orina y secreción prostática con el fin de confirmar la presencia bacteriana. La presencia de leucocitos en el líquido seminal permite diferenciar entre una patología inflamatoria o un cuadro no inflamatorio. El Antígeno prostático específico (PSA) mide el nivel de antígeno prostático específico en sangre, es una sustancia producida por la próstata y cuyos niveles elevados tiene una relación directa con alteraciones prostática (López Larrayoz et al., 2017).

El subtipo III (CP/CPPS) es el más habitual entre los pacientes aquejados de dicha sintomatología, si bien, la confusión de sus síntomas con otras enfermedades provoca que numerosos diagnósticos en consultas de Urología se refieran al CP/CPPS de origen no bacteriano, con lo cual, la mayoría de los estudios se refieren a la sintomatología asociada al CP/CPPS. El estrés agudo o crónico, así como la incidencia de los factores psicosociales se encuentran entre las principales causas de CP/CPPS (Baker, 1998).

Con el fin de contrarrestar los síntomas, el tratamiento farmacológico habitual no ha propiciado mejoras sustanciales en los varones afectados de CP/CPPS, sin embargo, hoy la fisioterapia se ha constituido como un tratamiento prometedor en pacientes diagnosticados de CP/CPPS. En esta dirección, existen evidencias en las que los pacientes responden de forma favorable a los tratamientos de biorretroalimentación del músculo elevador del ano, encontrándose efectos más bajos en otros tratamientos clínicos de origen farmacológico (Potts y O’Dougherty, 2000).

Existen evidencias que señalan la presencia del dolor pélvico crónico también en mujeres (Baker, 1998), sin embargo, la prevalencia sobre los sujetos varones y la complejidad etiológica hacen difícil establecer evidencias clínicas ha encaminado los

tratamientos hacia los sujetos varones. Otros tratamientos mejoraron al 27% de los sujetos sometidos al tratamiento de masaje interno (Thiele, 1963). A su vez, la modificación del estilo de vida y no permanecer inmóviles durante un tiempo extenso son determinantes para contrarrestar los síntomas (Gerber, 1998).

2.6.3 El efecto de los condicionantes sociales: el lugar de trabajo presente

Diversos estudios demuestran que la edad, el tabaquismo y un nivel educativo bajo se relaciona con un incremento de la prostatitis asintomática (NIH-IV) (Ran Zhang, Andrea K Chomistek, et al., 2015). Así como otros autores indican que el tabaquismo, el consumo de alcohol, una baja actividad física y glucosa elevada en sangre se relaciona con un elevado riesgo de prostatitis y con la disfunción eréctil (Ran Zhang, Andrea K Chomistek, et al., 2015).

En el estudio de cohorte sobre factores de vida relacionados con CP/CPPS en profesionales sanitarios con un tamaño de muestra de 51529 hombres con edades comprendidas entre los 40 y los 75 años, realizado entre los años 1986 y 2008, se observó que no existe relación entre factores de riesgo como obesidad, tabaquismo e hipertensión con la prostatitis crónica. Asimismo, dicho trabajo indica que no existe asociación con el índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, porción cadera-cintura, consumo de tabaco e hipertensión con el riesgo de CP/CPPS (Ran Zhang, Andrea K Chomistek, et al., 2015). Estas evidencias contrastan con otras halladas en la literatura reciente y que se exponen a continuación.

2.6.4 Evidencias en sujetos deportistas

Existe una escasa evidencia sobre la influencia de la actividad física en la sintomatología asociada a la inflamación prostática. Un estudio de cohorte con 185.412 esquiadores de larga distancia durante los años 1989-2010 y no participantes en carrera de larga distancia de esquí (Vasaloppet), realizada en Suecia durante los años mencionados (Hallmarker et al., 2015), estimó las ratios de peligrosidad y probabilidad de padecer cáncer durante los más de 20 años de seguimiento, comparando aquellos sujetos que participaron en la mencionada carrera de esquí de fondo con aquellos que nunca realizaron dicha carrera dentro de la población sueca. Los resultados que obtuvieron reflejan una disminución del 6% en el riesgo de cáncer invasivo, así como una reducción del 32% en cáncer relacionados con el consumo de tabaco, el peso corporal, la actividad física habitual o el consumo de frutas y verduras como factores etiológicos.

En otro estudio se pone de manifiesto que los ciclistas no tienen más problemas o disfunciones sexuales y urinarias que los nadadores y corredores. Sin embargo, los ciclistas son más propensos a las estenosis uretrales, constituyéndose en deportes como el ciclismo un problema. A más tiempo montando en bicicleta y un sillín más elevado, aumenta la asociación, con bajas posibilidades de llagas genitales y entumecimiento (Awad et al., 2018). Si bien estas observaciones no han sido halladas específicamente para la CP/CPPS, aunque la sintomatología, referida a la inflamación prostática, fue similar.

2.6.5 El vacío de la literatura sobre la influencia de la actividad física en la prostatitis crónica y sus efectos en el lugar de trabajo

Existen numerosos artículos que relacionan la práctica de determinados deportes con la aparición de prostatitis (Asplund, Barkdull, y Weiss, 2008; Kai, Lee, Andrews, Wilkinson, y Forster, 2010; Leibovitch y Mor, 2005; Robertson, Barker, Fahrer, y Schache, 2009; St Sauver et al., 2011), sin embargo, para contrarrestar esta visión, la revisión que aquí proponemos trata de mostrar, en primer lugar, una reflexión acerca de la influencia que la actividad física pudiera ejercer en personas que muestran la sintomatología asociada a CP-CPPS y, en segunda instancia, examinar las posibles relaciones de estos efectos con los obtenidos en otros estudios.

En 2016 una revisión analizó las alternativas terapéuticas existentes, encontrando diversas terapias para el tratamiento de la prostatitis crónica/síndrome de dolor crónico pélvico como modificaciones en los estilos de vida, fitoterapia, extractos bacterianos orales, inmunoestimulantes, acupuntura, terapia miofascial y *biofeedback*, terapias neuromoduladoras, ondas de choque extracorpóreas, fármacos con efecto sobre el sistema central y periférico, terapias cognitivo-conductuales y terapias térmicas (Jiménez-Pacheco et al., 2016).

Asimismo, otros estudios transversales y longitudinales muestran que cantidades crecientes de actividad física están asociadas con una disminución de la mortalidad y una mejor salud y funcionamiento, incluida una disminución de los síntomas de ansiedad, estrés y depresión (Estabrooks, Glasgow, y Dzewaltowski, 2003; Pate et al., 1995). De igual modo, es posible observar la incidencia que la sintomatología relacionada con la prostatitis crónica puede ocasionar en el lugar de trabajo cuya ocupación es sedentaria. De acuerdo con su aparición, el crecimiento de la edad de jubilación puede propiciar la aparición de estos síntomas y la preocupación de las empresas. El tratamiento farmacológico habitual no ha logrado dirimir con precisión los síntomas. La actividad física coadyuva en diferentes contextos y enfermedades (Pedersen y Saltin, 2015). Sin embargo, las revisiones recientes no atestiguan una relación directa de la actividad física sobre la prostatitis en el lugar de trabajo, en tanto la prostatitis no es una enfermedad laboral reconocida.

Ante los beneficios del estilo de vida saludable, entre los que se encuentra la actividad física, junto con las recientes evidencias que señalan una posible incidencia de la actividad físico-deportiva en sujetos deportistas, parece interesante realizar una revisión sistemática actualizada de esta patología analizando los perjuicios o beneficios que la actividad física podría tener en CP/CPPS, entendiendo este subtipo no bacteriano y su sintomatología.

2.7 EN BÚSQUEDA DE PROGRAMAS EFICACES: EVOLUCIÓN, BARRERAS Y NECESIDADES

De acuerdo con las ideas de Chenoweth, la cuestión de localizar los programas más incidentes sobre las variables objetivo tuvo lugar en Estados Unidos. Uno de los argumentos más recurrentes conformados se refería a que la situación laboral y

económica de las organizaciones empresariales requería de intervenciones inmediatas en materia preventiva con el fin de ahorrar costes en la salud de los empleados (Chenoweth, 1987). Las posturas de Chenoweth se observan implícitas en la citada obra de Pronk (2009). Ambos autores enfatizan sobre que el ahorro de costes en materia de salud fue el principal desencadenante de impulsar estas políticas preventivas en las empresas.

Años más tarde, desde el punto de partida en Estados Unidos, principalmente, parece instaurarse una demanda estructural también en Europa. En vista de la evidencia existente, todo parece indicar que uno de los factores más importantes que impulsó a las empresas europeas hacia la implementación de estos programas fue precisamente el mismo que en sus orígenes atrajo a las empresas americanas a implementar estos programas, si bien, además de la influencia de dichas políticas laborales de empresas de Estados Unidos sobre Europa, parece lógico presuponer el punto de inflexión que la crisis económica ha establecido con las empresas europeas, además del influjo causado por la modernización del mercado de trabajo y el desarrollo de políticas del bienestar con el fin de favorecer el ahorro de costes y la optimización de los recursos dentro del sistema económico productivo.

Por los motivos expuestos y tal como puede localizarse en la literatura existente, un gran número de programas de promoción de la salud laboral los encontramos en Estados Unidos (Chenoweth, 1987; Conn et al., 2009; Pronk, 2009a). De igual modo, la importancia de la cultura se ha visto reflejada en investigaciones previas, donde en Estados Unidos el propio modelo sanitario basado en las primas de las aseguradoras, contrasta con el modelo que, concretamente, existen en España (Kraft, 1984). Sin embargo, siguiendo nuevamente las observaciones de Guazzi et al. (2014), la mayoría de los programas PST estadounidenses son muy discutibles a la hora de crear contextos de trabajo que promuevan la salud colectivamente, alejada de la mera modificación de las conductas individuales. Pese a ello, los países europeos asimilaron la tendencia estadounidense volcada en hacer eficaces los programas desde un enfoque individualista. Partiendo de este contexto, continúa existiendo la necesidad de conformar organizativamente una promoción de la salud en el trabajo que se base en la creación de ambientes de trabajo que promuevan la salud colectiva, en completa armonía con los factores sociales, culturales y organizativos de las empresas europeas (Guazzi et al., 2014).

Con el objetivo de abordar los problemas económicos, laborales y de salud pública existentes en la UE, se han desarrollado interesantes iniciativas de promoción de la salud en el trabajo (Comisión Europea, 2014). Si bien, a tenor de la afirmación anterior, parece verosímil considerar los aspectos culturales del país cuando nos referimos a los programas de promoción de la actividad física y la salud en el lugar de trabajo. Dicha afirmación ha sido igualmente considerada en el reciente metaanálisis propuesto por Rongen et al. (2013).

En la actualidad, las organizaciones públicas bajo el auspicio institucional (gubernamental-administrativo) europeo encargadas de la promoción de la salud laboral son, por un lado, la citada Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), y, por otro, la Red Europea para la Promoción de la Salud y el

Bienestar Internacional están realizando importantes contribuciones en la promoción de la salud en el trabajo dentro del continente europeo.

Realizar un análisis retrospectivo sobre la génesis y evolución de la promoción de la salud en el trabajo, así como sus concepciones teóricas, sus aplicaciones y el marco institucional que procura su fomento y promoción, excedería sobremedida los límites formales del presente trabajo, además —posiblemente— de sobrepasar su objeto de estudio. Si bien, con el fin de abordar la situación en la UE, conviene remontarse a 1970. En ese año La Porte escribió *La gymnastique de pause dans l'entreprise*, conformándose como una de las primeras incursiones de nuestro objeto de estudio en Europa. Se observaron que las pausas con actividad física disminuyen la relajación de una tarea principal exige esfuerzos musculares estáticos intensos (LaPorte, 1970).

En este sentido, consideramos más relevante contextualizar teóricamente el objeto formal del estudio a través de las ideas que algunos autores han expuesto sobre el conocido concepto de bienestar, los programas de intervención y sus efectos sobre distintos parámetros de salud y organizativos en las empresas europeas. Para ello, a continuación se establece una argumentación teórica con una triple intención: primero, para dilucidar la sospecha de la existencia de entornos y territorios culturalmente diferentes; segundo, para presentar una humilde muestra de la evidencia empírica existente con el fin de justificar las ideas planteadas por Guazzi et al. (2014), sobre las cuales los programas (y por tanto, las intervenciones experimentales de los estudios localizados) no pueden ser *las mismas* en Europa que en Estados Unidos. En tercer lugar, se pretenden identificar los aspectos latentes y subyacentes que podrían revestir interés en vista de futuras investigaciones.

Así pues, en relación con Guazzi et al. (2014) la idea de bienestar en el lugar de trabajo tiene múltiples significados a través de las organizaciones y los países de Europa, precisando a su vez que no existen importantes estudios europeos que establezcan meridianamente su incidencia integral (Guazzi et al., 2014). Asimismo, a tenor de la literatura existente, los diferentes estudios que se han realizado al respecto varían ampliamente en aspectos metodológicos, criterios diagnósticos y periodos de observación, intervención y tratamiento, siendo francamente difícil establecer una comparativa precisa de los mismos. Además, la mayoría de los estudios científicos localizados, en su mayoría, no son europeos.

Dentro del entorno laboral, las necesidades económicas y sociales abrieron hueco a la influencia que la actividad física y los programas de salud para los empleados de una organización podían tener no sólo sobre parámetros relacionados con la salud pública, sino también con la productividad, el absentismo laboral y el ahorro de costes en materia sanitaria.

La llegada de estos programas exitosos a Europa se produjo de una forma más simple de lo que cabía esperar. Como en los países estadounidenses tenían efectos favorables, muchos países europeos se interesaron después en desarrollar este tipo de iniciativas en sus organizaciones empresariales. Concretamente, S. Maes, Kittel, Scholten, y Verhoeven llevaron a cabo un trabajo experimental de promoción de la salud dentro de una empresa fabricante de productos para el hogar. Al finalizar el tratamiento

experimental se observó que el grupo de intervención sufrió una disminución del estrés en el trabajo frente a los participantes pertenecientes al grupo control (Maes, Kittel, Scholten, y Verhoeven, 1992).

Dichos resultados, fueron en la misma línea que en el trabajo de Lechner, de Vries, Adriaansen, y Drabbels, en 1997. En su investigación estudiaron el efecto de la participación en un programa de ejercicio físico sobre 884 sujetos pertenecientes al cuerpo de policía, profesionales de la industria química y banqueros. Los resultados de este estudio arrojaron que los sujetos con una alta participación en el programa redujeron significativamente 4,8 días las bajas por enfermedad (Lechner, de Vries, Adriaansen, y Drabbels, 1997). Si bien, Pohjonen y Ranta señalaron que la mayoría de las intervenciones se centraban en puestos de trabajo de oficina y puntualizaron que la mayoría de las intervenciones recogidas en la literatura, contemplaban a trabajadores que ya eran físicamente activos (Pohjonen y Ranta, 2001).

La literatura científica también se ha centrado en el impacto de los programas de ejercicio físico sobre los costes y los beneficios de las intervenciones. Por ejemplo, un estudio característico muy reciente sobre la variable económica es el de Gussenhoven, van Wier, Bosmans, Dekkers, y van Mechelen, publicado en 2013. Este estudio, desarrollado con trabajadores irlandeses, concluyó que no era más rentable el asesoramiento sobre estilos de vida saludable para reducir el peso corporal frente a los programas de atención habituales en las empresas (Gussenhoven et al., 2013).

Por su parte, parámetros como la productividad laboral y el rendimiento en el trabajo también han sido estudiados. Investigaciones al respecto parecen arrojar también resultados inconclusos. En este sentido, en el año 2007 se publicó un estudio de Mills, Kessler, Cooper, y Sullivan, constituyéndose como un claro ejemplo de intervención en Europa. En dicha investigación, esta vez con un diseño cuasiexperimental, se trabajó con una muestra de 618 empleados de una multinacional en el Reino Unido. La intervención consistió en un programa formativo de salud de 12 meses de duración. Las conclusiones del estudio sugirieron que establecer un programa de promoción de salud adecuado y bien implementado puede producir no sólo efectos favorables sobre la salud, sino también sobre la productividad laboral (Mills, Kessler, Cooper, y Sullivan, 2007).

Más allá del terreno puramente académico, numerosas empresas han empezado a implementar programas de promoción de la actividad física y salud corporativa. A nivel mundial son muchas las entidades que velan por la salud de sus empleados, fomentando actuaciones en torno a la actividad física y el deporte. Algunas de ellas son *IBM, Roche Diagnostic Corp, Microsoft, Google, Nasa, General Motors, Pepsi-Cola, Motorola* (Jiménez Gutierrez y García López, 2012). Una de las primeras en poner en marcha estas iniciativas fue la americana *Johnson and Jonhson* (Wilbur, 1983).

La literatura científica nos muestra algunas de las intervenciones de promoción de la salud dentro del contexto laboral europeo. Algunas de ellas vienen recogidas en el trabajo de (Guazzi et al., 2014). Si bien las entidades anteriormente referenciadas resultan las más relevantes para establecer someramente un mapa institucional en torno a la promoción de la salud en el lugar de trabajo, existen otras entidades sin ánimo

de lucro que conforman el plano institucional de lo que se conoce como *Workplace Health Promotion*, o guardan relación con él.

Sobre la promoción de la salud laboral en empresas existen también diferentes trabajos de revisión. La revisión de Hutchinson y Wilson (2012) señala que los programas de promoción de la salud en las empresas pueden mejorar la salud general (Hutchinson y Wilson, 2012). Por su parte, otras revisiones citadas en el trabajo de Rongen et al. (2013) han recogido las evidencias sobre parámetros como el incremento de actividad física, reducción de grasa corporal, beneficios en la dieta, mejora de la productividad y la capacidad para el trabajo así como la reducción del absentismo laboral, aunque todos ellos arrojaron pequeños efectos de las intervenciones y muy heterogéneos entre sí (Conn et al., 2009; Proper et al., 2003; Proper et al., 2002).

Hasta el momento no se conoce realmente la influencia de estas intervenciones sobre diferentes parámetros dentro del entorno europeo. En los diferentes estudios existen una gran cantidad de datos que controlar, disparidad de parámetros, diferentes diseños, resultados y conclusiones.

Por este motivo, coincidiendo con el diagnóstico de la situación de Jiménez y Gutiérrez, el punto de situación en el que nos encontramos es que la evidencia proporcionada no justifica un programa que desencadene beneficios (Jiménez Gutierrez y García López, 2012). En esta dirección, otros autores advierten que la mayoría de estas intervenciones ponen de manifiesto que la evidencia científica confirmatoria sobre la eficacia de la actividad física en los lugares de trabajo es todavía limitada (Proper et al., 2002). Por su parte, las revisiones realizadas, todavía muestran efectos pequeños de las intervenciones (Rongen et al., 2013). Dicha problemática, hace complicado que se pueda establecer una homogeneidad entre los estudios y confirmar con meridiana precisión, qué contenidos, cargas, duración y características han de reunir los programas con el fin de resultar efectivos para con las poblaciones estudiadas o intervenidas en el lugar de trabajo.

A pesar de que un programa de salud corporativa es una herramienta que los empleadores pueden utilizar para contribuir en la mejora de sus resultados profesionales y personales (Jiménez Gutierrez y García López, 2012) hasta el momento no se han recogido en una revisión los estudios de intervención que examinen los efectos provocados sobre los parámetros medidos analizándose exclusivamente para el contexto empresarial europeo.

Por todo ello, se hace relevante desde un punto de vista científico identificar los trabajos que analizan la influencia de los programas de actividad física y salud en las empresas y organizaciones europeas. Además, sería muy interesante encontrar si en Europa se han encontrado parámetros determinantes sobre la salud, la capacidad para el trabajo y el absentismo laboral que nos permitan conocer las intervenciones que se han hecho sobre entidades europeas, así como su eficacia.

2.8 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

En vista de la literatura existente, los efectos de los programas de actividad física y salud en las empresas se han mostrado reducidos sobre numerosos parámetros medidos, si bien, la mayoría de los estudios de revisión sistemática y metaanálisis no han considerado exclusivamente los efectos de los programas en las empresas europeas. Antes de realizar un trabajo experimental, sería interesante conocer la operativización de las variables dependientes que han sido medidas en los estudios europeos y examinar los efectos de los programas de intervención sobre las mismas. Para medir los efectos de dichas intervenciones en Europa, todavía no han sido examinados los efectos y la variabilidad de los programas de intervención localizados en los estudios científicos de carácter experimental que han investigado la incidencia de los programas de actividad física y salud en las empresas y organizaciones europeas.

De igual modo, investigaciones previas han advertido la necesidad de continuar realizando estudios experimentales en el lugar de trabajo para medir la eficacia de dichos programas. Este vacío de conocimiento se hace todavía más evidente en España. A este respecto, parece relevante conocer la incidencia de un programa adaptado a una empresa española con el fin de examinar los efectos de una intervención específica en el lugar de trabajo.

Por otra parte, las alteraciones causantes de CP/CPPS en la musculatura pélvica o el sistema nervioso pueden verse reducidos gracias a la actividad física. Asimismo, la incidencia de la actividad física en el lugar de trabajo sobre diversas enfermedades o dolencias han sido analizadas con anterioridad en la literatura, sin embargo, los estudios previos no recogen intervenciones específicas sobre CP/CPPS. Examinar los efectos de los programas sobre enfermedades no descritas previamente puede arrojar una contribución original y novedosa al objeto de estudio. No obstante, ciertamente todavía existe un vacío de conocimiento sobre qué variables dependientes ha hallado efecto la actividad física en relación con CP/CPPS. A pesar de la literatura existente, los distintos programas de intervención se muestran heterogéneos. Asimismo, todavía no ha sido explorada si la heterogeneidad de los resultados encontrados en los estudios experimentales que empleen la actividad física como tratamiento coadyuvante, puede guardar relación con el tipo de intervención realizada. Es por ello por lo que se hace relevante desde un punto de vista científico estudiar primero la influencia de la actividad física como tratamiento complementario sobre CP/CPPS.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

3 OBJETIVOS E HIPÓTESIS

3.1 OBJETIVOS

3.1.1 Objetivos generales

- A. Evaluar la eficacia de los programas de actividad física y salud empleados en las empresas y las organizaciones europeas.
- B. Determinar el efecto del programa de ejercicio físico grupal implementado en el grupo experimental durante 12 semanas de duración en trabajadores de oficina de una empresa española sobre la salud mental y física y en las variables relacionadas con el rendimiento y la productividad en el trabajo.
- C. Realizar una revisión sistemática empleando las técnicas de metaanálisis de la prostatitis crónica en relación con los perjuicios o beneficios que la actividad física podría tener en la prostatitis crónica o dolor pélvico crónico.

3.1.2 Objetivos específicos

- A.1 Examinar los efectos y la variabilidad de los programas de intervención localizados en los estudios científicos de carácter experimental que han investigado la incidencia de la promoción de la actividad física y la salud en las empresas y organizaciones europeas.
- A.2 Estudiar si la heterogeneidad de los estudios nos permite arrojar evidencia científica suficiente para una valoración objetiva de los programas y el posterior diseño de intervenciones.
- B.1 Determinar el efecto de un programa de ejercicio supervisado basado en la capacidad aeróbica y la fuerza, desarrollado de forma grupal y de 12 semanas de duración en el lugar de trabajo con empleados de una empresa española en puestos de trabajo de oficina para mejorar:
 - Síntomas de depresión
 - Ansiedad
 - Capacidad para el trabajo
 - Absentismo y presentismo laboral
 - Costes en la productividad
 - Satisfacción laboral
 - Condición física y medidas antropométricas de los participantes
 - Salud física y mental percibida de los participantes
- C.1 Examinar la influencia de la actividad física como coadyuvante a los tratamientos de CP/CPPS.
- C.2 Examinar si la heterogeneidad de los resultados encontrados en los estudios experimentales que empleen la actividad física como tratamiento coadyuvante

a CP/PPS nos permite arrojar evidencia científica suficiente para la valoración de su eficacia y el posterior diseño de intervenciones en el lugar de trabajo.

3.2 HIPÓTESIS

- A. La variabilidad en cuanto a la operativización de las variables dependientes identificadas en los estudios de actividad física y salud en las empresas europeas hará difícil hacer una valoración objetiva sobre el impacto de los programas en las mismas.
- B. Un programa de ejercicio físico supervisado en el lugar de trabajo:
- Disminuirá los niveles de depresión
 - Disminuirá los niveles de ansiedad
 - Incrementará la capacidad para el trabajo
 - Mejorará la condición física y las medidas antropométricas tomadas de los participantes
 - Reducirá el absentismo y el presentismo
 - Reducirá los costes en la productividad
 - Incrementará la satisfacción laboral
 - Mejorará la salud física y mental de los participantes
- C. La heterogeneidad en los efectos de los distintos programas o intervenciones de actividad física para el tratamiento de la CP/PPS dependerán del tipo de intervención realizada.

MATERIAL Y MÉTODOS

4 MATERIAL Y MÉTODOS

La presente tesis doctoral se compone de tres estudios adecuados en su diseño metodológico al problema de investigación. En primer lugar, se desarrolla un trabajo de revisión empleando sobre la eficacia de las intervenciones de los programas de actividad física y salud en las empresas europeas. El segundo estudio consiste en la realización de un trabajo de campo de carácter experimental con dos grupos pre-post supervisado con un grupo de empleados de oficina españoles sobre diferentes variables dependientes, identificadas muchas ellas en el metaanálisis previo. El tercer estudio consiste en la realización de un nuevo trabajo de metaanálisis para evaluar la influencia de la actividad física sobre la prostatitis crónica para localizar posibles asociaciones que permitan evidenciar un posible campo de aplicación de la actividad física en el lugar de trabajo como tratamiento complementario a una patología evidenciada epidemiológicamente en el lugar de trabajo. A continuación, se desglosa la metodología de cada estudio.

4.1 ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES EUROPEAS

4.1.1 Estrategia de búsqueda e identificación de los estudios

Comenzamos este trabajo realizando una revisión sistemática de los estudios de intervención en empresas y organizaciones europeas. Dada la proliferación de los trabajos científicos e intervenciones no publicadas, el objeto de esta revisión no ambiciona, ni mucho menos, compilar ni abarcar su totalidad, sino que la aspiración es configurar un mapa de las intervenciones que se han realizado en Europa siguiendo una metodología científica. La idea fue conformar un marco analítico en el que ubicar los distintos estudios comparados sobre los efectos de los programas de intervención sobre las variables predominantes.

Se identificaron estudios relevantes realizando búsquedas tanto electrónicas como manuales. Las búsquedas electrónicas se llevaron a cabo mediante el uso de varias bases de datos: PubMed, Web of Science y Sport Discus, siendo incluidos aquellos estudios realizados hasta junio de 2014. Se desarrollaron frases de búsqueda adaptadas a las bases de datos a las que nos dirigíamos empleando palabras clave: 1) health promotion; 2) workplace; 3) physical activity; 4) variables: absentismo, productividad, capacidad para el trabajo, salud; y 5) RCT. También se llevó a cabo una búsqueda manual, consulta de referencias de otras revisiones y una consulta a expertos de referencia en el sector de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesionales de la salud y empresarios.

4.1.2 Selección de estudios

4.1.2.1 Criterios de inclusión

Con el fin de ser incluidos para el tratamiento estadístico y posterior cálculo del tamaño del efecto, los artículos debían cumplir los siguientes criterios: 1) describir una promoción de salud laboral empleando la actividad física y/u otro programa de promoción de la salud para los empleados de la organización; 2) desarrollar la

intervención dentro de una empresa y/u organización europea; 3) realizar un ensayo de control aleatorio (RCT); 4) evaluar los efectos de la intervención sobre parámetros fisiológicos o de salud, el absentismo laboral o la capacidad para el trabajo; 5) presentar una adecuada descripción del estudio, la población analizada, las características de la intervención y las medidas utilizadas; 6) incluir una muestra representativa de al menos cinco sujetos; 7) estar escritos en inglés o en castellano; 8) encontrarse publicados antes de junio de 2014. Además, para ser incluidos en el metaanálisis se requería información sobre los niveles, ya sea con un tratamiento pre-post, niveles o cambio por grupo de intervención y control, o las diferencias entre el grupo de intervención y control correspondiente al 95%.

4.1.2.2 Criterios de exclusión

Se excluyeron artículos por los siguientes motivos: 1) no contenían suficiente información estadística para la estimación del TE; 2) los resultados no guardaron relación con las variables dependientes; 3) estudios con un diseño de carácter cualitativo o informes de casos narrativos; 4) estudios que no reunieron una calidad metodológica con arreglo a la escala de evaluación metodológica empleada.

4.1.3 Codificación de los estudios

Con la utilización de un formulario de extracción de datos se obtuvo información sobre las características de la población (sexo, edad); el contenido de la intervención (frecuencia, tipo) y las medidas dependientes de interés (absentismo laboral, parámetros de salud, capacidad y productividad en el trabajo). Para cada medida de interés, se calcularon posteriormente los tamaños del efecto. Dos investigadores realizaron la extracción de datos. En caso de duda, los datos se discutieron hasta que se llegó al acuerdo.

4.1.4 Evaluación de la calidad metodológica

La calidad metodológica de los estudios fue evaluada por uno de los revisores de forma independiente y en caso de duda por dos, utilizando la adaptación al castellano de la escala PEDro desarrollada, basada en la lista Delphi (Verhagen et al., 1998). La traducción y adaptación al español de la escala PEDro fue realizada por Antonia Gómez-Conesa, con el apoyo de la Asociación Española de Fisioterapeutas y la Unidad de Metaanálisis de la Universidad de Murcia. La traducción se realizó de acuerdo a las de Beaton, Bombardier, Guillemin, y Ferraz, del año 2000 (Beaton, Bombardier, Guillemin, y Ferraz, 2000).

El formulario consta de once ítems e incluye información sobre la asignación al azar, la aprobación del comité institucional de revisión, características de los sujetos, el cegamiento, el método de muestreo, la medición, la recopilación de datos, la intervención, la interpretación de los resultados, y la notificación de los sesgos y limitaciones. También incluía los resultados para al menos un resultado clave y las medidas puntuales y de variabilidad. Dos ítems que no formaban parte de la lista Delphi fueron incluidos en la escala PEDro (ítems 8 y 10).

El rango de puntuaciones posibles de 0 a 11. La presencia de indicadores de la calidad de las evidencias presentadas se asigna 1 punto y “no”, 0 puntos. Posteriormente, se analizaron las diferencias de puntuación de opinión hasta que se alcanzó el consenso.

4.1.5 Cálculo del tamaño del efecto

Para cada medida de resultado de interés, fue estimado un tamaño del efecto (TE) genérico sobre la base de los datos originales en el artículo, siguiendo el modelo propuesto Hedges en 1982 (Hedges, 1982) a través del programa *Effect Size determination Program* desarrollado por Wilson y Lipsey en el año 2001 (Wilson y Lipsey, 2001). Los datos fueron registrados en una base de datos de Excel®, versión 2010 para Windows XP®. A partir de entonces, la información sobre la población, el estudio y las características de la intervención, así como la medida de resultado estudiado fue introducida.

En primer lugar, se realizó un cálculo general del tamaño del efecto en una puesta en común de todas las publicaciones, independientemente de la medida de resultado. Para ello se emplearon las informaciones derivadas de las medias, desviaciones típicas, pruebas t de los diferentes estudios y otros estadísticos de contraste como la F de Snedecor. Con el fin de corregir el sesgo positivo de la diferencia media tipificada para tamaños muestrales pequeños, se llevó a cabo una corrección de la *d* resultante propuesta por Hedges en 1982 (Hedges, 1982).

Una vez calculados los tamaños del efecto a nivel global y de cada uno de los estudios, se identificaron aquellas variables predominantes agrupando aquellos estudios cuyas variables eran susceptibles de analizar por su homogeneidad. Se adoptó el modelo de efectos fijos, que determina la homogeneidad de las medidas de tratamiento de los diferentes estudios.

Es por ello por lo que se presentan todos los estudios analizados ($n = 18$), con cada una de las variables presentadas en los mismos y su correspondiente tamaño del efecto. Por otro lado, las variables predominantes que se agruparon por su homogeneidad. La homogeneidad de los estudios se contrastó mediante el procedimiento propuesto por Hedges y Olkin (1985) que implica calcular el estadístico *Q*, el cual se distribuye según Chi cuadrado (X^2) con $k-1$ grados de libertad, donde k es el número de tamaños del efecto. Los resultados se presentan por tablas clasificados por cada una de las variables. Las tablas muestran los estadísticos descriptivos más relevantes, media y desviación típica, si la hubiera, el número de participantes en las intervenciones y el control y, por último el estadístico de contraste. Asimismo, se presenta el tamaño del efecto global, ya corregido, junto con el intervalo correspondiente, para un intervalo de confianza (IC) de un 95 %. Además, se calculó el nivel de significación global de todos los estudios partiendo de puntuaciones *z* y una estimación ponderada del tamaño del efecto.

Para la adecuada interpretación de los diferentes tamaños del efecto, se siguió la propuesta de Cohen en 1988. Un tamaño del efecto pequeño fue considerado con una puntuación alrededor de 0,2; alrededor de 0,5 representó un efecto medio y alrededor de 0,80 un efecto grande (Cohen, 1988). Las diferencias significativas fueron

consideradas viendo que el tamaño del efecto de una intervención no estaba incluido dentro de un IC de un 95 %.

4.2 ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD

4.2.1 Diseño del trabajo de campo

4.2.1.1 Descripción general

Para determinar el efecto del programa de ejercicio físico grupal implementado en el grupo experimental durante 12 semanas de duración en trabajadores de oficina de una empresa española sobre la salud mental y física y en las variables relacionadas con el rendimiento y la productividad en el trabajo, se diseñó un estudio cuasiexperimental con dos grupos pre-post que fue desarrollado entre abril y junio de 2016 en una empresa sita en Valencia (Comunidad Valenciana, España). Todos los participantes firmaron un consentimiento informado antes del comienzo de este. El programa tuvo una duración de 12 semanas, dos días a la semana y con sesiones de 60 minutos. Se tomaron datos antes (pre) y después (post-test) de la intervención a un grupo, sometido al tratamiento, frente al grupo control, que no se sometió a la intervención. Los datos fueron tratados de forma confidencial y anónima con arreglo a la Ley Orgánica 14/2007, de 3 de julio de 2007. Las propiedades del espacio se encuentran detalladas en el Anexo 4.

4.2.2 Metodología adoptada para la construcción de un modelo organizativo exploratorio

Con el fin de establecer un modelo organizativo marco capaz de adaptarse a la cultura corporativa de la propia organización, fueron considerados los aspectos teóricos marcados por Fertman (Fertman, 2015) y los criterios de calidad de la *ENWHP* para pequeñas y medianas empresas (ENWHP, 2001).

4.2.3 Modelo de planificación exploratoria propuesto

4.2.3.1 Aspectos previos

La comunidad científica no ha adoptado todavía un marco de trabajo único que permita desarrollar programáticamente las tareas de planificación de los programas. Dichas intervenciones han estado sujetas a diferentes criterios técnicos lejos de cualquier comprobación empírica de los mismos. Si bien no fue objeto del presente estudio examinar los modelos de planificación propuestos por diferentes autores, con el fin de validar uno de ellos, sí lo fue el de conformar unas directrices teóricas básicas que partieran de la integración de los elementos considerados más relevantes de cada uno de ellos. Dicho elemento se consideró necesario con el fin de sugerir el latente campo de trabajo referido a la validación empírica de un modelo de planificación efectivo para las organizaciones.

4.2.3.2 Fases adoptadas para su consecución

A pesar de la multidisciplinariedad de términos y de las distintas contribuciones e ideas de entidades (gubernamentales o no) que en torno a los modelos de planificación han

venido sugiriéndose en distintos foros académicos y profesionales, se llegó a la conclusión de que todos ellos guardan unas directrices en común muy bien recogidas en la obra de Fertman (Fertman, 2015).

Dada la reciente aparición de la obra en el marco del presente estudio, y su concreción y adaptabilidad de dichas fases para el versátil tejido empresarial intercultural en el que puede verse localizada la entidad objeto de muestra, nos pareció interesante emplear su modelo de planificación. Para determinar el marco de consecución del estudio fueron consideradas tres fases que a su vez se presentan sugerentemente a debate científico cara a futuras intervenciones. Siguiendo las distintas contribuciones previamente citadas, dichas fases son: planificación, implementación y evaluación.

La fase de planificación estableció la disposición de recursos organizativos, humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo la intervención; por su parte, en la fase de implementación se llevó a cabo el desarrollo del trabajo de campo; por último, la fase de evaluación siguió con la digitalización de los datos obtenidos para su posterior tratamiento estadístico, además de las tareas de desmontaje y liquidación de la intervención en términos logísticos y organizativos (Fertman, 2015).

4.2.4 Selección de participantes

4.2.4.1 Diseño y composición de la muestra

Con arreglo a los criterios de inclusión establecidos, únicamente personas sanas y con puestos de trabajo en oficina fueron reclutadas para participar en el estudio. La información del estudio fue publicitada a través de un llamamiento a medios y una nota de prensa que invitaba a las empresas interesadas a participar. La supervisión de solicitudes se realizó a través del Grupo de Investigación Social en el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, quien también difundió la información entre sus miembros con el fin de lograr la composición de la muestra.

4.2.4.2 Criterios de inclusión

- Personas mayores de 18 años y menores de 65 años
- Que desempeñan una ocupación laboral regular en oficina
- Disposición a participar en el programa
- Capacidad para comunicarse en castellano, inglés, francés o valenciano
- Firmante del consentimiento informado suministrado al inicio del programa

4.2.4.3 Criterios de exclusión

- No desempeñar una ocupación laboral regular en oficina
- Personas con enfermedades cardiovasculares o pulmonares diagnosticadas clínicamente
- Personas con problemas musculoesqueléticos diagnosticados clínicamente
- Mujeres embarazadas
- No firmantes del consentimiento informado suministrado al inicio del programa

4.2.4.4 Procedimiento para la selección de los sujetos

La empresa interesada contactó con el responsable del proyecto y se acordaron las acciones de trabajo con arreglo a la cultura corporativa de la organización. El trabajo quedó dividido en dos fases: la primera estableció un llamamiento interno a la participación a toda la población conformada en la empresa; la segunda, estableció las condiciones de la participación y el suministro de la información necesaria para comenzar la intervención. Para ello se facilitó a los participantes preinscritos un documento guía orientativo denominado *Guía del participante*, que contenía ejemplos con los ejercicios del programa y respondía a una batería de preguntas frecuentes (Anexo 3). A los participantes les fue transmitida la información de participar en un programa de ejercicio físico supervisado de tres meses de duración, con una duración total del proyecto de cuatro meses desde su comunicación. Aquellos que no cumplieran los criterios de inclusión o no deseaban participar en el programa se les invitó a formar parte del grupo control. Los participantes que cumplieron los criterios de inclusión completaron el consentimiento informado y el documento de descarga de responsabilidades (Anexo 9). En todo momento los participantes tuvieron ocasión de contactar por correo electrónico con el Coordinador del proyecto y formular tantas cuestiones se consideraron oportunas. Los participantes afirmaron no cumplir de forma regular las recomendaciones internacionales de actividad física de acuerdo con la OMS (OMS, 2010).

Una vez alcanzado el consentimiento de la empresa, se envió una llamada a la participación a través de una comunicación formal empleando los canales corporativos de anuncio, principalmente a través de correo electrónico corporativo y anuncios en tableros de anuncios.

Asimismo, se asignó a un coordinador del proyecto en la empresa encargado de difundir la información entre la totalidad de empleados. Se estableció el criterio de la voluntariedad de participación en el estudio desde una doble perspectiva. Primero, aquellos participantes que desearan participar en el programa de entrenamiento y, segundo, aquellos empleados que desearan participar en el estudio, pero no en el programa de entrenamiento. Los participantes no fueron informados de los propósitos del estudio con el fin de controlar el sesgo producido por la observación del investigador.

4.2.5 Composición de los grupos y temporalización

Los participantes fueron divididos en dos grupos: un grupo de intervención o experimental y un grupo control. Aquellos participantes que deseaban participar en el protocolo experimental fueron asignados al grupo de intervención. Todos los participantes fueron codificados con el fin de anonimizar el proceso.

- **Grupo experimental:** trabajadores/as en puestos de trabajo de oficina que deseen adherirse al programa y que se encuentren en edad de trabajar. La intervención experimental duró 12 semanas, con un global de 22 sesiones de entrenamiento. Ambos grupos fueron medidos con arreglo a las variables seleccionadas antes y después de las 12 semanas de entrenamiento. Después, el grupo control fue invitado a participar en una segunda intervención con el fin de cegar los grupos y para que no se produjera el sesgo ocasionado por la

observación del investigador con arreglo a otros estudios seminales (Brox y Frøystein, 2005) sin embargo, esta opción tuvo que ser descartada ante la falta de recursos.

- **Grupo control:** trabajadores/as en puestos de trabajo de oficina que voluntariamente desearon colaborar con la investigación desde su participación en este grupo.

La Figura 21 muestra el proceso de temporalización y conformación de los grupos.

Figura 21. Algoritmo de decisión de participantes

Nota. Fuente: Elaboración propia (2017).

4.2.6 Diseño del programa de intervención

4.2.6.1 Intervención de ejercicio físico

Promoción de Ejercicio en el Trabajo (PRODET) fue el nombre que recibió el programa. El programa se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa seleccionada. El programa tuvo una duración de 12 semanas de trabajo conformadas entre abril y junio de 2016. El programa fue diseñado por el Coordinador del proyecto, bajo la supervisión del Grupo de Investigación Social en el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, y conducido por un profesional Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte especializado en *fitness* y con la certificación de Antropometrista (Nivel 1) por la Sociedad Internacional Para el Avance de la Cineantropometría (ISAK). Dicho profesional fue contratado con cargo al Coordinador del proyecto, quien dirigió su formación durante dos semanas.

Durante una primera fase se llevó a cabo la presentación del estudio en la empresa, así como el establecimiento del marco científico y la programación de tareas. En una segunda fase se diseñó el programa de intervención, que contuvo una parte de ejercicio físico y otra formativa mediante el envío de formaciones a través de correo electrónico. El técnico contratado tuvo la oportunidad de contactar en todo momento con el

Coordinador del proyecto. Semanalmente se hacía un reporte al inicio y al final con el fin de prever los recursos necesarios en cada momento del programa. A su vez el Coordinador del proyecto custodió y supervisó las acciones relativas al tratamiento de la información anonimizada de los participantes y la distribución de los grupos. Finalmente se conformaron tres grupos de trabajo divididos en horarios flexibles con base en su calendario laboral.

Con el fin de favorecer la máxima participación, en todo momento la empresa pudo seleccionar los horarios que consideró necesarios con base en la demanda establecida de los participantes. Antes y después del programa, se tomaron los datos pre-test y post-test. Una vez conformadas las demandas establecidas, se procedió a la adquisición de los equipamientos necesarios para desarrollar el programa de acuerdo con el inventario. Todas las sesiones incorporaron un calentamiento, una parte principal y una vuelta a la calma.

Ponderación mensual de cargas asociadas al desarrollo de las sesiones

Durante el programa se llevó a cabo un trabajo de fuerza, capacidad aeróbica, flexibilidad y salud en la espalda. La salud en la espalda se trabajó con arreglo a las rutinas que la empresa ya venía desarrollando. Las sesiones se programaron siguiendo los principios de entrenamiento. El 10 % de tiempo útil de las sesiones de cada mes se destinó a realizar un calentamiento. Durante el primer mes se procuró realizar un mayor trabajo de fuerza para alcanzar una mayor adherencia de la musculatura al trabajo de resistencia posterior. La capacidad aeróbica fue incrementándose hasta un 30 % de la carga de trabajo el segundo mes. La flexibilidad y los ejercicios relacionados con la zona media y baja de la espalda se trabajaron progresivamente en el programa hasta el tercer mes de trabajo (Figura 22).

Figura 22. Infográfico sobre la distribución de trabajo del programa de ejercicio

Nota. Fuente: Elaboración propia (2017).

Asimismo, el plan de trabajo presentó una distribución de objetivos conformados por los tres meses de trabajo. La primera semana del programa se empleó para familiarizar

a los participantes con el programa y aprender la técnica de los ejercicios. Asimismo, se fue adaptando la intensidad de estos de forma progresiva. Durante el segundo mes se buscó un aumento del trabajo aeróbico a través de juegos y dinámicas grupales. Finalmente, el tercer mes se procuró mantener el trabajo de movilidad y prevención adquirido previamente, además de progresar con el trabajo aeróbico. En la Tabla 6 se describen los objetivos de PRODET distribuidos durante los tres meses.

Tabla 6. Programación de los objetivos mensuales de PRODET

Mes	Objetivo
Primer mes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer una familiarización con la sala, material y compañeros 2. Aprender la técnica de los ejercicios 3. Adaptar la intensidad mínima de entrenamiento según las recomendaciones internacionales 4. Aprender ejercicios para realizar durante el trabajo para estirar y relajar la musculatura con dolencias
Segundo mes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar el trabajo aeróbico pautado en movilidad y prevención 2. Desarrollar una progresión de trabajo aeróbico a través de juegos grupales
Tercer mes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progresar con el trabajo aeróbico manteniendo el trabajo de movilidad y prevención

Nota. Fuente: Elaboración propia (2017).

Sesiones desarrolladas

Las sesiones se distribuyeron con arreglo a tres partes: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. El calentamiento estuvo dedicado a los primeros diez minutos de la sesión, compuesto fundamentalmente por activación muscular, ejercicios aeróbicos en progresión, movilidad articular, estiramientos y dinámicas grupales a través de juegos motores. El plan de trabajo siguió las recomendaciones propuestas para la población española en la revisión de Estévez-López, Tercedor y Delgado-Fernández (Estévez-López, Tercedor, y Delgado-Fernández, 2012) y de acuerdo con los componentes del entrenamiento del trabajo de revisión sistemática con metaanálisis del estudio 1 (Tabla 7).

Tabla 7. Recomendaciones de actividad física para la salud en sujetos sanos

Capacidad física	Recomendaciones recogidas
<i>Fitness</i> cardiorespiratorio	150 minutos de actividad física moderada, 5 días a la semana o 75 minutos semanales de actividad vigorosa con una frecuencia de 3 días a la semana
Fuerza y fuerza resistencia	De 2 a 3 series de entre 8 y 10 ejercicios con una carga de 8 a 12 repeticiones. Al menos, dos días semanales no contiguos

Capacidad física	Recomendaciones recogidas
Flexibilidad	2 o 3 días semanales de estiramientos, de 2 a 4 repeticiones con una duración de 15 segundos por ejercicio

Nota. Adaptado de “Recomendaciones de actividad física para adultos sanos. Revisión y situación actual”, por Estévez-López, F., Tercedor, P., Delgado-Fernández, M., 2012, *Journal of Sport & Health Research*, 4(3).

Sesión 1

Calentamiento: Introducción a diferentes ejercicios de movilidad articular. A la vez que se explicaba cada ejercicio, se numeró y se practicó. Una vez explicados todos los ejercicios, se dispuso a los alumnos en círculo, se eligió aleatoriamente a uno de ellos y se le asignó un número que corresponde con uno de los ejercicios previamente numerados para que lo realice y lo explique al resto de participantes.

Parte principal: Siguiendo la dinámica del calentamiento, se realizaron diferentes ejercicios generales de fuerza, con y sin material, para el trabajo de diferentes grupos musculares (pectoral, dorsal, abdominal, lumbar, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y sóleos, bíceps y tríceps braquial, deltoides, etc.). El objetivo de esta dinámica fue enseñar y consolidar la técnica de los ejercicios buscando el máximo aprovechamiento del tiempo de la sesión.

Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de estiramiento dinámico y relajación.

Sesión 2

Calentamiento: Repaso a los ejercicios de calentamiento realizados en la primera sesión. Introducción de nuevos ejercicios de calentamiento específicos de zonas sensibles a dolencias musculoesqueléticas como hombros, cuello y lumbar. Estos ejercicios incluyen movilidad de estas zonas, así como concienciación de la musculatura implicada y correcta ejecución técnica.

Parte principal: Preparación de un 1 circuito de fuerza por parejas mediante ejercicios generales. Las pautas para la realización del circuito fueron: 15-20 repeticiones por ejercicio, 30 segundos de descanso entre ejercicios y 1-2 minutos de descanso entre rondas. Se realizaron 3 series.

Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de estiramiento dinámico y relajación.

Sesión 3

Calentamiento: Planteamiento de nuevos ejercicios de calentamiento más dinámicos y con un mayor componente propioceptivo.

Parte principal: Preparación de un circuito de ejercicios para el fortalecimiento de las zonas más sensibles a problemas musculares en esta población. Se realizaron ejercicios

con las bandas elásticas y *tone loops* para fortalecimiento del complejo glenohumeral, zona lumbar, caderas y también para la realización de ejercicios posturales en bipedestación y tumbado supino.

Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de relajación y movilidad de cadera con los *fitballs*.

Sesión 4

Calentamiento: Planteamiento de nuevos ejercicios de calentamiento más dinámicos y con un mayor componente propioceptivo. Realización de algunos ejercicios de la parte principal de la tercera sesión como método preventivo en el desarrollo de dolencias musculares.

Parte principal: Preparación de una batería de ejercicios que se realizaron en forma de circuito. Selección de ejercicios generales realizados con bandas elásticas, *fitball*, gomas, esterillas, etc. Se marcaron 8 estaciones en el espacio para que los participantes se fueran desplazando por las mismas, sin descansar entre ejercicios, pero sí al terminar el circuito (>1' min). Se realizaron 4 series.

Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de relajación y movilidad de cadera con los *fitballs*.

Sesión 5

Calentamiento: Calentamiento por parejas. Se realizaron ejercicios de movilidad y estiramientos dinámicos generales, además de algunos ejercicios de velocidad de reacción. También se llevaron a cabo ejercicios de fortalecimiento y prevención para la zona del cuello y lumbar.

Parte principal: Circuito de entrenamiento de fuerza por parejas. Planteamiento de 6 ejercicios generales siguiendo los patrones de tracción, empuje, sentadilla, *split* y trabajo del CORE. Se realizó un breve intervalo de trabajo aeróbico para comprobar la respuesta cardiovascular midiendo la FC. Vuelta a la calma: Realización de diferentes ejercicios de relajación y movilidad de cadera con los *fitballs*.

Sesión 6

Calentamiento: Calentamiento por parejas. Se realizaron ejercicios de movilidad y estiramiento dinámico generales, además de algunos ejercicios de velocidad-reacción. También se realizará ejercicios de fortalecimiento y prevención para la zona del cuello y lumbar.

Parte principal: Preparación de una serie de ejercicios realizados en sillas de oficina para aplicar durante su jornada laboral para liberar y relajar muscularmente aquellas zonas donde acusan mayores dolencias.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y respiración tumbados sobre las colchonetas.

Sesión 7

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Preparación de un circuito mixto de fuerza y aeróbico compuesto por 4 ejercicios de fuerza para pectoral, dorsal, miembros inferiores y CORE y un ejercicio adicional con una mayor implicación aeróbica adaptado a las capacidades de cada persona, consistente en *skipping* bajo, *skipping* alto y ejercicios de coordinación sobre el step. Este último ejercicio se eligió en función del nivel de cada persona. Se realizaron 3 series del circuito, descansando entre 1-2 min al acabar el quinto ejercicio.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 8

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Se propuso un circuito combinado de tipo aeróbico y de fuerza por intervalos de trabajo/descanso en una ratio 1:1, con 30 segundos por cada intervalo. El circuito está compuesto por 2 ejercicios con step para incidir en el componente cardiovascular, un ejercicio de fuerza con gomas y otro de CORE.

Al finalizar cada ronda, se descansa 1 min completo y se vuelve a empezar, realizando un total de 4 series.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 9

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Propuesta de 20 tareas a realizar durante la sesión. Cada tarea se corresponde con un ejercicio distinto de fuerza muscular, CORE o fortalecimiento. Entre cada tarea, el participante debe completar un ejercicio de tipo cardiovascular, que será adaptado en función de cada persona (*skipping*, desplazamientos, saltitos en step, etc.). Cada participante debe realizar en el orden marcado las distintas tareas y el ejercicio cardiovascular intercalado.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 10

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Sesión de estiramientos y ejercicios de fortalecimiento para las zonas más sensibles a dolencias musculares. La sesión se desarrolla principalmente con el uso de *fitballs*, gomas y colchonetas.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 11

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Preparación de diferentes juegos por grupos en los que los desplazamientos, la velocidad de reacción, la agilidad y el control corporal serán los componentes que más destaquen para la consecución de las diferentes tareas empleadas.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación para terminar la sesión.

Sesión 12

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Sesión de estiramientos y ejercicios de fortalecimiento para las zonas más sensibles a dolencias musculares. La sesión se desarrolla principalmente con el uso de *fitballs*, gomas y colchonetas.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 13

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Se propone un circuito combinado de tipo aeróbico y de fuerza por intervalos de trabajo/descanso en una ratio 1:1, con 30 segundos por cada intervalo. El circuito estuvo compuesto por 2 ejercicios con step para incidir en el componente cardiovascular, un ejercicio de fuerza con gomas y otro de CORE. Al finalizar cada ronda, se descansa 1' completo y se vuelve a empezar, realizando un total de 4 rondas.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 14

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Sesión de estiramientos y ejercicios de fortalecimiento para las zonas más sensibles a dolencias musculares. La sesión se desarrolla principalmente con el uso de *fitballs*, gomas y colchonetas.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 15

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Circuito de ejercicios de fuerza específicos para el trabajo de los miembros superiores. Se proponen dos ejercicios para dorsal ancho y dos para pectoral mayor, uno para deltoides posterior, uno de bíceps y otro de tríceps. Además, se realizaron ejercicios isométricos de abdominal.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 16

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Circuito de ejercicios de fuerza específicos para el trabajo de los miembros inferiores. Se proponen distintos ejercicios para el trabajo de cuádriceps, isquiotibiales, sóleo y gemelos. Se propone una variedad de ejercicios con estabilidad monopodal y unipodal, además del uso de algunos materiales elásticos.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 17

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Se dan una serie de números que corresponden con un movimiento en concreto. Una vez informados y practicados, se realizan intervalos de 1 minuto durante el cual se va cantando los números y los participantes realizaron los movimientos correspondientes. Se progresa hacia intervalos de hasta 2 min.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 18

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Se propuso un circuito de cuerpo completo. El circuito consistió en la realización de 6 ejercicios, con 10 repeticiones y 4 series por ejercicio. Entre serie y serie se realizó un ejercicio cardiovascular o abdominales para aumentar la actividad durante la sesión.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 19

Calentamiento: Calentamiento en grupo. Se realizan distintos ejercicios de desplazamiento y estiramientos dinámicos, propiocepción y movilidad articular. Además, se realizan algunos juegos de velocidad-reacción.

Parte principal: Propuesta sesión de ejercicios para prevenir y fortalecer zonas con mayor riesgo de dolencias. Además, se realizan estiramientos estáticos.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 20

Calentamiento: Calentamiento en grupo. Se realizan distintos ejercicios de desplazamiento y estiramientos dinámicos, propiocepción y movilidad articular. Además, se realizan algunos juegos de velocidad-reacción.

Parte principal: Circuito de entrenamiento específico para la mejora de las pruebas físicas: saltos, abdominales, equilibrio, velocidad y coordinación manual, etc.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 21

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Se propone una batería de juegos de velocidad reacción y agilidad por parejas y tríos. Después, se realiza un circuito de carácter aeróbico con *steps*, gomas y ejercicios de desplazamiento.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Sesión 22

Calentamiento: Calentamiento individual. Realización de estiramientos dinámicos generales y recordatorio de ejercicios de prevención y fortalecimiento realizados en las primeras sesiones.

Parte principal: Circuito de entrenamiento específico para la mejora de las pruebas físicas: saltos, abdominales, equilibrio, velocidad y coordinación manual, etc.

Vuelta a la calma: Ejercicios de relajación y estiramientos dinámicos.

Los Anexos 5 y 7, respectivamente, muestran algunos ejemplos de ejercicios realizados en la estructura de cargas del programa, así como los materiales empleados para su desarrollo.

Intensidad del entrenamiento

La intensidad fue prescrita con arreglo a los valores de la frecuencia cardiaca de reserva (HRR). La Figura 23 muestra unos valores graduales durante las primeras seis sesiones que alcanzaron el 60 % de la HRR. De igual modo, a medida que aumentaba el trabajo aeróbico, el trabajo preventivo y de movilidad se alcanzaron puntuaciones del 70 % de la HRR. Por su parte, la Tabla 8 muestra el contenido principal de la sesión y el porcentaje de HRR. Las mayores puntuaciones de HRR se tuvo en cuenta para los circuitos de fuerza y aeróbicos por parejas y grupales, con cargas de 6 ejercicios: 4x10 repeticiones (60-70%) y un 35-40% para la flexibilidad y el fortalecimiento de zonas sensibles.

Figura 23. Sesión realizada, intensidad por % de HRR

Nota. Fuente: Elaboración propia (2017).

Tabla 8. Tipo de sesión realizada, intensidad por % de HRR

Mes	Sesión	Contenido principal sesión	Intensidad (%HRR)
Primer mes	1	Inicio programa: familiarización y ejercicios generales de fuerza	35 %
	2	Circuito fuerza: 3x15 (1' rec)	40 %
	3	Fortalecimiento zonas sensibles	40 %
	4	Circuito funcional: 8 estaciones	50 %
	5	Circuito entrenamiento fuerza por parejas	60 %
	6	Ejercicios en sillas de oficina	35 %
	7	Circuito combinado: fuerza y aeróbico: 5 ejercicios (1' rec)	60 %
	8	Circuito combinado: fuerza y aeróbico: 1:1 (30" rec)	70 %
Segundo mes	9	Fuerza muscular, core y fortalecimiento	70 %
	10	Fortalecimiento zonas sensibles y estiramientos	35 %
	11	Juegos grupales: agilidad y control corporal	70 %
	12	Estiramientos y ejercicios de fortalecimiento	35 %
	13	Circuito combinado: fuerza y aeróbico: 1:1 (30" rec)	70 %
	14	Estiramientos y ejercicios de fortalecimiento	35 %
	15	Fuerza específica miembros superiores	70 %
	16	Fuerza específica miembros inferiores	70 %
Tercer mes	17	Juegos grupales: agilidad y control corporal	60 %
	18	Circuito completo 6 ejercicios: 4x10 rep	70 %
	19	Prevención y fortalecimiento zonas con dolencias	35 %
	20	Circuito entrenamiento específico	70 %
	21	Juegos velocidad de reacción y agilidad por parejas y tríos	70 %
	22	Cierre del programa: circuito de entrenamiento específico	70 %

Nota. Fuente: Elaboración propia (2017).

4.2.6.2 Programa de formaciones en línea

La literatura existente propone que programas que aglutinan mejores efectos de las intervenciones son aquellos que incorporan algún trabajo telemático a través de formaciones en línea (Andersen et al., 2013; Eriksen et al., 2002; Robroek, Polinder, Bredt, y Burdorf, 2012). A tal efecto se diseñaron trece formaciones que fueron enviadas a los participantes a través de correo electrónico corporativo. Con el fin de garantizar la recepción de estas, fueron enviadas seleccionando la opción de acuse de recibo.

Las formaciones consistieron en una recopilación de consejos sobre temas variados en torno a la promoción de hábitos saludables, más concretamente, la promoción de la salud mental, la nutrición y la actividad física. El coordinador del proyecto envió individualmente a cada participante y a través de correo electrónico corporativo cada una de las formaciones. Todas ellas fueron seleccionadas metodológicamente a través de la conformación de un grupo de discusión que permitió confeccionarlas en función del momento presente en el programa de entrenamiento (Tabla 9).

Tabla 9. Programación mensual de envío de formaciones

Mes	Formación
Primer mes	1. Hidratación relativa al entrenamiento 2. Recomendaciones en hidratación 3. Riesgos del sedentarismo
Segundo mes	4. No más sedentarismo 5. Entrenar la fuerza: ¿por qué? 6. Mareos, náuseas o vértigos durante la actividad física 7. Alimentación relativa al entrenamiento 8. Pirámide nutricional 9. Pérdida de peso
Tercer mes	10. ¿Estirar antes de sesiones de fuerza? 11. Descanso, estiramientos estáticos y producción de fuerza (I) 12. Descanso, estiramientos estáticos y producción de fuerza (II) 13. Desentrenamiento

Nota. Fuente: Elaboración propia (2017).

Formación 1

Hidratación relativa al entrenamiento: en ella se procuraron ofrecer los consejos relativos indispensables antes de comenzar con las sesiones de entrenamiento.

Formación 2

Recomendaciones en hidratación: una vez puestos de manifiesto los beneficios de la hidratación, los participantes recibieron una batería de recomendaciones específicas.

Formación 3

Riesgos del sedentarismo: con el fin de reflexionar sobre los efectos nocivos para la salud que un estilo de vida sedentario puede ocasionar en un ser humano y favorecer así una promoción de hábitos de salud con los participantes que procurara adherirlos al ejercicio físico.

Formación 4

No más sedentarismo: más específica y directa que la anterior, con esta nueva formación se pretendió incidir sobre las molestias recurrentes y para mejorar los niveles de fatiga y cansancio mientras se está trabajando.

Formación 5

Entrenar la fuerza: ¿por qué?: fundamentos anatómicos, biomecánicos y fisiológicos para el entrenamiento de la fuerza en adultos.

Formación 6

Mareos, náuseas o vértigos durante la actividad física: desde el propósito de prevenir estos síntomas recurrentes, se propusieron estos mecanismos de acción en forma de recomendaciones para procurar una educación básica a los participantes en la materia.

Formación 7

Alimentación relativa al entrenamiento: recomendaciones sobre hábitos alimenticios y nutricionales que permitan a los participantes escoger sus mejores estrategias de hidratación y hábitos nutricionales.

Formación 8

Pirámide nutricional: formación específica orientada a la divulgación y explicación de la pirámide nutricional y sus alimentos predominantes.

Formación 9

Pérdida de peso. Consejos para la pérdida de peso basados en estilos de vida saludables.

Formación 10

¿Estirar antes de sesiones de fuerza? Con el fin de analizar los diferentes tipos de estiramientos y reflexionar sobre su importancia tras la realización de sesiones de fuerza.

Formación 11

Descanso, estiramientos estáticos y producción de fuerza: si en la anterior formación se abordaron asuntos acerca de los efectos de estirar antes de una sesión de fuerza, en esta formación se abordaron los efectos de la realización de estiramientos mientras se descansa entre las distintas series de un mismo ejercicio.

Formación 12

Descansos, estiramientos estáticos y producción de fuerza (II): pautas sobre el descanso. Diferencias entre descanso activo y pasivo. Trabajo muscular.

Formación 13

Desentrenamiento: en esta formación se analizó la incidencia que podría desempeñar una persona entrenada que sigue hábitos saludables cuando deja de realizar ejercicio físico y comienza una vida sedentaria.

El contenido íntegro de las formaciones remitidas puede consultarse en el Anexo 6.

4.2.7 Procedimiento de toma de datos y protocolo de experimentación

Los participantes fueron informados en una sesión independiente a la primera con relación a la programación. Después de firmar sus consentimientos informados, se procedió a la toma de datos pre-test. Posteriormente, se desarrolló el programa de intervención con el grupo experimental. Una vez finalizado el programa, tanto el grupo experimental como el control se sometieron a la toma de datos post-test. A ambos grupos se les animó a continuar con un estilo de vida activo más allá del programa de entrenamiento. El procedimiento de toma de datos fue digitalizado en una base de datos para su posterior procesamiento estadístico de acuerdo con el siguiente protocolo experimental (Figura 24).

Figura 24. Protocolo experimental del trabajo de campo

Nota. Fuente: Elaboración propia (2017).

4.2.8 Variables e instrumentos utilizados

4.2.8.1 Variables psicológicas

Depresión

La depresión es un problema común entre los trabajadores (Kessler, Merikangas, y Wang, 2008) y puede definirse como un trastorno que consiste en un sentimiento de tristeza, pérdidas de energía y problemas para realizar actividades de la vida diaria que afecta a cerca de 120 millones de personas en todo el mundo (Lépine y Briley, 2011). Desde hace años se conoce que afecta a muchas formas, por ejemplo, baja moral, disminución de la productividad, mayores accidentes, etc. (Johnson y Indvik, 1997). Se administró la “Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos” (CES-D) (Radloff, 1977) (Anexo 10). El CES-D mide los síntomas de diagnóstico definidos por la

Asociación Psiquiátrica Americana en el manual “*American and Statistical Manual (DSM-V)*” para un episodio depresivo mayor. Se trata de un cuestionario que evalúa los síntomas depresivos de la población en general. Entre los distintos ítems se encuentran los ánimos depresivos, pérdida de apetencia, sentimientos o percepciones negativas en relación con la autoestima. El tiempo de administración osciló en 5 minutos. Se trata de una escala tipo Likert donde los participantes responden la frecuencia en la que han experimentado los síntomas en la última semana, siendo “0” raramente o nunca y “3” la mayor parte del tiempo. Su corrección establece un sumatorio de las puntuaciones obtenidas hasta un máximo de 60 puntos. Por encima de 16 puntos se considera un participante con trastorno depresivo. La confiabilidad y consistencia del instrumento Alfa de Cronbach (α) se consideró apropiada para la población española en estudios previos ($\alpha \geq 0,82$) (Herrero y Gracia, 2007; Ruiz-Grosso et al., 2012; Soler et al., 1997).

Ansiedad estado y ansiedad rasgo a través del “Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE)”

Se trata de un instrumento que evalúa dos tipos relativos de ansiedad, tipificados en subescalas: la ansiedad como estado se refiere a una emoción temporal y la ansiedad como rasgo, que establece una predisposición a la ansiedad (Spielberger, Gorsuch, y Lushene, 1970). Cada subescala tiene 20 ítems (Anexo 11). En el “Inventario de Ansiedad-Estado” hay 10 ítems negativos y positivos. Las respuestas se encuentran estructuradas en una escala tipo Likert que oscila de 0 a 4 para sendas subescalas, en las que el participante debe responder cómo se siente con relación a las cuestiones formuladas. Los resultados se encuentran divididos en alto, medio y bajo para ambas subescalas, siendo considerado alto cuando la puntuación resultante es mayor o igual que 45; medio entre 30 y 44 y, bajo, cuando es menor o igual que 30 puntos. Posee una consistencia interna entre 0,86 y 0,95, observándose la medida Alfa de Cronbach (α) mayor de 0,8822 (Spielberger, 2013). Investigaciones previas han situado el Alpha de Cronbach (α) por encima de 0,83 (Rojas-Carrasco, 2010).

4.2.8.2 Variables sobre la productividad y el rendimiento en el trabajo

Capacidad para el trabajo

El concepto de capacidad para el trabajo puede ser definido como la habilidad de un empleado o trabajador para rendir bien en su trabajo (Ilmarinen y Rantanen, 1999) tal como refrendan otros autores (De Zwart et al., 2002). Se empleó el instrumento WAI traducido literalmente como “Índice de Capacidad para el Trabajo” (ICP) (Anexo 12). Fue desarrollado en 1994 por un grupo de trabajo integrado por miembros del *Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)* y *The Finnish Post Ltd* (Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, Katajarinne, y Tulkki, 1994). El ICP es un instrumento utilizado en la investigación relacionada con la salud ocupacional para evaluar la capacidad laboral de los trabajadores. El ICP se ha consolidado como una herramienta ampliamente utilizada que ayuda a las empresas a la promoción de la capacidad para el trabajo (Ilmarinen, 2009). Siguiendo la retrospectiva de Ilmarinen (2007) el instrumento cubre las siguientes dimensiones:

1. “Capacidad para el trabajo actual”
2. “Capacidad para el trabajo con relación a las exigencias del trabajo”

3. “Número de enfermedades diagnosticadas o condiciones limitantes que sufren”
4. “Deterioro estimado debido a enfermedades o condiciones limitantes”
5. “Cantidad de bajas por enfermedades ocurridas durante el último año”
6. “Pronóstico propio autoevaluado de la capacidad laboral durante dos años”
7. “Capacidad mental para el trabajo” (p. 160).

Cada respuesta está asociada a una puntuación diferente. Se calculan los totales de cada dimensión para determinar su puntuación final. Entre 7 y 27 puntos se considera una capacidad para el trabajo mala. Entre 28 y 36 puntos se establece moderada. Entre 37 y 43 puntos es buena. Entre 44 y 49 puntos se establece muy buena (Tuomi et. al, 1994). El nivel de confiabilidad Alpha de Cronbach fue suficiente ($\alpha > 0,83$) (Peralta, Godoi Vasconcelos, Härter Griep, y Miller, 2012).

Pérdidas en la productividad relacionadas con la salud

Se empleó el instrumento “iMTA *Productivity Cost Questionnaire*” (“Cuestionario sobre los costes en la productividad iPCQ”) (Anexo 13). Los costes en la productividad suponen una valoración económica que contribuyen significativamente a los costes totales de las evaluaciones económicas, conformándose como una variable que se desconoce aún con claridad los motivos o causas que hacen que no sea estudiada en la literatura (Bouwman et al., 2015). Los autores del instrumento, se plantearon diseñar un cuestionario estandarizado que permitiera homogeneizar las pérdidas de productividad.

El cuestionario sobre los costes en la productividad de iMTA (iPCQ) incluye tres módulos que miden las pérdidas de productividad del trabajo remunerado debido al absentismo, el presentismo y las pérdidas de productividad relacionadas con el trabajo no remunerado. Las preguntas para medir el absentismo y el presentismo se derivaron de los cuestionarios validados existentes (Koopmanschap, 2005; Van Roijen, Essink-Bot, Koopmanschap, Bonsel, y Rutten, 1996). Se consideró absentismo a corto plazo un máximo de 20 días perdidos en las últimas cuatro semanas.

El número de horas por día y por semana se calcularon dividiendo el número de horas semanales entre el número de días entre semana. En caso de producirse un absentismo superior a 20 días, se consideró a largo plazo. Sobre las tasas de eficiencia se encontraron niveles de confiabilidad satisfactorios ($\alpha = 0,729$) y moderado en las respuestas del número de días de trabajo en los que no asistió al trabajo ($\alpha = 0,556$) (Bouwman et al., 2015). En el supuesto de producirse, a la fecha de realización del cuestionario se restó al tiempo de trabajo perdido, tipificado en el cuestionario también en forma de fecha, resultando los días. En caso de producirse, la ausencia a corto plazo informada que faltaron más de cuatro semanas al trabajo se registró en el cuestionario como “0” (Bouwman et al., 2013). La valoración económica de los costes en la productividad basada en el absentismo siguió dos métodos:

1. Método de coste de fricción: hasta que se completa una vacante. Pérdidas sufridas hasta que se ocupa de nuevo el puesto, donde la ausencia es mayor al tiempo de fricción, se determina la duración del periodo de fricción. El periodo de fricción establece un sumatorio entre la duración estimada de la vacante y cuatro semanas.

2. Método de capital humano: la duración depende de la velocidad.

Los costes en la productividad se valoraron sobre la base de los salarios por hora en España en 2014 (INE, 2015) con base en dos vías:

1. Cálculo de los costes de productividad a corto plazo (en el caso de haberse producido absentismo a corto plazo): se calculó multiplicando el absentismo a corto plazo por el número de horas por día y por semana, y por el coste estándar de productividad por hora. El salario por hora se fijó en España en 14,75 euros (INE, 2015).
2. Cálculo de costes en la productividad a largo plazo (en el caso de haberse producido absentismo a largo plazo): en caso de producirse, el procedimiento a atender fue determinado con arreglo a los tres supuestos siguientes:
 - a. Si la duración total es mayor que cuatro semanas, pero menor que el periodo de fricción.
 - b. Si la duración de la ausencia es más larga que el periodo de fricción, pero parte del periodo de fricción cae dentro del periodo entre dos mediciones consecutivas (para este caso es preciso tener en cuenta el número de días de ausencia).
 - c. Si la duración de la ausencia es mayor que el periodo de fricción y todo el periodo de fricción ha transcurrido antes de la fecha de medición anterior a esta.

El presentismo se calculó siguiendo la fórmula descrita a continuación (Bouwman et al., 2013):

$$\text{Presentismo} = \text{Número de días laborales deteriorados} * [1 - (\text{puntuación de eficiencia}/10)] * \text{número de horas/día laborable}$$

Los costes en la productividad basados en el presentismo se calcularon multiplicando el resultado de la fórmula anterior por el precio coste estándar de la productividad (14,75).

En el supuesto de que los participantes informaran sobre su desempeño en un trabajo no remunerado, se calcularon las pérdidas de productividad no pagadas, con arreglo a la fórmula descrita por Bouwman et al. (2013).

$$\text{Pérdidas de productividad no pagadas} = \text{cantidad de días perdidos} * \text{cantidad de horas de ayuda por día}$$

Los costes en la productividad basados en el presentismo se calcularon multiplicando el resultado de la fórmula anterior por el precio coste estándar de la productividad (14,75).

4.2.8.3 Satisfacción laboral

Se empleó el “Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26” de Meliá et al. versión 1990 (Anexo 14). El instrumento pertenece a una familia de cuestionarios sobre satisfacción laboral desarrollados en la Unidad de Psicometría de la Universidad de Valencia y cuyas respuestas se basaban en escalas tipo Likert (Meliá y Peiró, 1988a, 1988b; Meliá et al., 1990). Con la finalidad de conformar un instrumento más breve y aplicable en contextos organizacionales, Meliá et al. (1990) desarrollaron una versión compuesta por 26 ítems con una respuesta de carácter dicotómico (verdadero o falso) y estructuradas en seis dimensiones: satisfacción con la supervisión y la participación en la organización, satisfacción con la remuneración y las prestaciones, satisfacción intrínseca, satisfacción con el ambiente físico, satisfacción con la cantidad de producción y satisfacción con la calidad de la producción. El instrumento presentó unas puntuaciones de consistencia interna satisfactorias en las puntuaciones totales (Alfa: 0,90) y unos valores fluctuantes 0,73 y 0,89 en los distintos factores. Se calcularon indicadores sintéticos según los sumatorios de respuestas positivas en cada dimensión, asignando el valor “1” cuando los sujetos respondieron “verdadero” y “0” cuando respondieron “falso”, de modo que el valor máximo de las puntuaciones de una dimensión fue el número de ítems que la contenía. Los datos fueron interpretados a partir del valor máximo de las puntuaciones de cada dimensión de acuerdo con Martín-García, Ruiz-Hervella y Sánchez-Bayle (2005). La Tabla 10 muestra una descripción de las dimensiones del instrumento y sus coeficientes Alfa sobre el estudio original de Meliá et al. (1990), junto con el valor máximo adoptado por las puntuaciones de cada indicador sintético.

Tabla 10. Descripción de las dimensiones del cuestionario S21/26 e interpretación de las puntuaciones

Dimensión	Descripción	Ítems	Valor máximo puntuaciones	Alfa (α)
“Satisfacción con la supervisión y participación en la organización”	Satisfacción con sus superiores y con su relación; trato y formación recibida por la empresa, así como la participación para la toma de decisiones por parte del empleado	10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20 y 21	9	0,89
“Satisfacción con la remuneración y las prestaciones”	Convenios laborales e incentivos; políticas de promoción y formación en la empresa	4, 9, 10, 12, 14, y 23	6	0,73
“Satisfacción intrínseca”	Satisfacción laboral que	1, 2, 3, y 18	4	0,77

Dimensión	Descripción	Ítems	Valor máximo puntuaciones	Alfa (α)
	ofrece la empresa en sí misma, oportunidades para destacar en aquello que le es del agrado al empleado y toma decisiones individuales			
“Satisfacción con el ambiente físico”	Aspectos relacionados con la ergonomía física y ambiental del puesto de trabajo (temperatura, iluminación, ventilación, etc.)	6, 7, 8, y 24	4	0,78
“Satisfacción con la cantidad de la producción”	Ritmo y cantidad de trabajo desarrollado	5 y 26	2	0,73
“Satisfacción con la calidad de la producción”	Adecuación y calidad de los recursos materiales y del trabajo	24 y 25	2	0,65

Nota. Fuente: Elaboración propia (2018).

4.2.8.4 Variables sobre la condición física

Aptitud aeróbica

Se midió a través de la prueba “*UKK Walk Test*” (2 Km). El test de UKK fue definido por para medir la capacidad aeróbica de los individuos (Laukkanen, Oja, Ojala, Pasanen, y Vuori, 1992; Oja, Laukkanen, Pasanen, Tyry, y Vuori, 1991). La prueba consiste en recorrer 2 Km caminando de forma rápida y continua. El test permite calcular el VO_2 máx partiendo de los resultados del Índice de Masa Corporal de los sujetos (Oja et al., 1991). Para calcular la capacidad aeróbica se registró la frecuencia cardiaca antes y después del ejercicio, así como los minutos y segundos empleados para realizar el recorrido. Para llevarlo a cabo, los participantes fueron invitados a emplear un acelerómetro incorporado en la aplicación *Sports Trakker* v. 2014 propiedad de *Sports Tracking*

Technologies con el fin de contabilizar las distancias realizadas. La toma de la frecuencia cardiaca fue tomada con un pulsómetro marca *Polar FT7*, que fue puesto a disposición de cada participante.

Índice de aptitud aeróbica

Partiendo de la prueba UKK 2 Km y el IMC, se calculó el VO_2 máx con arreglo a la fórmula propuesta por Laukkanen (Laukkanen, 1995). La fórmula fue diferente para hombres y mujeres.

Hombres: $420 + (E * 0,2) - [(Ti * 0,19338) + (FCmedia * 0,56) + (IMC * 2,6)]$ Mujeres: $304 + (E * 0,4) - [(Ti * 0,1417) + (FCmedia * 0,32) + (IMC * 1,1)]$

Donde:

- FC media = Frecuencia cardiaca media durante la prueba expresada en pulsaciones por minuto
- E = Edad del sujeto expresada en años
- Ti = Tiempo empleado en caminar los dos mil metros expresado en segundos
- IMC = Índice masa corporal expresado en Kg/m^2

Este cálculo ha sido resaltado en la literatura científica como una forma de medición fiable y válida (Haakstad y Bø, 2007). Se han encontrado evidencias científicas sobre la correlación positiva entre el UKK 2 Km *Walking Test* y el VO_2 máx ($r = ,57$, $p < 0,01$) (Hagen y Bø, 2003; Laukkanen et al., 1992).

Consumo máximo de oxígeno (VO_2 máx)

La valoración aeróbica en trabajos de resistencia ha sido una de las cualidades básicas esenciales para evaluar la condición física (Oja et al., 1991). La prueba de campo empleada para tal fin fue la predicción del VO_2 máx, medido en $ml/kg^{-1}/min^{-1}$ según la siguiente fórmula (Laukkanen, 1995; Laukkanen, Kukkonen-Harjula, Oja, Pasanen, y Vuori, 2000) empleadas en trabajos de campo con la población española (Prada, 2005). La fórmula fue diferente para hombres y mujeres:

Para hombres: $VO_2 \text{ máx (estimado)} = 184'9 - 4'65 (Ti) - 0'22 (FC) - 0'26 (E) - 1'05 (IMC)$ Para mujeres: $VO_2 \text{ máx (estimado)} = 116'2 - 2'98 (Ti) - 0'11 (FC) - 0'14 (E) - 0'39 (IMC)$
--

Donde:

- VO_2 máx = Consumo máximo de oxígeno expresado en $ml\ kg^{-1}\ min^{-1}$
- Ti = Tiempo empleado en caminar los dos mil metros expresado en segundos
- FC = Frecuencia cardiaca al finalizar la prueba expresada en pulsaciones por minuto
- E = Edad del sujeto expresada en años
- IMC = Índice masa corporal expresado en Kg/m^2

Aptitud musculoesquelética

Con arreglo a los recursos disponibles fueron seleccionadas pruebas de aptitud musculoesquelética validadas en la batería versión española Eurofit para adultos (Oja, Tuxworth, Alvarez, y Edo, 1998).

- **Flexibilidad de la zona baja de la espalda, extensores de cadera y flexores de rodilla (*sit and reach*)** (Wells y Dillon, 1952): el sujeto inició la prueba sentado en el suelo, con las piernas extendidas y juntas. Cada ejecutante colocó los pies sobre el cajón de flexibilidad, con pies descalzo y mirando hacia adelante. Seguidamente el sujeto flexionó el tronco hacia adelante, empujando una barra cursor tan lejos como le resultaba posible. La medida se calculó según la distancia medida en centímetros que el participante era capaz de desplazar el cursor (Nivel de confiabilidad Alpha de Cronbach: 0,89-0,99) (Ayala, de Baranda, de Ste Croix, y Santonja, 2012).
- **Resistencia de músculos de brazos y manos** (dinamometría manual): la prueba de dinamometría se desarrolló con los sujetos de pie, flexionando el brazo y con la mano en supinación. A continuación, el participante flexionó los dedos de la mano ejerciendo la mayor fuerza posible. Se empleó un dinamómetro analógico *Takei 5001 Hand Grip Dynamometer* con unas dimensiones de 154mm W x 235mm D x 59mm H con un rango de medidas entre 0 y 100 kgf.
- **Potencia de los músculos del tren inferior** (salto vertical y horizontal): la prueba de salto vertical se destinó a evaluar la potencia del tren inferior. Inicialmente, el sujeto traza con el hombro relajado y con las plantas de los pies apoyadas en el suelo, una línea sobre una regla medida en la pared lateral. Para su ejecución, el sujeto partía posición de bipedestación, con las piernas abiertas a la anchura de los hombros. A continuación, realizó un salto vertical procurando trazar una nueva línea. Seguidamente, se mide la distancia entre una marca y otra. Las marcas se fueron dibujadas empleando un rotulador color negro marca *Edding 400*. La prueba de salto horizontal se ejecutó sobre una superficie plana en la que el participante ejecutó dos intentos. Con los pies juntos, el participante realizó un salto sobre una cinta métrica colocada en el suelo. La medida registra el punto de apoyo del talón del pie más cercano al comienzo de la cinta métrica. Se registró la mejor puntuación de los dos intentos. La cinta métrica fue un flexómetro marca *Stanley PowerLock* de 5 m (16 pulgadas).
- **Fuerza resistencia** a través de los abdominales. La prueba de abdominales consistió en contabilizar el número de flexiones y extensiones de tronco en 30 segundos. Para ello, los participantes se colocaron en tendido supino con las piernas ligeramente flexionadas sobre una colchoneta de 140 x 50 x 1,5 cm. marca *ELK Sport*, mientras un compañero les sujetaba los tobillos. A continuación, el ejecutante ejecutó la tarea de abdominales. El tiempo fue medido empleando un cronómetro *Traceable (Control Company)*.

Aptitud motriz

Consistió en desarrollar una batería de pruebas seleccionadas de la batería Eurofit, con arreglo a las funciones propias del puesto de trabajo (Oja et al., 1998).

- **Velocidad segmentaria: movimientos de la mano (*plate tapping test*):** el golpeo de las placas mide la velocidad de la extremidad superior. Los sujetos se colocaron delante de la misma mesa en el lugar de trabajo con las piernas separadas a la anchura de los hombros. La disposición de la prueba ofrece un cuadrado en el centro y dos círculos en cada lateral. Para su ejecución el participante debe colocar su mano no dominante sobre el cuadrado y la otra mano sobre uno de los círculos. Al comenzar la prueba, el participante ha de tocar de forma alternativa los dos círculos 25 veces. La prueba finaliza cuando se llega al número 50. Se contabilizaron los minutos y los segundos con un cronómetro *Traceable (Control Company)*.
- **Equilibrio unipodal:** el equilibrio pretendió medir la coordinación de los movimientos preservando el equilibrio corporal. Para ello se empleó el *Flamingo Balance Test*, consistente en preservar el equilibrio sobre un solo pie durante 1 minuto. El participante se colocó en posición erguida sobre un apoyo en una barra metálica marca *Eveque* de 3 cm de ancho y 60 cm de longitud. Se contabilizaron el número de veces que el participante tocó el suelo con el pie contrario al que tenía en apoyo durante 60 segundos (Oja et al., 1998).

4.2.8.5 Variables físicas y antropométricas

Estatura y peso

La estatura y el peso se midieron empleando una báscula con tallímetro marca *Gima-Pegaso*. Los sujetos realizaron la prueba desprovistos de ropa pesada y con pies descalzos, de acuerdo con las instrucciones previas recibidas.

Índice de Masa Corporal (IMC)

El IMC representa una unidad de medida apropiada para calcular el estado ponderal de una persona, aplicable indistintamente en mujeres y hombres, constituyéndose como una medida internacionalmente aceptada para medir el sobrepeso y la obesidad de las personas (Moreno, 2012). El IMC se calculó a partir de la fórmula propuesta en el siglo XIX por Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796 – 1874) (Nuttall, 2015).

$\text{IMC} = \text{Peso (Kg)} / \text{Talla}^2 (\text{m}^2)$

La interpretación del IMC se tipificó con arreglo a la siguiente clasificación (Figura 25).

Clasificación del IMC	
Insuficiencia ponderal	< 18,5
Intervalo normal	18,5-24,9
Sobrepeso	≥ 25
Preobesidad	25,0-29,9
Obesidad	≥ 30
Obesidad de clase I	30,0-34,9
Obesidad de clase II	35,0-39,9
Obesidad de clase III	≥ 40

Figura 25. Clasificación del IMC. Adaptado de: OMS

Nota. Adaptado de “Datos y cifras”, de Datos sobre la obesidad (10), 14 de octubre, 2018. Organización Mundial de la Salud [OMS]. Recuperado de <https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/>

Perímetro cintura

El perímetro de cintura es una medida muy útil para estimar el riesgo cardiovascular (Martínez-Hervás et al., 2008; Puig et al., 2014) y estudiar el sobrepeso y la obesidad (Jiménez, 2013). Los sujetos se posicionaron en posición de bipedestación, con los músculos del abdomen relajados. Se empleó una cinta métrica para realizar la medición entre la cresta ilíaca y el lado inferior extremo de la 12ª costilla. En los casos en los que no fue posible detectar con precisión sendos puntos, se calculó una distancia aproximada. Para la medición del perímetro de la cintura se empleó una cinta antropométrica de Policloruro de vinilo (PVC) marca *Holtain* de 10 cm de ancho y 1500 mm de longitud.

Pliegue cuádriceps

Situado en la cara anterior del muslo, en el punto intermedio entre la rótula y el pliegue inguinal. Los sujetos se posicionaron en sedestación con los pies apoyados en el suelo. Seguidamente, se emplearon tres mediciones. El dato que se registró fue la mediana de las tres mediciones. La interpretación de los resultados se especificó con arreglo a la Guía Técnica del INSST para la población trabajadora española (Cabello, 2008, 2014).

Pliegue abdominal

El pliegue abdominal se encuentra situado 3 cm a la derecha de la cicatriz umbilical (Lapunzina y Aiello, 2002). Los sujetos se situaron en posición erguida, con la musculatura abdominal relajada. Seguidamente, se emplearon tres mediciones. El dato que se registró fue la mediana de las tres mediciones realizadas. La interpretación de los resultados se especificó con arreglo a la Guía Técnica del INSST para la población trabajadora española (Cabello, 2008, 2014). Para la determinación de los pliegues se empleó un plicómetro calibrado marca *Holtain* con apertura de 50 mm y precisión de 0,2 mm.

Porcentaje de grasa (% GC)

El porcentaje de masa grasa determina la masa grasa existente en un ser humano y determina el nivel de obesidad de una persona; más concretamente, en la población española se han localizado evidencias sobre su nivel de predicción (Manuel Fernández-Real, Vayreda, Casamitjana, Ricart, y Saez, 2001). Para determinarlo se siguió la fórmula de Deurenberg (Deurenberg, Weststrate, y Seidell, 1991). Dicha estimación ha sido validada en la literatura y precisa estimaciones razonablemente válidas de la grasa corporal en hombres y mujeres de todas las edades ($R^2 = 0,79$).

$$\% \text{ Grasa corporal (\%GC)} = 1,2 * (\text{IMC}) + 0,23 * (\text{E}) - 10,8 * (\text{S}) - 5,4$$

Donde:

- IMC = Índice masa corporal expresado en Kg/m^2
- E = Edad del sujeto expresada en años
- S = Género/Sexo; donde 1 = hombres y 2 = mujeres

La tabla baremada fue considerada con arreglo a la clasificación propuesta por Gallagher et al. (Gallagher et al., 2000) (Tabla 11).

Tabla 11. Porcentaje de grasa baremado en mujeres y hombres

	Edad	Bajo	Recomendado	Alto	Muy alto
Mujer	20-39	5-20	21-33	34-38	>38
	40-59	5-22	23-34	35-40	>40
	60-79	5-23	24-36	37-41	>41
Hombre	20-39	5-7	8-20	21-25	>25
	40-59	5-10	11-21	22-27	>27
	60-79	5-12	13-25	26-30	>30

Adaptado de “Manual de Instrucción Medidor de Grasa Corporal” por Gallagher et al., 2000, *American Journal of Clinical Nutrition* vol. 72 set 20000.

Los datos físicos y antropométricos fueron incorporados en una hoja de registro de datos para su posterior digitalización (Anexo 16).

4.2.8.6 Salud percibida

Se empleó la versión española del “Cuestionario de Salud SF-36 v2” (Alonso et al., 1995) partiendo de la referencia original de Ware et al (Ware Jr y Sherbourne, 1992) (Anexo 15). Este cuestionario sobre la calidad de vida mide la salud autopercebida en forma ocho dimensiones y 36 ítems: “Función Física” (10); “Rol Físico” (4); Dolor Corporal” (2); “Salud General” (5); “Vitalidad” (4); “Función Social” (2); “Rol Emocional” (3) y 2 componentes sumarios (“Físico” y “Mental”). Seguidamente, los ítems son transformados de un “peor estado de salud” (0) a un “excelente estado de salud” (100). El cuestionario ha obtenido unas puntuaciones reseñables en la población española y se ha conformado como un instrumento de medida fiable para establecer la evaluación de

la salud percibida de los participantes (alfa de Cronbach entre 0,71 y 0,94), excepto en la dimensión de relación social ($\alpha = 0,45$), aunque consistente con relación al instrumento original (Alonso et al., 1995). Otros estudios han avalado igualmente su consistencia para medir el estado de salud percibida ($\alpha > 0,80$) (Brazier et al., 1992).

Las variables descritas a continuación fueron las variables dependientes y fueron medidas antes y después del programa experimental con ambos grupos. La variable independiente fue el programa de ejercicio físico empleado con los dos grupos. Ante la falta de recursos, únicamente el grupo experimental recibió la intervención. De igual modo, se registraron para sendos grupos los siguientes datos demográficos: edad, género, nivel educativo, profesión, categoría laboral, situación y antigüedad laboral. (Tabla 12).

Tabla 12. Variables, instrumentos y referencias de las variables dependiente seleccionadas

Variable	Instrumento	Referencias
Variables psicológicas		
Depresión	“Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos” (CES-D)	(Radloff, 1977)
Ansiedad Estado	“Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado” (IDARE)	(Spielberger et al., 1970)
Ansiedad Rasgo		
Variables sobre la productividad y el rendimiento en el trabajo		
Capacidad para el trabajo	“Índice de Capacidad para el trabajo” (ICP) – “Work Ability Index” (WAI)	Institute of Occupational Health (FIOH) y The Finnish Post Ltd (Tuomi et al., 1994)
Pérdidas en la productividad asociadas con la salud	“Cuestionario sobre los costes en la productividad” “(iMTA Productivity Cost Questionnaire – iPCQ)”	(Bouwman et al., 2015)
Pérdidas en la productividad relacionadas con el absentismo		
Pérdidas en la productividad relacionadas con el presentismo		
Pérdidas en la productividad asociadas con el trabajo no remunerado		
Variables sobre la satisfacción en el trabajo		
Satisfacción con la supervisión y participación en la organización	“Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26”	(Meliá et al., 1990)
Satisfacción con la remuneración y las prestaciones		
Satisfacción intrínseca		

Material y métodos

Variable	Instrumento	Referencias
Satisfacción con el ambiente físico		
Satisfacción con la cantidad de producción		
Satisfacción con la calidad de producción		
Satisfacción total (26 ítems)		
Variables de la condición física		
<i>Aptitud aeróbica</i>	<i>“UKK Walk Test” – 2 Km test</i> FC medida a través de pulsómetro <i>Onrhythm 310</i> <i>Acess Geonaute</i>	(Laukkanen et al., 1992; Oja et al., 1991)
Índice de capacidad aeróbica	Fórmula índice de capacidad aeróbica partiendo de los resultados del 2 Km walking test	(Hagen y Bø, 2003; Laukkanen et al., 1992)
Consumo de oxígeno máximo (VO ₂ máx)	Fórmula estimativa del VO ₂ máx	(Laukkanen, 1995)
<i>Aptitud musculoesquelética</i>		
Flexibilidad y zona baja de la espalda	<i>“Sit and Reach flexibility test”</i>	(Wells y Dillon, 1952)
Resistencia de los músculos de brazos y manos	Dinamometría manual a través de dinamómetro analógico <i>Takei 5001</i> <i>Hand Grip Dynamometer</i> con unas dimensiones de 154mm W x 235mm D x 59mm H con un rango de medidas entre 0 y 100 kgf	(Oja et al., 1998)
Resistencia de los músculos de brazos y manos		
Potencia de los músculos del tren inferior: saltos	Rotulador <i>Edding 400</i> y flexómetro marca <i>Stanley PowerLock</i> de 5 m (16 pulgadas)	
Fuerza resistencia: abdominales	Colchoneta de 140 x 50 x 1,5 cm. marca <i>ELK Sport</i> cronómetro <i>Traceable (Control</i> <i>Company)</i>	
<i>Aptitud motriz</i>		
Velocidad segmentaria	<i>“Plate Tapping Test”</i> : cronómetro <i>Traceable (Control Company)</i> .	
Equilibrio unipodal	<i>Flamingo Balance Test</i> : barra metálica marca Eveque de 3 cm de ancho y 60 cm de longitud	

Variable	Instrumento	Referencias
Variables físicas y antropométricas		
Estatura (cm)	Báscula con tallímetro marca <i>Gima-Pegaso</i>	(Lapunzina y Aiello, 2002)
Peso (Kg)		(Cabello, 2008, 2014)
Índice de Masa Corporal (IMC)	Peso (Kg) / Talla ² (m ²)	Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/
Perímetro de cintura (cm)	Cinta antropométrica de Policloruro de vinilo (PVC) marca <i>Holtain</i> de 10 cm de ancho y 1500 mm de longitud.	(Lapunzina y Aiello, 2002) (Cabello, 2008, 2014)
Pliegue cuádriceps Pliegue abdominal	Plicómetro calibrado marca <i>Holtain</i> con apertura de 50 mm y precisión de 0,2 mm.	
Porcentaje de masa grasa (%)	Fórmula descrita y validada de Deurenberg (1991)	(Deurenberg et al., 1991)
Variables relacionadas con la salud percibida		
Salud percibida	“Cuestionario SF-36 versión española V.2”	(Alonso et al., 1995) (Ware Jr y Sherbourne, 1992).

Nota. Fuente: Elaboración propia (2018).

4.2.9 Análisis estadístico de los datos

El análisis de datos se realizó con la versión 25.0 de IBM SPSS para Windows (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). El supuesto de normalidad se comprobó mediante la prueba de kolmogorov-Smirnov y el de igualdad de varianzas mediante la prueba de Levene. Para comparar las características del grupo experimental y control se realizaron pruebas U de Mann-Whitney para las variables cuantitativas y Chi Cuadrado para las nominales. Para el análisis de las variables dependientes del estudio, se llevó a cabo una U de Mann-Whitney en el pre para comprobar que los grupos experimental y control son iguales. Se calculó la diferencia pre post sobre la que se aplicó de nuevo U de Mann-Whitney. Como índices del tamaño del efecto se calculó $\eta^2 = z/(n-1)$. La interpretación

de η^2 se basó en los siguientes valores: $<0,06$ pequeño, $\geq 0,06$ hasta $<0,14$ medio y $\geq 0,14$ grande (Cohen, 1988). El nivel de riesgo se fijó en 0,05 excepto para las pruebas u de Mann-Whitney aplicadas a las variables dependientes del estudio, en las que, para controlar el error tipo I, alfa se dividió entre 2.

4.3 ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA

4.3.1 Adquisición de la evidencia

La revisión sistemática se llevó a cabo siguiendo los criterios PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), que tiene como objetivo mejorar el estándar de presentación de informes de revisiones sistemáticas y metaanálisis (Liberati et al., 2009). Para realizar este trabajo se realizó una revisión de la evidencia publicada hasta junio del 2018 empleando los términos científicos: prostatitis, chronic pelvic pain síndrome, sport, athletes y physical activity combinados con los operadores Booleanos (AND; OR). Las bases de datos utilizadas fueron Scopus, PubMed, ScienceDirect, PEDro, The Cochrane Library, Dialnet y Scielo. Todas las búsquedas realizadas por dos investigadores independientes. Se incluyeron artículos publicados hasta junio del 2018 en español/inglés. Los criterios de exclusión fueron literatura no española/inglesa o artículos con graves defectos metodológicos.

4.3.2 Evaluación de calidad metodológica

Para evaluar la calidad metodológica (validez externa, validez interna e informes estadísticos), se efectuó a través de la escala PEDro (de Morton, 2009; Maher, Sherrington, Herbert, Moseley, y Elkins, 2003) (demostrada herramienta válida y fiable para este fin), mientras que el nivel de evidencia se estableció de acuerdo con la escala del *Oxford Center for Evidence-Based Medicine* (CEBM) (Wright, Swiontkowski, y Heckman, 2011). Ambos parámetros se evaluaron de forma independiente por dos de los autores y todos los desacuerdos surgidos se resolvieron hasta alcanzar el consenso.

4.3.3 Análisis cuantitativo

Los datos fueron registrados en una base de datos de Excel (Versión 2013 para Windows 10) según la información sobre la población, características del estudio y medidas de resultados. Para cada medida de interés se estimó un tamaño del efecto (TE) sobre los datos originales del artículo revisado (Hedges, 1982) por Hedges y Larry a través del software *Effect Size determination Program* (Wilson y Lipsey, 2001). Para ello se utilizaron las informaciones obtenidas de las medias, desviaciones típicas, pruebas t de los diferentes estudios y otros estadísticos de contraste como la F de Snedecor. Para corregir el sesgo positivo de la diferencia media tipificada para tamaños muestrales pequeños, se corrigió la d resultante (Hedges, 1982). Se adoptó el modelo de efectos fijos, que determina la homogeneidad de las medidas de tratamiento de los diferentes estudios. La homogeneidad de los estudios se contrastó mediante el procedimiento propuesto por Hedges y Olkin que implica calcular el estadístico Q, el cual se distribuye según Chi cuadrado χ^2 con $k-1$ grados de libertad, donde k es el número de tamaños del efecto (Hedges y Olkin, 1985). Entre los diferentes estudios, se presenta el tamaño del efecto, ya corregido, junto con el intervalo correspondiente, para un intervalo de

confianza (IC) de un 95 %. Se consideró un tamaño del efecto pequeño cuando el valor del estadístico fue una puntuación alrededor de 0,20; alrededor de 0,50 representó un efecto medio y en torno a 0,80 un efecto grande (Cohen, 1988). Las diferencias significativas fueron consideradas viendo que el tamaño del efecto de una intervención no se contempló dentro de un IC de un 95 %.

RESULTADOS

5 RESULTADOS

5.1 ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES EUROPEAS

5.1.1 Extracción de datos

La búsqueda se tradujo en 696 títulos únicos. Los títulos y los resúmenes fueron revisados obteniéndose los artículos completos de los títulos potencialmente elegibles. Uno de los dos investigadores realizó la búsqueda. En caso de duda, se celebró un debate entre los investigadores.

La Figura 26 muestra un diagrama de flujo que explica la trayectoria de inclusión de los artículos. Con base en los títulos, 491 fueron excluidos (70,55 %). La mayoría de los títulos fueron excluidos en gran medida porque no representaban una intervención de actividad física en el entorno laboral. Durante el análisis posterior de los resúmenes, 127 (61,95 %) de los 205 resúmenes fueron descartados en gran medida porque no cumplían los diseños de RCT, no tenían una aplicación directa en Europa (N = 34, 16,59 %), no desarrollaban las intervenciones dentro de organizaciones y/o empresas (N = 34, 16,59 %) o no presentaban los datos adecuados para el posterior cálculo del tamaño del efecto (N = 9, 2,39 %).

Los 78 (38,05 %) artículos restantes se recuperaron para la revisión completa, de los cuales 60 fueron excluidos. Por no aplicarse la intervención en Europa fueron excluidos 21 estudios (35 %). Otros veintidós (36,67 %) no ofrecieron datos suficientes para el posterior cálculo del tamaño del efecto. Carecían de variables que pudieran ser de interés diez estudios (16,67 %). No se trataban de estudios de investigación cinco de ellos (8,33 %). Fueron excluidos dos estudios (3,33 %) porque no presentaban una intervención siguiendo un diseño RCT. Por último, 18 publicaciones cumplieron los criterios de inclusión (Figura 26).

Figura 26. Diagrama de flujo para la trayectoria de inclusión

5.1.2 Características de los estudios

La Tabla 13 muestra las características de los 18 estudios. Los estudios incluidos estuvieron en un rango de años de publicación entre 1993 y 2013. El total de participantes incluidos en el análisis fue de 7473, de los cuales 3926 pertenecen a los grupos de intervención y 3547 a los de control. Aunque no todos los estudios informaron

sobre el género, la muestra de género estuvo compuesta aproximadamente por 2384 varones y 4187 mujeres. La edad media de los participantes fue de 43 años, con una desviación típica de 4 años y unos rangos de edad comprendidos entre 38 y 47 años. Por su parte, la duración de las intervenciones fue de aproximadamente 8 meses, con una desviación típica de 5 meses y unos rangos entre 2 y 12. Las puntuaciones de la Escala PEDro arrojaron una media de 7,72 y una desviación típica de 0,89 (Anexo 1). Los estudios seleccionados proporcionaron la mayor parte de la información necesaria para el análisis estadístico (Tabla 13).

Tabla 13. Características de los estudios

Variables	Datos descriptivos de los estudios
Número de estudios incluidos (N)	18
Rangos de fecha de publicación (años)	1993-2013
Media Puntuaciones Escala PEDro (M±DT)	7,72±0,89 (7-10)
Total de participantes incluidos (N)	7473 Experimental: 3926 Control: 3547
Total de participantes varones (N)	2384
Total de participantes mujeres (N)	4187
Edad media de los participantes (M±DT)	43±4 (38-47)
Duración intervenciones (meses) (M±DT)	8,19±5,19 (2-12)

Datos presentados: N = número de sujetos; M±DT = media ± desviación típica

La Tabla 14 muestra los contenidos de las intervenciones de los 18 artículos incluidos en el metaanálisis. En ella aparecen los tamaños del efecto calculados individualmente para las variables de cada estudio. La mayoría de los estudios fueron aplicados sobre ciudades del Norte de Europa (N = 11). La distribución de la población fue diversa, llamando especialmente la atención la elevada participación de mujeres en los estudios (N = 4187) frente a casi la mitad de los varones (N = 2384). Los estudios se recogen en el Anexo 2.

Respecto al enfoque de los programas, obviamente todos los estudios analizados contemplaron las intervenciones a través de actividad física (N = 18) incluyéndose en cuatro de ellos un complemento relacionado con la dieta y la nutrición (N = 4) (Christensen, Overgaard, Carneiro, Holtermann, y Sogaard, 2012; Robroek et al., 2012; Strijk, Proper, van der Beek, y van Mechelen, 2012; Strijk, Proper, van Mechelen, y van der Beek, 2013). Otros estudios también complementaron las intervenciones de actividad física con el asesoramiento sobre el estilo de vida y la actividad física (N = 2).

El contenido de las intervenciones fue diverso, realizando diferentes programas que tenían que ver con el asesoramiento sobre la actividad física, el entrenamiento de coordinación, entrenamientos aeróbicos, ejercicios cognitivos, yoga y talleres sobre educación para la salud. Además, cuatro estudios realizaron dos intervenciones sobre distintas variables (N = 4) (Eriksen et al., 2002; Jorgensen, Faber, Hansen, Holtermann, y Sogaard, 2011; Pohjonen y Ranta, 2001; von Thiele Schwarz, Lindfors, y Lundberg, 2008).

Así mismo, se encontraron intervenciones sobre empresas muy variadas, concretamente una compañía de seguros (N = 1) (Reijonsaari et al., 2012); dos hospitales (N = 2) (Strijk et al., 2012; Strijk et al., 2013); dos de servicios de limpieza (N = 2) (Jorgensen et al., 2011; Nurminen et al., 2002); dos de funcionarios públicos (N = 2) (Dallat, 2013; Proper et al., 2004); uno de servicios sociales (N = 1) (Pohjonen y Ranta, 2001); dos asilos de ancianos (N = 2) (Brox y Frøystein, 2005; Tveito y Eriksen, 2009); Uno de servicios postales (N = 1) (Eriksen et al., 2002); uno de construcción (N = 1) (Groeneveld et al., 2011); un banco (N = 1) (Kerr y Vos, 1993); uno desarrollado en un centro clínico (N = 1) (von Thiele Schwarz et al., 2008); uno con oficinistas (N = 1) (Andersen et al., 2013); y, por último, tres que combinaban distintas empresas de sectores tales como los bancos y los funcionarios públicos, que se clasificaron como mixtos (N = 3) (Christensen et al., 2012; McEachan et al., 2011; Robroek et al., 2012).

En cuanto a la calidad metodológica, siguiendo la escala PEDro de los estudios analizados, recibieron una puntuación de calidad media de 7,68, una desviación típica de 0,89 y un rango de valores entre 7 y 10.

Tabla 14. Características, intervenciones y contenidos de los estudios incluidos en el metaanálisis

Estudio	Industria	Perdidos seguimiento (%)	Enfoque y contenido programa	Duración programa	Escala PEDro	Medida (variable Dependiente)	TE
Reijonsaari (2012)	Seguros (Finlandia)	36 (193/521)	Actividad física: Programa online basado en actividad física: monitorización por acelerómetros y asesoramiento a distancia	12 meses; 3 momentos de medición	8	Actividad física (IPAQ)	-0,17
						VO ₂ máx (ml/kg/min)	-0,12
						Peso (Kg)	-0,08
						Perímetro de la cintura (cm)	-0,10
						% grasa (%)	0,13
						Presión sistólica (mm Hg)	-0,14
Mc Eachan (2011)	Mixta (Reino Unido)	2 (28/1260)	Actividad física: Educación para la salud	12 meses	8	Presión diastólica (mm Hg)	-0,23
						Presión sistólica (mm Hg)	0,20
						Presión diastólica (mm Hg)	0,00
						Utilidad media (€)	-1,12

Estudio	Industria	Perdidos seguimiento (%)	Enfoque y contenido programa	Duración programa	Escala PEDro	Medida (variable Dependiente)	TE
						Beneficio salud (€)	-1,06
						Beneficio neto salud (€)	-1,37
Strijk (2012)	Hospital (Países Bajos)	21 (155/557)	Actividad física + nutrición: programa de ejercicio (sesión yoga) +3 visitas coach de vitalidad personal + ejercicio aeróbico dirigido + ejercicio libre + provisión de fruta gratis.	6 meses; 1 vez a la semana, 45 minutos	7	Actividad física moderada (SQUASH)	0,07
						Actividad física vigorosa (SQUASH)	0,00
						Deportes (SQUASH)	0,22
						Actividad física vigorosa (CSA)	0,25
						Actividad física moderada (CSA)	0,12
						Ingesta fruta (piezas fruta)	0,16
						VO ₂ máx (ml/kg/min)	-0,08
						Salud mental (test)	-0,01
						Necesidad de recuperación (fórmula)	-0,01
Jørgensen (2011)	Limpiadoras (Dinamarca)	36 (89/242)	Actividad física: Entrenamiento coordinación	12 meses; sesiones de 20 minutos semanales	10	Capacidad trabajo (WAI)	-0,05
Proper (2004)	Funcionarios públicos (Países Bajos)	4 (13/299)	Actividad física: Práctica actividad física	9 meses; 7 consultas personales para la promoción de la actividad física de 20 minutos	8	Absentismo laboral (ratio)	0,13

Resultados

Estudio	Industria	Perdidos seguimiento (%)	Enfoque y contenido programa	Duración programa	Escala PEDro	Medida (variable Dependiente)	TE
Pohjonen (2001)	Servicios sociales (Finlandia)	46 (40/87)	Actividad física: Práctica actividad física	9 meses; 2 sesiones semanales; aeróbico y entrenamiento muscular; consejos generales	7	Peso (Kg) % grasa (%) VO ₂ máx (ml/kg/min) Work ability (WAI)	1: - 0,46 2: - 0,44 1: - 0,45 2: - 0,44 1: 3,05 2: 0,63 1: 0,44 2: 0,85
Robroek (2012)	Mixto (Países Bajos)	40 (366/924)	Actividad física+nutrición: Polifacético: actividad física, educación para la salud	6 meses; 3 recopilación datos fisiológicos, 5 asesoramiento	8	Salud percibida	0,15
Brox (2005)	Asilo ancianos (Noruega)	18 (22/129)	Actividad física: Programa de <i>fitness</i> en grupo; clases de actividad física, nutrición manejo del estrés	6 meses; 24 intervenciones	9	Salud percibida Absentismo laboral (nº días)	0,20 0,16
Tveito (2009)	Asilo ancianos (Noruega)	28 (11/40)	Actividad física + estilo de vida: Ejercicio físico (1), información sobre salud y gestión del estrés (2)	9 meses; (1) 3 veces/ semana (2) 1 vez/ semana cada 4 meses	9	Salud percibida Absentismo laboral (nº días)	0,56 0,03
Eriksen (2002)	Servicios postales (Noruega)	30 (232/860)	Actividad física: Programa de danza aeróbica (1), programa de salud con tres componentes: ejercicio físico, información sobre el estilo de vida, examen en el lugar de trabajo (2)	12 semanas; (1) 24 intervenciones (2) + 12 sesiones + 2 exámenes	7	Absentismo laboral (ratio)	1: 0,16 2: 0,17

Estudio	Industria	Perdidos seguimiento (%)	Enfoque y contenido programa	Duración programa	Escala PEDro	Medida (variable Dependiente)	TE
Groenveld (2011)	Construcción (Países Bajos)	27 (174/573)	Asesoramiento actividad física: Objetivos de salud en sesiones de asesoramiento sobre sobrepeso/obesidad	6 meses; 7 sesiones	7	Absentismo laboral (ratio)	0,04
Kerr (1993)	Banco (Países Bajos)	n/p	Actividad física: Programas de <i>fitness</i> a medida	1-2 veces/semana, duración desconocida	7	Absentismo laboral (nº días)	0,17
Von Thiele Schwarz (2008)	Dentistas (Suecia)	10 (18/177)	Actividad física: Elección por parte del empleado de un programa de ejercicio de mediana o alta exigencia	6 meses; 1 sesión introductoria + 3 mediciones	7	Salud percibida	0,10
						Capacidad trabajo (WAI)	0,41
Nurminen (2002)	Servicio de lavandería (Finlandia)	9 (28/260)	Actividad física: Sesiones de asesoramiento destinadas a la actividad física	8 meses; 26 sesiones	8	Estado de salud	0,16
						Capacidad trabajo (WAI)	0,10
Dallat (2013)	Funcionarios públicos (Irlanda)	n/p	Actividad física: Sensores de seguimiento	12 semanas de intervención; 6 meses de seguimiento	7	Índice de Masa Corporal (IMC) – (Kg/m ²)	0,00
						Absentismo (nº días)	0,07
						Productividad (QQ)	0,16
Andersen (2013)	Oficinistas (Dinamarca)	0 (160/160)	Actividad física: Entrenamiento aeróbico	10 semanas; Subir escaleras; 10 minutos, 5 días/ semana	8	Actividad física baja (horas/sem.)	0,00
						Actividad física moderada (horas/sem.)	0,02
						Actividad física vigorosa (horas/sem.)	0,16
						Peso (Kg)	0,05
						% grasa (%)	0,02
						Presión sistólica (mm Hg)	0,18

Resultados

Estudio	Industria	Perdidos seguimiento (%)	Enfoque y contenido programa	Duración programa	Escala PEDro	Medida (variable Dependiente)	TE
						Presión diastólica (mm Hg)	0,12
Christensen (2012)	Mixto (Dinamarca)	0 (8/98)	Dieta + ejercicio: ejercicio físico y cognitivo	12 meses; Una parte de dieta, y una segunda de ejercicio de fuerza e iniciación práctica libre	7	VO ₂ máx (ml/kg/min)	0,05
						Peso (Kg)	0,08
						Perímetro cintura (cm)	-0,28
						% grasa (%)	0,07
						Presión sistólica (mm Hg)	0,21
						Presión diastólica (mm Hg)	0,18
						Índice de Masa Corporal (IMC) – (Kg/m ²)	0,00
Strijk (2013)	Hospital (Países Bajos)	32 (230/730)	Actividad física + nutrición: programa de ejercicio (sesión yoga) +3 visitas coach + ejercicio aeróbico dirigido + ejercicio libre + provisión de fruta gratis	6 meses; 1 vez a la semana, 45 minutos	7	Productividad (WHO-HPQ)	-0,01
						Absentismo (sí-no)	0,07

Nota. n/p: no es posible calcularlo con base en los datos presentados; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: <0,2 pequeño, ≥0,5 hasta <0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988)

La Tabla 15 muestra los instrumentos predominantes empleados en los diferentes estudios incluidos en el metaanálisis.

Tabla 15. Instrumentos, referencias y principales características de los instrumentos empleados en las intervenciones europeas

Instrumento	Medida	Definición y explicación de su significado o posible aplicación	Características técnicas y referencias habituales	Estudios asociados en el metaanálisis
Índice de Capacidad para el Trabajo (ICP-WAI)	Puntuación (varía en función del ítem)	Mide el estado del sujeto a la hora de realizar sus funciones laborales en plenas capacidades	(Imarinen y Tuomi, 1993; Ilmarinen et al., 2005); Institute of Occupational Health (FIOH) y The Finnish Post Ltd (Tuomi et al., 1994).	Jorgensen (2011) Pohjonen (2001) Von Thiele Schwarz (2008) Nurmimen (2002)
SQUASH cuestionario	Puntuación	El cuestionario SQUASH mide en cuatro dimensiones los niveles habituales de actividad con referencia la última semana	(Wendel-Vos, Schuit, Saris, y Kromhout, 2003)	Stirjk (2011)
CSA	Puntuación	Acrónimo en inglés de <i>Computer Science Application</i> . Monitorización de actividad física a través de acelerometría (<i>GTM1</i> y <i>ActiTrainer</i> ; <i>ActiGraph</i> , Pensacola, Florida, Estados Unidos)	(Wendel-Vos et al., 2003)	Stirjk (2012)
VO ₂ máx	ml/kg ⁻¹ /min ⁻¹	Medida validada para estudiar la capacidad física de los individuos	(Laukkanen, 1995)	Reijonsaari (2012) Pohjonen ₁ (2001) Pohjonen ₂ (2001) Stirjk (2011) Christensen (2012)

Resultados

Instrumento	Medida	Definición y explicación de su significado o posible aplicación	Características técnicas y referencias habituales	Estudios asociados en el metaanálisis
Perímetro de cintura	cm	Mide la concentración de grasa en la zona abdominal. Establece una medida en cm	Antropometría: cinta métrica (Reiju Oy) con un rango de 0 a 150 cm	Reijonsaari (2012) Christensen (2012)
Porcentaje de grasa	%	Mide la cantidad de masa grasa de un individuo estableciendo una puntuación en pesos porcentuales	(Jebb, Cole, Doman, Murgatroyd, y Prentice, 2000)	Reijonsaari (2012) Pohjonen ¹ (2001) Pohjonen ² (2001) Christensen (2012) Andersen (2013)
Presión sistólica	mmhg	La presión de la sangre en las arterias cuando el corazón bombea la sangre	<i>Monitor Omron M3 Intellisense</i>	Reijonsaari (2012) Von Thiele Swarz (2008) McEachan (2011) Christensen (2012) Andersen (2013)
Presión diastólica	mmhg	La mínima presión de la sangre en las arterias cuando se relajan los ventrículos	Monitor de medición Omron M3 Intellisense	Reijonsaari (2012) Von Thiele Swarz (2008) McEachan (2011) Christensen (2012) Andersen (2013)

Instrumento	Medida	Definición y explicación de su significado o posible aplicación	Características técnicas y referencias habituales	Estudios asociados en el metaanálisis
Salud percibida	Estado de salud percibida autoinformada	Puede realizarse a través de cuestionario, percepciones subjetivas o a través de otras dimensiones o ítems	(Ware, Kosinski, y Keller, 1996)	Robroek (2012) Brox (2005) Tveito (2009) Von Thiele Schwarz (2008) Nurminen (2002)
Absentismo	Preguntas o cuestiones de carácter dicotómicas o numéricas	Ratios, números, días u observaciones acerca de los días de baja laboral. Las intervenciones incluyen preguntas subjetivas	(Koopmanschap, 2005)	Brox (2005) Tveito (2009) Eriksen ¹ (2002) Eriksen ² (2002) Kerr (1993) Dallat (2013)

Nota. 1: Intervención 1; 2: Intervención 2.

5.1.3 Efectos de los programas a nivel general

Dieciocho estudios evaluaron el efecto de la promoción de la actividad física y la salud en los centros de trabajo europeos. Las variables que destacaron en dichos estudios fueron la capacidad para el trabajo, con cuatro estudios (N = 4) (Jorgensen et al., 2011; Nurminen et al., 2002; Pohjonen y Ranta, 2001; von Thiele Schwarz et al., 2008); Actividad física a través de SQUASH y CSA con dos estudios (Strijk et al., 2012; Strijk et al., 2013); VO2 máx, con cuatro estudios (N = 4) (Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari et al., 2012; Strijk et al., 2012); Peso, con cuatro (N = 4) (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari et al., 2012); perímetro de la cintura (N = 2) (Christensen et al., 2012; Reijonsaari et al., 2012); Porcentaje de grasa, con cuatro estudios (N = 4) (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari et al., 2012); Presión sistólica, con cinco estudios (N = 5) y presión diastólica, también con cinco estudios (N = 5) (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; McEachan et al., 2011; Reijonsaari et al., 2012; von Thiele Schwarz et al., 2008); salud, con cinco estudios (N = 5) (Brox y Frøystein, 2005; Nurminen et al., 2002; Robroek et al., 2012; Tveito y Eriksen, 2009; von Thiele Schwarz et al., 2008) y, por último, absentismo, con cinco estudios (N = 5) (Brox y Frøystein, 2005; Dallat, 2013; Kerr y Vos, 1993; Tveito y Eriksen, 2009). El tamaño del

efecto de los programas de intervención fue, independientemente de la variable, significativo (TE = 0,21; CI 95 % 0,07 a 0,35; P = 0,001), aunque fue un efecto pequeño. A continuación, se muestran las tablas de resultados clasificadas por variables predominantes identificadas, el primer autor del trabajo y sus correspondientes tamaños del efecto.

5.1.4 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo

Se llevaron a cabo seis intervenciones independientes dentro de cuatro estudios, con una muestra de 836 sujetos (Jorgensen et al., 2011; Nurminen et al., 2002; Pohjonen y Ranta, 2001; von Thiele Schwarz et al., 2008). De las seis intervenciones analizadas, solamente Pohjonen (2001) encontró un efecto significativo sobre la capacidad para el trabajo (TE = 0,85; IC 95 %, 0,18 a 1,50); P < 0,05). Asimismo, analizando todas las intervenciones desde un punto de vista global, los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo tuvieron un efecto significativo (TE = 0,21; IC 95 %, 0,06 a 0,36; P = 0,003) (Figura 27).

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).

Figura 27. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo (ICP-WAI)

5.1.5 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada a través de cuestionario SQUASH y CSA

De las tres intervenciones, con una muestra de 1666 sujetos, únicamente resultó significativa la intervención propuesta por Strijk (2012) para ejercicio de moderado a vigoroso siguiendo el cuestionario SQUASH (TE = 0,22; IC 95 % 0,05 a 0,38). Asimismo, abordando la influencia de las intervenciones de forma global, los programas de

actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por el cuestionario SQUASH también resultó significativa, aunque el tamaño del efecto fue pequeño (TE = 0,05; IC 95 % 0,00 a 0,19; P = 0,02). En las dos intervenciones, para una muestra total de 268 participantes, los programas de intervención (Strijk, 2012) no resultaron significativos sobre la actividad física medida por el CSA (TE = 0,12; IC 95 % -0,06 a 0,43; P = 0,06) (Figura 28 y Figura 29).

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, $\geq 0,5$ hasta < 0,8 medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 28. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por cuestionario SQUASH

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, $\geq 0,5$ hasta < 0,8 medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 29. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la actividad física evaluada por el CSA

5.1.6 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el VO₂ máx (ml/kg/min)

Para una muestra representativa de 983 participantes, repartidos en cinco intervenciones independientes, los efectos de los programas de actividad física y salud (Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari et al., 2012; Strijk et al.,

2012) solamente Pohjonen (2001) en su primera intervención encontró un efecto significativo sobre el VO₂ máx (TE = 3,05; IC 95 % 2,34 a 3,77; P < 0,05). Por otro lado, al abordar los cinco estudios desde un punto de vista global, el efecto no fue significativo (TE = 0,05; IC 95 % -0,08 a 0,18; P = 0,24) (Figura 30).

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).

Figura 30. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el VO₂ máx (ml/kg/min)

5.1.7 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el peso (Kg)

Cinco intervenciones independientes investigaron la influencia de los programas de actividad física y salud. 883 participantes compusieron la muestra total de las intervenciones (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; Pohjonen y Ranta, 2001; Reijonsaari et al., 2012). Varios estudios redujeron el peso de los participantes con sus intervenciones, entre ellos Reijonsaari (2012) (TE = -0,08; IC 95 % -2,52 a 0,09); y las dos intervenciones de Pohjonen (2001) (TE = -0,46; IC 95 % -0,94 a 0,03 para la primera intervención y TE = -0,44; IC 95 % -1,08 a 0,20 para la segunda), si bien, únicamente el estudio de Christensen (2012) resultó significativo (TE = 0,08; IC 95% -0,32 a 0,16; P < 0,05). Asimismo, teniendo en cuenta los resultados desde la globalidad de las intervenciones, los efectos de los programas de actividad física y salud no lograron reducir el peso de forma significativa (TE = -0,08; IC 95 % -0,22 a 0,05) (Figura 31).

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, $\geq 0,5$ hasta < 0,8 medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 31. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el peso (Kg)

5.1.8 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el perímetro de la cintura (cm) y porcentaje de grasa (%)

Para una muestra total de 619 participantes repartidos en dos estudios (Christensen et al., 2012; Reijonsaari et al., 2012), los programas de actividad física y salud para la variable perímetro de la cintura redujeron el perímetro de la cintura en ambos casos (TE = -0,28; IC 95 % -0,67 a 0,12), aunque el tamaño del efecto podría ser despreciable, de la misma forma que los resultados obtenidos de manera global (TE = -0,13; IC 95 % -0,22 a 0,03; P = 0,05) (Figura 32). Una muestra de 883 sujetos conformó cinco intervenciones independientes de actividad física y salud laboral en empresas sobre el porcentaje de grasa. Las intervenciones de Pohjonen (2001) mostraron un tamaño del efecto que podría ser despreciable (TE = -0,45; IC 95 % -0,90 a 0,07 y TE = -0,44; IC 95 % -0,90 a 0,07, respectivamente). No se observaron efectos significativos en las intervenciones de Reijonsaari et al. (2012), Christensen et al. (2012) y Andersen (2013). Analizando los estudios de manera global, no se redujo el porcentaje de grasa de forma significativa (TE = -0,03; IC 95 % -0,10 a 0,18) (Figura 33).

Resultados

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, $\geq 0,5$ hasta < 0,8 medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 32. Efectos de los programas de actividad física salud sobre perímetro de la cintura (cm)

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, $\geq 0,5$ hasta < 0,8 medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 33. Efectos de los programas de actividad física salud sobre el porcentaje de grasa (%)

5.1.9 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la presión sistólica (mm Hg)

Para 2161 participantes repartidos entre cinco intervenciones, (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; McEachan et al., 2011; Reijoonsaari et al., 2012; von Thiele Schwarz et al., 2008) sobre la presión sistólica el efecto de las intervenciones de actividad física y salud solo fue significativo, aunque pequeño, en el estudio de Von Reijoonsaari (2012), que logró reducir la presión arterial sistólica (TE = -0,14; IC 95% -0,16 a 0,32) sin embargo el tamaño del efecto podría ser despreciable. Los TE observados en el trabajo de Von Thiele Schwarz et al. (2008) resultó significativo a favor del grupo control (TE = 0,37; IC 95% 0,01 a 0,73). Por el contrario, en el trabajo de Mc. Eachan et al. (2012) resultaron significativos a favor del grupo de ejercicio (TE = 0,20; IC 95% 0,09 a 0,30). El efecto global de la presión sistólica resultó significativo, aunque el TE encontrado fue pequeño (TE = 0,10; IC 95% 0,04-0,21; P = 0,002) (Figura 34).

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, $\geq 0,5$ hasta < 0,8 medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 34. Efectos de los programas de actividad física salud sobre la presión sistólica (mm Hg)

5.1.10 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la presión diastólica (mm Hg)

De un total de 2161 participantes divididos en seis intervenciones independientes (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012; McEachan et al., 2011; Reijonsaari et al., 2012; von Thiele Schwarz et al., 2008) el efecto de las intervenciones de actividad física y salud no produjo un descenso de la presión arterial diastólica en los estudios de Mc Eachan (2011) y Reijoonsaari (2012) (TE = -0,23; IC = 95 % -0,40 a 0,06) y el tamaño del efecto podría ser despreciable. En cambio, la intervención de Von Thiele Schwarz (2008) encontró un efecto significativo a favor del grupo control (TE = 0,52; IC = 95 % 0,01 a 0,73). Por su parte, el efecto de las intervenciones de actividad física y salud sobre la presión diastólica desde un punto de vista global, no ocasionaron un descenso significativo de la misma sobre los participantes (Figura 35).

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, $\geq 0,5$ hasta < 0,8 medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 35. Efectos de los programas de actividad física salud sobre la presión diastólica (mm Hg)

5.1.11 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la salud percibida

De una muestra de 1441 participantes, se analizaron cinco estudios para evaluar la salud de los participantes (Brox y Frøystein, 2005; Nurminen et al., 2002; Robroek et al., 2012; Tveito y Eriksen, 2009; von Thiele Schwarz et al., 2008). El efecto de las intervenciones sobre la salud de los participantes según las informaciones de salud percibida fue significativo en el caso de Robroek (2012) (TE = 0,15; IC 95% 0,021 a 0,28) y en el estudio de Von Thiele Schwarz (2008) (TE = 0,10; IC 95% 0,41 a 0,61) a favor del grupo que se sometió al programa. Analizando los estudios de manera global, las intervenciones incrementaron de forma significativa la salud percibida de los participantes (TE = 0,18; IC 95% 0,08 a 0,28; $P = 0,00001$) (Figura 36).

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; * $P < 0,05$ en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: $< 0,2$ pequeño, $\geq 0,5$ hasta $< 0,8$ medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 36. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre la salud física y mental autopercibida

5.1.12 Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo laboral

Los efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo fueron analizados con una muestra de 1577 participantes repartidos en seis intervenciones. Aunque se observan efectos de las intervenciones sobre el absentismo laboral en el estudio de Brox (2005) (TE = 0,08; IC = 95% -0,29-0,44), Tveito (2009) (TE = -0,002; IC = 95% -0,62 a 0,62); las dos intervenciones de Eriksen (2002) (TE = -0,01; IC = 95% -0,19 a 0,17 y TE = -0,12; IC = 95% -0,34 a 0,14; $P < 0,05$) y la intervención llevada a cabo por Kerr (1993) (TE = -0,29; IC = 95 % -0,61 a 0,03) el tamaño del efecto resultó despreciable al incluir el IC el 0. Asimismo, abordando la influencia de las intervenciones de forma global, los programas de actividad física y salud no lograron reducir significativamente el absentismo laboral (TE = 0,04; IC = 95% -0,14-0,06; $P = 0,21$) (Figura 37).

Nota. EC: estadístico de contraste; IC: Intervalo de confianza 95%; a: t (gl); b: F de Snedecor; 1: intervención 1; 2: intervención 2; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, $\geq 0,5$ hasta < 0,8 medio y $\geq 0,8$ grande (Cohen, 1988).

Figura 37. Efectos de los programas de actividad física y salud sobre el absentismo

5.2 ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD

5.2.1 Selección de los participantes

Un total de 206 trabajadores de oficina fueron localizados de los cuales 98 se perdieron en la primera fase de seguimiento bien por no representar un trabajo de oficina (N = 14), no estar interesados en participar en el programa (N = 68), no responder al llamamiento (N = 9) o por motivos personales (N = 7). Finalmente fueron seleccionados 108 participantes de los cuales, se perdieron 35 debido a falta de tiempo (N = 11), lesiones (N = 2) u otras razones (N = 24). Finalmente, 72 participantes fueron asignados al grupo experimental y al grupo control. Inicialmente, 43 sujetos se asignaron al grupo experimental y 29 al grupo control. Finalmente, durante el desarrollo del programa hubo una muerte experimental de 3 sujetos en el grupo experimental debido a falta de tiempo (N = 1) y otras razones (N = 2). El grupo control tuvo dos sujetos perdidos durante el programa debido a la falta de tiempo. En total, se registraron datos de 67 trabajadores, de los cuales 40 trabajadores de oficina fueron del grupo experimental y 27 del grupo control (Figura 38).

Figura 38. Diagrama de flujo de reclutamiento de participantes en el estudio

5.2.2 Características de la muestra

Los datos descriptivos de los participantes se presentan como número de casos y porcentaje (%) a excepción de las variables cuantitativas, que se presentan como media y desviación típica ($M \pm DT$). La muestra se compuso por 67 sujetos en edad de trabajar, trabajadores de oficina y declarados sedentarios de los cuales 33 fueron hombres (49,25%) y 34 fueron mujeres (50,75%). Los sujetos presentaron una media de edad de $34,95 \pm 12,52$ años. De ellos, 3 presentaron estudios primarios (4,48%), 1 informó poseer una formación profesional de primer grado (1,49%), 4 poseía una formación profesional

de segundo grado (5,97%), 2 poseían el bachillerato (2,99%), 12 poseían una titulación media (17,91%) y 45 eran titulados universitarios (67,16%). En cuanto a las profesiones, 7 eran pedagogos (10,45%), 10 administrativos (14,93%), 17 investigadores (25,37%), 1 se dedicaba a la gestión de proyectos, al diseño gráfico, técnico coordinador, oficinas, informes y ensayos, gestión económica, técnico superior, especialista y técnico de gestión (1,49%), 4 eran ingenieros, responsables de calidad o técnicos de gestión, (5,97%), 3 se dedicaban a la asistencia técnica y comercial (4,48%) y 2 a técnico de laboratorio y oficina (2,99%).

En relación con su categoría laboral, 56 de ellos eran empleados o trabajadores (83,58%), 10 trabajadores en puestos intermedios (14,93%) y 1 (1,49%) ostentaban puestos directivos o de dirección general. En referencia a la situación laboral, 4 de ellos todavía no contaban con un contrato legalizado (5,97%), 3 eran eventuales y otros 3 poseían un contrato de seis meses o menos (4,48 %), 5 posee un contrato de hasta un año (7,46%), 2 de ellos posee un contrato de hasta dos años (2,99%) y 51 de ellos tiene un trabajo fijo (76,12%). Los sujetos del grupo experimental poseían una antigüedad de 11 ± 6 años y los pertenecientes al grupo control, una antigüedad de 7 ± 7 años.

En la Tabla 16 se presentan los estadísticos descriptivos y el resultado de la comparación del grupo experimental y el grupo control en las características de la muestra. Ambos grupos obtuvieron puntuaciones similares en la mayor parte de las variables, a excepción de la edad ($Z = 2,73$; $P = 0,006$), la situación laboral ($X^2_5 = 12,7$; $P = 0,026$) y la antigüedad en la empresa ($Z = 2,25$; $P = 0,024$) a favor del grupo experimental (Tabla 16).

Tabla 16. Características de la muestra: datos demográficos y variables descriptivas de la muestra (media y desviación típica) o frecuencias; estadístico de contraste; valor de p para la comparación del grupo experimental con el grupo control

Variable	Frecuencia (N = 67)	Porcentaje (%)	GE (N = 40)	GC (N = 27)	EC	P
Edad (años, M$\pm$DT)			37,62 $\pm$ 12,36	31,00 $\pm$ 11,92	Z = 2,73	0,006*
Género						
Hombres	33	49,25	19	14	X ² ₁ = 122	0,727
Mujeres	34	50,75	21	13		
Composición corporal						
Peso (Kg)			68,64 $\pm$ 11,11	69,33 $\pm$ 5,13	Z = 4,88	0,626
Talla (m)			1,70 $\pm$ 8,5	1,69 $\pm$ 7,03	Z = 5,89	0,833
Nivel educativo (N)					X ² ₅ = 5,55	0,352
Primarios (ESO, Certificado Escolaridad, Graduado)	3	4,48	2	1		
Formación Profesional Primer Grado	1	1,49	1	0		

Resultados

Variable	Frecuencia (N = 67)	Porcentaje (%)	GE (N = 40)	GC (N = 27)	EC	P
Formación Profesional Segundo Grado	4	5,97	4	0		
Bachiller (ES, BUP, COU)	2	2,99	2	0		
Titulación Media (Esc. Técnicas, Prof. E.G.B., Graduados Sociales, A.T.S., etc.)	12	17,91	7	5		
Licenciados, Doctores, Másteres universitarios	45	67,16	24	21		
Profesión (N)					$X^2_{19} = 13,45$	0,815
Pedagogo	7	10,45	4	3		
Administrativo	10	14,93	7	3		
Investigador	17	25,37	8	9		
Gestión proyectos	1	1,49	1	0		
Dirección financiera	1	1,49	1	0		
Ingeniero	4	5,97	3	1		
Auxiliar investigación	1	1,49	1	0		
Diseño gráfico	1	1,49	1	0		
Responsable de calidad	4	5,97	1	3		
Técnico de gestión	4	5,97	2	2		
Asistencia técnica	3	4,48	1	2		
Técnico coordinador	1	1,49	1	0		
Técnico compras	2	2,99	2	0		
Oficina, informes, ensayos	1	1,49	1	0		
Comercial	3	4,48	1	2		
Técnico laboratorio	2	2,99	1	1		
Oficina	2	2,99	1	1		
Gestión económica	1	1,49	1	0		
Técnico superior	1	1,49	1	0		
Especialista	1	1,49	1	0		
Técnico de gestión	1	1,49	0	1		
Categoría laboral (N)					$X^2_8 = 3,77$	0,878
Empleado o trabajador	56	83,58	34	22		

Variable	Frecuencia (N = 67)	Porcentaje (%)	GE (N = 40)	GC (N = 27)	EC	P
Mando intermedio	10	14,93	6	4		
Alta dirección o dirección general	1	1,49	0	1		
Situación laboral (N)					$X^2_5 = 12,7$	0,026*
Trabajo sin nómina o contrato legalizado	4	5,97	2	2		
Eventual por terminación de tarea o realizando una sustitución	3	4,48	1	2		
Contrato de seis meses o menos	3	4,48	1	2		
Contrato hasta un año	5	7,46	1	4		
Contrato hasta dos años	2	2,99	0	2		
Fijos	51	76,12	36	15		
Antigüedad (años, M±DT)			11±6	7±7	Z = 2,25	0,024*

Nota. N = número de sujetos; M = media; DT = desviación típica; GE = grupo experimental; GC = grupo control; EC = estadístico de contraste; X^2 = Chi cuadrado; *P < 0,05.

5.2.3 Muerte experimental: pérdidas de participantes y adherencia al programa

La intervención tuvo una adherencia del 90,3% y tan solo 3 participantes del grupo experimental no alcanzaron el 80% de la asistencia requerida al programa. Hubo asimismo un 76,14% de sujetos que alcanzaron una asistencia por encima del 85%. Durante el seguimiento, la falta de tiempo fue una razón característica en el caso de 4 sujetos, si bien, dichas ausencias han sido señaladas en la literatura como uno de los principales factores de ausencia de práctica de actividad física entre los españoles (Ferrando y Goig, 2011). Hubo tres sujetos (N = 3) que aludieron otros motivos. Sin embargo, la mortandad experimental asociada a la realización de la batería de test físicos fue en el grupo control de un 85% (N = 23).

5.2.4 Respuestas del programa

La Figura 39 muestra una comparativa entre la intensidad deseada del programa por parte del equipo de investigación y la que se produjo en los participantes. La intensidad del ejercicio físico percibida en todas las sesiones por los participantes se adecuó en a la esperada. Las sesiones se diseñaron siguiendo una intensidad media de $55,45 \pm 0,15$ y la intensidad media percibida por los participantes tras las sesiones de ejercicio físico fue de $55,45 \pm 0,15$. No se encontraron diferencias significativas entre la intensidad esperada y la percibida (Z = 0,70; P = 0,483) (Figura 39).

Figura 39. Resultados de la intensidad esperada y la intensidad percibida durante el desarrollo de las sesiones del grupo experimental

5.2.5 Variables psicológicas

En la Tabla 17 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo (experimental vs control) y del momento de medición. Los sujetos del grupo control presentaron niveles significativamente superiores de depresión que los sujetos del grupo experimental en el pre-test ($Z = 2,57$; $P = 0,010$; $\eta^2 = 0,17$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en depresión del pre al post ($Z = 0,22$; $P = 0,412$).

Los niveles de ansiedad estado pre-test del grupo control y del experimental no fueron significativamente diferentes ($Z = 0,79$; $P = 0,432$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de “Ansiedad Estado” del pre al post ($Z = 1,57$; $P = 0,120$). Tampoco se observaron diferencias significativas en la “Ansiedad Rasgo” que presentaron ambos grupos en el pre-test ($Z = 1,28$; $p = 0,200$) y tampoco en el cambio pre-post experimentado por ambos grupos ($Z = 1,75$; $p = 0,080$).

Tabla 17. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para las variables psicológicas observadas al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos

	Grupos	Inicio		12 semanas		EC	P	η^2
		M	DT	M	DT			
Depresión (CES-D)	Experimental	14,14	7,38	10,93	4,62	0,79	0,432	
	Control	16,82	4,36	13,59	3,91			
Ansiedad Estado (STAIIa)	Experimental	46	3,92	47,12	3,84	1,57	0,120	
	Control	46,95	4,08	46,92	3,48			
Ansiedad Rasgo (STAIIb)	Experimental	39,1	3,9	37,71	4,43	1,75	0,080	
	Control	37,71	4,43	37,46	4,47			

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; * $P < 0,05$; η^2 presentados según la propuesta de Cohen: $< 0,06$ pequeño, $\geq 0,06$ hasta $< 0,14$ medio y $\geq 0,14$ grande (Cohen, 1988).

5.2.6 Variables sobre la productividad y el rendimiento en el trabajo

5.2.6.1 Capacidad para el trabajo

En la Tabla 18 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo (experimental vs control) y del momento de medición. Los sujetos del grupo experimental no presentaron niveles de capacidad para el trabajo significativamente mejores que los del grupo control en el pre-test ($Z = 1,04$; $P = 0,300$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la capacidad para el trabajo del pre al post ($Z = 1,20$; $P = 0,228$).

Los sujetos del grupo experimental y del control no presentaron diferencias significativas en ninguna de las dimensiones de capacidad para el trabajo pre-test. No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en la dimensión capacidad actual pre-test ($Z = 0,95$; $P = 0,342$); tampoco se encontraron diferencias significativas con la demanda en el trabajo ($Z = 0,45$; $P = 0,651$); y con las enfermedades diagnosticadas ($Z = 1,77$; $P = 0,077$); el deterioro estimado tampoco resultó significativo en ambos grupos ($Z = 0,00$; $P = 1,000$); no se observaron diferencias significativas en las ausencias en el último año en ambos grupos en la fase pre-test ($Z = 0,00$; $P = 1,000$); la estimación de las limitaciones para el trabajo por desórdenes tampoco fue diferente en ambos grupos ($Z = 1,44$; $P = 0,150$); tampoco se observaron diferencias significativas en la capacidad mental en el grupo con respecto al grupo control pre-test ($Z = 0,75$; $P = 0,451$).

No se encontraron diferencias significativas en las seis primeras dimensiones en el cambio de los valores de la capacidad para el trabajo del pre al post ($Z = 0,40$; $P = 0,692$ para capacidad actual para el trabajo; $Z = 1,57$; $P = 0,116$ para la variable relación con la demanda de trabajo; $Z = 1,65$; $P = 1,000$ para las enfermedades diagnosticadas; $Z = 0,57$; $P = 0,572$ para el deterioro estimado; $Z = 1,13$; $P = 0,260$ en las ausencias en el último año; $Z = 1,62$; $P = 0,106$ en las limitaciones por desórdenes), aunque sí se observaron diferencias significativas en el cambio de los valores en la capacidad mental a favor del grupo experimental ($Z = 2,36$; $P = 0,019$; $\eta^2 = 0,09$).

Tabla 18. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para el Índice de Capacidad para el Trabajo observado al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos

	Grupos	Inicio		12 semanas		EC	P	η^2
		M	DT	M	DT			
Capacidad para el trabajo (puntuación ICP)	Experimental	48,30	0,39	48,40	1,26	1,20	0,228	
	Control	48,25	1,54	48,00	4,30			
Capacidad actual en el trabajo	Experimental	8,61	1,32	9,05	0,22	0,40	0,692	
	Control	8,95	1,16	8,94	1,06			
Relación con la demanda de trabajo	Experimental	9,14	0,89	9,23	0,91	1,57	0,116	
	Control	9,17	1,09	9,65	1,46			

	Grupos	Inicio		12 semanas		EC	P	η^2
		M	DT	M	DT			
Enfermedades diagnosticadas	Experimental	4,45	1,80	1,07	1,63	0,65	1,000	
	Control	5,25	2,07	1,07	1,63			
Deterioro estimado	Experimental	5,65	0,54	5,62	0,80	0,57	0,572	
	Control	5,57	0,75	5,60	0,52			
Ausencias en el último año	Experimental	4,26	0,45	4,68	0,42	1,13	0,260	
	Control	3,96	1,80	4,40	1,12			
Limitaciones para el trabajo por desórdenes	Experimental	6,67	0,20	6,89	0,18	1,62	0,106	
	Control	7,00	0,00	6,57	0,16			
Capacidad mental	Experimental	3,22	0,84	3,75	0,60	2,36	0,019*	0,09
	Control	3,13	1,14	1,87	1,93			

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η^2 presentados según la propuesta de Cohen: < 0,06 pequeño, $\geq$ 0,06 hasta < 0,14 medio y $\geq$ 0,14 grande (Cohen, 1988).

5.2.6.2 Pérdidas en la productividad relacionadas con la salud

En la Tabla 19 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo (experimental vs control) y del momento de medición. No se encontraron diferencias significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en el presentismo en el pre-test ($Z = 0,33$; $P = 0,706$) ni en la valoración económica del presentismo en el pre-test ($Z = 0,55$; $P = 0,580$). No se observaron diferencias significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en las pérdidas de productividad pre-test ($Z = 1,39$; $P = 0,371$). No se hallaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y control en el absentismo a corto plazo en el pre-test ($Z = 0,89$; $P = 0,371$) ni en los costes en la productividad a corto plazo ($Z = 0,27$; $P = 0,788$).

No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en el presentismo del pre al post ($Z = 0,00$; $P = 1,00$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en la valoración del presentismo del pre al post ($Z = 1,29$; $P = 0,197$). No se observaron diferencias en el cambio de los valores en las pérdidas de productividad ($Z = 1,22$; $P = 0,221$), ni en los costes de la productividad a corto plazo entre el grupo experimental y el control del pre al post ($Z = 1,00$; $P = 0,317$). Tampoco se encontraron diferencias significativas en el cambio de los valores en el absentismo a corto plazo entre el grupo experimental y el control del pre al post ($Z = 0,00$; $P = 1,00$).

Tabla 19. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para los costes en la productividad (*iMTA Productivity Cost*) observado al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos

	Grupos	Inicio		12 semanas		EC	P	η^2
		M	DT	M	DT			
Presentismo	Experimental	4,06	4,51	0,11	0,13	,00	1,00	
	Control	-2,29	1,08	0,08	0,10			
Valoración presentismo	Experimental	128,13	149,35	121,25	141,50	1,29	0,197	
	Control	130,00	125,02	96,43	119,64			
Pérdidas productividad	Experimental	17,33	20,43	6,10	4,42	1,22	0,221	
	Control	3,33	3,06	10,33	11,93			
Absentismo corto plazo	Experimental	1,20	0,45	1,20	0,45	,00	1,00	
	Control	1,00	0,00	2,00	0,32			
Costes productividad corto plazo	Experimental	261,00	96,30	268,80	97,94	1,00	0,317	
	Control	221,25	18,87	450,00	59,17			

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η^2 presentados según la propuesta de Cohen: < 0,06 pequeño, $\geq$ 0,06 hasta < 0,14 medio y $\geq$ 0,14 grande (Cohen, 1988).

5.2.7 Variables sobre la satisfacción en el trabajo

En la Tabla 20 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo (experimental vs control) y del momento de medición. No se encontraron diferencias significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en la “satisfacción con la supervisión y participación en la organización” en el pre-test ($Z = 0,56$; $P = 0,57$). No se observaron diferencias significativas en la “satisfacción con la remuneración y las prestaciones” en el pre-test ($Z = 1,89$; $P = 0,06$). No se encontraron diferencias significativas en la “satisfacción intrínseca” en el pre-test ($Z = 0,95$; $P = 0,341$). No se observaron diferencias significativas en la “satisfacción con el ambiente físico” en el pre-test ($Z = 0,181$; $P = 0,856$). No se encontraron diferencias significativas en la “satisfacción con la cantidad de la producción” en el pre-test a favor del grupo control ($Z = 1,09$ $P = 0,286$). No se observaron diferencias significativas en la “satisfacción con la calidad de la producción” en el pre-test ($Z = 0,74$; $P = 0,941$). No se encontraron diferencias significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en las puntuaciones totales de la satisfacción laboral ($Z = 0,50$; $P = 0,620$).

No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la “satisfacción con la supervisión y participación en la organización” del pre al post ($Z = 0,22$; $P = 0,823$). No se encontraron diferencias

significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la “satisfacción con la remuneración y las prestaciones” del pre al post ($Z = 0,52$; $P = 0,575$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la “satisfacción intrínseca” del pre al post ($Z = 0,14$; $P = 0,885$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la “satisfacción con el ambiente físico” del pre al post ($Z = 0,28$; $P = 0,783$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la “satisfacción con la cantidad de la producción” del pre al post ($Z = 0,54$; $P = 0,593$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la “satisfacción con la calidad de la producción” del pre al post ($Z = 1,31$; $P = 0,191$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en las puntuaciones totales de satisfacción laboral del pre al post ($Z = 0,81$; $P = 0,832$).

Tabla 20. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para la satisfacción en el trabajo y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos

	Grupos	Inicio		12 semanas		EC	P	η^2
		M	DT	M	DT			
Satisfacción con la supervisión y participación en la organización	Experimental	5,87	2,80	6,88	1,97	0,22	0,823	
	Control	6,27	2,75	5,47	2,61			
Satisfacción con la remuneración y las prestaciones	Experimental	2,44	1,75	3,21	1,92	0,52	0,575	
	Control	3,32	1,53	2,73	1,53			
Satisfacción intrínseca	Experimental	3,68	0,92	3,77	0,87	0,14	0,885	
	Control	3,59	0,60	3,47	0,92			
Satisfacción con el ambiente físico	Experimental	3,08	1,06	3,12	0,95	0,28	0,783	
	Control	3,14	1,08	2,81	1,17			
Satisfacción con la cantidad de producción	Experimental	1,45	0,76	1,69	0,62	0,54	0,593	
	Control	1,18	0,91	1,44	0,81			
Satisfacción con la calidad de producción	Experimental	1,60	0,56	1,58	0,56	1,31	0,191	
	Control	1,55	0,68	1,43	0,73			
Satisfacción total (26 ítems)	Experimental	17,86	5,11	20,55	3,12	0,81	0,832	
	Control	18,64	4,62	17,43	4,73			

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; * $P < 0,05$; η^2 presentados según la propuesta de Cohen: $< 0,06$ pequeño, $\geq 0,06$ hasta $< 0,14$ medio y $\geq 0,14$ grande (Cohen, 1988).

5.2.8 Variables sobre la condición física y medidas antropométricas

En la Tabla 21 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo (experimental vs control) y del momento de medición. A continuación, se describen los resultados de cada variable asociada a la condición física y medidas antropométricas.

5.2.8.1 Nivel de condición física y capacidad aeróbica

Resistencia (UKK 2 Km walking test)

No se observaron en los sujetos del grupo experimental y el control diferencias significativas en resistencia en la realización *UKK 2 Km Walking Test* en el pre-test ($Z = 0,31$; $P = 0,760$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de resistencia ($Z = 0,52$; $P = 0,607$).

Frecuencia cardiaca (UKK 2 Km walking test)

No se observaron en el pre-test diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en la frecuencia cardiaca en la realización del *UKK 2 Km Walking Test* ($Z = 0,12$; $P = 0,900$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la frecuencia cardiaca ($Z = 0,23$; $P = 0,819$).

Índice de aptitud aeróbica: nivel de condición física

No se encontraron diferencias significativas en el índice de aptitud aeróbica en los sujetos del grupo experimental y el control en el pre-test ($Z = 0,77$; $P = 0,439$). Tampoco se observaron diferencias significativas en el cambio de los valores en el índice de aptitud aeróbica entre los grupos experimental y control ($Z = 1,55$; $P = 0,121$).

Capacidad aeróbica (VO_2 máx)

No se encontraron diferencias significativas en el VO_2 máx en los sujetos del grupo experimental y el control en el pre-test ($Z = 0,78$; $P = 0,440$). Tampoco se observaron diferencias significativas en el cambio de los valores en el VO_2 máx entre los grupos experimental y control ($Z = 1,54$; $P = 0,120$).

5.2.8.2 Aptitud musculoesquelética

Flexibilidad y zona baja de la espalda (sit and reach)

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en la flexibilidad en el pre-test ($Z = 1,05$; $P = 0,293$). No se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la flexibilidad ($Z = 0,19$; $P = 0,850$).

Resistencia de los músculos de brazos y manos (dinamometría manual)

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en la resistencia de los músculos de brazos y manos a través de la dinamometría manual en el pre-test ($Z = 0,45$; $P = 0,650$). Se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la resistencia de los músculos de brazos y manos a través de la dinamometría manual a favor del grupo experimental ($Z = 2,17$; $P = 0,030$; $\eta^2 = 0,07$).

Potencia del tren inferior (salto vertical)

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en la potencia del tren inferior a través del salto vertical en el pre-test ($Z = 1,50$; $P = 0,135$). Se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control a favor del grupo experimental en el cambio de los valores de la potencia del tren inferior medida a través de salto vertical ($Z = 2,33$; $P = 0,020$; $\eta^2 = 0,08$).

Potencia del tren inferior (salto horizontal)

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en la potencia del tren inferior a través del horizontal en el pre-test ($Z = 0,53$; $P = 0,598$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la potencia del tren inferior medida a través del salto horizontal ($Z = 1,00$; $P = 0,320$).

Fuerza-resistencia (abdominales)

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en la fuerza resistencia en el pre-test ($Z = 1,34$; $P = 0,180$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la fuerza resistencia medida a través de la prueba de abdominales ($Z = 1,45$; $P = 0,148$).

Fuerza-resistencia (plancha)

No se observaron diferencias significativas entre los grupos experimental y control en el pre-test en la plancha ($Z = 0,89$; $P = 0,369$). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la fuerza resistencia medida a través de la plancha a favor del grupo experimental ($Z = 2,34$; $P = 0,020$; $\eta^2 = 0,08$).

5.2.8.3 Aptitud motriz

Velocidad segmentaria (plate tapping test)

No se observaron diferencias significativas entre los grupos experimental y control en el pre-test en la velocidad segmentaria de los miembros superiores medido a través del test de placas ($Z = 1,28$; $P = 0,199$). No se encontraron diferencias entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores de la velocidad segmentaria de los miembros superiores medido a través de la prueba de placas ($Z = 1,20$; $P = 0,230$).

Equilibrio unipodal (flamingo balance test)

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en el equilibrio general unipodal en el pre-test ($Z = 1,25$; $P = 0,210$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en el equilibrio general unipodal medido a través de la prueba flamingo ($Z = 0,72$; $P = 0,469$).

5.2.8.4 Variables físicas y antropométricas

Peso (Kg)

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en el peso corporal en el pre-test ($Z = 4,88$; $P = 0,626$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en el peso corporal ($Z = 2,50$; $P = 0,803$).

Índice de Masa Corporal (IMC)

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en el IMC en el pre-test ($Z = 0,59$; $P = 0,555$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en el índice de masa corporal ($Z = 0,11$; $P = 0,909$).

Perímetro de cintura

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en el perímetro de cintura en el pre-test ($Z = 1,05$; $P = 0,293$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en el perímetro de cintura ($Z = 0,55$; $P = 0,584$).

Pliegue cuádriceps

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en el pliegue del cuádriceps en el pre-test ($Z = 0,32$; $P = 0,749$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en el pliegue del cuádriceps ($Z = 1,75$; $P = 0,861$).

Pliegue abdominal

No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en el pliegue abdominal en el pre-test ($Z = 0,93$; $P = 0,248$). No se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en el pliegue abdominal ($Z = 1,05$; $P = 0,293$).

Porcentaje de grasa (%)

Se encontraron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en el porcentaje de grasa en el pre-test a favor del grupo experimental ($Z = 2,39$; $P = 0,017$; $\eta^2 = 0,08$). Se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en el cambio de los valores en el porcentaje de grasa a favor del grupo experimental ($Z = 2,44$; $P = 0,015$; $\eta^2 = 0,09$).

Tabla 21. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para la condición física al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos

	Grupos	Inicio		12 semanas		EC	P	η ²
		M	DT	M	DT			
Aptitud aeróbica								
Resistencia (2 Km test)	Experimental	18,98	2,80	17,76	2,63	0,52	0,607	
	Control	20,16	4,30	17,53	1,36			
Frecuencia cardiaca (2 Km test)	Experimental	105,94	19,75	115,43	18,52	0,23	0,819	
	Control	114,25	43,96	106,67	10,07			
Índice de aptitud aeróbica (<i>UKK test</i>)	Experimental	75,50	13,83	84,63	9,36	1,55	0,121	
	Control	78,08	11,29	76,65	8,64			
VO ₂ máx (ml/kg ⁻¹ /min ⁻¹)	Experimental	27,04	8,18	29,57	2,16	1,54	0,120	
	Control	30,12	6,37	28,66	0,97			
Aptitud musculoesquelética								
Flexibilidad y zona baja de la espalda (<i>sit and reach</i>)	Experimental	18,10	2,29	15,62	7,61	0,19	0,850	
	Control	19,50	6,36	19,27	10,50			
Resistencia de los músculos de brazos y manos (dinamometría manual)	Experimental	36,08	11,74	38,76	12,50	2,17	0,030*	0,07
	Control	33,75	10,59	29,64	8,27			
Potencia del tren inferior (salto vertical)	Experimental	37,19	12,88	37,22	10,64	2,33	0,020*	0,08
	Control	28,00	4,60	27,49	6,10			
Potencia del tren inferior (salto horizontal)	Experimental	152,24	31,57	155,70	33,80	1,00	0,320	
	Control	146,09	31,04	146,00	16,32			
Fuerza-resistencia (abdominales)	Experimental	16,08	4,52	21,16	5,61	1,45	0,148	
	Control	19,00	1,41	22,14	5,34			
Fuerza-resistencia (plancha)	Experimental	103,49	46,56	141,14	42,79	2,34	0,020*	0,08
	Control	120,46	51,71	93,14	45,73			
Aptitud motriz								
Velocidad segmentaria (<i>plate tapping test</i>)	Experimental	29,94	6,23	30,14	4,77	1,20	0,230	
	Control	28,57	12,94	28,51	12,91			
Equilibrio unipodal (<i>flamingo balance test</i>)	Experimental	3,41	2,55	2,50	2,45	0,72	0,463	
	Control	5,50	2,12	7,00	11,66			
Variables físicas y antropométricas								
Peso (Kg)	Experimental	68,64	11,12	68,58	9,86	2,50	0,803	
	Control	69,33	5,13	75,59	7,08			
Índice de Masa Corporal (IMC)	Experimental	23,70	3,11	23,68	2,70	0,11	0,909	
	Control	24,57	3,06	24,49	1,68			
Perímetro de cintura (cm)	Experimental	79,59	9,64	78,84	8,22	,055	0,584	
	Control	82,45	10,64	85,79	6,45			
Pliegue cuádriceps	Experimental	27,46	9,26	25,04	9,53	1,75	0,861	

	Grupos	Inicio		12 semanas		EC	P	η^2
		M	DT	M	DT			
Pliegue abdominal	Control	26,27	12,08	27,05	12,21	1,05	0,293	
	Experimental	26,12	8,06	25,97	6,89			
	Control	28,11	6,44	27,49	4,88			
	Experimental	25,36	1,73	23,68	2,74			
Porcentaje de grasa (%)	Control	24,56	1,63	24,82	3,22	2,44	0,015*	0,09
	Experimental							

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; *P < 0,05; η^2 presentados según la propuesta de Cohen: < 0,06 pequeño, $\geq$ 0,06 hasta < 0,14 medio y $\geq$ 0,14 grande (Cohen, 1988).

5.2.9 Variables relacionadas con la salud percibida

Salud percibida a través del instrumento SF-36 v.2.

Las puntuaciones más altas fueron las de “función física” y las más bajas las de “rol emocional”. Todos los participantes manifestaron al inicio y al final del programa una salud buena. En la Tabla 22 se presentan los estadísticos descriptivos en función del grupo (experimental vs control) y del momento de medición. No se encontraron diferencias significativas entre los sujetos del grupo experimental y los del control en la “función física” en el pre-test ($Z = 0,02$; $P = 0,170$). No se observaron diferencias significativas en los sujetos del grupo experimental y el control en las dimensiones de “función social”, “rol físico”, “salud mental”, “vitalidad”, “salud general” y las puntuaciones totales de la salud mental ($Z = 1,38$; $P = 0,170$ para la variable “función social”; $Z = 0,60$; $P = 0,547$ para la variable “rol físico”; $Z = 0,12$; $P = 0,902$ para la variable “salud mental”; $Z = 0,75$; $P = 0,453$ para la variable “vitalidad”; $Z = 0,59$; $P = 0,555$ para la variable “salud general”; $Z = 1,00$; $P = 0,317$ para la variable puntuaciones totales de salud mental). Se observaron diferencias significativas entre los sujetos del grupo experimental y el control en la dimensión de “rol emocional”, “dolor corporal” y las puntuaciones totales de “salud física” en el pre-test ($Z = 3,55$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,19$ para la variable “rol emocional”; $Z = 3,55$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,19$ para la variable “dolor corporal”; $Z = 3,58$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,19$ para las puntuaciones totales de salud física) a favor del grupo experimental.

Se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores de la salud física y en las puntuaciones totales de salud física a favor del grupo experimental ($Z = 5,99$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,54$ para la variable “función física”; $Z = 5,10$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,39$ para la puntuación total de salud física). Se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores de las dimensiones “función social”, “rol físico”, “rol emocional”, “vitalidad” y “salud general” a favor del grupo experimental ($Z = 6,64$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,67$ para la variable “función social”; $Z = 6,43$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,62$ para la variable “rol físico”; $Z = 5,15$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,40$ para la variable “rol emocional”; $Z = 5,15$; $P = 0,00$; $\eta^2 = 0,40$ para la variable “vitalidad”; $Z = 5,60$; $P = 0,00$; $\eta^2 = 0,48$ para la variable “salud general”).

Resultados

Se observaron diferencias significativas entre el grupo experimental y control en el cambio de los valores en la dimensión “salud mental” y en las puntuaciones totales de la salud mental del pre al post ($Z = 3,18$; $P = 0,001$; $\eta^2 = 0,15$ para la variable “salud mental”; $Z = 4,83$; $P = 0,000$; $\eta^2 = 0,35$ para la variable de puntuaciones totales de la salud mental). Se encontraron diferencias significativas en los valores de la dimensión “dolor corporal” del pre al post ($Z = 2,06$; $P = 0,040$; $\eta^2 = 0,06$) a favor del grupo experimental.

Tabla 22. Estadísticos descriptivos (media y desviación típica), estadísticos de contraste y p-valor para la salud percibida al inicio y tras 12 semanas de entrenamiento para los dos grupos

	Grupos	Inicio		12 semanas		EC	P	η^2
		M	DT	M	DT			
Función física	Experimental	55,17	4,10	55,84	2,26	5,99	0,0001*	0,54
	Control	54,81	4,87	45,89	8,52			
Función social	Experimental	51,31	5,35	52,91	5,49	6,64	0,0001*	0,67
	Control	52,04	7,63	50,09	3,96			
Rol físico	Experimental	51,35	9,06	52,72	9,69	6,43	0,0001*	0,62
	Control	50,39	13,75	50,00	8,43			
Rol emocional	Experimental	48,73	8,79	50,58	7,94	5,15	0,0001*	0,40
	Control	55,52	11,08	53,36	5,72			
Salud mental	Experimental	52,03	9,52	52,90	8,75	3,18	0,0001*	0,15
	Control	49,30	14,70	47,36	12,24			
Vitalidad	Experimental	51,78	6,38	53,37	7,30	5,15	0,0001*	0,40
	Control	51,52	9,58	47,25	9,00			
Dolor corporal	Experimental	50,64	7,24	45,58	12,64	2,06	0,040*	0,06
	Control	44,47	7,23	51,35	8,17			
Salud general	Experimental	51,89	7,76	55,62	5,30	5,60	0,0001*	0,48
	Control	49,30	11,47	47,89	8,01			
Totales salud física	Experimental	52,30	5,03	52,62	7,91	5,10	0,0001*	0,39
	Control	47,23	5,76	46,14	14,99			
Totales salud mental	Experimental	50,75	7,58	54,53	4,43	4,83	0,0001*	0,35
	Control	49,99	12,54	48,92	8,87			

Nota. M = media; DT = desviación típica; EC = estadístico de contraste; * $P < 0,05$; η^2 presentados según la propuesta de Cohen: $<0,06$ pequeño, $\geq 0,06$ hasta $<0,14$ medio y $\geq 0,14$ grande (Cohen, 1988).

5.3 ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA

5.3.1 Síntesis de la evidencia

De los 93 artículos encontrados inicialmente en la revisión durante los últimos 10 años, 27 fueron descartados por aparecer duplicados, 15 se suprimieron por ser cartas al director, notas, resúmenes o presentaciones en congresos. Además, se descartaron 5 artículos por idioma al no estar redactado en inglés o castellano. Por último, 6 más fueron eliminados por tener una temática diferente a la prostatitis en el deporte. Se

seleccionaron finalmente 10 artículos que cumplieron los criterios de inclusión, tal y como se muestran en el diagrama de flujo tipo consort de la (Figura 40).

Figura 40. Diagrama de flujo explicativo de la revisión bibliográfica

5.3.2 Evaluación de la calidad metodológica

Se analizaron metodológicamente los 10 estudios que cumplían los criterios de inclusión (Anexo 17). Con el objetivo de valorar la calidad metodológica de los estudios seleccionados, se les aplicó la escala PEDro, El rango de puntuaciones posibles de 0 a 11. La presencia de indicadores de la calidad de las evidencias presentadas se asigna 1 punto y “no”, 0 puntos. Posteriormente, se analizaron las diferencias de puntuación de opinión

hasta que se alcanzó el consenso. Autores como Moseley et al. (2002) defienden que una puntuación igual o mayor de 5 denota buena calidad metodológica y riesgo de sesgo bajo (Moseley, Herbert, Sherrington, y Maher, 2002). Se observa una calidad metodológica de buena a excelente, puntuando todos entre 5 y 10 puntos sobre 10, con una media de $6,00 \pm 1,15$ (Anexo 8).

5.3.3 Extracción y análisis de datos

Se realizó una evaluación de los estudios seleccionados por 2 revisores de manera independiente, extrayéndose a una tabla los siguientes datos: autor, año de publicación del artículo, protocolo de intervención, tamaño de la muestra, tipo de estudio, duración, seguimiento y resultados obtenidos.

5.3.4 Síntesis de los resultados

De los estudios revisados se recogieron 7 estudios observacionales que recogen relaciones entre los síntomas CP/CPPS y la actividad física y 3 estudios donde a través de un programa específico de ejercicios evalúan los síntomas asociados con CP/CPPS. En la Tabla 23 se resumen los datos obtenidos de los artículos estudiados.

Tabla 23. Análisis de los resultados obtenidos de los diferentes artículos seleccionados en la revisión

Referencia	Datos Demográficos	Tipo de estudio	Duración	Protocolo de intervención	Parámetros medidos	Resultados
Giubilei et al. 2007	N = 231 G. Exp = 52 GC = 51 20-50 años	G. Exp: ejercicio aeróbico → AEG	18 semanas	AEG → Ejercicios aeróbicos	NIH-CPSI Intensidad de dolor	Los ejercicios aeróbicos mejoran los síntomas asociados con CP/CPPS
		GC: stretching		P/FlexG → No aeróbico.		
		and motion exercises → P/FlexG		Actividad física ligera		
Bartoletti et al. 2009	N = 425 G. ciclista = 245 G. otros deportes = 105 G. sedentarios (GC) = 75 38,21 años	Evaluación de los síntomas genitourinarios a través de National Institute of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index, the International Prostatic Symptom Score, and the pain Visual Analogic Scale	No mostrado	Recogida de datos observacionales	NIH-CPSI IPS3Score VAS PSA Ag	No hay diferencias significativas entre deportistas y GC EVA con diferencias significativas entre grupos. Los ciclistas dan puntuaciones más altas en la zona perianal y suprapúbica

Referencia	Datos Demográficos	Tipo de estudio	Duración	Protocolo de intervención	Parámetros medidos	Resultados
		Evaluación del dolor perianal y zona suprapúbica				
Serdá et al. 2010	N = 33	Programa progresivo de fuerza-resistencia para pacientes con cáncer de próstata	24 semanas	16 semanas control directo 8 semanas trabajo autónomo	Antropometría Fuerza/Resistencia TA, Dolor Calidad de vida	Mejora en extremidades inferiores en mayor medida que en el tronco. Mejora en Calidad de Vida. Disminución de Riesgo Cardiovascular. Disminución de HTA
Serdá et al. 2011	N = 33	Programa progresivo de fuerza-resistencia para pacientes con cáncer de próstata	24 semanas	16 semanas control directo 8 semanas trabajo autónomo	Antropometría Fuerza/Resistencia TA, Dolor Calidad de vida	Mejora en extremidades inferiores en mayor medida que en el tronco. Mejora en Calidad de Vida. Disminución de Riesgo Cardiovascular. Disminución de HTA
Wu et al. 2013	N = 1868 19-78 años	4930 No prostatitis 4820 prostatitis	3 meses	Recogida de datos observacionales	NIH-IV prostatitis en relación con medidas antropométricas, consumo de tabaco, HTA y nivel de colesterol	No hay diferencias significativas entre grupos al analizar los parámetros estudiados.
Zhang R. et al. 2015	N = 20918 sanos	Comprobación de nivel de actividad física	24 años	Actividad física de ocio	MET*h*wk ⁻¹ Síntomas CP/CPPS	689 de los 20918 hombres desarrollaron síntomas de CP/CPPS Fumar, beber, ausencia de actividad física y elevado nivel de glucosa en plasma se asocian con un incremento en el riesgo de síntomas prostáticos. No hay relación con la edad
Zhang Z. et al. 2015	N = 2790 20-84 años. China	34,20% Prostatitis 40,30% No prostatitis	4 meses	NIH-CPSI FAMHES	Síntomas de prostatitis	

Resultados

Referencia	Datos Demográficos	Tipo de estudio	Duración	Protocolo de intervención	Parámetros medidos	Resultados
Hållmarker et al. 2015	N = 185412 esquiadores N = 184617 población general	Incidencia de número de casos a lo largo del tiempo.	1989-2010	Registro de esquiadores a través del número de registro nacional sueco. Registro de no esquiadores a través del registro oficial de la población sueca	Nº de casos Nº de casos de cáncer por 1000 personas al año	Disminución en un 6% en el riesgo de cáncer invasivo esquiadores frente a no esquiadores (1827 vs. 1435) (1.51 vs. 1.22 p>0.001) La probabilidad de incrementar el nº de casos de cáncer de próstata en 20 años supone un 4,6% más en esquiadores frente a un 3,8% en no esquiadores
Zhang R. et al. 2015	N = 19791 50,7 años	Evaluación de los síntomas CP/CPPSs a través del cuestionario del National Institute of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index, en relación a información médica y factores de vida.	22 años	Cuestionarios validados, así como historial de enfermedad de uretrales. Estudio de cohortes	MET*h*wk ⁻¹ Síntomas CP/CPPS NIH-CPSI Intensidad de dolor	653 casos con CP/CPPS. No asociación con obesidad, fumar o hipertensión y desarrollo de síntomas CP/CPPS
Awad et al. 2017	N = 3932 G. ciclista baja intensidad=1858 G. ciclista alta intensidad=916 G. natación/corredores=1158 1361 practicaban ciclismo y natación o carrera	Evaluación de la relación de síntomas urinarios y sexuales por la realización de ciclismo	9 meses	Diseño cross-seccional	Síntomas CP/CPPS NIH-CPSI Intensidad de dolor	No hay relación entre ciclismo y mayores problemas urinarios o sexuales comparados con nadadores o corredores. Los ciclistas presentan tamaños estructurales de la uretra mayores que el resto de deportistas

Nota. CP/CPPS: Síndrome de dolor pélvico crónico; G.: Grupo; G. Exp: Grupo Experimental; NIH-CPSI: *National Institute of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index*; TA: Tensión Arterial; HTA: Hipertensión Arterial; AEG: *Aerobic Exercise group*; P/FlexG: *Placebo/Streching and motion exercises group*.

5.3.5 Estimaciones de efectos combinados de las medidas de resultado

Referente al tamaño del efecto para poder realizar las estimaciones para el modelo de metaanálisis, se realizó la comparación de los estudios que presentaban datos de sujetos con y sin prostatitis crónica según la diferencia pre y post test sobre las variables índice de masa corporal, calidad de vida relacionada con el índice de masa corporal e incontinencia urinaria.

5.3.5.1 Análisis de la comparación del índice de masa corporal (IMC)

Se analizaron cuatro comparaciones de forma independiente, con una muestra de 8896 sujetos (Figura 41). Ninguno de los estudios encontró diferencias significativas en el IMC entre los sujetos con y sin síntomas de prostatitis. El análisis de todas las intervenciones desde un punto de vista global mostró que los programas no tuvieron un efecto significativamente distinto en ambos grupos de sujetos en la diferencia del pre al post (TE = 0,033; IC 95%, -0,038 a 0,092; P = 0,4557).

Estudio	Con síntomas de prostatitis 1			Sin síntomas de prostatitis 1			TE	Peso (%)	IC 95%
	M	DT	N	M	DT	N			
Ran Zhang et al. (2015)	25,30	-	5446	25,50	-	653	0,026	62,92	(-0,055-0,107)
Zhang et al. (2015)	23,63	0,20	346	23,95	0,10	2444	0,006	32,71	(-0,038-0,060)
Gianluca et al. (2006)	22,03	3,80	48	21,64	3,40	49	0,108	2,64	(-0,179-0,395)
Serdà et al. (2010) ¹	28,67	2,99	33	28,20	3,10	33	0,148	1,81	(-0,335-0,631)
TE Global (CI 95%): 0,033 (-0,038-0,092) Z = 0,827; P = 0,4082

Nota. EC: estadístico de contraste; 1: Pretest-posttest; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).

Figura 41. Análisis de la comparación del índice de masa corporal (IMC)

5.3.5.2 Análisis de la calidad de vida en relación con el índice de masa corporal (IMC)

Cuando se analiza la calidad de vida relacionada con el índice de masa corporal, se estudiaron dos comparaciones de forma independiente, con una muestra de 442 sujetos (Figura 42). No se hallaron diferencias significativas en la calidad de vida en relación con el IMC entre los sujetos con y sin síntomas de prostatitis en la diferencia del pre al post. De forma global el análisis no mostró un tamaño del efecto significativo (TE = 0,025; IC 95%, -0,038 a 0,092; P = 0,4557).

Resultados

Nota. EC: estadístico de contraste; 1: Pretest-posttest; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).

Figura 42. Análisis de la calidad de vida en relación con el índice de masa corporal (IMC)

5.3.5.3 Análisis con relación a la incontinencia urinaria

Por último, se analizaron tres comparaciones de forma independiente con relación a la incontinencia urinaria, con una muestra de 483 sujetos (Figura 43). Se encontraron diferencias significativas en el estudio de Serdà et al. en el análisis entre los sujetos con y sin síntomas de prostatitis en la diferencia del pre al post (TE = 1,42; IC 95 %, 0,882-1,965). El análisis global de las intervenciones resultó significativo (TE = 0,11; IC 95%, 0,038 a 0,43; P = 0,0246).

Nota. EC: estadístico de contraste; 1: Pretest-posttest; *P < 0,05 en el estudio original; TE: tamaños del efecto interpretados siguiendo la propuesta de Cohen: < 0,2 pequeño, ≥ 0,5 hasta < 0,8 medio y ≥ 0,8 grande (Cohen, 1988).

Figura 43. Análisis de la comparación de la incontinencia urinaria

DISCUSIÓN

6 DISCUSIÓN

6.1 ESTUDIO 1: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO: UN METAANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES EUROPEAS

6.1.1 Los programas de actividad física y su influencia en el entorno laboral europeo

El primer objetivo del estudio consistió en examinar los efectos y la variabilidad de los programas de intervención localizados en los estudios científicos de carácter experimental que han investigado la incidencia de los programas de actividad física y salud en las empresas y organizaciones europeas.

En relación con los efectos observados, los distintos programas mostraron dificultades generalizadas para encontrar efectos grandes. Los resultados globales mostraron efectos de las intervenciones, si bien estos fueron pequeños. Sobre las variables dependientes predominantes identificadas, se observó una gran heterogeneidad de estas. Más concretamente, los estudios analizados en el metaanálisis mostraron efectos significativos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo, la adherencia a la actividad física medida a través del cuestionario SQUASH, el perímetro de la cintura, la presión sistólica, la salud percibida de los participantes, sin embargo, conviene señalar que los efectos encontrados fueron pequeños. En cambio, no se observaron efectos significativos sobre las variables VO_2 máx, peso corporal, presión diastólica y absentismo laboral.

A pesar de los reducidos efectos encontrados, lo cierto es que algunos trabajos de revisión muestran asociaciones positivas entre la promoción de la salud laboral y determinados indicadores de salud (Anderson et al., 2009). Sin embargo, en términos globales, nuestros resultados fueron muy similares a los hallados por Rongen et al. (2013), quienes observaron un TE pequeño y una enorme heterogeneidad de variables. En nuestro metaanálisis destacan estudios que han mostrado la efectividad de estos programas dependiendo de las características de la población, el contenido de la intervención y los criterios de calidad. De igual modo, no se ha establecido la efectividad de las intervenciones teniendo en cuenta la distribución por género y edades (Rongen et al., 2013). En el caso de nuestra investigación, se han tenido en cuenta las características de los estudios y de la población, no obstante, conviene destacar la complejidad que supone identificar la efectividad de los programas de intervención sobre la variable género, pues no todos los estudios contemplan dichos contrastes.

Desde un punto de vista estadístico, el metaanálisis incrementó la potencia del contraste al considerar grandes tamaños muestrales, por tanto, los estudios individuales en los que el intervalo de confianza incluye el cero, globalmente arrojan un tamaño del efecto positivo. A pesar de que los autores informan de un efecto significativo del programa, al verse incluido el cero en el IC, la estimación del tamaño del efecto en algunos casos fue despreciable. Este es el caso de los TE globales observados en las variables perímetro de la cintura y presión sistólica. De igual modo, los TE obtenidos por Pohjonen (2001) para la variable porcentaje de grasa, así como los de la presión arterial diastólica en los estudios de Mc Eachan (2011) y Reijoonsaari (2012) mostraron efectos

de las intervenciones, aunque estos se mostraron pequeños. En estos casos observados, el IC obtenido también está relacionado con el hecho de que los efectos encontrados sean pequeños en esas variables. Si bien, conviene matizar que, aunque estos estudios encuentran un efecto significativo, considerando el tamaño del efecto global teniendo en cuenta todas las investigaciones señaladas, no fue significativo en la mayoría de ellas.

Tamaños del efecto reducidos se han encontrado en otras investigaciones similares (Andersen et al., 2013; Conn et al., 2009). En este sentido, nuestro tamaño del efecto obtenido para todas las intervenciones obtuvo unos resultados muy similares a los obtenidos en otros trabajos de metaanálisis (Rongen et al., 2013). Sin embargo, todavía se constituyen como efectos muy reducidos, justificándose si atendemos a algunos trabajos de revisión que adelantaban la larga heterogeneidad de las intervenciones y los resultados de los efectos (Cook, Sackett, y Spitzer, 1995).

6.1.2 La asociación entre la variabilidad y una valoración objetiva de la influencia de la actividad física en las empresas europeas

El segundo objetivo fue estudiar si la heterogeneidad de los estudios nos permite arrojar evidencia científica suficiente para una valoración objetiva de los programas y el posterior diseño de intervenciones.

A tenor de nuestros resultados, la heterogeneidad de los estudios y las variables dependientes medidas parecen constituir una barrera importante a la hora de arrojar una evidencia científica concluyente. Asimismo, la heterogeneidad asociada a los tipos de intervención realizados en las empresas analizadas puede explicar los TE observados. Rongen et al. (2013) señalaron en su estudio de metaanálisis que la efectividad de los programas venía motivada por el tipo de intervención realizada y en los casos en los que el grupo control no recibió ningún tratamiento. De igual modo, en nuestro estudio no se observaron TE grandes en ECA que fueron de calidad. Aunque se han tratado de homogeneizar al máximo los estudios, lo cierto es que de nuestro trabajo se extraen múltiples indicadores para medir parámetros de salud. No obstante, estos indicadores son muy dispares entre sí y ofrecen resultados a menudo escasos para obtener una información lo suficientemente relevante como para ser concluyentes al respecto.

Los resultados de nuestro metaanálisis parecen indicar que el estado de la cuestión en las empresas europeas dificulta la realización de una valoración objetiva de la influencia de las intervenciones de actividad física y promoción de la salud en el lugar de trabajo a partir de los estudios analizados. Por todo ello, medir las variables que hagan posible una valoración objetiva de los programas en ECA de alta calidad se hace necesario para la obtención de efectos grandes. Dichos hallazgos coinciden con las observaciones de Proper, Koning, van der Beek, Hildebrandt, Bosscher y van Mechelen (2003) en otros trabajos de revisión.

La heterogeneidad de los programas y la operativización de las variables dependientes de los distintos estudios, difícilmente hacen sencilla una valoración objetiva de la condición física de los sujetos. Es por ello por lo que podría constituir una buena alternativa medirla en términos de absentismo laboral. El absentismo laboral se parece

más aceptable como indicador de salud hacia un tratamiento de índices de salud global, en detrimento de otros específicos más complejos de medir. La idea refrenda la premisa en la que, si un sujeto informa de que se siente bien, resulta lógico pensar que en realidad lo está.

En vista de los resultados obtenidos, todo parece indicar que la cuestión se encuentra no solo en realizar intervenciones lo más objetivas posibles, sino que sería interesante dirigirse primero hacia aquellas variables sobre las que se han obtenido mayores tamaños del efecto.

Asimismo, al igual que otras revisiones anteriores realizadas lejos del entorno europeo no condujeron a obtener unos resultados concluyentes (Conn et al., 2009). Nuestra revisión en Europa corrobora los hallazgos de Conn et al. (2009) en tanto soporta la influencia de las intervenciones sobre diferentes variables. La obtención de efectos pequeños sugiere una alta variabilidad de programas y un estado muy primario de las intervenciones en Europa. En esta dirección, los resultados obtenidos corroboraron la hipótesis de partida de nuestro estudio acerca de la variabilidad en cuanto a la dificultad de realizar valoraciones objetivas sobre el impacto de los programas debido a la operativización de las variables dependientes de los estudios.

6.1.3 Sobre la metodología empleada en el metaanálisis

Este estudio ha definido las variables predominantes sobre las que distintos programas de intervención de actividad física y salud han participado en las empresas y las organizaciones europeas. Se han detectado once variables agrupadas entre sí. Conviene precisar igualmente que las técnicas de metaanálisis, tal como exponen autores como Meca y Molina, entendidas bajo el propósito de resolver un problema científico mediante una sistematización de la información, son hoy en día una herramienta de investigación que ha contribuido no solo a la realización de búsquedas sistemáticas de bibliografía, sino también a la extracción de sus medidas del efecto (Meca, 2003; Molina y Marino, 2001).

Abordando los métodos de búsqueda para localizar los estudios relevantes, en el presente trabajo se recurrió no sólo a la búsqueda computarizada, sino también a la consulta de fuentes informales hacia las que acceder a textos no publicados. Generalmente, los trabajos que se publican suelen tener efectos y resultados positivos sobre sus intervenciones, por lo que si se quieren evitar sesgos en la investigación, conviene consultarlas (Cooper, Hedges, y Valentine, 2009). Dados estos sesgos en los que se podía caer, nuestra revisión se completó con la búsqueda en fuentes no formales tales como la consulta de expertos de reconocido prestigio.

La consulta de expertos nos permitió identificar algunas de las variables sobre las que más se había incidido sobre prácticas reales en empresas. De esta manera nunca se había tenido en cuenta por otros revisores la inclusión de variables como la productividad laboral, el absentismo y algunos parámetros de salud específicos como el VO₂ máx como indicador de la condición física de los sujetos. Sin embargo, las intervenciones encontradas no cumplieron la mayoría de los criterios de inclusión, al

manifestarse como pruebas piloto alejadas, en muchos de los casos, del método científico.

En la búsqueda de los estudios relevantes, se han identificado otros trabajos de revisión (Conn et al., 2009; Proper et al., 2003; Rongen et al., 2013). Estas revisiones, aunque sí tuvieron en cuenta estudios europeos en su inclusión, no acotaron los criterios de búsqueda sobre el entorno europeo.

En otras revisiones sistemáticas realizadas con anterioridad, incluso abordan sus objetivos basándose sobre una única medida, acotando el efecto de la promoción de la actividad física sobre la salud laboral de las empresas hacia una sola variable (Kuoppala, Lamminpää, Liira, y Vainio, 2008). En algunos de estos trabajos, la actividad física se constituía como un factor más de promoción de la salud laboral, aunque no era un elemento indispensable para la inclusión de los estudios.

En los metaanálisis es muy frecuente restringir el idioma de búsqueda (Delgado-Rodríguez, Llorca-Díaz, y In Piedrola-Gil, 2001), si bien este elemento puede resultar un condicionante en las mismas. Algunas de las revisiones consultadas no contemplaron la posibilidad de atender a estudios escritos en castellano, factor que sí incluyó el presente trabajo, aunque desgraciadamente la literatura no haya arrojado estudios suficientes con los criterios de inclusión establecidos.

Por su parte, el presente estudio localizó todos los estudios sin restricción ninguna sobre el año de publicación. Por el contrario, algunas revisiones sistemáticas consideran solamente los estudios publicados en los últimos veinte años, tal vez con el objetivo de homogeneizar la metodología de las investigaciones.

6.2 ESTUDIO 2: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO EN EL LUGAR DE TRABAJO SOBRE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD

6.2.1 Principales hallazgos sobre los objetivos

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del programa de ejercicio físico grupal implementado en el grupo experimental durante 12 semanas de duración en trabajadores de oficina de una empresa española sobre la salud mental y física y en las variables relacionadas con el rendimiento y la productividad en el trabajo.

El estudio que nos ocupa es una de las primeras aplicaciones de un estudio de carácter cuasiexperimental en una empresa española que arroja resultados recientes acerca del objeto de estudio de la PST en España. Los resultados han mostrado que un programa de ejercicio físico supervisado en el lugar de trabajo, de 12 semanas de duración, dentro del contexto de aplicación en el que se llevó a cabo, tuvo incidencia sobre la fuerza resistencia y la pérdida del porcentaje de grasa. Asimismo, el programa también fue beneficioso sobre la potencia del tren inferior y la salud física y mental percibida, si bien, los efectos se mostraron pequeños.

6.2.2 Descensos en los síntomas de la depresión y la ansiedad

Los sujetos del grupo control se mostraron con niveles significativamente superiores de depresión en el pre-test, si bien el instrumento empleado determinaba un estado sintomático de depresión por encima de 16 puntos. En ninguno de los dos grupos se obtuvieron niveles de depresión pre-test por encima de estas puntuaciones. Los niveles de depresión disminuyeron en el grupo que realizó ejercicio físico cerca de un 22%. Estos resultados parecen encontrarse relacionados con el descenso en el dolor percibido hallado en nuestro estudio, existen evidencias de que la actividad física puede mitigar los factores estresantes en el trabajo. Estos resultados coinciden con otras observaciones en la literatura (Sliter, Sinclair, Cheung, y McFadden, 2014). Por otro lado, se observaron descensos en las puntuaciones de los niveles de ansiedad estado en el grupo experimental y disminuyeron los niveles de ansiedad rasgo del grupo experimental, si bien los cambios de los valores no presentaron diferencias significativas entre los grupos experimental y control. Otros estudios que centraron el programa en el entrenamiento aeróbico mejoraron significativamente los niveles de ansiedad rasgo (Altchiler y Motta, 1994), reuniendo nuevas evidencias sobre la incidencia del entrenamiento aeróbico sobre la ansiedad. No obstante, tras concluir el programa, ambos grupos redujeron sus puntuaciones pre-test en la sintomatología de la depresión a través del instrumento CES-D y la ansiedad rasgo, pero no fue significativo en nuestro estudio.

Una de las causas que podría atribuirse al descenso de las medias podría encontrarse en el tipo de muestreo. En este sentido, el establecimiento de dos grupos al azar pre-post hubiera mejorado el control del estudio y favorecido una mayor homogeneidad de los grupos (Feeley et al., 2009). Este aspecto crucial no pudo ser posible debido al proceso de reclutamiento de los participantes. Sin embargo, en la literatura se encuentran resultados dispares, como los observados por Rongen et al. (2013), quienes en su trabajo de metaanálisis hallaron TE pequeños en los efectos de los ECA analizados. Otro elemento distintivo que puede explicar estos hallazgos reside en los criterios de inclusión y el escaso y dispar tamaño muestral entre los grupos.

De haberse producido un criterio de inclusión que cribara la participación a través de la justificación de niveles elevados de depresión, hubieran comprometido los plazos del proyecto, pues la investigación sufrió dificultades para acceder a una muestra razonable, que finalmente resultó ser una limitación del estudio. Las barreras asociadas a la participación hubiera sido interesante explorarlas para haber identificado una mayor participación de acuerdo con las indicaciones recogidas en Fertman (2015). La adecuada disposición de recursos resultó determinante. En esta dirección, existen investigaciones que señalan que dichas barreras pueden deberse a la concepción filosófica de determinadas personas a no conciliar los hábitos de vida con el trabajo (Goetzel y Ozminkowski, 2008). Otro aspecto relevante reside en que, ante la falta de recursos, no fue posible controlar de forma exhaustiva los hábitos de actividad física de los sujetos del grupo experimental, siendo esta una variable extraña que interfirió sobre los resultados obtenidos (Chu et al., 2014).

6.2.3 Implicaciones sobre el rendimiento y la productividad

6.2.3.1 Singularidades y condicionantes en la capacidad para el trabajo

De acuerdo con el instrumento ICP, los participantes de ambos grupos arrojaron unas puntuaciones generales altas antes de la intervención. Nuevamente la composición muestral basada en la no aleatorización de los sujetos fue determinante. Además, los sujetos se encontraron respaldados por una cultura corporativa fuerte antes del comienzo de la intervención. Por este motivo pueden localizarse resultados influidos todavía por este sesgo.

En nuestro estudio no se observaron efectos sobre la capacidad mental post-ejercicio entre los grupos experimental y control. Las ausencias en el último año fueron mayores en el grupo control que en el experimental tras el programa de intervención. Estos datos no parecen resaltar la incidencia del programa al no observarse efectos estadísticamente significativos. En general, los estudios arrojan un efecto pequeño de las intervenciones en esta variable, principalmente porque ya presentaban buenos indicadores globales de capacidad para el trabajo antes del tratamiento.

6.2.3.2 Los costes en la productividad basados en el presentismo y el absentismo

Nuestra investigación identificó un descenso de las cifras de presentismo y su valoración económica, si bien los cambios asociados en las medias del grupo experimental no fueron significativamente diferentes a los observados en el grupo control. El presentismo se conforma como una variable muy compleja. Esta investigación tuvo limitaciones a la hora de comprender bien las causas subyacentes del presentismo en el lugar de trabajo analizado y se estimó de acuerdo con el instrumento empleado (Bouwman et al., 2015), aunque ha sido señalado que es complejo seleccionar los mejores instrumentos, pues nuevamente la variabilidad asociada a las mediciones se encuentra presente en esta variable (Despiégl, Danchenko, François, Lensberg, y Drummond, 2012).

Si bien, aunque incipientes, los datos obtenidos en nuestro estudio pueden arrojar una visión explicativa de la empresa en la que se intervino. En este sentido, la literatura científica parece coincidir en que los programas de PST que buscan incidir sobre esta variable buscan desarrollar aspectos como el liderazgo, la promoción de la salud individual y una buena cultura (Cancelliere et al., 2011). Estos aspectos fueron identificados en la organización, si bien, dichas variables no fueron controladas durante el estudio. De igual modo, el presentismo parece estar motivado con ciertos factores de riesgo, no obstante, la operativización de esta variable dependiente y los elementos que podrían incidir sobre ella todavía no parecen claros en la literatura (Cancelliere et al., 2011).

No obstante, en el citado estudio de Altchiler y Motta (1994), no parecieron establecer correlación los resultados del entrenamiento aeróbico sobre la depresión con relación a otras variables psicosociales, como la capacidad para el trabajo o el absentismo. Estos resultados parecen sugerir vacíos de conocimiento en la carga de los programas y en las posibles relaciones entre las variables. El tratamiento de programas a través de variables homogéneas y controladas parece ser una solución (Altchiler y Motta, 1994). Por otro

lado, mayores niveles de estrés parecen estar relacionados con mayores costes en la productividad asociados al presentismo. Permanecer en el trabajo siguiendo unos hábitos de vida inadecuados, de igual modo, pueden aumentar los costes en la productividad, aunque los foros científicos continúan señalando que los instrumentos todavía no son suficientemente consistentes (Despiégl et al., 2012). Nuestro programa no obtuvo efectos sobre el absentismo. Otros estudios advierten la relación entre la actividad física y el absentismo si el participante realiza actividad física, pero no de forma sistemática en el lugar de trabajo, sino porque el sujeto ya es físicamente activo (Martínez-López y Saldarriaga-Franco, 2008). Si bien, los efectos todavía son pequeños de acuerdo con otros autores. (Wattles y Harris, 2003). Estos planteamientos pueden sugerir que los programas de actividad física en el lugar de trabajo han de venir motivados por lo que cada persona pueda realizar en función de sus motivaciones y aspiraciones. Esta idea se puede ver muy claramente, sobre todo, en aquellos casos en los que la filosofía de la persona no encaja con realizar actividad física en el propio centro de trabajo (Goetzel y Ozminkowski, 2008). Estos supuestos pueden guardar relación con la capacidad de conciliación que tenga esta persona y su ritmo de vida.

Por otro lado, nuestro programa de intervención no encontró diferencias significativas entre el grupo experimental y el control en un descenso en los costes en la productividad asociados al presentismo. Estos hallazgos confrontan con otras investigaciones recientes, donde alertan que la falta de ejercicio físico favorece un descenso del rendimiento en el trabajo y un aumento de los costes en la productividad. No obstante, los efectos todavía se muestran pequeños en programas de resistencia de hasta 12 meses de duración (Blangsted, Sogaard, Hansen, Hannerz, y Sjogaard, 2008). De igual modo, el presentismo se ha relacionado con las malas relaciones en el lugar de trabajo. Las malas relaciones en el lugar de trabajo se encuentran relacionada con la dimensión función social del instrumento SF-36. Sin embargo, los resultados de dicha dimensión no se encuentran en consonancia con la obtención de un descenso en los costes en la productividad basados en el presentismo. Este hallazgo confronta con otros autores, donde la creación de ambientes de trabajo participativos puede mejorar la productividad en el trabajo (Kuoppala, Lamminpää, y Husman, 2008; Tsutsumi, Nagami, Yoshikawa, Kogi, y Kawakami, 2009). No obstante, la heterogeneidad de los instrumentos no permiten clarificar los distintos escenarios para establecer evidencias consistentes (Mattke, Balakrishnan, Bergamo, y Newberry, 2007).

El programa de intervención, a pesar de no incidir de forma significativa, ha arrojado un cambio en los valores de las medias que debiera considerarse, a pesar de las limitaciones propias del estudio. Los hallazgos obtenidos, coinciden con las observaciones de otros autores acerca de la disparidad de los programas, que no permiten arrojar juicios confirmatorios sobre las características (intensidad, cargas, duración, etc.) que han de contener las intervenciones (Blangsted et al., 2008; Rivilis et al., 2006).

Los niveles de absentismo permanecieron iguales antes y después en el grupo experimental, frente a un aumento del absentismo del grupo control del pre al post-test, ocasionando en este segundo grupo un mayor aumento de los costes en la productividad asociados a las ausencias en el lugar de trabajo, aunque estos cambios en los valores del pre al post no resultaron estadísticamente significativos.

El programa no resultó efectivo para producir un descenso en los costes en la productividad basados en el absentismo, aunque las medias mejoraron. Los programas que mejores seguimientos han arrojado se han visto reflejados en la literatura con mayores duraciones de las intervenciones (Jorgensen et al., 2011; Nurminen et al., 2002; Pohjonen y Ranta, 2001; Proper et al., 2003; von Thiele Schwarz et al., 2008). De igual modo, estas intervenciones no incluían exclusivamente ejercicio físico, sino programas integrales o multicomponente (Kuoppala, Lamminpää, y Husman, 2008; Kuoppala, Lamminpää, Liira, et al., 2008).

6.2.4 La satisfacción laboral

Nuestro estudio no mejoró la satisfacción laboral en el grupo experimental con respecto al control en el cambio de valores de satisfacción laboral en ninguna de las dimensiones analizadas. La diferencia con respecto al grupo experimental fue muy similar en todas las variables consideradas. Estos resultados confrontan con estudios previos que sí obtuvieron efectos de los programas sobre la satisfacción laboral, aunque no siempre han establecido la actividad física como elemento vehicular de la intervención y los resultados no han sido concluyentes (Navidian et al., 2014; Ohta et al., 2007). Aunque existen evidencias sobre el entrenamiento de fuerza, a la hora de mermar los efectos de los programas en la satisfacción laboral en empresas europeas y con una duración de la intervención de 20 semanas con dos grupos al azar pre-post (Roessler et al., 2013). Estos resultados sugieren efectos adversos de la fuerza para una incidencia sobre esta variable.

De igual modo, se han encontrado asociaciones sobre una mejor calidad de vida y la satisfacción laboral en determinadas ocupaciones (Navidian et al., 2014). A pesar de ello, la calidad de vida asociada por una mejora de la condición física en general en nuestro estudio se manifestó insuficiente con relación a los efectos sobre las variables físicas y antropométricas.

Las cifras de participación contrastan con otras obtenidas en la literatura (Eriksen et al., 2002; Groeneveld et al., 2011). Partiendo de estos datos, parece lógico pensar que el grupo de participantes permaneció cohesionado gracias al respaldo voluntario de la organización y el procedimiento de reclutamiento de participantes. La incidencia de los directores o gerentes ya ha sido señalado para alcanzar grandes cotas de participación en los programas (Sloan y Gruman, 1988). Sin embargo, en nuestro estudio no se observaron tales influencias sobre la satisfacción laboral.

Una mayor participación de los empleados en el programa, asimismo, guarda una relación con niveles más bajos de ansiedad laboral que, a su vez, se encuentran relacionados con niveles altos de satisfacción laboral (Steinhardt, Dolbier, Gottlieb, y McCalister, 2003). En nuestra investigación se han encontrado menores niveles de ansiedad rasgo en el grupo experimental, pero, paradójicamente, se han observado mayores niveles de la ansiedad estado en el IDARE en el grupo experimental. Estos resultados, si bien no son los esperados, pueden respaldarse con otros casos aparecidos en la literatura que, al igual que en nuestro estudio, no encontraron impactos positivos del programa sobre la ansiedad. Estudiar los motivos que condujeron a la obtención de

mayores niveles de ansiedad, a pesar de la participación de los sujetos y la implicación de la propia empresa, hubiera sido interesante.

A su vez, desconocemos los motivos que les condujeron a los participantes a inscribirse en el programa. Probablemente, dada la duración de este, el programa resultó insuficiente para alcanzar efectos relevantes en la satisfacción laboral y sus variables correlacionadas. Sobre el programa de entrenamiento, en un estudio desarrollado con el fin de comparar los efectos del entrenamiento aeróbico frente al anaeróbico sobre la satisfacción laboral, no hallaron efectos tras ocho semanas (Altchiler y Motta, 1994). A pesar de que mayores duraciones de los programas están asociados a mejores efectos sobre la salud (Robroek et al., 2012; Tveito y Eriksen, 2009), la variabilidad de los efectos, el control de las variables extrañas y el tipo de trabajo no permiten arrojar juicios concluyentes, si bien, todo parece indicar que la carga del programa debe oscilar, al menos, en los seis meses; a su vez, el programa debería incorporar medidas rigurosas de control y seguimiento. Nuestro programa incluyó a un buen número de empleados, sin embargo, a pesar de la escasa mortandad experimental identificada durante el seguimiento del programa, no toda la empresa se inscribió. En este sentido, conviene señalar que los programas deberían implicar a toda su comunidad, a pesar de las reticencias que parecen existir en la mayoría de las empresas (Goetzel y Ozminkowski, 2008).

Dallat (2013) desarrolló un programa de actividad física de 12 semanas de intervención y 6 meses de seguimiento. Estas doce semanas de intervención arrojaron resultados razonables sobre el rendimiento laboral, establecido como un predictor de la satisfacción en el trabajo (Steinhardt et al., 2003). No obstante, el estudio de Dallat incorporó sensores de seguimiento de la actividad física, lo cual fue determinante para controlar debidamente el programa. Este aspecto fue una limitación de nuestro estudio y que muy probablemente haya incidido en la disparidad de los resultados, a menudo, a favor del grupo control acerca de la satisfacción laboral (Dallat, 2013).

Otros estudios no han encontrado evidencias con relación a la actividad aeróbica (Gronningæter, Hytten, Skauli, Christensen, y Ursin, 1992). En otro estudio reciente realizado en España, medían la satisfacción laboral de forma subjetiva. Sin embargo, se afirman influencias positivas de la actividad física sobre la satisfacción laboral basándose únicamente en la percepción de los participantes. De igual modo, parece lógico que los sujetos que realizaban actividad física moderada pueden arrojar mejores efectos. Esta idea ha sido reflejada en la literatura por otros autores (Gómez Chacón, Grimaldi Puyana, Bernal García, y Fernández Gavira, 2016). Si bien, estas ideas se han manifestado más claramente en otros estudios que tuvieron una mayor dotación de recursos y unas condiciones de experimentación basadas en la aleatorización de los sujetos.

Conviene señalar aquí que la medición a través de cuestionario puede resultar contraproducente si no se realiza un buen protocolo de seguimiento. Los cuestionarios, asimismo, sugieren al participante que responda en función de su estado de salud en función de un límite temporal. En este sentido, responder con arreglo al último mes puede ser interesante en intervenciones que contemplen una duración de entre 6 y 9 meses, aunque no siempre se muestran efectivas (Rongen et al., 2013).

No obstante, todo parece indicar que una buena organización del programa favorece la participación, y esta, a su vez, facilita la mejora de los factores psicosociales, entre los que se encuentra la satisfacción laboral. De igual modo, diversos estudios sustentan que un mayor trabajo aeróbico puede contribuir a un descenso del estrés y como consecuencia de este descenso del estrés, favorecer una mayor satisfacción laboral. Así pues, el trabajo aeróbico parece determinante en mayores cantidades. Una explicación de que nuestro estudio no haya obtenido efectos significativos puede ser la duración del programa y las cargas de resistencia aeróbica asociadas al mismo.

Por su parte, la capacidad para el trabajo de nuestro estudio no resultó significativa en el grupo experimental con respecto al control tras la intervención (Steinhardt et al., 2003). Asimismo, los costes en la productividad basados en el absentismo parecen justificar las relaciones de las pérdidas de satisfacción laboral. Los instrumentos no identificaron los motivos, si bien, nuestro estudio coincide con otros autores que señalan la importancia de seguir estudiando estas relaciones entre variables y la propia heterogeneidad de los programas (Conn et al., 2009). Estas observaciones han quedado evidentes en nuestro estudio y en el trabajo de metaanálisis previo, en tanto no se encontraron TE significativos y pocos efectos significativos del programa de intervención desarrollado.

6.2.5 Cambios en las variables físicas y en la composición corporal

El programa encontró diferencias significativas en la dinamometría manual, salto vertical, plancha y porcentaje de grasa.

6.2.5.1 Fuerza resistencia

Nuestros resultados muestran que una de las principales mejoras que experimentaron los sujetos del grupo experimental fue que los sujetos del grupo experimental presentaron mejores niveles de fuerza resistencia frente a los del grupo control, produciéndose en el grupo experimental un incremento de un 27% del rendimiento con respecto al pre-test y reduciendo significativamente los valores del grupo control, que se redujeron un 22,68% con respecto al pre-test. Este hecho puede explicar la realización de sesiones completas en las que se trabajaba todo el cuerpo, poniendo especial atención a cargas basadas en la fuerza-resistencia y la flexibilidad. Genaidy et al. también localizaron efectos de un programa combinado de ejercicio basado en la resistencia progresiva y flexibilidad de tronco sobre la resistencia muscular (124%) y un 11% la fuerza muscular (Genaidy, Davis, Delgado, Garcia, y Al-Herzalla, 1994), por lo que sugirieron emplear estos mecanismos de actuación para alcanzar mejores efectos. Los programas de resistencia y fuerza han sido sugeridos también para la reducción de los síntomas de dolor musculoesquelético en las regiones expuestas en la zonas cervical y lumbar en trabajadores de oficina (Holtermann et al., 2010).

Otros autores sugieren que las dinámicas de las organizaciones de oficina, acumulan mucho estrés (Tetrick y Winslow, 2015). Los beneficios de la actividad física favoreciendo estas capacidades físicas pueden ayudar a mitigar dichos síntomas (Beehr y Newman, 1978; Durán, 2010), lo cual sugiere un aumento de la motivación de los empleados para el desarrollo de estas variables físicas en el lugar de trabajo (Capdevila, Niñerola, y Pintanel, 2004). Estos aspectos motivacionales han sido señalados por otros

autores, cuando se trata de iniciar un programa de actividad física en el lugar de trabajo (Moreno-Collazos y Cruz-Bermúdez, 2015).

Ambrose y Goligtlhy (2015) justificaron la incidencia de la actividad física como tratamiento complementario al dolor crónico y señalan los efectos que esta puede producir sobre los síntomas de dolor crónico o la mejora de la calidad de vida en general, sugiriendo así un incremento motivacional para la práctica en las organizaciones.

6.2.5.2 Porcentaje de grasa

El porcentaje de grasa disminuyó de forma significativa en los sujetos del grupo experimental con respecto al control, si bien estas diferencias ya se encontraron en el pre-test. No obstante, el tamaño del efecto encontrado en el cambio de valores en el porcentaje de grasa fue ligeramente superior cuando se compararon los valores en el post test entre grupos ($\eta^2 = 0,08$). Pohjonen y Ranta (2001) identificaron en un estudio de seguimiento de cinco años una reducción del porcentaje de grasa del grupo experimental frente al control. Si bien, otros tratamientos en Europa que obtuvieron tamaños del efecto superiores al obtenido en nuestro estudio (Andersen et al., 2013; Christensen, Overgaard, Hansen, Sogaard, y Holtermann, 2013). Ello puede deberse a la homogeneidad de los datos basales de los participantes, quienes fueron aleatorizados en ambas intervenciones. Dicha cuestión no pudo ser abordada en nuestro estudio, si bien, parece ser una problemática común a la hora de abordar un trabajo de campo en organizaciones (Goetzel y Ozminkowski, 2008). Asimismo, los contenidos del programa y la adaptación al tipo de trabajo parecen influir. Los programas de 12 meses de duración con tres momentos de medición, basados en ejercicio físico aeróbico y al menos 4 días a la semana han arrojado tamaños del efecto superiores (Andersen et al., 2013; Christensen et al., 2012). No obstante, se han observado mejores efectos con intervenciones de 9 meses, 2 sesiones semanales y con un componente basado en la condición física aeróbica y entrenamiento muscular, acompañados de consejos generales, aunque estos estudios también aleatorizaron a los participantes (Pohjonen y Ranta, 2001).

Estos hallazgos coinciden con las contribuciones de Rejoonsaari et al. (2012) que desarrollaron un programa online basado en actividad física. A diferencia de nuestro programa, este estuvo monitorizado por acelerómetros, si bien, también contó con asesoramiento a distancia. De igual modo, otros autores contemplan efectos positivos de los programas de actividad física, cuando se combinan con aspectos nutricionales. Más recientemente, el estudio de Strijk et al. propusieron en 2012 un programa de ejercicio físico, más sesiones de yoga, más 3 visitas de un asesor de vitalidad personal, ejercicio aeróbico dirigido, ejercicio libre y provisión de fruta gratuita, sin embargo, la horquilla programática de las intervenciones contaron con periodos de seguimiento y tuvieron una duración de 12 y 6 meses respectivamente, obtuvieron efectos positivos, en el porcentaje de grasa del orden del 0,6% y el perímetro de la cintura, aunque estos efectos se mostraron moderados (Reijonsaari et al., 2012; Strijk et al., 2012; Strijk et al., 2013).

Por el contrario, en nuestro programa tampoco logramos incrementar el VO_2 máx. Esta variable resulta especialmente relevante para explicar los resultados al ser considerada

un excelente predictor de la salud (Hoppeler, 2018; Sabour et al., 2016; Strasser y Burtcher, 2018; van Beek, Kirkwood, y Bassingthwaite, 2016). En este sentido, el hecho de no haber observado efectos sobre esta variable podría establecer una posible explicación a la falta de efecto del programa. Asimismo, también es posible que los TE tan pequeños localizados en el metaanálisis previo se deban a que, a nivel general, no se encontraron TE significativos del VO_2 máx. En general, los sujetos informaron sobre una buena salud, en cambio, los niveles de condición física fueron pobres en ambos grupos desde el principio. Los sujetos del grupo control alcanzaron niveles de IMC elevados que inducían a un sobrepeso, si bien, el programa pareció incidir únicamente sobre el porcentaje de grasa y no sobre el VO_2 máx, a pesar de observarse efectos significativos sobre la capacidad aeróbica. Tal vez las diferencias entre los sujetos en cuanto a sus hábitos y su edad pudieron interferir. No todos sujetos pudieron someterse a las valoraciones de la condición física.

Pohjonen et al. (2001) obtuvieron observaron grandes efectos de la intervención sobre el VO_2 máx a través de un programa de 9 meses de duración. En este sentido, la asignación aleatoria de los grupos parece dirigir las propuestas que han arrojado los mejores efectos en Europa, y que los factores que limitan la obtención de mayores puntuaciones, son otras, como, por ejemplo, el control de la actividad física a través de acelerómetro. En el caso del estudio de Pohjonen, los contenidos del programa se mostraron muy similares al nuestro y consistió en dos sesiones semanales de ejercicio físico aeróbico y entrenamiento muscular, acompañado de un programa formativo a través de consejos generales (Pohjonen y Ranta, 2001). Parece lógico pensar, además, que el contenido del programa se ajustó hacia una mejora de los resultados en las variables físicas y antropométricas, si bien, en nuestro estudio, no fue suficiente para establecer diferencias significativas entre los grupos experimental y control en el cambio de los valores del pre al post.

6.2.6 Efectos sobre la salud física y mental percibida

En nuestro estudio se encontraron mejoras significativas sobre salud percibida a través del cuestionario SF-36, si bien, los efectos se mostraron moderados por debajo de $\eta^2 = 0,54$. Más concretamente, en la salud física y en las puntuaciones totales de salud física se observaron tamaños del efecto grandes de $\eta^2 = 0,54$ para la variable salud física y $\eta^2 = 0,39$ en el caso de las puntuaciones totales. Estos hallazgos son muy similares a los obtenidos por Tveito y Eriksen (2009), quienes realizaron un ECA basado en actividad física y estilo de vida consistentes en información sobre salud y gestión del estrés. A pesar de ello, dichos resultados sugieren una mayor consistencia, puesto que las puntuaciones totales de salud física mostraban diferencias significativas entre los grupos experimental y control en el pre-test, al igual que con las dimensiones rol emocional, dolor corporal.

Otro de los hallazgos relevantes de nuestra investigación se localizó en la incidencia del programa sobre las dimensiones función social, rol físico, vitalidad y salud general. Un motivo de los efectos del programa sobre estas variables puede deberse al buen nivel de participación y seguimiento. A este respecto, Robroek et al. (2012) en el programa mixto de actividad física y nutrición que implementaron, a pesar de contar con un tamaño muestral grande, lo cierto es que los efectos en la salud percibida mejoraron,

aunque no sobrepasaron un tamaño del efecto pequeño con unas tasas de abandono por encima del 40%. En vista de la literatura existente, estos indicadores parecen venir acompañados no solamente de la citada motivación, sino de una fuerte cultura organizativa basada en la participación y la cohesión de grupo. Estos hallazgos se encuentran en consonancia con otros estudios (Chu et al., 2014; Chu et al., 2000; Goetzel y Ozminkowski, 2008).

Nuestro programa tuvo una duración de tres meses, sin embargo, se encontraron buenas puntuaciones en la dimensión de salud social. Aquellos sujetos que concurrieron al programa de forma regular encontraron mejores efectos de la intervención. Acree et al. (2006) compararon los beneficios en la calidad de vida que proporciona la práctica de actividad física regular, observando que la calidad de vida fue superior en sujetos de práctica regular.

El programa también resultó efectivo para la dimensión salud mental y en las puntuaciones totales de la salud mental percibida. Dicha evidencia ha estado fuertemente relacionada con la literatura reciente. Bize y Plotnikoff (2009) hallaron la relación entre un mayor gasto energético y un mejor estado de salud. Esta asociación puede dar pistas sobre el contenido de los programas, donde los mayores efectos se han encontrado asociadas con los programas de resistencia de al menos 9 meses de duración, donde se implican a las comunidades y existe una integración de los programas dentro de las líneas estratégicas globales de las organizaciones (Goetzel, 2005; Goetzel y Ozminkowski, 2008).

6.2.7 Análisis comparativo de los hallazgos con las evidencias localizadas en Europa

La Figura 44 muestra un resumen de la evidencia localizada en Europa en torno a los efectos de los programas de actividad física y salud sobre las empresas. En el mapa se localizan estrellas para aquellos países que han arrojado un mayor número de estudios, además de reunir una evidencia científica más consistente. Asimismo, la leyenda muestra flechas que indican ligeras y escasas evidencias.

Nota. Fuente: Elaboración propia (2019).

Figura 44. Análisis comparativo de las evidencias localizadas en Europa

En Europa se han localizado múltiples intervenciones, de muy diversa índole, si bien con efectos que sugieren una buena dirección de las intervenciones (Brox y Frøystein, 2005; Pohjonen y Ranta, 2001; Puig-Ribera et al., 2008; Reijonsaari et al., 2012; Reijonsaari, Vehtari, van Mechelen, Aro, y Taimela, 2009). Los países nórdicos son hoy quienes reúnen gran parte de la evidencia científica existente en Europa. En otros países como España, Italia o Portugal, todavía se han de seguir realizando intervenciones con el fin de aumentar evidencias. Las investigaciones científicas de calidad en el campo son escasas. Los programas han de adaptarse a las distintas realidades y contextos empresariales. Existen evidencias que han sostenido que los factores ambientales en el trabajo propician una mejor consecución de los programas, aun teniendo estos una duración más breve en el tiempo (Pohjonen y Ranta, 2001). Habitualmente los programas con mayores adherencias mostraron una mejor consecución de los objetivos. De igual modo, los programas multicomponente resultaron ser más eficaces, sobre todo para mejorar la salud percibida y la capacidad para el trabajo. De igual modo, se han mostrado insuficientes los programas de una sesión semanal y más efectivos los que realizaban dos, junto con sesiones de asesoramiento (Nurminen et al., 2002). La aleatorización de los sujetos es primordial para un mayor rigor científico. Los estudios

sugieren la necesidad de convencer a los cuerpos directivos de las organizaciones para impulsar estos programas. Las causas o motivos de su implementación dependen del tipo de empresa (Goetzel y Ozminkowski, 2008).

En todo caso, las percepciones subjetivas se mostraron en Europa muy satisfactorias y sugieren una buena consecución de los programas, sobre todo en quejas de salud subjetivas, bajas por enfermedad o estrés laboral. A este respecto, los programas multicomponente centrados en el objetivo pueden resultar mejores (Eriksen et al., 2002). El control de la actividad física a través de acelerómetro y el uso de las tecnologías puede establecer un papel importante (Strijk et al., 2012; Strijk et al., 2013).

Son necesarios más diseños aleatorizados basados teóricamente que garanticen una calidad metodológica (Conn et al., 2009; Rongen et al., 2013), a pesar de las citadas dificultades para realizarlos (Kerr y Vos, 1993). De igual modo, sería interesante buscar asociaciones en los instrumentos para establecer indicadores de confiabilidad representativos de las empresas y los contextos.

A tenor de nuestros resultados, lo cierto es que en Europa no caben los programas de actividad física en los lugares de trabajo de oficina con duraciones inferiores a las 12 semanas y que no estén aleatorizadas. Recientemente se han observado efectos de los programas de ejercicio aeróbico sobre la capacidad para el trabajo, la necesidad de recuperación, la productividad y la calificación del esfuerzo, si bien, los resultados sugieren que, los programas que tengan una duración inferior a cuatro meses, no parecen arrojar efecto (Lidegaard, Sogaard, Krstrup, Holtermann, y Korshøj, 2018). Es importante que los sujetos sean aleatorizados. A pesar de las dificultades, todo parece indicar que se ha de conducir las intervenciones hacia un camino basado en la promoción y en la construcción de programas que operativicen las variables dependientes de forma homogénea.

El programa llevado a cabo no fue suficiente para encontrar beneficios y atribuir los beneficios al control de variables propias de la intervención, no obstante, ofrece algunas pistas sobre las intervenciones en una empresa española, dentro del contexto que le es propio. En primer lugar, en vista de buscar un mayor control de las variables extrañas a través de ensayos clínicos aleatorizados; en segundo lugar, implicando a toda la comunidad de la empresa. Por último, manejando indicadores globales de salud como el VO₂ máx como predictores de la salud en las organizaciones, así como el absentismo o la capacidad para el trabajo en las organizaciones.

6.3 ESTUDIO 3: METAANÁLISIS SOBRE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO A LA PROSTATITIS CRÓNICA

6.3.1 La influencia de la actividad física sobre la prostatitis crónica: evidencias sobre la incontinencia urinaria

El tercer estudio tuvo por objetivo examinar la influencia de la actividad física como tratamiento complementario a CP/CPPS. Los resultados obtenidos muestran todavía pocos estudios que han abordado los efectos de la actividad física sobre la CP/CPPS. Al igual que en nuestra revisión anterior, a pesar de que los autores informan de un efecto

significativo del programa, la estimación del tamaño del efecto en muchos casos incluye el 0, lo que indica que pudiera ser despreciable para otras variables observadas.

En nuestro metaanálisis tan solo encontramos efectos significativos sobre la incontinencia urinaria. Sobre esta variable igualmente se observaron resultados muy heterogéneos. Así, se observó un TE grande sobre esta variable en el estudio de Serdá et al. (2011). En el citado estudio, los autores implementaron un programa de 24 semanas de duración, experimentando mejoras de la capacidad de la fuerza-resistencia. Pese a que el empleo vehicular de la fuerza-resistencia en las extremidades inferiores puede mejorar los síntomas de la incontinencia urinaria, sin embargo, el tipo de intervención realizada parece explicar la heterogeneidad en los resultados.

La evidencia sobre los efectos de la actividad física sobre la sintomatología asociada a CP/CPPS todavía es muy incipiente. Se ha visto que el trabajo sedentario no beneficia los síntomas de CP/CPPS. A su vez, sobre los descensos generales del riesgo de discapacidad para el trabajo, se han localizado en la literatura los programas multicomponentes como los más efectivos (Pelletier, 1993, 1999, 2001; Pelletier, 2005). Sin embargo, todavía se hacen necesarias investigaciones controladas que permitan obtener TE grandes.

6.3.2 Heterogeneidad de los estudios incluidos en la revisión

El segundo objetivo del estudio pretendió analizar si la heterogeneidad de los resultados encontrados en los estudios experimentales que empleen la actividad física como tratamiento coadyuvante a CP/CPPS nos permite arrojar evidencia científica suficiente para la valoración de su eficacia y el posterior diseño de intervenciones en el lugar de trabajo.

Según los datos obtenidos tras el análisis de los resultados en nuestra revisión, podemos encuadrar dos tipos de estudios, aquellos que efectuaron estudios observacionales para comprobar si existía relación entre los síntomas asociados con CP/CPPS y el ejercicio o la actividad física (Awad et al., 2018; Bartoletti et al., 2009; Hallmarker et al., 2015; R. Zhang et al., 2015; Ran Zhang, Siobhan Sutcliffe, et al., 2015; Z. Zhang et al., 2015) y aquellos que realizaron algún programa específico de actividad física para comprobar la relación del mismo con posibles síntomas asociados con CP/CPPS.

En el estudio realizado entre 2002-2004 a 231 hombres, con edades comprendidas entre 20 y 50 años con síntomas positivos de CP/CPPS, les fue indicado ejercicio físico moderadamente intenso (Giubilei et al., 2007). Fueron aleatorizados dos grupos compuestos por 52 integrantes en un grupo de ejercicio aeróbico y 51 integrantes en otro grupo operativizado con placebo/estiramientos y ejercicios de movilidad. El papel de la actividad física sobre los síntomas de la CP/CPPS fue analizado por medio de un estudio prospectivo, aleatorizados a doble ciego, en el cual se pudo observar que la cohorte de pacientes que realizaban un ejercicio aeróbico mejoraba significativamente en la puntuación total del cuestionario NIH-CPSI y su calidad de vida respecto al grupo placebo a las 18 semanas. Estos datos fueron obtenidos a pesar de que inicialmente casi la mitad de los pacientes sometidos a ejercicio aeróbico presentaron una exacerbación

del dolor. El estudio concluyó que el ejercicio aeróbico representa una opción válida de tratamiento para la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico.

Serdá et al. (2011) llevaron a cabo dos estudios, ambos se engloban dentro de unos estudios cuasiexperimentales de 33 participantes en fase de tratamiento del cáncer de próstata. Las variables estudiadas fueron; variables antropométricas, fuerza-resistencia, tensión arterial, fatiga, incontinencia, dolor y calidad de vida. Dichas variables se estudiaron durante 24 semanas, observándose una mejora significativa de la capacidad de la fuerza-resistencia, más evidente en las extremidades inferiores, así como una mejora en la tensión arterial, la incontinencia urinaria y el dolor.

Por el contrario, en el estudio observacional analítico de cohorte desarrollado por Wu et al. (2013) para evaluar los síntomas genitourinarios en sujetos que practican ciclismo comparados con otros deportes o con gente sedentaria (Grupo Control), fueron evaluados 425 hombres de 38,21 años de media los cuales fueron divididos en 3 grupos: 245 ciclistas, 105 otros deportes, 75 sedentarios. No existen diferencias significativas entre deportistas y el grupo control. En la escala EVA hubo diferencias significativas dando puntuaciones más altas en ciclistas en las zonas perianal y suprapúbica. No hubo diferencias entre grupos en síntomas urinarios o en antígeno específico prostático. En vista de los estudios analizados, además de existir escasas referencias que sustenten los estudios nos permiten corroborar la hipótesis de investigación acerca de que la variabilidad asociada a los diseños experimentales representa una heterogeneidad en los efectos de los distintos programas o intervenciones de actividad física para el tratamiento de la prostatitis crónica o dolor pélvico y dependerán del tipo de intervención realizada.

La intervención que ha arrojado los mejores efectos se localizó en la de Serdá et al. (2011) sobre la incontinencia urinaria planteó un programa de fuerza-resistencia programado en progresión. En este sentido, la mejora de la capacidad física de las personas puede mejorar la calidad de vida de estos enfermos. En esta dirección, una mala salud mental o la obesidad se encuentran asociados con CP/CPPS (Latthe, Mignini, Gray, Hills, y Khan, 2006). Asimismo, la presencia de estos síntomas asociados en el lugar de trabajo y en puestos de trabajo de oficina, parecen desprender la idea de desarrollar nuevas investigaciones que procuren intervenir en contextos en los que los pacientes posean síntomas relativos a la CP/CPPS, como es el caso del lugar de trabajo.

En otros estudios se han encontrado asociaciones entre la baja salud mental y unos mayores trastornos musculoesqueléticos (Patten, Williams, y Wang, 2006). De igual modo, en los estudios específicos que promovían la actividad física en el lugar de trabajo se lograron mejoras en la aptitud aeróbica y en la ausencia media de enfermedad (aumentó de 6,8 a 15,6 días en el grupo de ejercicio y de 10.4 a 14.5 en el grupo de control). Si bien las cargas han de ser superiores a dos días semanales (Brox y Frøystein, 2005).

Sobre el particular, nuevamente la variabilidad localizada en la literatura sugiere realizar nuevos análisis específicos sobre el tipo de trabajo, la localización geográfica y los contextos culturales y ambientales. En nuestro estudio 2, los pacientes no informaron sobre enfermedades propias y, por ende, se encontraron buenos indicadores de salud

mental percibida. Otras investigaciones han arrojado estos hallazgos en Europa empleando ejercicio físico aeróbico, entrenamiento de fuerza progresivo y moderado, además de estiramientos con arreglo a unas pautas supervisadas (Kerr y Vos, 1993; Tveito y Eriksen, 2009).

Estas relaciones advierten de una posible relación entre ambos componentes de la salud hacia la realización intervenciones exitosas en el lugar de trabajo a partir de enfermedades o síntomas específicos. Existen evidencias que cada vez más relacionan los síntomas con el dolor pélvico (Vela Navarrete, González Enguita, García Cardoso, Manzarbeitia, y Soriano García, 2007). Diversas investigaciones han hallado efectos positivos de los programas de actividad física sobre los trastornos musculoesqueléticos (Proper et al., 2003) aunque la literatura científica se muestra todavía muy reducida cuando se trata de conocer los efectos específicos de la prostatitis crónica. Han sido muy pocos los estudios localizados y ninguno de ellos se dirigió explícitamente al lugar de trabajo. Ante la escasez de estudios y el poco efecto de la actividad física sobre CP/CPPS, no es posible arrojar evidencia científica suficiente para la valoración de su eficacia y el posterior diseño de intervenciones en el lugar de trabajo. En este estudio se ha realizado un primer paso, sin embargo, nuevas investigaciones son necesarias para encontrar mayores evidencias.

CONCLUSIONES

7 CONCLUSIONES

7.1 CONCLUSIONES SOBRE EL PRIMER OBJETIVO

A.1

- La heterogeneidad de los estudios no permitió arrojar evidencia científica suficiente para una valoración objetiva de los programas y el posterior diseño de intervenciones. Los distintos programas mostraron dificultades generalizadas para encontrar efectos grandes. Asimismo, los estudios mostraron efectos significativos de los programas de actividad física y salud sobre la capacidad para el trabajo, la adherencia a la actividad física medida a través del cuestionario SQUASH, la presión sistólica, el perímetro de la cintura y la salud percibida de los participantes, aunque los TE fueron pequeños.
- No se observaron efectos significativos sobre las variables VO_2 máx, peso corporal, presión diastólica y absentismo laboral.
- Los TE globales observados en las variables perímetro de la cintura, presión arterial diastólica mostraron efectos significativos, sin embargo, el IC incluía el 0, lo cual se encontró relacionado con el hecho de que los efectos observados fueran pequeños en esas variables. Si bien, considerando el tamaño del efecto global teniendo en cuenta todas las investigaciones señaladas, no fue significativo en la mayoría de ellas.

A.2

- El tipo de intervención realizada podría explicar la heterogeneidad de los resultados.
- La variabilidad de la operativización de las variables dependientes hace difícil obtener una valoración objetiva de los efectos de las intervenciones con el fin de diseñar programas exitosos en el futuro.
- Aún existen pocos estudios y muy dispares entre sí con los que reunir suficiente evidencia científica sobre la efectividad de los programas, constituyendo la variabilidad la operativización de las variables dependientes una dificultad añadida a la hora de hacer una valoración objetiva.

7.2 CONCLUSIONES SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO

B.1

- Los resultados han mostrado que un programa de ejercicio físico aeróbico y de fuerza realizado de forma grupal y supervisado en el lugar de trabajo, de 12 semanas de duración tuvo incidencia sobre la fuerza resistencia y la pérdida del porcentaje de grasa en los sujetos de una empresa española cuyas ocupaciones

se basaron en tareas sedentarias. Asimismo, el programa también incidió sobre la potencia del tren inferior y la salud física y mental percibida de los sujetos, si bien, los efectos se mostraron pequeños.

- El programa no produjo efectos sobre los síntomas de depresión, ansiedad, capacidad mental en el trabajo, absentismo, presentismo, costes en la productividad y satisfacción laboral.

7.3 CONCLUSIONES SOBRE EL TERCER OBJETIVO

C.1

- La existencia de pocos estudios que hayan abordado los efectos de la actividad física sobre la CP/CPPS proporciona una escasa evidencia sobre los efectos de la actividad física sobre la sintomatología asociada a CP/CPPS.
- A pesar de que los autores informan de un efecto significativo del programa, la estimación del tamaño del efecto en muchos casos incluye el 0, lo que indica que pudiera ser despreciable para otras variables observadas.
- El metaanálisis halló efectos significativos sobre la incontinencia urinaria y no encontró efectos sobre el IMC y la calidad de vida.

C.2

- La heterogeneidad de los resultados no permite arrojar evidencia científica suficiente para la valoración de su eficacia y el posterior diseño de intervenciones.
- La variabilidad asociada a los diseños experimentales incluidos en el metaanálisis representa una heterogeneidad en los efectos de los distintos programas o intervenciones de actividad física para el tratamiento de CP/CPPS. Dicha variabilidad podría explicar el hallazgo de tamaños del efecto pequeños para las distintas variables dependientes analizadas en nuestro estudio.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

8 LIMITACIONES DE LOS ESTUDIOS

8.1 LIMITACIONES SOBRE EL PRIMER OBJETIVO

- Aunque intentó localizar estudios e intervenciones no publicadas, el primero de los estudios de la presente tesis doctoral tuvo que recoger solamente estudios publicados y, en la mayoría de los casos, de libre acceso. En este sentido, hubiera sido interesante calcular el índice de tolerancia para estimar el riesgo al no incluir estudios no publicados.
- El metaanálisis estuvo sujeto al número de estudios que ofrecían datos suficientes para calcular el TE, así como la enorme heterogeneidad entre los estudios, donde fue muy variado el tipo de programa, la empresa a la que se dirigía y la operativización de las variables dependientes de los mismos, sobre todo en aquellas variables que fueron medidas subjetivamente.
- Atendiendo al número de sujetos perdidos en los distintos estudios analizados, es posible que estos resultados también tengan que ver con la denominada mortandad experimental, constituyéndose como una amenaza a la validez interna de los estudios. Se pierden muchos sujetos durante el seguimiento y dado que no queda claro de qué grupos se pierden dichos participantes, se hace difícil saber si la muestra restante es una pérdida de la muestra aleatoria de los que comenzaron, respecto a los que no comenzaron. En el grupo experimental suelen permanecer los mejores, de ahí también pueden derivarse los efectos de las intervenciones.
- Este estudio ha evaluado el tamaño del efecto global de diferentes intervenciones independientemente del tipo de variable empleada, elemento que ayuda a la estimación de la influencia de las intervenciones sobre las variables, pero que contribuye a la variabilidad de estas. Además, al presentar todavía un análisis sobre muy pocos estudios científicos, es posible que se existan circunstancias que no faciliten la comprensión de los resultados.

8.2 LIMITACIONES SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO

- Hubiera sido interesante haber realizado un estudio aleatorizado con dos grupos al azar pre-post con un tamaño muestral más grande y homogéneo con relación a los datos basales para evitar la variabilidad asociada al programa de ejercicio.
- Durante el programa de ejercicio no se emplearon mecanismos de control de cargas a través de medios tecnológicos, como acelerómetros o GPS, que hubieran propiciado una información muy valiosa para determinar las cargas de trabajo en las sesiones aeróbicas con diseño de trabajo grupal.
- La población estudiada en la empresa objeto del segundo estudio presentado en la tesis doctoral no manifestó síntomas sobre la CP/CPPS. Su buen estado de salud general y las diferencias entre grupos, asociados a una reducción del

estrés, pueden estar relacionados con la no identificación de la presencia de estos síntomas. Los sujetos físicamente más activos pudieron argumentar dicha relación, aunque no pudo comprobarse estadísticamente.

- Hubiera resultado de interés realizar comparativas en función de las variables descriptivas de los sujetos, especialmente en función del género, situación laboral y ocupación. Todos estos resultados, a su vez, podrían haberse complementado con estudios de valoración económica que pudieran arrojar información valiosa a las empresas a la hora de hacer operativa la viabilidad de los programas de PST.

8.3 LIMITACIONES SOBRE EL TERCER OBJETIVO

- Los estudios no publicados no fueron incluidos y la escasa literatura existente, en sí misma, supuso una limitación a la hora de arrojar una evidencia más concluyente. Hubiera sido interesante calcular el índice de tolerancia.
- El metaanálisis estuvo sujeto al número de estudios que ofrecían datos suficientes para la obtención del TE.
- Se tuvieron en cuenta artículos que incluyeron sintomatología asociada a la próstata, si bien, a pesar su complejidad etiológica, hubiera sido interesante incluir una revisión sistemática exhaustiva por tipo de práctica de actividad física y género.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

9 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- Existen indicios de la eficacia de los programas de intervención en las empresas europeas sobre variables como el absentismo laboral y los parámetros de salud. Sin embargo, sería necesario seguir realizando intervenciones con rigor científico al respecto. Se han encontrado numerosas publicaciones que desgraciadamente no han cumplido los criterios de inclusión, por lo que establecer rigor científico en las intervenciones puede ser clave para comprobar la verdadera eficacia de las intervenciones.
- En este sentido, dada la disparidad de variables y su concepción aislada, sería interesante realizar intervenciones que trabajen con indicadores globales de salud, para evitar el problema de la variabilidad. Por último, entender las características de los estudios y la población analizada, puede arrojar resultados más concluyentes sobre la eficacia de las intervenciones.
- Asimismo, examinar los tamaños del efecto más grandes junto con el entorno laboral, parámetros de salud y la calidad metodológica de los estudios, puede contribuir hacia la homogeneidad de los estudios y a aclarar aún más una situación, que, hoy, sigue en busca de las variables que realmente puedan provocar el éxito en las intervenciones con empresas reales en el futuro.
- Se hace necesario realizar en el contexto europeo ECA de calidad con dos grupos al azar pre-post estableciendo una homogeneidad de variables dependientes en función del tipo de trabajo y área geográfica. Asimismo, el programa de ejercicio sería deseable que fuera adaptado al tipo de trabajo con la finalidad de reunir una mayor base científica para el posterior diseño de programas específicos que permitan un desarrollo apropiado de la condición física y las variables predictoras de salud en las organizaciones.
- Puede ser interesante, sobre todo en situaciones donde existen carencias de recursos materiales o económicos para llevar a cabo las intervenciones, desarrollar nuevos contrastes de hipótesis y establecer caminos para hallar correlaciones que determinen los efectos de las intervenciones entre las distintas variables descriptivas con el fin de obtener posibles efectos y relaciones entre ellas, en función del contexto organizacional, tamaño de la empresa y tipo de trabajo.
- De igual modo, sería conveniente explorar los motivos por los cuales la evidencia empírica, a pesar del aparente interés que manifiestan las organizaciones europeas y españolas en los programas de PST, el número de investigaciones rigurosas sigue siendo reducido en empresas sitas en Europa o España. En este sentido, realizar investigaciones basadas en revisiones críticas, estudios seccionales a través de encuesta, *focus group* o de corte cualitativo pueden ser de utilidad para procurar inducir la realidad localizable en los nuevos escenarios vinculados a la empresa saludable que presenta el trabajo como concepto amplio y en las percepciones de las organizaciones, muy especialmente la de los

directores de recursos humanos, los responsables de la PST en las organizaciones y las posibles demandas de práctica de actividad física en el lugar de trabajo (ausentes, latentes o establecidas) de los propios empleados.

- Hallar los mecanismos de respuesta y tratamiento siguiendo un diseño metodológico homogéneo puede ser de gran utilidad para la realización de intervenciones terapéuticas más eficaces en el futuro en el caso de la CP/CPPS y su prevalencia en las organizaciones.
- Sería interesante hacer una revisión exhaustiva y sistemática de las teorías y los modelos de planificación de PST recogidos en la literatura y analizar los posibles efectos de su implementación en entornos laborales determinados. De igual modo, recoger en un experimento (basado en las técnicas de antes-después) la revisión, el diseño y la aplicación de un modelo de planificación basado en las teorías de PST más apropiadas al contexto con el fin de conformar un modelo integral de referencia ajustado al tipo de trabajo, las enfermedades prevalentes e incidentes y los contextos sociales, culturales y organizacionales de las empresas y las zonas geográficas de las que forman parte, podría establecer un marco de trabajo conjunto y homogéneo en la comunidad científica y en las empresas sobre el que cimentar las intervenciones de PST en el futuro.
- En vista de los trabajos de campo, consideramos de capital importancia validar los instrumentos de medición sobre las poblaciones diana para medir las variables dependientes de forma válida, objetiva y fiable. Asimismo, adaptarlos al contexto y a las personas objeto de muestra según el tipo de trabajo y organización podría procurar mejores y más exhaustivas observaciones de las relaciones entre las variables y los distintos contextos de las empresas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abraham, C., y Graham-Rowe, E. (2009). Are worksite interventions effective in increasing physical activity? A systematic review and meta-analysis. *Health Psychology Review*, 3(1), 108-144. doi:10.1080/17437190903151096
- Ackermann, R. T., Williams, B., Nguyen, H. Q., Berke, E. M., Maciejewski, M. L., y LoGerfo, J. P. (2008). Healthcare Cost Differences with Participation in a Community-Based Group Physical Activity Benefit for Medicare Managed Care Health Plan Members. *Journal of the American Geriatrics Society*, 56(8), 1459-1465.
- Acree, L. S., Longfors, J., Fjeldstad, A. S., Fjeldstad, C., Schank, B., Nickel, K. J., . . . Gardner, A. W. (2006). Physical activity is related to quality of life in older adults. *Health and Quality of Life Outcomes*, 4(1), 37. doi:10.1186/1477-7525-4-37
- ACSM. (2013). *ACSM's guidelines for exercise testing and prescription*. United States: Lippincott Williams & Wilkins.
- Aguirre, A., Tous, D., y Castillo, A. (1999). *Administración de organizaciones: fundamentos y aplicaciones*. Madrid: Pirámide.
- Aguirre Zubiaurre, Z., y Martínez Díaz, M. (2006). Influencia de la situación laboral en el ajuste familia-trabajo. *MAPFRE Medicina*, 17(1), 14-24.
- Ahlstrom, L., Grimby-Ekman, A., Hagberg, M., y Dellve, L. (2010). The work ability index and single-item question: associations with sick leave, symptoms, and health – a prospective study of women on long-term sick leave. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 36(5), 404-412.
- Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Whitt, M. C., Irwin, M. L., Swartz, A. M., Strath, S. J., . . . Leon, A. S. (2000). Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET intensities. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 32(9), S498-S516. doi:10.1097/00005768-200009001-00009
- Albornoz, S. (1998). *O que é trabalho*. São Paulo: Brasiliense.
- Alcón, S., Fornasari, A., Gómez, N., y Nardi, A. (1993). El concepto de calidad total aplicado a un centro de información. *Proceedings del Cuarto Encuentro para la Integración de Bibliotecas y Centros de Documentación de las Fuerzas Armadas*. Buenos Aires, Argentina.
- Aldag, R. J., y Brief, A. P. (1978). Examination of alternative models of job satisfaction. *Human relations*, 31(1), 91-98.
- Aldana, S. G. (2001). Financial impact of health promotion programs: a comprehensive review of the literature. *American Journal of Health Promotion*, 15(5), 296-320.
- Alonso, J. (2000). La medida de la calidad de vida relacionada con la salud en la investigación y la práctica clínica. *Gaceta Sanitaria*, 14(2), 163-167.
- Alonso, J., Prieto, L., y Antó, J. (1995). La versión española del SF-36 Health Survey (Cuestionario de Salud SF-36): un instrumento para la medida de los resultados clínicos. *Medicina Clínica*, 104(20), 771-776.

- Altchiler, L., y Motta, R. (1994). Effects of aerobic and nonaerobic exercise on anxiety, absenteeism, and job satisfaction. *Journal of Clinical Psychology*, 50(6), 829-840. doi:10.1002/1097-4679(199411)50:6<829::AID-JCLP2270500603>3.0.CO;2-I
- Ambrose, K. R., y Golightly, Y. M. (2015). Physical exercise as non-pharmacological treatment of chronic pain: Why and when. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*, 29(1), 120-130. doi:10.1016/j.berh.2015.04.022
- Andersen, L. L., Sundstrup, E., Boysen, M., Jakobsen, M. D., Mortensen, O. S., y Persson, R. (2013). Cardiovascular Health Effects of Internet-Based Encouragements to Do Daily Workplace Stair-Walks: Randomized Controlled Trial. *Journal of Medical Internet Research*, 15(6).
- Anderson, L. M., Quinn, T. A., Glanz, K., Ramirez, G., Kahwati, L. C., Johnson, D. B., . . . Kalra, G. P. (2009). The effectiveness of worksite nutrition and physical activity interventions for controlling employee overweight and obesity: a systematic review. *American Journal of Preventive Medicine*, 37(4), 340-357. doi:10.1016/j.amepre.2009.07.003.
- Anderson, P. (1979). *Consideraciones sobre el marxismo occidental*. Madrid: Siglo XXI.
- Anderson, R. U. (2004). The prostatitis manual: a practical guide to management of prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Urology*, 63(1), 213-213.
- Andersson Schaeffer, J. (2014). *Spaces for innovation*. Mälardalen University, Västerås.
- Anthony, P. D. (2014). *The ideology of work*. Londres: Routledge.
- Antunes, R. (1999). Las metamorfosis y la centralidad del trabajo, hoy. *El trabajo del futuro*, 41-58.
- Anzalone, A. (2015). Elementos para una perspectiva filosófica del trabajo. *Lex Social: Revista de Derechos Sociales*, 5(2), 133-152.
- Applebaum, H. (1992). *The concept of work: Ancient, medieval, and modern*. Albany: SUNY Press.
- Arendt, H. (2012). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.
- Arendt, H., Cruz, M., y Novales, R. G. (1993). *La condición humana* (Vol. 3). Barcelona: Paidós.
- Asplund, C., Barkdull, T., y Weiss, B. D. (2008). Genitourinary problems in bicyclists. *Current Sports Medicine Reports*, 6(5), 333. doi:10.1007/s11932-007-0072-1
- Atlantis, E., Chow, C.-M., Kirby, A., y Fiatarone Singh, M. A. (2006). Worksite intervention effects on physical health: a randomized controlled trial. *Health Promotion International*, 21(3), 191-200. doi:10.1093/heapro/dal012
- Awad, M. A., Gaither, T. W., Murphy, G. P., Chumnarnsongkhroh, T., Metzler, I., Sanford, T., . . . Breyer, B. N. (2018). Cycling, and Male Sexual and Urinary Function: Results from a Large, Multinational, Cross-Sectional Study. *The Journal of Urology*, 199(3), 798-804. doi:10.1016/j.juro.2017.10.017
- Ayala, F., de Baranda, P. S., de Ste Croix, M., y Santonja, F. (2012). Fiabilidad y validez de las pruebas sit-and-reach: revisión sistemática. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*, 5(2), 57-66.

- Ayuso-Mateos, J. L., Vázquez-Barquero, J. L., Dowrick, C., Lehtinen, V., Dalgard, O. S., Casey, P., . . . Dunn, G. (2001). Depressive disorders in Europe: prevalence figures from the ODIN study. *The British Journal of Psychiatry*, 179(4), 308-316.
- Baker, P. K. (1998). Musculoskeletal problems. En *Chronic Pelvic Pain* (pp. 215-240). Philadelphia: WB Saunders.
- Barley, S. R. (1996). Technicians in the Workplace: Ethnographic Evidence for Bringing Work into Organizational Studies. *Administrative Science Quarterly*, 41(3), 404-441. doi:10.2307/2393937
- Bartoletti, R., Cai, T., Mondaini, N., Giubilei, G., Gavazzi, A., Mazzoli, S., y Gontero, P. (2009). Cycling and genitourinary symptoms: results from an observational analytical cohort study. *Journal of Andrological Sciences*, 16, 98-103.
- Battaglia, F. (1950). Existencialismo y marxismo. *Revista de Estudios Políticos*(53), 13-28.
- Battaglia, F. (1951). *Filosofía del trabajo*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955.
- Bauer, U. E., Briss, P. A., Goodman, R. A., y Bowman, B. A. (2014). Prevention of chronic disease in the 21st century: elimination of the leading preventable causes of premature death and disability in the USA. *The Lancet*, 384(9937), 45-52.
- Baun, W. B. (1995a). The Impact of Worksite Health Promotion Programs on Absenteeism. En R. L. Kaman (Ed.), *Worksite health promotion economics: Consensus and analysis* (pp. 10-11): Human Kinetics Publishers.
- Baun, W. B. (1995b). The Impact of Worksite Health Promotion Programs on Absenteeism. En R. L. Kaman (Ed.), *Worksite health promotion economics: Consensus and analysis* (pp. 132-133): Human Kinetics Publishers.
- Baun, W. B., Bernacki, E. J., y Tsai, S. P. (1986). A preliminary investigation: effect of a corporate fitness program on absenteeism and health care cost. *Journal of Occupational Medicine*, 28(1), 18-22.
- Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., y Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *Spine*, 25(24), 3186-3191.
- Becker, H. S. (1970). *Field work evidence*. New Brunswick, NJ: Transaction Books.
- Beehr, T. A., y Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model, and literature review 1. *Personnel Psychology*, 31(4), 665-699.
- Benavides, F., Benach, J., y Román, C. (1999). Tipos de empleo y salud: análisis de la Segunda Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo. *Gaceta Sanitaria*, 13(6), 425-430.
- Benavides, F., Maqueda, J., Rodrigo, F., Pinilla, J., García, A. M., Ronda, E., . . . Ruiz-Frutos, C. (2008). Prioridades de investigación en salud laboral en España. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 54(211), 25-27.
- Berger, P. L. (1964). *The human shape of work: Studies in the sociology of occupations*. Londres: MacMillan.

- Bernaards, C. M., Bosmans, J. E., Hildebrandt, V. H., van Tulder, M. W., y Heymans, M. W. (2011). The cost-effectiveness of a lifestyle physical activity intervention in addition to a work style intervention on recovery from neck and upper limb symptoms and pain reduction in computer workers. *Occupational and Environmental Medicine*, 68(4), 265-272. doi:10.1136/oem.2008.045450
- Bertera, R. L. (1990). The effects of workplace health promotion on absenteeism and employment costs in a large industrial population. *American Journal of Public Health*, 80(9), 1101-1105.
- Bidet, J. (1995). Quand le travail fait époque. *La crise du travail*, PUF, Paris, 245-259.
- Bize, R., y Plotnikoff, R. C. (2009). The relationship between a short measure of health status and physical activity in a workplace population. *Psychology, Health & Medicine*, 14(1), 53-61. doi:10.1080/13548500802032699
- Blair, S. N., Davey Smith, G., Lee, I. M., Fox, K., Hillsdon, M., McKeown, R. E., . . . Marmot, M. (2010). A tribute to Professor Jeremiah Morris: the man who invented the field of physical activity epidemiology. *Annals of Epidemiology*, 20(9), 651-660. doi:10.1016/j.annepidem.2010.06.001
- Blair, S. N., LaMonte, M. J., y Nichaman, M. Z. (2004). The evolution of physical activity recommendations: how much is enough? *The American Journal of Clinical Nutrition*, 79(5), 913S-920S.
- Blair, S. N., Piserchia, P. V., Wilbur, C. S., y Crowder, J. H. (1986). A Public Health Intervention Model for Work-Site Health Promotion: Impact on Exercise and Physical Fitness in a Health Promotion Plan After 24 Months. *Journal of the American Medical Association*, 255(7), 921-926. doi:10.1001/jama.1986.03370070075029
- Blanch, J. (2003). Trabajar en la modernidad industrial. En *Teoría de las relaciones laborales: fundamentos* (pp. 19-148). Barcelona: UOC.
- Blangsted, A. K., Sogaard, K., Hansen, E. A., Hannerz, H., y Sjogaard, G. (2008). One-year randomized controlled trial with different physical-activity programs to reduce musculoskeletal symptoms in the neck and shoulders among office workers. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 34(1), 55.
- Borgatta, E. F., y Montgomery, R. J. (2000). *Encyclopedia of Sociology-Volume I*: Philadelphia: Macmillan Reference.
- Bosch, X., Alfonso, F., y Bermejo, J. (2002). Diabetes y enfermedad cardiovascular. Una mirada hacia la nueva epidemia del siglo XXI. *Revista Española de Cardiología*, 55(05), 525-527.
- Bourdieu, P. (1978). Sport and social class. En *Information International Social Science Council* (Vol. 17, pp. 819-840).
- Bouwman, C., Hakkaart-van Roijen, L., Koopmanschap, M., Krol, M., Severens, H., y Brouwer, W. (2013). Manual of the iMTA productivity cost questionnaire (iPCQ). Rotterdam: iMTA, Erasmus University Rotterdam.
- Bouwman, C., Krol, M., Severens, H., Koopmanschap, M., Brouwer, W., y Roijen, L. H.-v. (2015). The iMTA Productivity Cost Questionnaire: A Standardized Instrument

- for Measuring and Valuing Health-Related Productivity Losses. *Value in Health*, 18(6), 753-758. doi:10.1016/j.jval.2015.05.009
- Braverman, H. (1978). *Trabajo y capital monopolista*. México: Nuestro Tiempo.
- Brazier, J. E., Harper, R., Jones, N., O'cathain, A., Thomas, K., Usherwood, T., y Westlake, L. (1992). Validating the SF-36 health survey questionnaire: new outcome measure for primary care. *British Medical Journal*, 305(6846), 160-164.
- Breda, J., Jakovljevic, J., Rathmes, G., Mendes, R., Fontaine, O., Hollmann, S., . . . Galea, G. (2018). Promoting health-enhancing physical activity in Europe: Current state of surveillance, policy development and implementation. *Health Policy*, 122(5), 519-527. doi:10.1016/j.healthpol.2018.01.015
- Brown, W., Bryson, A., Forth, J., y Whitfield, K. (2009). *The evolution of the modern workplace*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brox, J., y Frøystein, O. (2005). Health-related quality of life and sickness absence in community nursing home employees: randomized controlled trial of physical exercise. *Occupational Medicine*, 55(7), 558-563.
- Bru Purón, C. (1994). *La ciudadanía europea*. Madrid: Fundación Sistema.
- Bryson, A., Forth, J., y Laroche, P. (2011). Evolution or revolution? The impact of unions on workplace performance in Britain and France. *European Journal of Industrial Relations*, 17(2), 171-187.
- Cabanellas, G. (1974). *Diccionario de Derecho Civil*. Buenos Aires: Editorial Heliasta SRL.
- Cabello, E. V. (2008). *Antropometría. España: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Centro de Nuevas Tecnologías*.
- Cabello, E. V. (2014). Tablas antropométricas. *Revista Científica Ministerio de Trabajo e Inmigración*, 21.
- Cagigal, J. M. (1975). *El deporte en la sociedad actual*. Madrid: Prensa Española.
- Cancelliere, C., Cassidy, J. D., Ammendolia, C., y Côté, P. (2011). Are workplace health promotion programs effective at improving presenteeism in workers? a systematic review and best evidence synthesis of the literature. *BMC Public Health*, 11(1), 395. doi:10.1186/1471-2458-11-395
- Capdevila, L., Niñerola, J., y Pintanel, M. (2004). Motivación y actividad física: el autoinforme de motivos para la práctica de ejercicio físico (AMPEF). *Revista de Psicología del Deporte*, 13(1).
- Caplow, T. (1954). *The sociology of work*. Minneapolis, MN, US: University of Minnesota Press.
- Carayon, P., y Smith, M. J. (2000). Work organization and ergonomics. *Applied Ergonomics*, 31(6), 649-662. doi:10.1016/S0003-6870(00)00040-5
- Cardila, F., Martínez, Á. M., Martín, A. B. B., del Carmen Pérez-Fuentes, M., Jurado, M. d. M. M., y Linares, J. J. G. (2015). Prevalencia de la depresión en España: Análisis de los últimos 15 años. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 5(2), 267-279.

- Caroll, A., Lipartito, K., Post, J., y Werhana, P. (2012). Corporate Responsibility. *The American Experience*, Cambridge University, New York.
- Carr, R. (2001). *Modern Spain, 1875-1980*. Oxford: Oxford University Press.
- Carrel, M. R., Elbert, N. F., y Hatfield, R. D. (1995). *Human resource management: global strategies for managing a diverse workforce* (P. Hall Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Casey, C. (2013). *Work, self and society: After industrialism*. London: Routledge.
- Castillo, J. J. (1999a). Sociology of Work at the Crossroad. *Current Sociology*, 47(2), 21-46.
- Castillo, J. J. (1999b). Which way forward for the sociology of work? An introduction. *Current Sociology*, 47(2), 1-4.
- Castillo, J. J. (2007). *El trabajo fluido en la sociedad de la información: organización y división del trabajo en las fábricas de software*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2014). About physical activity. Consultado el 08-05-2016, recuperado de: <https://www.cdc.gov/physicalactivity/index.html>
- Chapman, J., Jones, D., y Gray, F. (2015). *Perceptions of change in office space design: redesigning Barwon Water's office environment*. Paper presented at the Living and learning: research for a better built environment, 49th International Conference of the Architectural Science Association proceedings, The University of Melbourne.
- Chapman, L. S. (2003). Meta-evaluation of worksite health promotion economic return studies. *American Journal of Health Promotion*, 17(3), 1-10.
- Chenoweth, D. H. (1987). *Planning health promotion at the worksite*. Dubuque, IA: Benchmark Press.
- Chinchilla, S. (2002). *Salud y seguridad en el trabajo*. Costa Rica: Euned.
- Chodzko-Zajko, W. J., Schwingel, A., & Romo-Pérez, V. (2012). Un análisis crítico sobre las recomendaciones de actividad física en España. *Gaceta Sanitaria*, 26(6), 525-533.
- Christensen, J. R., Overgaard, K., Carneiro, I. G., Holtermann, A., y Sogaard, K. (2012). Weight loss among female health care workers--a 1-year workplace based randomized controlled trial in the FINALE-health study. *BMC Public Health*, 12, 625. doi:10.1186/1471-2458-12-625
- Christensen, J. R., Overgaard, K., Hansen, K., Sogaard, K., y Holtermann, A. (2013). Effects on presenteeism and absenteeism from a 1-year workplace randomized controlled trial among health care workers. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 55(10), 1186-1190. doi:10.1097/JOM.0b013e31829b2816
- Chu, A. H. Y., Koh, D., Moy, F. M., y Müller-Riemenschneider, F. (2014). Do workplace physical activity interventions improve mental health outcomes? *Occupational Medicine*, 64(4), 235-245. doi:10.1093/occmed/kqu045

- Chu, C., Breucker, G., Harris, N., Stitzel, A., Gan, X., Gu, X., y Dwyer, S. (2000). Health-promoting workplaces—international settings development1. *Health Promotion International*, 15(2), 155-167. doi:10.1093/heapro/15.2.155
- Clements-Croome, D. (2006). *Creating the productive workplace* (2nd Edition ed.). Oxford: Taylor and Francis.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Hillsdale, NJ: Erlbaum: Routledge Academic.
- Comisión Europea. (2014). Special Eurobarometer 334. Sport and physical activity. En European Commission, Directorate-General for Education and Culture. Consultado el 20-05-2016, recuperado de: https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S776_72_3_EBS334
- Comisión Europea. (2015). Special Eurobarometer 412. Sport and physical activity. En European Commission, Directorate-General for Education and Culture. Consultado el 20-05-2017, recuperado de: https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S1116_80_2_412
- Conn, V., Hafdahl, A. R., Cooper, P. S., Brown, L. M., y Lusk, S. L. (2009). Meta-analysis of workplace physical activity interventions. *American Journal of Preventive Medicine*, 37(4), 330-339. doi:10.1016/j.amepre.2009.06.008
- Cook, D., Sackett, D. L., y Spitzer, W. O. (1995). Methodologic guidelines for systematic reviews of randomized control trials in health care from the Potsdam Consultation on Meta-Analysis. *Journal of Clinical Epidemiology*, 48(1), 167-171.
- Cooper, H., Hedges, L. V., y Valentine, J. C. (2009). *The handbook of research synthesis and meta-analysis*. Nueva York: Russell Sage Foundation.
- Coriat, B. (1982). *Taller y el cronómetro: ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa*. Mexico: Siglo XXI.
- Cornfield, D. B., y Hodson, R. (2002). *Worlds of work: Building an international sociology of work*. New York: Springer Science & Business Media.
- Costa, M., & López, E. . (2009). Educación para la salud: Una estrategia para cambiar los estilos de vida. *Revista Educación en Valores*, 12, 86-103.
- Cox, C. C. (2003). *ACSM's worksite health promotion manual: A guide to building and sustaining healthy worksites*. Champaign: Human Kinetics.
- Cox, M., Shephard, R., y Corey, P. (1987). Physical activity and alienation in the workplace. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 27(4), 429.
- Cox, M., Shephard, R. J., y Corey, P. (1981). Influence of an employee fitness programme upon fitness, productivity and absenteeism. *Ergonomics*, 24(10), 795-806. doi:10.1080/00140138108924900
- Crawford, J. O., Graveling, R. A., Cowie, H., y Dixon, K. (2010). The health safety and health promotion needs of older workers. *Occupational Medicine*, 60(3), 184-192.

- Crews, D. J., y Landers, D. M. (1987). A meta-analytic review of aerobic fitness and reactivity to psychosocial stressors. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 19(5, Suppl), 114-120. doi:10.1249/00005768-198710001-00004
- CSD. (2010) Deporte en el Ámbito Laboral. En: Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte. Consejo Superior de Deportes, España.
- Cuesta Pérez-Camino, A., Crespo González, S., Pérez Bol, R., Velázquez Álvarez, J., y Augusto Rendo, B. (2015). *Infección del tracto urinario en el varón joven*. Paper presented at the XII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, A Coruña, Palexco.
- Dallat, M. (2013). A lesson in business: cost-effectiveness analysis of a novel financial incentive intervention for increasing physical activity in the workplace. *BMC Public Health*, 13, 953. doi:10.1186/1471-2458-13-953
- Davies, S. (2015). Co-working becomes co-living. *Pocket Living*. Consultado el 04-04-2017, recuperado de: https://www.pocketliving.com/bucket/pocket/documents/20151020%20Co-working%20becomes%20co-living%20-%20FT_562763f09555d.pdf
- De la Garza Toledo, E. (2000). El papel del concepto de trabajo en la teoría social del siglo XX. *The role of the labour concept in the social theory of the XX century.* En: de la Garza Toledo, E.(coord.). *El Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo (Latin American Treatise of the Sociology of Labour)*. Mexico: COLMEX.
- de Miguel Calvo, J. M., Gallo, I. S., De las Mozas Majano, O., y López, J. M. H. (2011). Efecto del ejercicio físico en la productividad laboral y el bienestar. *Revista de Psicología del Deporte*, 20(2), 589-604.
- de Morton, N. A. (2009). The PEDro scale is a valid measure of the methodological quality of clinical trials: a demographic study. *Australian Journal of Physiotherapy*, 55(2), 129-133. doi:10.1016/S0004-9514(09)70043-1
- De Zwart, B., Frings-Dresen, M., y Van Duivenbooden, J. (2002). Test–retest reliability of the Work Ability Index questionnaire. *Occupational Medicine*, 52(4), 177-181.
- Delgado-Rodríguez, M., Llorca-Díaz, J. M., y In Piedrola-Gil, G. (2001). Medicina preventiva y salud pública. En: Barcelona: Masson Salvat-Medicina.
- Delgado, A. (2018). Los neoficios: el nuevo escenario laboral. *Emprendedores*. Consultado el 11-02-2019, recuperado de: <https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/a78558/emprendedores-online-neoficios-trafficker-copywriter-afiliado/>
- Deming, W. E. (1989). *Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis*. España: Ediciones Díaz de Santos.
- Despiégel, N., Danchenko, N., François, C., Lensberg, B., y Drummond, M. F. (2012). The Use and Performance of Productivity Scales to Evaluate Presenteeism in Mood Disorders. *Value in Health*, 15(8), 1148-1161. doi:10.1016/j.jval.2012.08.2206
- Dessler, G. (1999). *Essentials of human resource management*. Upper Saddle River, New York: Prentice Hall.

- Deurenberg, P., Weststrate, J. A., y Seidell, J. C. (1991). Body mass index as a measure of body fatness: age- and sex-specific prediction formulas. *British Journal of Nutrition*, 65(2), 105-114. doi:10.1079/BJN19910073
- Díaz-Foncea, M., y Marcuello, C. (2014). Las empresas sociales en España: concepto y características. *Gizarte Ekonomiaren Euskal Aldizkaria-Revista Vasca de Economía Social*(8).
- Díaz-Franco, J. (2002). Medicina de empresa-medicina del trabajo: un proceso de legitimación. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, 5(1), 1-3.
- Díaz, J. (2009). *Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo*. Madrid: Editorial Tebar.
- Díaz Zazo, M. (2015). *Prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud laboral*. Madrid: Ediciones Paraninfo, SA.
- Dishman, R. K., Oldenburg, B., O'Neal, H., y Shephard, R. J. (1998). Worksite physical activity interventions. *American Journal of Preventive Medicine*, 15(4), 344-361. doi:10.1159/000335255
- Dolan, S. L., y Raich, M. (2010). La gestión de las personas y los recursos humanos en el siglo XXI: cambio de paradigmas, roles emergentes, amenazas y oportunidades. 2012, 10, 35-52.
- Domínguez-Lara, S., Calderón, G., y Arroyo, F. (2016). Cuestionario de Satisfacción S21/26: Análisis psicométrico preliminar en trabajadores administrativos. *Revista de Investigación*, 7, 51-67.
- Dourish, P. (2006, April 22-27, 2006). *Implications for design*. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems Montréal, Québec, Canada.
- Drach, G. W., Fair, W. R., Meares, E. M., y Stamey, T. A. (1978). Classification of Benign Diseases Associated with Prostatic Pain: Prostatitis or Prostatodynia? *Journal of Urology*, 120(2), 266-266. doi:10.1016/S0022-5347(17)57135-9
- Dumazedier, J. (2000). *Metamorfosis del trabajo y surgimiento de una sociedad del tiempo libre*. Paper presented at the Ocio y desarrollo humano. Propuestas para el 6º Congreso Mundial de Ocio, Bilbao: Universidad de Deusto.
- Durán, J. (1995). Análisis evolutivo del deporte en la sociedad española (1975-1990): hacia una creciente complejidad y heterogeneidad deportiva. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, 2(1), 15-24.
- Durán, M. M. (2010). Bienestar psicológico: el estrés y la calidad de vida en el contexto laboral. *Revista Nacional de Administración*, 1(1), 71-84.
- Eddy, J. M., y Kahler, H. S. (1992). *Well now*. United States: Wellness Councils of America (WELCOA).
- Elliot, J. (1972). *Revoluciones y rebeliones de la Europa moderna*. Madrid: Alianza.
- Engbers, L. H., van Poppel, M. N. M., Chin A Paw, M. J. M., y van Mechelen, W. (2005). Worksite Health Promotion Programs with Environmental Changes: A Systematic

- Review. *American Journal of Preventive Medicine*, 29(1), 61-70. doi:10.1016/j.amepre.2005.03.001
- ENWHP. (2001). Criteria and Models of good Practice for Workplace Health Promotion in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). En Perugia (Italy).
- Eraut, M. (2007). Learning from other people in the workplace. *Oxford review of education*, 33(4), 403-422.
- Eriksen, H., Ihlebaek, C., Mikkelsen, A., Grønningsæter, H., Sandal, G., y Ursin, H. (2002). Improving subjective health at the worksite: a randomized controlled trial of stress management training, physical exercise and an integrated health programme. *Occupational Medicine*, 52(7), 383-391.
- Espuny, M. (2005). Los accidentes de trabajo: perspectiva histórica. *IUSLabor, Universidad Pompeu Fabra*, (3). Consultado el 08-03-2018, recuperado de: <http://www.upf.edu/iuslabor/032005/art16.htm>
- Esser Díaz, J., y Rojas Malpica, C. (2006). Subjetividad, trabajo y salud mental. *Salud de los Trabajadores*, 14(2), 81-85.
- Esser Díaz, J., Vásquez Antúnez, N., Couto, M. D., y Rojas, M. (2007). Trabajo, ergonomía y calidad de vida.: Una aproximación conceptual e integradora. *Salud de los Trabajadores*, 15(1), 51-57.
- Estabrooks, P. A., Glasgow, R. E., y Dzewaltowski, D. A. (2003). Physical Activity Promotion Through Primary Care. *Journal of the American Medical Association*, 289(22), 2913-2916. doi:10.1001/jama.289.22.2913
- Estévez-López, F., Tercedor, P., y Delgado-Fernández, M. (2012). Recomendaciones de actividad física para adultos sanos. Revisión y situación actual *Journal of Sport & Health Research*, 4(3).
- EU-OSHA. (2017). Work-related accidents and injuries cost EU €476 billion a year according to new global estimates [Press release]. Consultado el 11-05-2018, recuperado de: <https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/press-room/eu-osha-presents-new-figures-costs-poor-workplace-safety-and-health-world>
- Eurostat. (2014). Employment statistics. Consultado el 16-05-2017, recuperado de: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics#searchInput
- Fabbri, J. (2015). Les espaces de coworking pour entrepreneurs. *Nouveaux espaces de travail et dynamiques interorganisationnelles collaboratives*, École polytechnique, Palaiseau.
- Fabius, R., y Frazee, S. (2009). Workplace-based health and wellness services. En *ACSM's worksite health handbook: a guide to building healthy and productive companies* (pp. 21-30). United States: Champaign IL: Human Kinetics.
- Fabius, R., y Glave, F. (2009). Workplace-Based Health and Wellness Services. En N. Pronk (Ed.), *ACSM's worksite health handbook: a guide to building healthy and productive companies* (pp. 21-30). United States: Human Kinetics.

- Feeley, N., Cossette, S., Côté, J., Héon, M., Stremler, R., Martorella, G., y Purden, M. (2009). The importance of piloting an RCT intervention. *Canadian Journal of Nursing Research*, 41(2), 84-99.
- Fernández-Ríos, M. (1995). *Análisis y descripción de puestos de trabajo: teoría, métodos y ejercicios*. Madrid: Ediciones Díaz Santos.
- Fernández-Ríos, M. (1999). *Diccionario de recursos humanos: organización y dirección* (Vol. 658). Madrid: Ediciones Díaz Santos.
- Ferrando, M. G., y Goig, R. L. (2011). *Ideal democrático y bienestar personal: Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010*: Consejo Superior de Deportes, España.
- Fertman, C. I. (2015). *Workplace health promotion programs: planning, implementation, and evaluation*. San Francisco: Jossey-Bass: John Wiley & Sons.
- Filinich, R. (2016). El capitalismo y el rechazo de los límites: el caso ejemplar del Taylorismo y el Fordismo. *Acta Sociológica*, 69, 17-50.
- Florida, R. (2002). The economic geography of talent. *Annals of the Association of American Geographers*, 92(4), 743-755.
- Ford, M. T., Cerasoli, C. P., Higgins, J. A., y Decesare, A. L. (2011). Relationships between psychological, physical, and behavioural health and work performance: A review and meta-analysis. *Work and Stress*, 25(3), 185-204. doi:10.1080/02678373.2011.609035
- Fornias, L., Lopes, M. R., Rey-López, J. P., Matsudo, V. K. R., y do Carmo Luiz, O. (2014). Sedentary behavior and health outcomes: an overview of systematic reviews. *Plos One*, 9(8), e105620.
- Fox, A. (1971). *A sociology of work in industry*. London: Collier-Macmillan.
- Franco Idárraga, H. (1997). Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En M. Valenzuela (Ed.). México: Universidad Autónoma de México.
- Freelancers Union & Elance-oDesk. (2012). *Freelancing in America: A national survey of the new workforce*. New York.
- Freyssenet, M. (1995). Historicité et centralité du travail. *La crise du travail*, 227-244.
- Fulmer, I. S., Gerhart, B., y Scott, K. S. (2003). Are the 100 best better? An empirical investigation of the relationship between being a “great place to work” and firm performance. *Personnel Psychology*, 56(4), 965-993.
- Fusi, J. (2013). *Breve historia del mundo contemporáneo: desde 1776 hasta hoy*. España: Galaxia Gutenberg.
- Gallagher, D., Heymsfield, S. B., Heo, M., Jebb, S. A., Murgatroyd, P. R., y Sakamoto, Y. (2000). Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 72(3), 694-701. doi:10.1093/ajcn/72.3.694
- Gandini, A. (2015). The rise of coworking spaces: A literature review. *Ephemera*, 15(1), 193.

- García-Ferrando, M., y Llopis, R. (2011). Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010. *Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas-Consejo Superior de Deportes*.
- García, A. M., y Gadea, R. (2008). Estimaciones de incidencia y prevalencia de enfermedades de origen laboral en España. *Atención Primaria*, 40(9), 439-445.
- García Gómez, M., Castañeda López, R., Herrador Ortiz, Z., Simón Soria, F., López Menduiña, P., y Alvarez Maeztu, E. (2016). Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España (1990-2014). *Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad*.
- García, R. S., y Moscoso-Sánchez, D. (2015). "How can one be a sports fan?" La contribución de Pierre Bourdieu al estudio social del deporte. *Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales*(30), 161-180.
- Genaidy, A., Davis, N., Delgado, E., Garcia, S., y Al-Herzalla, E. (1994). Effects of a job-simulated exercise programme on employees performing manual handling operations. *Ergonomics*, 37(1), 95-106. doi:10.1080/00140139408963627
- Gerber, G. S. (1998). Benign Prostatic Hyperplasia in Older Men. *Clinics in Geriatric Medicine*, 14(2), 317-332. doi:10.1016/S0749-0690(18)30120-4
- Gil-Monte, P. R., y Moreno-Jiménez, B. (2005). El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). *Una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar*. Madrid: Pirámide, 36-37.
- Giubilei, G., Mondaini, N., Minervini, A., Saieva, C., Lapini, A., Serni, S., . . . Carini, M. (2007). Physical Activity of Men With Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome Not Satisfied With Conventional Treatments—Could it Represent a Valid Option? The Physical Activity and Male Pelvic Pain Trial: A Double-Blind, Randomized Study. *The Journal of Urology*, 177(1), 159-165. doi:10.1016/j.juro.2006.08.107
- Goetzel, R. Z. (2001). A Corporate Perspective: Reflections from the Economic Buyer of Health Promotion Programs. *American Journal of Health Promotion*, 15(5), 357-357. doi:10.4278/0890-1171-15.5.357
- Goetzel, R. Z. (2005). Examining the value of integrating occupational health and safety and health promotion programs in the workplace. *Rockville, Md.: US Department of Health and Human Services, Public Health Services, Centers for Disease Control, National Institute of Occupational Health and Safety*.
- Goetzel, R. Z., y Ozminkowski, R. J. (2008). The Health and Cost Benefits of Work Site Health-Promotion Programs. *Annual Review of Public Health*, 29(1), 303-323. doi:10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090930
- Gómez Chacón, R., Grimaldi Puyana, M., Bernal García, A., y Fernández Gavira, J. (2016). La práctica de actividad física y su relación con la satisfacción laboral en una organización de alimentación. *Journal of Sports Economics & Management*, 2 (6), 85-98.

- González, K., Fuentes, J., y Márquez, J. L. (2017). Physical Inactivity, Sedentary Behavior and Chronic Diseases. *Korean Journal of Family Medicine*, 38(3), 111-115. doi:10.4082/kjfm.2017.38.3.111
- Gorz, A. (1997). *Farewell to the working class: an essay on post-industrial socialism*. London: Pluto Press.
- Gould, S. J. (1996). La postura hizo al hombre. *Razón y revolución* (2).
- Gouliquer, L. (2000). Pandora's Box: The Paradox of Flexibility in Today's Workplace. *Current Sociology*, 48(1), 29-38. doi:10.1177/0011392100048001004
- Grant C, y Brisbin R. (1992). *Workplace wellness: The key to higher productivity and lower health costs*. New York: Wiley.
- Green, L. W., Kreuter, M. W., Deeds, S. G., Partridge, K. B., y Bartlett, E. (1980). *Health education planning: a diagnostic approach*. Palo Alto, California.
- Greenberg, J., y Baron, R. A. (2000). *Behavior in organizations: Understanding and managing the human side of work*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Grint, K. (2005). *The sociology of work: introduction*. Cambridge: Polity Press.
- Groeneveld, I. F., van Wier, M. F., Proper, K. I., Bosmans, J. E., van Mechelen, W., y van der Beek, A. J. (2011). Cost-effectiveness and cost-benefit of a lifestyle intervention for workers in the construction industry at risk for cardiovascular disease. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 53(6), 610-617.
- Gronningæter, H., Hytten, K., Skauli, G., Christensen, C. C., y Ursin, H. (1992). Improved Health and Coping by Physical Exercise or Cognitive Behavioral Stress Management Training in a Work Environment. *Psychology & Health*, 7(2), 147-163. doi:10.1080/08870449208520016
- Guazzi, M., Faggiano, P., Mureddu, G. F., Faden, G., Niebauer, J., y Temporelli, P. L. (2014). Worksite Health and Wellness in the European Union. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 56(5), 508-514. doi:10.1016/j.pcad.2013.11.003
- Gubler, D. J. (2002). Epidemic dengue/dengue hemorrhagic fever as a public health, social and economic problem in the 21st century. *Trends in Microbiology*, 10(2), 100-103.
- Guillén Fonseca, M. (2006). Ergonomía y la relación con los factores de riesgo en salud ocupacional. *Revista Cubana de Enfermería*, 22(4), 0-0.
- Gussenhoven, A. H., van Wier, M. F., Bosmans, J. E., Dekkers, J. C., y van Mechelen, W. (2013). Cost-effectiveness of a distance lifestyle counselling programme among overweight employees from a company perspective, ALIFE@Work: a randomized controlled trial. *Work*, 46(3), 337-346. doi:10.3233/wor-121555
- Haakstad, L. A., y Bø, K. (2007). Fitness and physical activity in Norwegian adults. *Advances in Physiotherapy*, 9(2), 89-96.
- Habermas, J., Muñiz, J. N., y Cotarelo, R. (1981). *La reconstrucción del materialismo histórico*. Madrid: Taurus Madrid.
- Habermas, J., Redondo, M. J., y Garrido, M. (1984). *Ciencia y técnica como "ideología"*. Madrid: Tecnos Madrid.

- Hackman, J. R. (1980). Work redesign and motivation. *Professional Psychology*, 11(3), 445.
- Hagen, L., y Bø, K. (2003). 2 Km Walkint Test and rated perceived fitness capacity in a norwegian rural population *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 35(5).
- Halkos, G., y Bousinakis, D. (2010). The effect of stress and satisfaction on productivity. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 59(5), 415-431. doi:10.1108/17410401011052869
- Hallmarker, U., James, S., Michaelsson, K., Arnlov, J., Sandin, F., y Holmberg, L. (2015). Cancer incidence in participants in a long-distance ski race (Vasaloppet, Sweden) compared to the background population. *European Journal of Cancer*, 51(4), 558-568. doi:10.1016/j.ejca.2014.12.009
- Hamer, M., Taylor, A., y Steptoe, A. (2006). The effect of acute aerobic exercise on stress related blood pressure responses: A systematic review and meta-analysis. *Biological Psychology*, 71(2), 183-190. doi:10.1016/j.biopsycho.2005.04.004
- Hansen, L. (1993). Safety management: A call for (r) evolution. *Professional Safety*, 38(3), 16.
- Harden, J., y Lynn, B. (2006). *Problematic relationships in the workplace* (Vol. 1). New York: Peter Lang.
- Harding, J., Freak-Poli, R. L. A., Backholer, K., y Peeters, A. (2013). Change in Health-Related Quality of Life Amongst Participants in a 4-Month Pedometer-Based Workplace Health Program. *Journal of Physical Activity and Health*, 10(4), 533-543. doi:10.1123/jpah.10.4.533
- Haro-García, L., Sánchez-Román, R., Juárez-Pérez, C. A., y Larios-Díaz, E. (2007). Justificaciones médicas de la jornada laboral máxima de ocho horas. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 45(2), 191-197.
- Haskell, W. L. (1989). Exercise as a means of maximizing human physical performance and productivity. *Biological Effects of Physical Activity*, 115-126.
- Haskell, W. L., Lee, I. M., Pate, R. R., Powell, K. E., Blair, S. N., Franklin, B. A., . . . Bauman, A. (2007). Physical activity and public health: Updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 39(8), 1423-1434. doi:10.1249/mss.0b013e3180616b27
- Haynes, B. P. (2007). The impact of the behavioural environment on office productivity. *Journal of Facilities Management*, 5(3), 158-171.
- Heaney, C. A., y Goetzel, R. Z. (1997). A Review of Health-Related Outcomes of Multi-Component Worksite Health Promotion Programs. *American Journal of Health Promotion*, 11(4), 290-307. doi:10.4278/0890-1171-11.4.290
- Heath, G. W., Parra, D. C., Sarmiento, O. L., Andersen, L. B., Owen, N., Goenka, S., . . . Brownson, R. C. (2012). Evidence-based intervention in physical activity: lessons from around the world. *The Lancet*, 380(9838), 272-281.
- Hedges, L. (1982). Estimation of effect size from a series of independent experiments. *Psychological Bulletin*, 92(2), 490.

- Hedges, L., y Olkin, I. (1985). *Statistical methods for meta-analysis*. Orlando: Academic.
- Heiss, G., Wallace, R., Anderson, G. L., Aragaki, A., Beresford, S. A., Brzyski, R., . . . Manson, J. E. (2008). Health risks and benefits 3 years after stopping randomized treatment with estrogen and progestin. *Journal of the American Medical Association*, 299(9), 1036-1045.
- Heras-Cañas, V., Gutiérrez-Soto, B., Serrano-García, M. L., Vázquez-Alonso, F., Navarro-Marí, J. M., y Gutiérrez-Fernández, J. (2016). Chronic bacterial prostatitis. Clinical and microbiological study of 332 cases. *Medicina Clínica*, 147(4), 144-147. doi: 10.1016/j.medcle.2016.09.032
- Herdman, M., Fox-Rushby, J., y Badia, X. (1997). 'Equivalence' and the translation and adaptation of health-related quality of life questionnaires. *Quality of Life Research*, 6(3), 0-0.
- Hermabessière, J., y Taillandier, J. (2002). Fisiología de la próstata. *EMC - Urología*, 34(1), 1-6. doi:10.1016/S1761-3310(02)72340-2
- Herrero, J., y Gracia, E. (2007). Una medida breve de la sintomatología depresiva (CESD-7). *Salud Mental*, 30(5), 40-46.
- Hobsbawm, E. (2010). *Age of revolution: 1789-1848*. United Kingdom: Hachette UK.
- Holm-Detlev Köhler, y Artilles, A. M. (2007). *Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales*. Madrid: Delta Publicaciones.
- Holtermann, A., Jorgensen, M. B., Gram, B., Christensen, J. R., Faber, A., Overgaard, K., . . . Sogaard, K. (2010). Worksite interventions for preventing physical deterioration among employees in job-groups with high physical work demands: background, design and conceptual model of FINALE. *BMC Public Health*, 10, 120. doi:10.1186/1471-2458-10-120
- Hoppeler, H. (2018). Deciphering VO2 max: limits of the genetic approach. *The Journal of Experimental Biology*, 221(21), jeb164327. doi:10.1242/jeb.164327
- Hoppock, R. (1935). *Job satisfaction*. Oxford: Harper.
- Howard, J., y Mikalachki, A. (1979). Fitness and employee productivity. *Canadian Journal of Applied Sport Sciences*, 4(3), 191-198.
- Howard, J. R. (1996). *The sociology of work: Concepts and cases*. California: Pine Forge.
- Hua, Y. (2007). *Designing open-plan workplaces for collaboration: An exploration of the impact of workplace spatial settings on space perception and collaboration effectiveness*. Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
- Hua, Y., Loftness, V., Heerwagen, J. H., y Powell, K. M. (2011). Relationship between workplace spatial settings and occupant-perceived support for collaboration. *Environment and Behavior*, 43(6), 807-826.
- Hua, Y., Loftness, V., Kraut, R., y Powell, K. M. (2010). Workplace collaborative space layout typology and occupant perception of collaboration environment. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 37(3), 429-448.
- Hudson, P. (2014). *The industrial revolution*. London: Bloomsbury Publishing.

- Huizinga, J. (2012). *Homo ludens*. España: Alizanza Editorial.
- Hurtado de Mendoza, C. (2013). *Percepción de riesgos psicosociales, estrés, ansiedad, variables de salud y conciliación de la vida laboral-familiar en trabajadores y trabajadoras*. Universidad Complutense de Madrid, España.
- Hutchinson, A. D., y Wilson, C. (2012). Improving nutrition and physical activity in the workplace: a meta-analysis of intervention studies. *Health Promotion International*, 27(2), 238-249. doi:10.1093/heapro/dar035
- Ilmarinen, J. (2007). The work ability index (WAI). *Occupational Medicine*, 57(2), 160-160.
- Ilmarinen, J. (2009). Work ability—a comprehensive concept for occupational health research and prevention. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 35(1), 1-5.
- Ilmarinen, J., & Tuomi, K. (1993). Work ability of aging workers. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 8-10.
- Ilmarinen, J., y Rantanen, J. (1999). Promotion of work ability during ageing. *American Journal of Industrial Medicine*, 36(S1), 21-23.
- Ilmarinen, J., Tuomi, K., y Seitsamo, J. (2005). New dimensions of work ability. *International Congress Series*, 1280, 3-7. doi: 10.1016/j.ics.2005.02.060
- INE. (2014). *Encuesta de Población Activa (EPA). Cuarto trimestre 2014*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
- INE. (2015). Salarios Ingresos y cohesión social [Tabla]. Consultado el 02-02-2015, recuperado de: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10885>
- INE. (2016). *Encuesta de Población Activa (EPA). Cuarto trimestre 2016*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
- INE. (2018). Estructura y dinamismo del tejido empresarial en España. En INE (Ed.), *Directorio Central de Empresas (DIRCE)* (pp. 1-7). España: INE.
- INSST. (2017). Beneficios del fomento de la actividad física y la práctica deportiva en términos de mejora de la salud, el bienestar y la productividad laboral. Madrid: INSST.
- INSST. (2017). Modelo Europeo de referencia para la PST [Figura]. European Network for Workplace Health Promotion, traducido por Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Consultado el 24-11-2017, recuperado de: www.insht.es/portal/site/PromocionSalud
- Institute for Health Metrics and Evaluation. (2018). Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016), Consultado el 11-04-2018, recuperado de: <http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool>
- International Ergonomics Association. (2013). Definition and Domains of Ergonomics. Consultado el 24-04-2018, recuperado de: <https://www.iea.cc/whats/index.html>

- Irwin, D. E., Milsom, I., Kopp, Z., Abrams, P., Artibani, W., y Herschorn, S. (2009). Prevalence, Severity, and Symptom Bother of Lower Urinary Tract Symptoms among Men in the EPIC Study: Impact of Overactive Bladder. *European Urology*, 56(1), 14-20. doi:10.1016/j.eururo.2009.02.026
- Itza, F., Teba, F., Zarza, D., Salinas, J., y Gomes, M. (2014). Perfil clínico de los pacientes con dolor pélvico crónico: un análisis descriptivo. *Archivos Españoles de Urología*, 67(8).
- Jaccard, P., y Hernández, R. (1971). *Historia social del trabajo: de la antigüedad hasta nuestros días*. Barcelona: Plaza & Janés.
- Jáuregui, R., Egea, F., y de la Puerta, J. (1998). *El tiempo que vivimos y el reparto del trabajo: la gran transformación del trabajo, la jornada laboral y el tiempo libre* (Vol. 61). Barcelona: Paidós.
- Jebb, S. A., Cole, T. J., Doman, D., Murgatroyd, P. R., y Prentice, A. M. (2000). Evaluation of the novel Tanita body-fat analyser to measure body composition by comparison with a four-compartment model. *British Journal of Nutrition*, 83(2), 115-122. doi:10.1017/S0007114500000155
- Jette, D. U., y Downing, J. (1994). Health status of individuals entering a cardiac rehabilitation program as measured by the medical outcomes study 36-item short-form survey (SF-36). *Physical Therapy*, 74(6), 521-527.
- Jiménez-Cruz, J. F., y Broseta-Rico, E. (2005). Clasificación, etiología, diagnóstico y tratamiento de las prostatitis. Otros tipos de prostatitis. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*, 23, 47-56.
- Jiménez-Pacheco, A., Jiménez-Pacheco, A., y Roldán-López, M. (2016). Estrategias terapéuticas para el tratamiento de la prostatitis crónica/síndrome de dolor pélvico crónico. *Revista Internacional de Andrología*, 14(1), 19-26. doi: 10.1016/j.androl.2015.07.004
- Jiménez, E. G. (2013). Composición corporal: estudio y utilidad clínica. *Endocrinología y Nutrición*, 60(2), 69-75.
- Jiménez Gutierrez, A., y García López, Ó. (2012). *Actividad física y ejercicio, una inversión segura*. Madrid: Cátedra de Investigación Sanitas Wellbeing: Universidad Europea de Madrid.
- Jiménez, V., Barriopedro, M. I., y Martínez del Castillo, J. (2014). *Intervenciones de actividad física en el lugar de trabajo: una revisión de los estudios europeos*. Paper presented at the VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, Cáceres, Extremadura.
- Johns, G. (2010). Presenteeism in the workplace: A review and research agenda. *Journal of Organizational Behavior*, 31(4), 519-542.
- Johnson, P. R., y Indvik, J. (1997). Blue on blue: Depression in the Workplace. *Journal of Managerial Psychology*, 12(6), 359-364.
- Jorgensen, M. B., Faber, A., Hansen, J. V., Holtermann, A., y Sogaard, K. (2011). Effects on musculoskeletal pain, work ability and sickness absence in a 1-year

- randomised controlled trial among cleaners. *BMC Public Health*, 11, 11. doi:10.1186/1471-2458-11-840
- Joroff, M. L., Porter, W. L., Feinberg, B., y Kukla, C. (2003). The agile workplace. *Journal of Corporate Real Estate*, 5(4), 293-311.
- Julia, S. (1982). Marx y la clase obrera de la revolución industrial. *Zona Abierta*, 8-9.
- Kääriä, S., Laaksonen, M., Rahkonen, O., Lahelma, E., y Leino-Arjas, P. (2012). Risk factors of chronic neck pain: A prospective study among middle-aged employees. *European Journal of Pain*, 16(6), 911-920.
- Kai, B., Lee, K. D., Andrews, G., Wilkinson, M., y Forster, B. B. (2010). Puck to Pubalgia: Imaging of Groin Pain in Professional Hockey Players. *Canadian Association of Radiologists Journal*, 61(2), 74-79. doi:10.1016/j.carj.2009.10.010
- Kerr, J. H., y Vos, M. C. (1993). Employee fitness programs, absenteeism and general well-being. *Work and Stress*, 7(2), 179-190. doi:10.1080/02678379308257059
- Kessler, R. C., Merikangas, K. R., y Wang, P. S. (2008). The prevalence and correlates of workplace depression in the national comorbidity survey replication. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 50(4), 381.
- Kickbusch, I., y Payne, L. (2003). Twenty-first century health promotion: the public health revolution meets the wellness revolution. *Health Promotion International*. doi:10.1093/heapro/dag418
- Kirkcaldy, B. D., Cooper, C. L., Shephard, R. J., y Brown, J. S. (1994). Exercise, job satisfaction and well-being among superintendent police officers. *European Review of Applied Psychology / Revue Européenne de Psychologie Appliquée*, 44(2), 117-123.
- Kleinman, A. (1988). *Suffering, healing and the human condition*. New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- Kleinman, A. (1997). *Writing at the margin: Discourse between anthropology and medicine*. Berkeley and Los Angeles: Univ of California Press.
- Koopmanschap, M. A. (2005). PRODISQ: a modular questionnaire on productivity and disease for economic evaluation studies. *Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research*, 5(1), 23-28. doi:10.1586/14737167.5.1.23
- Kouvonen, A., Vahtera, J., Oksanen, T., Pentti, J., Väänänen, A. K., Heponiemi, T., . . . Kivimäki, M. (2012). Chronic workplace stress and insufficient physical activity: a cohort study. *Occupational and Environmental Medicine*, oemed-2012-100808.
- Kraft, R. A. y. C. (1984). The importance of cultural variables in program design. En O. D. a. T. Ainsworth (Ed.), *Health Promotion in the Workplace* (pp. 63-96): New York: Wiley and Sons.
- Kraïm-Leleu, M., Lesage, F.-X., Drame, M., Lebargy, F., y Deschamps, F. (2016). Occupational risk factors for COPD: a case-control study. *Plos One*, 11(8), e0158719.
- Kuijpers, W., Groen, W. G., Aaronson, N. K., y van Harten, W. H. (2013). A systematic review of web-based interventions for patient empowerment and physical

- activity in chronic diseases: relevance for cancer survivors. *Journal of Medical Internet Research*, 15(2), e37.
- Kuoppala, J., Lamminpää, A., y Husman, P. (2008). Work health promotion, job well-being, and sickness absences—a systematic review and meta-analysis. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 50(11), 1216-1227.
- Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J., y Vainio, H. (2008). Leadership, job well-being, and health effects—a systematic review and a meta-analysis. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 50(8), 904-915.
- Lack, D. M. (2011). Presenteeism revisited: a comprehensive review. *Aaohn Journal*, 59(2), 77-91.
- Lafargue, P. (1991). El derecho a la pereza, ed. Pérez Ledesma. Madrid: Fundamentos.
- Lallement, M. (2011). Europe and the economic crisis: forms of labour market adjustment and varieties of capitalism. *Work, Employment & Society*, 25(4), 627-641. doi:10.1177/0950017011419717
- Landers, D. M. (1994). Performance, Stress, and Health: Overall Reaction. *Quest*, 46(1), 123-135. doi:10.1080/00336297.1994.10484114
- LaPorte, W. (1970). *La gymnastique de pause dans l'entreprise*. Brussels: Editions de L'administration de L'éducation Physique des Sports.
- Lapunzina, P., y Aiello, H. (2002). *Manual de antropometría normal y patológica: fetal, neonatal, niños y adultos*. Madrid: Elsevier España.
- Lasheras, R. y Pérez, B. (2012). El impacto social de la crisis: ¿qué sabemos? Crisis y fractura social en Europa. En Laparra y Pérez (Coord.), *Causas y efectos en España. Colección de estudios sociales*, Núm. 35 (p. 20). Barcelona: Obra Social "La Caixa".
- Latthe, P., Mignini, L., Gray, R., Hills, R., y Khan, K. (2006). Factors predisposing women to chronic pelvic pain: systematic review. *British Medical Journal*, 332(7544), 749-755. doi:10.1136/bmj.38748.697465.55
- Laukkanen, R. (1995). *Development and evaluation of a 2-km walking test for assessing maximal aerobic power of adults in field conditions*. UKK Institute and University of Kuopio, Tampere and Kuopio; Kuopio University Publications D. Medical Sciences 23. 1993.
- Laukkanen, R. M., Oja, P., Ojala, K. H., Pasanen, M. E., y Vuori, I. M. (1992). Feasibility of a 2-km walking test for fitness assessment in a population study. *Scandinavian Journal of Social Medicine*, 20(2), 119-126.
- Laukkanen, R. M. T., Kukkonen-Harjula, T. K., Oja, P., Pasanen, M. E., y Vuori, I. M. (2000). Prediction of Change in Maximal Aerobic Power by the 2-km Walk Test after Walking Training in Middle-Aged Adults. *International Journal of Sports Medicine*, 21(02), 113-116. doi:10.1055/s-2000-8872
- Leadon, A. (2015). *Workplace design: Facilitating collaborative and individual work within the creative office environment*. The Florida State University, Florida.

- Lechner, L., de Vries, H., Adriaansen, S., y Drabbels, L. (1997). Effects of an employee fitness program on reduced absenteeism. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 39(9), 827-831.
- Leibovitch, I., y Mor, Y. (2005). The Vicious Cycling: Bicycling Related Urogenital Disorders. *European Urology*, 47(3), 277-287. doi: 10.1016/j.eururo.2004.10.024
- Leighton, P., y Brown, D. (2013). *Future working: The rise of Europe's independent professionals*. Europe: The European Federation of Inland Ports: EFIP.
- Lemon, S. C., Zapka, J., Li, W., Estabrook, B., Magner, R., y Rosal, M. C. (2009). Perceptions of worksite support and employee obesity, activity, and diet. *American Journal of Health Behavior*, 33(3), 299-308.
- Lépine, J.-P., y Briley, M. (2011). The increasing burden of depression. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 7(Suppl 1), 3.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado, 10 de noviembre de 1995, núm. 269, pp. 32590 a 32611.
- Levin, A. C. (2005). Changing the role of workplace design within the business organisation: A model for linking workplace design solutions to business strategies. *Journal of Facilities Management*, 3(4), 299-311.
- Leysen, M., Nijs, J., Meeus, M., van Wilgen, C. P., Struyf, F., Vermandel, A., . . . Roussel, N. A. (2015). Clinimetric properties of illness perception questionnaire revised (IPQ-R) and brief illness perception questionnaire (Brief IPQ) in patients with musculoskeletal disorders: A systematic review. *Manual Therapy*, 20(1), 10-17.
- Li, J., y Siegrist, J. (2012). Physical activity and risk of cardiovascular disease—a meta-analysis of prospective cohort studies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 9(2), 391-407.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., . . . Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *British Medical Journal*, 339, b2700. doi:10.1136/bmj.b2700
- Lidegaard, M., Sjøgaard, K., Krstrup, P., Holtermann, A., y Korshøj, M. (2018). Effects of 12 months aerobic exercise intervention on work ability, need for recovery, productivity and rating of exertion among cleaners: a worksite RCT. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 91(2), 225-235. doi:10.1007/s00420-017-1274-3
- Litwin, M., McNautgton, M., Fowler, F., Nickel, J., Calhoun, E., Pontari, M., . . . O'Leary, M. (1999). The National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index: Development and Validation of a New Outcome Measure *Journal of Urology*, 162(2), 369-375. doi:10.1016/S0022-5347(05)68562-X
- Liu, C.-J., y Latham, N. (2011). Can progressive resistance strength training reduce physical disability in older adults? A meta-analysis study. *Disability and Rehabilitation*, 33(2), 87-97. doi:10.3109/09638288.2010.487145
- Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.

- Long, B. C., y Stavel, R. v. (1995). Effects of exercise training on anxiety: A meta-analysis. *Journal of Applied Sport Psychology*, 7(2), 167-189. doi:10.1080/10413209508406963
- López Larrayoz, I., García Cores, F., Pereira Sanz, S., Manrique Olmedo, B., Escribano Romo, G., y Panadero Carlavilla, F. (2017). Prostatitis. Madrid: Portalfarma, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
- Lounsbury, M., y Kaghan, W. N. (2001). Organizations, occupations and the structuration of work. En *The Transformation of Work* (pp. 25-50). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
- Macniven, R., Engelen, L., Kacen, M. J., y Bauman, A. (2015). Does a corporate worksite physical activity program reach those who are inactive? Findings from an evaluation of the Global Corporate Challenge. *Health Promotion Journal of Australia*, 26(2), 142-145. doi:10.1071/HE14033
- Maes, S., Kittel, F., Scholten, H., y Verhoeven, C. (1992). Healthier work at brabantia, a comprehensive approach to wellness at the worksite. *Safety Science*, 15(4-6), 351-366. doi:10.1016/0925-7535(92)90024-t
- Maestre, D. G. (2007). *Ergonomía y psicología social*. Madrid: FC Editorial.
- Maher, C. G., Sherrington, C., Herbert, R. D., Moseley, A. M., y Elkins, M. (2003). Reliability of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials. *Physical Therapy*, 83(8), 713-721.
- Maier, A. (2009). Occupational Health. En *Information Resources in Toxicology* (Fourth Edition) (pp. 335-343): Amsterdam: Elsevier.
- Maitland, A., y Thomson, P. (2014). *Future Work (Expanded and Updated): Changing organizational culture for the new world of work*. London: Springer.
- Malik, S. H., Blake, H., y Suggs, L. S. (2014). A systematic review of workplace health promotion interventions for increasing physical activity. *British Journal of Health Psychology*, 19(1), 149-180. doi:10.1111/bjhp.12052
- Mammen, G., y Faulkner, G. (2013). Physical activity and the prevention of depression: a systematic review of prospective studies. *American Journal of Preventive Medicine*, 45(5), 649-657.
- Manguroff, J., Channe, N., y Georgieff, N. (1960). Tempo, Dosierung, Anzahl und Charakter der Übungen für Berufsgymnastik. *Voprosi na Fizika Kultur, Sofia*, 5, 161.
- Manuel Fernández-Real, J., Vayreda, M., Casamitjana, R., Ricart, W., y Saez, M. (2001). Índice de masa corporal (IMC) y porcentaje de masa grasa: un IMC mayor de 27,5 kg/m² podría suponer obesidad en la población española. *Medicina Clínica*, 117(18), 681-684. doi: 10.1016/S0025-7753(01)72222-1
- Marcuse, H. (1933). *Sobre els fonaments filosòfics del concepte econòmic-científic del treball*. Barcelona: Edicions 62.
- Marshall, A. L. (2004). Challenges and opportunities for promoting physical activity in the workplace. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 7(1), 60-66.

- Martens, R. (1974). Arousal and Motor Performance. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 2(1), 155-188.
- Martín-García, M., Ruiz-Hervella, V., y Sánchez-Bayle, M. (2005). Satisfacción laboral en el personal de las fundaciones sanitarias en Galicia. *Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI*, 3(2), 303-313.
- Martin, A., Sanderson, K., y Cocker, F. (2009). Meta-analysis of the effects of health promotion intervention in the workplace on depression and anxiety symptoms. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 35(1), 7-18.
- Martínez-Hervás, S., Romero, P., Ferri, J., Pedro, T., Real, J. T., Priego, A., . . . Ascaso, J. F. (2008). Perímetro de cintura y factores de riesgo cardiovascular. *Revista Española de Obesidad*, 6(2), 97-104.
- Martínez-López, E., y Saldarriaga-Franco, J. (2008). Inactividad Física y Ausentismo en el Ámbito Laboral. *Revista de Salud Pública*, 10, 227-238.
- Martínez del Castillo, J. (2014). Las funciones profesionales de los titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. *Profesiones*, XV, 14-15.
- Martínez del Castillo, J., Jiménez-Beatty, J., Campos Izquierdo, A., Del Hierro, D., Martín, M., y González, M. D. (2007). Barreras organizativas y sociales para la práctica de actividad física en la vejez. *European Journal of Human Movement*(19), 13-35.
- Martínez del Castillo, J., Jiménez Beatty, E., Campos Izquierdo, A., Del Hierro, D., Martín, M., y González, M. D. (2007). Barreras organizativas y sociales para la práctica de actividad física en la vejez. *European Journal of Human Movement*(19), 13-35.
- Martínez del Castillo, J., Martín Rodríguez, M., Hierro Pinés, D., Jiménez-Beatty, J. E., y González Rivera, M. D. (2008). Barreras a la actividad física en las mujeres adultas y alternativas de conciliación. *Actividad física y Deporte: Ciencia y Profesión*(9), 12-24.
- Martínez del Castillo, J., Moscoso Sánchez, D., Martín Rodríguez, M., Jiménez-Beatty, J., y del Hierro, D. (2016). Cambios sociales y cambios en las prácticas y demandas de actividad física y deporte: 1966-2016. Nuevos retos organizativos. En INEF (Ed.), *INEF. 50 Años* (pp. 83-117). Madrid: INEF.
- Martínez del Castillo, J., Puig, N., Boix, R., y Millet, L. (1993). Las instalaciones deportivas en España. *International Review for the Sociology of Sport*, 28, 324-324.
- Marx, K. (1972). *The marx-engels reader* (Vol. 4). New York: Norton.
- Marx, K. (1984). *El capital: crítica de la economía política. Libro III: El proceso global de la producción capitalista*. Madrid: Siglo XXI.
- Marx, K. (2015). *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*. Buenos Aires: Ediciones Colihue SRL.
- Matson-Koffman, D. M., Brownstein, J. N., Neiner, J. A., y Greaney, M. L. (2005). A Site-Specific Literature Review of Policy and Environmental Interventions That Promote Physical Activity and Nutrition for Cardiovascular Health: What Works? *American Journal of Health Promotion*, 19(3), 167-193. doi:10.4278/0890-1171-19.3.167

- Mattke, S., Balakrishnan, A., Bergamo, G., y Newberry, S. J. (2007). A review of methods to measure health-related productivity loss. *American Journal of Managed Care*, 13(4), 211.
- Mayhew, C. (2001). *Occupational health and safety risks faced by police officers*. Canberra: Citeseer, Australian Institute of Criminology, 2001.
- McEachan, R. R., Lawton, R. J., Jackson, C., Conner, M., Meads, D. M., y West, R. M. (2011). Testing a workplace physical activity intervention: a cluster randomized controlled trial. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8, 29. doi:10.1186/1479-5868-8-29
- Meares, E. M. (1968). Bacteriologic localization patterns in bacterial prostatitis and urethritis. *Investigative Urology*, 5, 492-518.
- Meca, J. (2003). La revisión del estado de la cuestión: El meta-análisis. En C. Camisón, M.J. Oltra y M.L. Flor (Eds.), *Enfoques, problemas y métodos de investigación en economía y dirección de empresas*. Tomo I (pp. 101-110). Castellón: ACEDE / Fundación Universitat Jaume I – Empresa.
- Meliá, J., y Peiró, J. (1988b). La medida de la satisfacción en organizaciones laborales: El Cuestionario de Satisfacción S20/23. *Psicologemas*. 3 (5), 59-74.
- Meliá, J., Pradilla, J., Martí, N., Sancerni, M., Oliver, A., y Tomás, J. (1990). Estructura factorial, fiabilidad y validez del cuestionario de satisfacción s21/26: un instrumento con formato dicotómico orientado al trabajo profesional. *Universitas Tarraconensis*, 12, 39.
- Meliá Navarro, J. L. (1999). *Medición y Métodos de Intervención en Psicología de la Seguridad y Prevención de Accidentes*. Barcelona: Paidós.
- Méndez, R. (1995). Hacia una nueva división espacial del trabajo en España. *Revista de Estudios Regionales*, 42, 131-178.
- Mills, P. R., Kessler, R. C., Cooper, J., y Sullivan, S. (2007). Impact of a health promotion program on employee health risks and work productivity. *American Journal of Health Promotion*, 22(1), 45-53.
- Mingote Adán, J. C., Pino Cuadrado, P. d., Sánchez Alaejos, R., Gálvez Herrero, M., y Gutiérrez García, M. D. (2011). El trabajador con problemas de salud mental: Pautas generales de detección, intervención y prevención. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 57, 188-205.
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (2012). Estados miembros. Consultado el 17-05-2017, recuperado de: <http://www.hablamosdeeuropa.es/panorama/miembros/>
- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. (2018). *Cifras PYME. Datos Enero 2018*. Madrid: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Consultado el 7-03-2019, recuperado de: www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents
- Mintzberg, H. (1979). *The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research*.|| University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial

- Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. *Historical Research Reference in Entrepreneurship*.
- Misuraca, P. M. (2013). *An examination of the relationship between job satisfaction and tacit knowledge sharing among knowledge workers: A quantitative study*. Tesis Doctoral. Capella University.
- Mohren, D. C. L., Swaen, G. M. H., Kant, I., Schayck, C. P., y Galama, J. M. D. (2005). Fatigue and job stress as predictors for sickness absence during common infections. *International Journal of Behavioral Medicine*, 12(1), 11. doi:10.1207/s15327558ijbm1201_2
- Molina, E. L., y Marino, A. P. (2001). *Introducción al análisis de datos en meta-análisis*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Montoya-Melger, A. (2006). *Derecho del trabajo*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Moreno-Collazos, J. E., y Cruz-Bermúdez, H. F. (2015). Asociación entre los motivos y la práctica de ejercicio en participantes de un programa de actividad física laboral. *Revista de la Facultad de Medicina*, 63, 609-615.
- Moreno, G. M. (2012). Definición y clasificación de la obesidad. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 23(2), 124-128.
- Moreno, L. (2004). Reforma y reestructuración del Estado del Bienestar en la Unión Europea. *Documentos de trabajo. CSIC. Unidad de Políticas Comparadas*, 9, 1.
- Morris, J. N., y Crawford, M. D. (1958). Coronary Heart Disease and Physical Activity of Work. *British Medical Journal*, 2(5111), 1485-1496. doi:10.1136/bmj.2.5111.1485
- Morris, J. N., Heady, J. A., Raffle, P. A., Roberts, C. G., y Parks, J. W. (1953). Coronary heart-disease and physical activity of work. *The Lancet*, 265(6796), 1111-1120; concl.
- Moseley, A. M., Herbert, R. D., Sherrington, C., y Maher, C. G. (2002). Evidence for physiotherapy practice: A survey of the Physiotherapy Evidence Database (PEDro). *Australian Journal of Physiotherapy*, 48(1), 43-49. doi:10.1016/S0004-9514(14)60281-6
- Munro, L. (2007). Absenteeism and presenteeism: possible causes and solutions: peer reviewed original article. *South African Radiographer*, 45(1), 21-23.
- Muñoz Poblete, C. F., y Vanegas López, J. J. (2012). Asociación entre puesto de trabajo computacional y síntomas musculoesqueléticos en usuarios frecuentes. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 58(227), 98-106.
- Navidian, A., Saber, S., Rezvani Amin, M., y Kianian, T. (2014). Correlation of quality of work life and job satisfaction in nurses of Kerman University of Medical Sciences. *Journal of Health Promotion Management*, 3(2), 7-15.
- Noguera, J. A. (1996). La teoría crítica: de Frankfurt a Habermas. Una traducción de la teoría de la acción comunicativa a la sociología. *Papers: Revista de Sociología* (50), 133-153.

- Noguera, J.A. (1998). *La Transformación del concepto de trabajo en la teoría social: la aportación de las tradiciones marxistas*. (Tesis doctoral): Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
- Noguera, J. A. (2000). El problema de la definición del trabajo. *Ponencia presentada en los I Encuentros entre Humanidades y Ciencias Sociales, Barcelona IUC, UPF*.
- Noguera, J. A. (2002). El concepto de trabajo y la teoría social crítica. *Papers: revista de sociología*, (68), 141-168
- Nurminen, E., Malmivaara, A., Ilmarinen, J., Ylostalo, P., Mutanen, P., Ahonen, G., y Aro, T. (2002). Effectiveness of a worksite exercise program with respect to perceived work ability and sick leaves among women with physical work. *Scandinavian Journal of Work Environment & Health*, 28(2), 85-93.
- Nurminen, E., Malmivaara, A., Ilmarinen, J., Ylostalo, P., Mutanen, P., Ahonen, G., y Aro, T. (2002). Effectiveness of a worksite exercise program with respect to perceived work ability and sick leaves among women with physical work. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 28(2), 85-93.
- Nuttall, F. Q. (2015). Body mass index: obesity, BMI, and health: a critical review. *Nutrition Today*, 50(3), 117.
- Nyati, F. (2014). Corporate health and wellness give you an edge: more to life-wellness. *HR Future*, 7(Jul 2014), 49.
- O'Donnell, M. P. (1992). *Design of workplace health promotion programs*. Toronto: Delmar Thomson Learning.
- O'Donnell, M. P. (2002). *Health promotion in the workplace*. New York: Cengage Learning.
- Oden, G., Crouse, S., y Reynolds, C. (1989). Worker productivity, job satisfaction and work-related stress: the influence of an employee fitness program. *Fitness in Business*, 3(6), 198-203.
- Ohta, M., Takigami, C., y Ikeda, M. (2007). Effect of Lifestyle Modification Program Implemented in the Community on Workers' Job Satisfaction. *Industrial Health*, 45(1), 49-55. doi:10.2486/indhealth.45.49
- OIT. (2013). Trabajo. *Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional*. Consultado el 24-05-2015, recuperado de: <https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3315?page=1>
- OIT. (2014). Employment-to-population ratio -- ILO modelled estimates. Consultado el 16-05-2017, recuperado de: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=7&_afLoop=594094413180180&_afWindowMode=0&_afWindowId=eyp9flsbx_1#!%40%40%3F_afWindowId%3Deyp9flsbx_1%26_afLoop%3D594094413180180%26MBI_ID%3D7%26_afWindowMode%3D0%26_a df.ctrl-state%3Deyp9flsbx_57
- OIT. (2016a). Employment-to-population ratio -- ILO modelled estimates. Consultado el 16-05-2017, recuperado de: <https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/>

- [Page3.jspx?MBI_ID=7& afrLoop=594094413180180& afrWindowMode=0& afrWindowId=eyyp9flsbx_1#!%40%40%3F afrWindowId%3Deyyp9flsbx_1%26 afrLoop%3D594094413180180%26MBI_ID%3D7%26 afrWindowMode%3D0%26 a df.ctrl-state%3Deyyp9flsbx_57](https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=7& afrLoop=594094413180180& afrWindowMode=0& afrWindowId=eyyp9flsbx_1#!%40%40%3F afrWindowId%3Deyyp9flsbx_1%26 afrLoop%3D594094413180180%26MBI_ID%3D7%26 afrWindowMode%3D0%26 a df.ctrl-state%3Deyyp9flsbx_57)
- OIT. (2016b). Labour force survey (LFS). Consultado el 13-03-2016, recuperado de: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=7& afrLoop=594094413180180& afrWindowMode=0& afrWindowId=eyyp9flsbx_1#!%40%40%3F afrWindowId%3Deyyp9flsbx_1%26 afrLoop%3D594094413180180%26MBI_ID%3D7%26 afrWindowMode%3D0%26 a df.ctrl-state%3Deyyp9flsbx_57
- Oja, P., Laukkanen, R., Pasanen, M., Tyry, T., y Vuori, I. (1991). A 2-km walking test for assessing the cardiorespiratory fitness of healthy adults. *International Journal of Sports Medicine*, 12(04), 356-362.
- Oja, P., Tuxworth, B., Alvarez, D. R., y Edo, M. (1998). *Eurofit para adultos: evaluación de la aptitud física en relación con la salud*: Ministerio de Educación y Cultura, España.
- OMS. (1997a). Declaración de Luxemburgo. *Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP)*.
- OMS. (1997b). Declaración de Luxemburgo sobre Promoción de la salud en el lugar de Trabajo. En *Documento técnico WHO*. Luxemburgo.
- OMS. (1998). Glosario. Ginebra: World Health Organization.
- OMS. (2001). *The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, new hope*. Ginebra: World Health Organization.
- OMS. (2010). Global recommendations on physical activity for health. Ginebra: World Health Organization.
- OMS. (2010b). *Entornos Laborales saludables: fundamentos y modelo de la OMS. Contextualización, prácticas y literatura de apoyo*. Washington: WHO. pp. 1-144.
- OMS. (2018). Datos y cifras. Datos sobre la obesidad (10). Organización Mundial de la Salud. Consultado el 14-10-2018, recuperado de: <https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/>
- Ortega y Gasset, J. (1966). El origen deportivo del Estado. *El Espectador*, 13, 60-80.
- Paris, F., Franco, A., y París, A. (2012). *Valoración socio-económica de un Programa de Actividad Física para los trabajadores de una empresa*. Madrid: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Pate, R. R., Pratt, M., Blair, S. N., Haskell, W. L., Macera, C. A., Bouchard, C., . . . Wilmore, J. H. (1995). Physical Activity and Public Health: A Recommendation From the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. *JAMA*, 273(5), 402-407. doi:10.1001/jama.1995.03520290054029
- Patten, S. B., Williams, J. V., y Wang, J. (2006). Mental disorders in a population sample with musculoskeletal disorders. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 7(1), 37. doi:10.1186/1471-2474-7-37

- Pedersen, B. K., y Saltin, B. (2015). Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 25(S3), 1-72. doi:10.1111/sms.12581
- Pelletier, K. R. (1993). A Review and Analysis of the Health and Cost-Effective Outcome Studies of Comprehensive Health Promotion and Disease Prevention Programs at the Worksite: 1991–1993 Update. *American Journal of Health Promotion*, 8(1), 50-62. doi:10.4278/0890-1171-8.1.50
- Pelletier, K. R. (1999). A Review and Analysis of the Clinical and Cost-Effectiveness Studies of Comprehensive Health Promotion and Disease Management Programs at the Worksite: 1995–1998 Update (IV). *American Journal of Health Promotion*, 13(6), 333-345. doi:10.4278/0890-1171-13.6.333
- Pelletier, K. R. (2001). A Review and Analysis of the Clinical- and Cost-Effectiveness Studies of Comprehensive Health Promotion and Disease Management Programs at the Worksite: 1998–2000 Update. *American Journal of Health Promotion*, 16(2), 107-116. doi:10.4278/0890-1171-16.2.107
- Pelletier, K. R. (2005). A review and analysis of the clinical and cost-effectiveness studies of comprehensive health promotion and disease management programs at the worksite: update VI 2000–2004. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 47(10), 1051-1058.
- Peltola, H. (2000). Worldwide Haemophilus influenzae type b disease at the beginning of the 21st century: global analysis of the disease burden 25 years after the use of the polysaccharide vaccine and a decade after the advent of conjugates. *Clinical Microbiology Reviews*, 13(2), 302-317.
- Peralta, N., Godoi Vasconcelos, A. G., Härter Griep, R., y Miller, L. (2012). Validity and reliability of the Work Ability Index in primary care workers in Argentina. *Salud Colectiva*, 8(2), 163-173.
- Peretti, J.-M. (1987). *Gestion des ressources humaines*. Paris: Librairie Vuibert Gestion.
- Pérez Bernat, S. (2014). *Estudio de incumplimientos sobre prevención de riesgos laborales en centros fijos de trabajo*. Trabajo Fin de Máster. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Universitat Jaume I.
- Pérez Bustamante, R. (2012). Del bilateralismo a la Comunidad Europea (1950-1993). *Mediterráneo Económico*, 22, 215-223.
- Pérez, D. C., Segura, J. & Mainat, A. (2005). Estudio de preparación física profesional de los Ingenieros de Minas. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 80, 15.
- Perrucci, C. C., y Banerjee, D. (2010). Job satisfaction: Impact of gender, race, worker qualifications, and work context. En *Gender and Sexuality in the Workplace* (pp. 39-58).
- Petruzzello, S. J., Landers, D. M., Hatfield, B. D., Kubitz, K. A., y Salazar, W. (1991). A Meta-Analysis on the Anxiety-Reducing Effects of Acute and Chronic Exercise. *Sports Medicine*, 11(3), 143-182. doi:10.2165/00007256-199111030-00002
- Pietsch, M. (1963). *La révolution industrielle: de la machine à vapeur à l'automation et à la fission de l'atome*. Paris: Petite Bibliothèque Payot.

- Pohjonen, T., y Ranta, R. (2001). Effects of Worksite Physical Exercise Intervention on Physical Fitness, Perceived Health Status, and Work Ability among Home Care Workers: Five-Year Follow-up. *Preventive Medicine*, 32(6), 465-475. doi:10.1006/pmed.2001.0837
- Porwoll, P. J. (1980). *Employee absenteeism: A summary of research*. Arlington: Educational Research Service.
- Potts, J. M., y O'Dougherty, E. (2000). Pelvic floor physical therapy for patients with prostatitis. *Current Urology Reports*, 1(2), 155-158. doi:10.1007/s11934-000-0051-z
- Powell, K. E., Thompson, P. D., Caspersen, C. J., y Kendrick, J. S. (1987). Physical activity and the incidence of coronary heart disease. *Annual Review of Public Health*, 8, 253-287. doi:10.1146/annurev.pu.08.050187.001345
- Prada, R. A. C. (2005). Valoración fisiológica de un programa de actividad física en adultos. *Archivos de Medicina del Deporte* 22 (105): 9-18
- Prince, S., Saunders, T., Gresty, K., y Reid, R. (2014). A comparison of the effectiveness of physical activity and sedentary behaviour interventions in reducing sedentary time in adults: a systematic review and meta-analysis of controlled trials. *Obesity Reviews*, 15(11), 905-919.
- Prins, R. (2013). Sickness absence and disability: an international perspective. En *Handbook of Work Disability* (pp. 3-14): Berlín: Springer.
- Promonet Comunicaciones. (2018). Cómo clasificar los puestos de trabajo. Barcelona: Promonet. Consultado el 18-09-2018, recuperado de: <https://www.gestion.org/como-clasificar-los-puestos-de-trabajo/>
- Pronk, N. (2009a). ACSM's Worksite health handbook: a guide to building healthy and productive companies. *ACSM's Health & Fitness Journal*, 13(3), 42-45.
- Pronk, N. (2009b). Population Health Management at the Worksite. En N. P. Pronk (Ed.), *ACSM's worksite health handbook: a guide to building healthy and productive companies* (pp. 2-9). United States: Human Kinetics.
- Proper, K. I., de Bruyne, M. C., Hildebrandt, V. H., van der Beek, A. J., Meerding, W. J., y van Mechelen, W. (2004). Costs, benefits and effectiveness of worksite physical activity counseling from the employer's perspective. *Scandinavian Journal of Work Environment & Health*, 30(1), 36-46.
- Proper, K. I., Koning, M., van der Beek, A. J., Hildebrandt, V. H., Bosscher, R. J., y van Mechelen, W. (2003). The effectiveness of worksite physical activity programs on physical activity, physical fitness, and health. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 13(2), 106-117. doi:PMID: 12629429
- Proper, K. I., Singh, A. S., Van Mechelen, W., y Chinapaw, M. J. (2011). Sedentary behaviors and health outcomes among adults: a systematic review of prospective studies. *American Journal of Preventive Medicine*, 40(2), 174-182.
- Proper, K. I., Staal, B. J., Hildebrandt, V. H., van der Beek, A. J., y van Mechelen, W. (2002). Effectiveness of physical activity programs at worksites with respect to

- work-related outcomes. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 28(2), 75-84.
- Puig-Ribera, A., McKenna, J., Gilson, N., y Brown, W. J. (2008). Change in work day step counts, wellbeing and job performance in Catalan university employees: a randomised controlled trial. *Promotion and Education*, 15(4), 11-16. doi:10.1177/1025382308097693
- Puig, N., y Martínez del Castillo, J. (1985). Evolución de las campañas de Deporte para Todos en España (1968-1983). Ensayo para poder valorar su influencia en la práctica deportiva de los españoles. *Revista de Investigación y Documentación sobre las Ciencias de la Educación Física y el Deporte*, 1(2), 59-104.
- Puig, T., Ferrero-Gregori, A., Roig, E., Vazquez, R., Gonzalez-Juanatey, J. R., Pascual-Figal, D., . . . Mendez, A. (2014). Valor pronóstico del índice de masa corporal y el perímetro de cintura en los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica (Registro Español REDINSCOR). *Revista Española de Cardiología*, 67(2), 101-106.
- Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., y Plamondon, K. E. (2000). Adaptability in the workplace: Development of a taxonomy of adaptive performance. *Journal of Applied Psychology*, 85(4), 612.
- Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. *Applied Psychological Measurement*, 1(3), 385-401.
- Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, 25 de agosto de 1978, núm. 203, pp. 19909 a 19916.
- Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado, 29 de marzo de 1995, núm. 75, pp. 9654 a 9688.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 1997, núm. 97, pp. 12918 a 12926.
- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. Boletín Oficial del Estado, 19 de diciembre de 2006, núm. 302, pp. 44487 a 44546.
- Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. Boletín Oficial del Estado, 20 de noviembre de 2008, núm. 280, pp. 46185 a 46320.
- Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado, 24 de octubre de 2015, núm. 255, pp. 100224 a 100308.

- Recio, A., y Banyuls, J. (2011). Crisis y modelos nacionales de empleo: la experiencia de diez países europeos en la crisis. *Revista de Economía Crítica*, 11, 173-184.
- Reijonsaari, K., Vehtari, A., Kahilakoski, O. P., van Mechelen, W., Aro, T., y Taimela, S. (2012). The effectiveness of physical activity monitoring and distance counseling in an occupational setting - results from a randomized controlled trial (CoAct). *BMC Public Health*, 12, 344. doi:10.1186/1471-2458-12-344
- Reijonsaari, K., Vehtari, A., van Mechelen, W., Aro, T., y Taimela, S. (2009). The effectiveness of physical activity monitoring and distance counselling in an occupational health setting--a research protocol for a randomised controlled trial (CoAct). *BMC Public Health*, 9, 494. doi:10.1186/1471-2458-9-494
- Reimann, B. C. (1974). Dimensions of Structure in Effective Organizations: Some Empirical Evidence. *Academy of Management Journal*, 17(4), 693-708. doi:10.5465/255647
- Reme, S. E., Tangen, T., Moe, T., y Eriksen, H. R. (2011). Prevalence of psychiatric disorders in sick listed chronic low back pain patients. *European Journal of Pain*, 15(10), 1075-1080.
- Renaud, L., Kishchuk, N., Juneau, M., Nigam, A., Tétreault, K., y Leblanc, M.-C. (2008). Implementation and Outcomes of a Comprehensive Worksite Health Promotion Program. *Canadian Journal of Public Health*, 99(1), 73-77. doi:10.1007/bf03403746
- Renee Baptiste, N. (2008). Tightening the link between employee wellbeing at work and performance: A new dimension for HRM. *Management Decision*, 46(2), 284-309. doi:10.1108/00251740810854168
- Rensi, G. (1923). *L'irrazionale il lavoro l'amore*. Milano: Società Editrice "Unitas".
- Reyero, J. (2015). Empresas activas, empresas sanas. Beneficios de la actividad física en el entorno laboral. Madrid: CEOE.
- Rich, N., Bateman, N., Esain, A., Massey, L., y Samuel, D. (2006). *Lean evolution: lessons from the workplace*: Cambridge University Press.
- Rieznik, P. (2001). Trabajo, una definición antropológica. *Razón y revolución*, 7, 1-21.
- Ritsila, J. J. (1999). Regional differences in environments for enterprises. *Entrepreneurship & Regional Development*, 11(3), 187-202.
- Ritzer, G. (1989). Sociology of work: A metatheoretical analysis. *Social Forces*, 67(3), 593-604.
- Rivilis, I., Cole, D. C., Frazer, M. B., Kerr, M. S., Wells, R. P., y Ibrahim, S. (2006). Evaluation of a participatory ergonomic intervention aimed at improving musculoskeletal health. *American Journal of Industrial Medicine*, 49(10), 801-810. doi:10.1002/ajim.20382
- Robbins, S. P., Coulter, M., Staines, M. O., y Hernández, J. O. J. (1996). *Administración*: Prentice-Hall Hispanoamericana Naucalpan de Juárez. México: Ed. de México.

- Roberts, R. O., Lieber, M. M., Bostwick, D. G., y Jacobsen, S. J. (1997). A review of clinical and pathological prostatitis syndromes. *Urology*, 49(6), 809-821. doi: 10.1016/S0090-4295(97)00235-5
- Robertson, B. A., Barker, P. J., Fahrner, M., y Schache, A. G. (2009). The Anatomy of the Pubic Region Revisited. *Sports Medicine*, 39(3), 225-234. doi:10.2165/00007256-200939030-00004
- Robroek, S. J., Polinder, S., Bredt, F. J., y Burdorf, A. (2012). Cost-effectiveness of a long-term Internet-delivered worksite health promotion programme on physical activity and nutrition: a cluster randomized controlled trial. *Health Education Research*, 27(3), 399-410. doi:10.1093/her/cys015
- Rodríguez-López, M., Baluja-Conde, I., y Bermúdez-Velásquez, S. (2007). Patologías benignas de la próstata: prostatitis e hiperplasia benigna. *Revista Biomédica*, 18(1), 13. doi:10.32776/revbiomed.v18i1.475
- Rodríguez Prada, G. (2004). Productividad y utilización del trabajo: Europa versus Estados Unidos. *Boletín ICE Económico: Información Comercial Española*(2828), 71-83.
- Roessler, K. K., Rugulies, R., Bilberg, R., Andersen, L. L., Zebis, M. K., y Sjøgaard, G. (2013). Does work-site physical activity improve self-reported psychosocial workplace factors and job satisfaction? A randomized controlled intervention study. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 86(8), 861-864. doi:10.1007/s00420-012-0823-z
- Rojas-Carrasco, K. E. (2010). Validación del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado en padres con un hijo en terapia intensiva. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 48(5), 491-496.
- Rongen, A., Robroek, S. J., van Lenthe, F. J., y Burdorf, A. (2013). Workplace health promotion: a meta-analysis of effectiveness. *American Journal of Preventive Medicine*, 44(4), 406-415. doi:10.1016/j.amepre.2012.12.007.
- Rothman, K. J. (2000). Epidemiological evidence on health risks of cellular telephones. *The Lancet*, 356(9244), 1837-1840.
- Rudman, W. (1987). Do onsite health and fitness programs affect worker productivity. *Fitness in Business*, 2(1), 2-8.
- Ruiz-Grosso, P., de Mola, C. L., Vega-Dienstmaier, J. M., Arevalo, J. M., Chavez, K., Vilela, A., . . . Huapaya, J. (2012). Validation of the spanish center for epidemiological studies depression and zung self-rating depression scales: a comparative validation study. *Plos One*, 7(10), e45413.
- Sabour, S., Ghassemi, F., Eston, R., Bennett, H., Parfitt, G., y Davison, K. (2016). Submaximal Step Tests to Estimate Maximal Oxygen Uptake in Healthy Adults: Methodological Issues About Validity and Reliability/Author's Reply to Sabour and Ghassemi" Submaximal Step Tests to Estimate Maximal Oxygen Uptake in Healthy Adults: Methodological Issues About Validity and Reliability". *Sports Medicine*, 46(9), 1381.

- Sáinz, C. G. (1993). Revisión de conceptos de la encuesta de población activa. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 173-184.
- Salguero, A., Martínez-García, R., Molinero, O., y Márquez, S. (2011). Physical activity, quality of life and symptoms of depression in community-dwelling and institutionalized older adults. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 53(2), 152-157. doi:10.1016/j.archger.2010.10.005
- Sanchez-Toledo Ledesma, A. (2012). Modelo de empresa Saludable: Modelos de gestión responsable. Madrid: Aenor Ediciones.
- Sánchez, A. L. (2004). *La participación de los trabajadores en la democracia industrial* (Vol. 170). Madrid: Los libros de la Catarata.
- Santos, A. C., Bredemeier, M., Rosa, K. F., Amantéa, V. A., y Xavier, R. M. (2011). Impact on the Quality of Life of an Educational Program for the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders: a randomized controlled trial. *BMC Public Health*, 11(1), 60. doi:10.1186/1471-2458-11-60
- Scarpetta, S., Sonnet, A., y Manfredi, T. (2010). Rising youth unemployment during the crisis. *Documents de travail de l'OCDE sur les affaires sociales, l'emploi et les migrations*, 106.
- Schaeffer, A. (2008). Epidemiology and evaluation of chronic pelvic pain syndrome in men. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 31, 108-111.
- Scheller, M. (1997). *Lavoro ed etica*. Roma: Città Nuova.
- Schmier, J. K., Jones, M. L., y Halpern, M. T. (2006). Cost of obesity in the workplace. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 32(1), 5-11. doi:PMID: 16539166
- School, I. B. (2013). Productividad y empresa saludable. En (Madrid ed.): Universidad de Navarra.
- Schulte, P. A., Wagner, G. R., Ostry, A., Blanciforti, L. A., Cutlip, R. G., Krajnak, K. M., . . . Parks, C. G. (2007). Work, obesity, and occupational safety and health. *American Journal of Public Health*, 97(3), 428-436.
- Selye, H. (1956). *The stress of life*. New York: McGraw-Hill.
- Sen, A. (2002). Health: perception versus observation: self reported morbidity has severe limitations and can be extremely misleading. London: British Medical Journal Publishing Group.
- Serdà Ferrer, B.-C., Monreal i Bosch, P., y Valle Gómez, A. d. (2011). Calidad de vida y cáncer de próstata: un programa progresivo de fuerza-resistencia= Quality of life and prostate cancer: a progressive resistance strength program. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 2011, vol. 11, núm. 42, p. 362-383.
- Shain, M., y Kramer, D. (2004). Health promotion in the workplace: framing the concept; reviewing the evidence. *Occupational and Environmental Medicine*, 61(7), 643-648.

- Shephard, R. J. (1995). Worksite Health Promotion and Productivity. En R. L. Kaman (Ed.), *Worksite health promotion economics: Consensus and analysis* (pp. 1-19): United States: Human Kinetics.
- Shephard, R. J. (1996). Worksite Fitness and Exercise Programs: A Review of Methodology and Health Impact. *American Journal of Health Promotion*, 10(6), 436-452. doi:10.4278/0890-1171-10.6.436
- Shephard, R. J., Vandewalle, H., Bouhlef, E., y Monod, H. (1988). Sex differences of physical working capacity in normoxia and hypoxia. *Ergonomics*, 31(8), 1177-1192. doi:10.1080/00140138808966756
- Shikdar, A. A., y Sawaqed, N. M. (2003). Worker productivity, and occupational health and safety issues in selected industries. *Computers & Industrial Engineering*, 45(4), 563-572. doi: 10.1016/S0360-8352(03)00074-3
- Sliter, K. A., Sinclair, R., Cheung, J., y McFadden, A. (2014). Initial evidence for the buffering effect of physical activity on the relationship between workplace stressors and individual outcomes. *International Journal of Stress Management*, 21(4), 348-360. doi:10.1037/a0038110
- Sloan, R. P., y Gruman, J. C. (1988). Participation in Workplace Health Promotion Programs: The Contribution of Health and Organizational Factors. *Health Education Quarterly*, 15(3), 269-288. doi:10.1177/109019818801500303
- Smeds, R. (1994). Managing Change towards Lean Enterprises. *International Journal of Operations & Production Management*, 14(3), 66-82. doi:10.1108/01443579410058531
- Smith, P. C., Kendall, L. M., & Hulin, C. L. (1969). *The measurement of satisfaction in work and retirement: A strategy for the study of attitudes*. Oxford, England: Rand McNally.
- Soler, J., Perez-Sola, V., Puigdemont, D., Perez-Blanco, J., Figueres, M., y Alvarez, E. (1997). Validation study of the Center for Epidemiological Studies-Depression of a Spanish population of patients with affective disorders. *Actas luso-espanolas de neurologia, psiquiatria y ciencias afines*, 25(4), 243-249.
- Sorensen, G., y Quintiliani, L. (2009). Effective Programs to Promote Worker Health Within Healthy and Safe Worksites. En N. P. Pronk (Ed.), *ACSM's worksite health handbook: a guide to building healthy and productive companies* (pp. 259-276). United States: Human Kinetics.
- Speck, R. M., Courneya, K. S., Masse, L. C., Duval, S., y Schmitz, K. H. (2010). An update of controlled physical activity trials in cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Cancer Survivorship*, 4(2), 87-100. doi:10.1007/s11764-009-0110-5
- Spielberger, C. D. (2013). *Anxiety and behavior*. New York: Academic Press.
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R., y Lushene, R. (1970). *Stai. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Self Evaluation Questionnaire)*. Palo Alto California: Consulting Psychologist, 22, 1-24.

- Sports Tracking Technologies. (2014). Sports Trakker (Versión 2014) [Aplicación Móvil]. Descargado de:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caynax.sportstracker>
- Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra.
- St Sauver, J. L., Jacobsen, S. J., Jacobson, D. J., McGree, M. E., Girman, C. J., Nehra, A., . . . Lieber, M. M. (2011). Statin use and decreased risk of benign prostatic enlargement and lower urinary tract symptoms. *BJU International*, 107(3), 443-450. doi:10.1111/j.1464-410X.2010.09598.x
- Steinhardt, M., Greenhow, L., y Stewart, J. (1991). The Relationship of Physical Activity and Cardiovascular Fitness to Absenteeism and Medical Care Claims among Law Enforcement Officers. *American Journal of Health Promotion*, 5(6), 455-460. doi:10.4278/0890-1171-5.6.455
- Steinhardt, M. A., Dolbier, C. L., Gottlieb, N. H., y McCalister, K. T. (2003). The Relationship between Hardiness, Supervisor Support, Group Cohesion, and Job Stress as Predictors of Job Satisfaction. *American Journal of Health Promotion*, 17(6), 382-389. doi:10.4278/0890-1171-17.6.382
- Steyerl, H. (2017). *Arte Duty Free: El arte en la era de la guerra civil planetaria*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Strasser, B., y Burtcher, M. (2018). Survival of the fittest: VO2max, a key predictor of longevity. *Frontiers in Bioscience*, 23, 1505-1516.
- Strawbridge, W. J., Deleger, S., Roberts, R. E., y Kaplan, G. A. (2002). Physical activity reduces the risk of subsequent depression for older adults. *American Journal of Epidemiology*, 156(4), 328-334.
- Strijk, J. E., Proper, K. I., van der Beek, A. J., y van Mechelen, W. (2012). A worksite vitality intervention to improve older workers' lifestyle and vitality-related outcomes: results of a randomised controlled trial. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 66(11), 1071-1078. doi:10.1136/jech-2011-200626
- Strijk, J. E., Proper, K. I., van Mechelen, W., y van der Beek, A. J. (2013). Effectiveness of a worksite lifestyle intervention on vitality, work engagement, productivity, and sick leave: results of a randomized controlled trial. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 39(1), 66-75. doi:10.5271/sjweh.3311
- Ströhle, A. (2009). Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders. *Journal of Neural Transmission*, 116(6), 777.
- Stroobants, M. (2005). Sociologie du travail: Domaines et approches. *Collection* 128, 41.
- Susskind, R. E., y Susskind, D. (2015). *The future of the professions: How technology will transform the work of human experts*. Oxford: Oxford University Press.
- Szell, N., Goldstein, S., Komisaruk, B., y Goldstein, I. (2016). 047 Review of the Evidence of the Female Prostate as a Functional Gland. *The Journal of Sexual Medicine*, 13(6), S259. doi:10.1016/j.jsxm.2016.04.046
- Tan, L., Wang, M.-J., Modini, M., Joyce, S., Mykletun, A., Christensen, H., y Harvey, S. B. (2014). Preventing the development of depression at work: a systematic review

- and meta-analysis of universal interventions in the workplace. *BMC Medicine*, 12(1), 74. doi:10.1186/1741-7015-12-74
- Taylor-Gooby, P. (2001). *Welfare states under pressure*. London: Sage.
- Tetrick, L. E., y Winslow, C. J. (2015). Workplace stress management interventions and health promotion. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 2(1), 583-603. doi:10.1146/annurev-orgpsych-032414-111341
- Thiele, G. H. (1963). Coccygodynia: Cause and treatment. *Diseases of the Colon & Rectum*, 6(6), 422-436. doi:10.1007/bf02633479
- Thompson, W. R. (2018). Worldwide Survey of Fitness Trends for 2019. *ACSM's Health & Fitness Journal*, 22(6), 10-17. doi:10.1249/fit.0000000000000438
- Tilgher, A. (1931). *Work: What it has meant to men through the ages*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Todaro, R., y Yáñez, S. (2004). *El trabajo se transforma*. Santiago de Chile: Centro de Estudios de la Mujer.
- Toker, S., y Biron, M. (2012). Job burnout and depression: Unraveling their temporal relationship and considering the role of physical activity. *Journal of applied psychology*, 97(3), 699.
- Torcal, M., y Magalhaes, P. (2010). *La ciudadanía europea en el Siglo XXI*. Madrid: CIS.
- Tripp, D., Crawford, A., y Nickel, J. (2017). *Quality of life and relationships in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: models of self-regulation and psychosocial risk factors*. Duesseldorf: German Medical Science GMS Publishing House: Urogenital Infections and Inflammations.
- Tsutsumi, A., Nagami, M., Yoshikawa, T., Kogi, K., y Kawakami, N. (2009). Participatory Intervention for Workplace Improvements on Mental Health and Job Performance Among Blue-Collar Workers: A Cluster Randomized Controlled Trial. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 51(5), 554-563. doi:10.1097/JOM.0b013e3181a24d28
- Tucker, L. A., Aldana, S. G., y Friedman, G. M. (1990). Cardiovascular Fitness and Absenteeism in 8,301 Employed Adults. *American Journal of Health Promotion*, 5(2), 140-145. doi:10.4278/0890-1171-5.2.140
- Tuomi, K., Ilmarinen, J., Jahkola, A., Katajarinne, L., y Tulkki, A. (1994). *Work ability index*: Institute of Occupational Health Helsinki. *Occupational Health Care*, 19.
- Tveito, T. H., y Eriksen, H. R. (2009). Integrated health programme: a workplace randomized controlled trial. *Journal of Advanced Nursing*, 65(1), 110-119. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04846.x
- Unión Europea. (1992). *Tratado de la Unión Europea*. Luxemburgo: OPOCE.
- van Beek, J. H., Kirkwood, T. B., y Basingthwaight, J. B. (2016). Understanding the physiology of the ageing individual: computational modelling of changes in metabolism and endurance. *Interface Focus*, 6(2), 20150079. doi:10.1098/rsfs.2015.0079

- van den Berg, T., Elders, L., de Zwart, B., y Burdorf, A. (2008). The effects of work-related and individual factors on the Work Ability Index: a systematic review. *Occupational and Environmental Medicine*, 25-28.
- van der Voordt, T. J. M. (2004). Productivity and employee satisfaction in flexible workplaces. *Journal of Corporate Real Estate*, 6(2), 133-148. doi:10.1108/14630010410812306
- Van Roijen, L., Essink-Bot, M.-L., Koopmanschap, M. A., Bonsel, G., y Rutten, F. F. (1996). Labor and health status in economic evaluation of health care: The Health and Labor Questionnaire. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 12(3), 405-415.
- Varekamp, I., Verbeek, J. H., de Boer, A., y van Dijk, F. J. H. (2011). Effect of job maintenance training program for employees with chronic disease - a randomized controlled trial on self-efficacy, job satisfaction, and fatigue. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 37(4), 288-297. doi:10.5271/sjweh.3149
- Varo, J. C., Martínez, J. H., y Martinez-Gonzalez, M. (2003). Benefits of physical activity and harms of inactivity. *Medicina Clínica*, 121(17), 665-672.
- Veiga, F., Fernández, R., Malfeito, J., y Casiano, L. (2006). Tratado de Geriátría para residentes. En G. Abellán, P. Abizanda, & C. Alastuey (Eds.), *Hiperplasia benigna de próstata*. Madrid-España: Sociedad Española de Geriátría y Gerontología (SEGG).
- Vela Navarrete, R., González Enguita, C., García Cardoso, J. V., Manzarbeitia, G., y Soriano García, F. (2007). Prostatitis crónica: una revisión crítica de su actual definición nosológica, clasificación y potencial carcinogénesis. *Archivos Españoles de Urología*, 60(6), 617-623.
- Verhagen, A. P., de Vet, H. C., de Bie, R. A., Kessels, A. G., Boers, M., Bouter, L. M., y Knipschild, P. G. (1998). The Delphi list: a criteria list for quality assessment of randomized clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. *Journal of Clinical Epidemiology*, 51(12), 1235-1241.
- Vicari, E., La Vignera, S., Castiglione, R., Condorelli, R. A., Vicari, L. O., y Calogero, A. E. (2014). Chronic bacterial prostatitis and irritable bowel syndrome: effectiveness of treatment with rifaximin followed by the probiotic VSL#3. *Asian Journal of Andrology*, 16(5), 735-739. doi:10.4103/1008-682X.131064
- Villar, M. F. (2014). Riesgos de trastornos musculoesqueléticos en la población laboral española. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
- Vithayathawornwong, S., Danko, S., y Tolbert, P. (2003). The role of the physical environment in supporting organizational creativity. *Journal of Interior Design*, 29(1-2), 1-16.
- von Thiele Schwarz, U., Lindfors, P., y Lundberg, U. (2008). Health-related effects of worksite interventions involving physical exercise and reduced workhours. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 179-188.

- Wang, X., Armstrong, M., Cairns, B., Key, T., y Travis, R. (2011). Shift work and chronic disease: the epidemiological evidence. *Occupational Medicine*, 61(2), 78-89.
- Wang, Y., Chen, C., Zhu, C., Chen, L., Han, Q., y Ye, H. (2016). Social Determinants of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome Related Lifestyle and Behaviors among Urban Men in China: A Case-Control Study. *BioMed Research International*, 2016.
- Wang, Y. T., Taylor, L., Pearl, M., y Chang, L.-S. (2004). Effects of Tai Chi exercise on physical and mental health of college students. *The American Journal of Chinese Medicine*, 32(03), 453-459.
- Ware, J. E., Kosinski, M., y Keller, S. (1996). A 12-Item Short-Form Health Survey: Construction of Scales and Preliminary Tests of Reliability and Validity. *Medical Care*, 34(3), 220-233.
- Ware Jr, J., y Sherbourne, C. (1992). The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. *Medical Care*, 30(6), 473-483.
- Watson, T. (2011). *Sociology, work and organisation*. London: Routledge.
- Wattles, M. G., y Harris, C. (2003). The relationship between fitness levels and employee's perceived productivity, job satisfaction and absenteeism *Journal of Exercise Physiology Online*, 6(1).
- Weber, M. (2009). *The theory of social and economic organization*. New York: Simon and Schuster.
- Weber, M. (2014). *Economía y sociedad*. Tubinga: Fondo de cultura económica.
- Wells, K. F., y Dillon, E. K. (1952). The sit and reach—a test of back and leg flexibility. *Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation*, 23(1), 115-118.
- Wendel-Vos, G. C., Schuit, A. J., Saris, W. H., y Kromhout, D. (2003). Reproducibility and relative validity of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity. *Journal of Clinical Epidemiology*, 56(12), 1163-1169. doi:10.1016/S0895-4356(03)00220-8
- Whitmer, R. (2009). Employee Health Promotion: A Historical Perspective. En N. Pronk (Ed.), *ACSM's worksite health handbook: a guide to building healthy and productive companies*. (pp. 10-20). United States: Human Kinetics.
- Wilbur, C. S. (1983). The Johnson & Johnson program. *Preventive Medicine*, 12(5), 672-681. doi:10.1016/0091-7435(83)90225-6
- Wilson, D. B., y Lipsey, M. (2001). Practical meta-analysis. *Оригинал презен тацуи (см. <http://www.mason.gmu.edu/>)*.
- Winslow Taylor, F., y Palazón, B. (1973). *Principios de la administración científica*. México: Herrero Hermanos.
- Wittchen, H.-U., Jacobi, F., Rehm, J., Gustavsson, A., Svensson, M., Jönsson, B., . . . Faravelli, C. (2011). The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. *European Neuropsychopharmacology*, 21(9), 655-679.

- Womack, J. (2006). *Working power over production: labor history, industrial work, economics, sociology, and strategic position*. Paper presented at the International Economic History Association, XIV International Economic History Congress.
- Wright, J., Swiontkowski, M., y Heckman, J. (2011). Introducing levels of evidence to the journal. *Orthopedic Trauma Directions*, 9(04), 27-28. doi:10.1055/s-0030-1267124
- Wynn, M. (2015). Organising freelancers: a hard case or a new opportunity? *The Handbook of Research on Freelancing and Self-Employment*, 93-103.
- Yohannes, A. M., Doherty, P., Bundy, C., y Yalfani, A. (2010). The long-term benefits of cardiac rehabilitation on depression, anxiety, physical activity and quality of life. *Journal of Clinical Nursing*, 19(19-20), 2806-2813. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03313.x
- Zhang, R., Chomistek, A. K., Dimitrakoff, J. D., Giovannucci, E. L., Willett, W. C., Rosner, B. A., y Wu, K. (2015). Physical activity and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 47(4), 757-764. doi:10.1249/mss.0000000000000472
- Zhang, R., Sutcliffe, S., Giovannucci, E., Willett, W. C., Platz, E. A., Rosner, B. A., . . . Wu, K. (2015). Lifestyle and Risk of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome in a Cohort of United States Male Health Professionals. *The Journal of Urology*, 194(5), 1295-1300. doi:10.1016/j.juro.2015.05.100
- Zhang, Z., Li, Z., Yu, Q., Wu, C., Lu, Z., Zhu, F., . . . Mo, Z. (2015). The prevalence of and risk factors for prostatitis-like symptoms and its relation to erectile dysfunction in Chinese men. *Andrology*, 3(6), 1119-1124. doi:10.1111/andr.12104

ANEXOS

11 ANEXOS

11.1 ANEXO 1: RESULTADOS DE LA ESCALA PEDro ESTUDIO 1

Referencia	PEDro													Conflicto de interés
	E	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL		
Reijoonsaari	s	s	s	s	-	-	-	s	s	s	s	8	No	
Mc Eachan	s	s	s	s	-	-	-	s	s	s	s	8	No	
Strik	s	s	s	s	-	-	-	-	s	s	s	7	No	
Jorgensen	s	s	s	s	-	s	s	s	s	s	s	10	No	
Proper	s	s	s	s	-	-	-	s	s	s	s	8	No	
Pohjonen	s	s	s	s	-	-	-	-	s	s	s	7	No	
Robroek	s	s	s	s	s	-	-	s	-	s	s	8	No	
Brox	s	s	s	s	s	-	s	-	s	s	s	9	No	
Tveito	s	s	s	s	s	s	-	-	s	s	s	9	No	
Eriksen	s	s	-	s	s	-	-	-	s	s	s	7	No	
Groenveld	s	s	-	s	-	-	-	s	s	s	s	7	No	
Kerr	s	s	s	s	s	-	-	-	-	s	s	7	No	
Von Thiele Schwarz	s	s	-	s	s	-	-	s	-	s	s	7	No	
Nurminen	s	s	s	s	-	-	-	s	s	s	s	8	No	
Dallat	s	s	s	s	-	-	-	-	s	s	s	7	No	
Andersen	s	s	s	s	-	-	-	s	s	s	s	8	No	
Tensen	s	s	s	s	-	-	-	s	-	s	s	7	No	
Strik	s	s	s	s	s	-	-	-	-	s	s	7	No	

11.2 ANEXO 2: ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS DEL ESTUDIO 1

Andersen, L. L., Sundstrup, E., Boysen, M., Jakobsen, M. D., Mortensen, O. S., y Persson, R. (2013). Cardiovascular health effects of internet-based encouragements to do daily workplace stair-walks: randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 15(6), e127. doi: 10.2196/jmir.2340

- Brox, J., & Frøystein, O. (2005). Health-related quality of life and sickness absence in community nursing home employees: randomized controlled trial of physical exercise. *Occupational Medicine*, 55(7), 558-563.
- Christensen, J. R., Overgaard, K., Carneiro, I. G., Holtermann, A., y Sogaard, K. (2012). Weight loss among female health care workers--a 1-year workplace based randomized controlled trial in the FINALE-health study. *Bmc Public Health*, 12, 625. doi: 10.1186/1471-2458-12-625
- Dallat, M. A. y. c. (2013). A lesson in business: cost-effectiveness analysis of a novel financial incentive intervention for increasing physical activity in the workplace. *Bmc Public Health*, 13, 953. doi: 10.1186/1471-2458-13-953
- Eriksen, H., Ihlebaek, C., Mikkelsen, A., Grønningsæter, H., Sandal, G., y Ursin, H. (2002). Improving subjective health at the worksite: a randomized controlled trial of stress management training, physical exercise and an integrated health programme. *Occupational Medicine*, 52(7), 383-391.
- Groeneveld, I. F., van Wier, M. F., Proper, K. I., Bosmans, J. E., van Mechelen, W., y van der Beek, A. J. (2011). Cost-effectiveness and cost-benefit of a lifestyle intervention for workers in the construction industry at risk for cardiovascular disease. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 53(6), 610-617.
- Jorgensen, M. B., Faber, A., Hansen, J. V., Holtermann, A., & Sogaard, K. (2011). Effects on musculoskeletal pain, work ability and sickness absence in a 1-year randomised controlled trial among cleaners. *Bmc Public Health*, 11, 11. doi: 10.1186/1471-2458-11-840
- Kerr, J. H., & Vos, M. C. H. (1993). Employee fitness programs, absenteeism and general well-being. *Work and Stress*, 7(2), 179-190. doi: 10.1080/02678379308257059
- McEachan, R. R., Lawton, R. J., Jackson, C., Conner, M., Meads, D. M., y West, R. M. (2011). Testing a workplace physical activity intervention: a cluster randomized controlled trial. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8, 29. doi: 10.1186/1479-5868-8-29
- Nurminen, E., Malmivaara, A., Ilmarinen, J., Ylostalo, P., Mutanen, P., Ahonen, G., y Aro, T. (2002). Effectiveness of a worksite exercise program with respect to perceived work ability and sick leaves among women with physical work. *Scandinavian Journal of Work Environment & Health*, 28(2), 85-93.
- Pohjonen, T., & Ranta, R. (2001). Effects of worksite physical exercise intervention on physical fitness, perceived health status, and work ability among home care workers: Five-year follow-up. *Preventive Medicine*, 32(6), 465-475. doi: 10.1006/pmed.2001.0837
- Proper, K. I., de Bruyne, M. C., Hildebrandt, V. H., van der Beek, A. J., Meerding, W. J., & van Mechelen, W. (2004). Costs, benefits and effectiveness of worksite physical activity counseling from the employer's perspective. *Scandinavian Journal of Work Environment & Health*, 30(1), 36-46.
- Reijonsaari, K., Vehtari, A., Kahilakoski, O. P., van Mechelen, W., Aro, T., y Taimela, S. (2012). The effectiveness of physical activity monitoring and distance counseling

- in an occupational setting - results from a randomized controlled trial (CoAct). *Bmc Public Health*, 12, 344. doi: 10.1186/1471-2458-12-344
- Robroek, S. J., Polinder, S., Bredt, F. J., y Burdorf, A. (2012). Cost-effectiveness of a long-term Internet-delivered worksite health promotion programme on physical activity and nutrition: a cluster randomized controlled trial. *Health Education Research*, 27(3), 399-410.
- Strijk, J. E., Proper, K. I., van der Beek, A. J., y van Mechelen, W. (2012). A worksite vitality intervention to improve older workers' lifestyle and vitality-related outcomes: results of a randomised controlled trial. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 66(11), 1071-1078. doi: 10.1136/jech-2011-200626
- Strijk, J. E., Proper, K. I., van Mechelen, W., y van der Beek, A. J. (2013). Effectiveness of a worksite lifestyle intervention on vitality, work engagement, productivity, and sick leave: results of a randomized controlled trial. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 39(1), 66-75. doi: 10.5271/sjweh.3311
- Tveito, T. H., y Eriksen, H. R. (2009). Integrated health programme: a workplace randomized controlled trial. *Journal of advanced nursing*, 65(1), 110-119.
- von Thiele Schwarz, U., Lindfors, P., y Lundberg, U. (2008). Health-related effects of worksite interventions involving physical exercise and reduced workhours. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 179-188.

11.3 ANEXO 3: GUÍA PARA PARTICIPANTES DE PRODET

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN EL CENTRO DE TRABAJO-PRODET
GUÍA DE EJERCICIO FÍSICO EN EL TRABAJO PARA PARTICIPANTES

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN EL CENTRO DE TRABAJO - PRODET

Guía de ejercicio físico en el trabajo para participantes

Investigador principal:

D. Víctor Jiménez Díaz-Benito

Investigador tutor:

Dr. Jesús Martínez del Castillo

Dra. María Isabel Barriopedro Moro

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN EL CENTRO DE TRABAJO-PRODET
GUÍA DE EJERCICIO FÍSICO EN EL TRABAJO PARA PARTICIPANTES

Índice

1. INDUMENTARIA.....	3
2. HORARIOS.....	3
3. SOBRE EL PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO	3
4. DESCRIPCIÓN Y DURACIÓN DEL PROGRAMA.....	3
5. DURACIÓN DE LAS SESIONES Y PERSONAL ENCARGADO.....	4
6. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN.....	4
7. SOBRE LA INGESTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ANTES Y DESPUÉS	4
8. FACTORES QUE INFLUYEN EN UNA CORRECTA HIDRATACIÓN.....	4
☒ Duración e intensidad del ejercicio físico.....	4
☒ Condiciones ambientales	4
☒ Características individuales	4
☒ Condición física.....	4
☒ Estado de hidratación	5
9. ESTRATEGIAS DE HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA	5
☒ Antes de la sesión.....	6
☒ Después de la sesión	6
PREGUNTAS FRECUENTES	6
REFERENCIAS DE INTERÉS	7

1. INDUMENTARIA

Se aconseja llevar ropa y calzado deportivo adecuados para participar en las sesiones. Los contenidos de las actividades a desarrollar en cada una de las sesiones implican trabajo de ejercicio físico funcional en la sala habilitada en el centro de trabajo. Asimismo, se recomienda utilizar atuendos cómodos y llevar una bolsa con ropa y productos para el aseo.

2. HORARIOS

- ☒ Grupo 1: lunes y miércoles de 13:45 a 14:30 horas
- ☒ Grupo 2: martes y jueves de 14:35 a 15:20 horas

3. SOBRE EL PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO

Lo primero de todo es comentar que si eres una persona sedentaria, tengas sobrepeso o no, es un factor de riesgo para tu salud. El primer objetivo que podemos marcarnos es, por tanto, dejar de serlo. Si hablamos de perder peso entran en juego muchos factores, la ingesta, la actividad física, los hábitos, otros componentes genéticos, el equilibrio entre ingesta y gasto etc., por lo que nosotros nos centraremos en la parte de actividad física. Aquellas personas que realizan actividad física con regularidad, aunque tengan sobrepeso, tendrán una mejor salud que una persona sedentaria que no realice actividad física con regularidad.

¿Cuántas veces a la semana y durante cuánto tiempo realizaremos ejercicio? Lo ideal es conseguir al menos llegar a las recomendaciones sobre Actividad Física y Salud publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que están consensuadas por la comunidad científica a nivel mundial. Estas recomendaciones dicen que para personas adultas deberían de realizar:

- ☒ Al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana o una combinación equivalente de las anteriores. Estas recomendaciones pueden alcanzarse sumando períodos de al menos 10 minutos seguidos cada uno.
- ☒ Realizar, al menos 2 días a la semana, actividades de fortalecimiento muscular y mejora de la masa ósea y actividades para mejorar la flexibilidad.

Como ves, hay que realizar actividad física "aeróbica", es decir, aquella que mueva grandes grupos musculares y también trabajar la fuerza, que permita mantener la masa muscular corporal.

4. DESCRIPCIÓN Y DURACIÓN DEL PROGRAMA

Descripción y características Ejercicio físico funcional en el centro de trabajo. Programación con sesiones de educación física y coaching para la mejora de la condición física y la adquisición de hábitos de vida saludables. El programa sigue las recomendaciones de la ACSM (150 minutos de ejercicio físico moderado a la semana).

Duración del programa: Del 5 de abril al 28 julio, 2 sesiones a la semana. 4 meses (a partir de la sexta semana se producen adaptaciones fisiológicas).

Estructura y programación: 2 sesiones en el centro de trabajo a la semana + 50 minutos de ejercicio fuera del trabajo (monitorización a través de diarios de actividad/acelerómetro).

5. DURACIÓN DE LAS SESIONES Y PERSONAL ENCARGADO

50 minutos dirigidos y supervisados por un profesional debidamente cualificado (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).

6. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN INTERVENCIÓN

Se precisa puntualidad para el comienzo de las sesiones; los participantes han de estar cambiados. Una vez están listos los participantes, dará comienzo la sesión bajo la siguiente estructura:

- ☒ Calentamiento (10 minutos)
- ☒ Parte principal (30 minutos)
- ☒ Vuelta a la calma (5-10 minutos)

7. SOBRE LA INGESTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ANTES Y DESPUÉS

La respuesta es sencilla: la hidratación es una cuestión de equilibrio. La práctica deportiva aumenta la pérdida de agua (y de electrolitos) en forma de sudor. Para compensar estas pérdidas debemos consumir suficiente agua (y electrolitos), ya sea en forma de líquidos o en forma de alimentos (no podemos olvidar que hay alimentos que contienen un gran porcentaje de agua como la fruta y las verduras, sopas, etc.). La sed no es un indicador fiable para la hidratación en el deporte, ya que cuando aparece ya se ha producido cierto grado de deshidratación. Además, el ejercicio retrasa la aparición de la sensación de sed.

Para personas con una actividad normal, no deportistas, existen unas recomendaciones generales diarias del agua que hay que tomar a partir de las bebidas (80% de la cantidad) y alimentos (20% de la cantidad), según la edad, estado fisiológico, nivel de actividad física y condiciones ambientales. Todo ello hace que las cantidades mínimas se vean incrementadas.

8. FACTORES QUE INFLUYEN EN UNA CORRECTA HIDRATACIÓN

☒ Duración e intensidad del ejercicio físico

Cuanto mayor es la intensidad y la duración del ejercicio mayor es la sudoración y por tanto mayor debe ser la ingesta de líquidos que necesitamos.

☒ Condiciones ambientales

La temperatura y humedad relativa del aire. A mayor temperatura y humedad, mayor es la necesidad de refrigeración del cuerpo y sudamos más para poder refrigerarnos. En un clima cálido y húmedo es más fácil que podamos deshidratarnos. Por tanto, cuando más calor y más humedad más líquido debemos ingerir.

☒ Características individuales

No todos somos iguales, no todo el mundo responde de la misma manera al ejercicio. No esperes a que tu compañero/a tenga sed para beber tú, o si no te encuentras bien no permanezcas en la sala aunque tu compañero/a lo haga.

☒ Condición física

Si estás bien entrenado toleras mejor la práctica deportiva en un ambiente caluroso. Cada uno debe de seguir el programa de ejercicio de acuerdo con sus posibilidades.

☒ Estado de hidratación

Un estado de hidratación adecuado favorece que el cuerpo ponga en marcha el mecanismo de la sudoración adecuadamente, es decir: ¡ya hay que estar correctamente hidratado antes de empezar a entrenar!

9. ESTRATEGIAS DE HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Es importante preparar la estrategia de hidratación y alimentación para las sesiones (Tabla 1):

Tabla 1. Pautas para la hidratación durante el programa PRODET

PAUTAS PARA LA HIDRATACIÓN DURANTE EL PROGRAMA PRODET			
Indicador	Antes de la sesión	Durante la sesión	Después de la sesión
Objetivo	Partir de un nivel de hidratación adecuado	Prevenir la deshidratación	Reponer líquidos y electrolitos perdidos por la orina y el sudor
Tipo de bebida	Agua + alimentos, bebida con contenido en sodio	Bebida para deportistas	Agua + alimentos o bebida para deportistas
Sabor	Un sabor agradable favorece la hidratación voluntaria y la rehidratación		
Temperatura	15°C - 21°C	10°C - 15°C	15°C - 21°C
Estrategia de hidratación	<ul style="list-style-type: none"> • 4 horas antes de la prueba, beber entre 5 y 7 ml/kg de peso corporal • 30 - 60 min antes del calentamiento beber 300 - 400 ml 	Beber entre 400 - 800 ml/hora a intervalos cortos de tiempo. Por ejemplo, 100 ml/15 min a partir del minuto 15 - 20 (Dependiendo de las condiciones ambientales las recomendaciones pueden ser mayores)	Beber 1,5 litros de líquido por cada kilo de peso perdido

*(Adaptado de Pedrero Chamizo, R. et al. 2008; ACSM, 2007)

De igual modo también es importante diseñar una adecuada dieta durante el programa

La alimentación del participante es similar a la establecida para toda la población, aunque con ligeros matices. De una manera gráfica e intuitiva se ha representado en forma de pirámide (Figura 1), lo que supone una adaptación de la pirámide nutricional de la población general a las necesidades específicas que conlleva la práctica físico-deportiva (González-Gross Marcela, Gutiérrez Angel, Mesa José Luis, Ruiz-Ruiz Jonatan, Castillo Manuel J, 2001).

Figura 1. Pirámide nutricional adaptada a las características de la población deportista

☒ Antes de la sesión

Si el ejercicio se desarrolla en menos de 60 minutos, no es necesario dar ningún aporte específico de carbohidratos. No obstante, la ingesta de 300-500 ml de bebida con una concentración de carbohidratos del 6-10%, cada 15 min y a una temperatura de 8-12 °C puede ayudar a preservar el glucógeno muscular y equilibrar la pérdida de fluido corporal. Hasta 60 minutos antes del comienzo de la sesión, no se recomienda ingerir grasas, proteínas y fibra. Se recomienda comer después de la sesión. Antes, es posible tomar algo de líquido y una fruta (plátano, por ejemplo).

☒ Después de la sesión

Durante las primeras horas, se deben ingerir comidas con un 70-80% de hidratos de carbono, para evitar ingerir muchas proteínas, fibras y grasas. Hay que tener presente que tras realizar un esfuerzo físico exhaustivo, es normal que el deportista no esté hambriento, prefiriendo ingerir líquidos antes que comidas sólidas. Hasta los 90 minutos posteriores se recomienda ingerir Glucosa, sacarosa, polímeros de glucosa, pasta, plátano, así como alimentos ricos en agua y bebidas. El consumo de proteínas es prescindible y la ingesta de grasas no es recomendable.

PREGUNTAS FRECUENTES

A fin de atender a las dudas que puedan surgir, se ha habilitado un buzón de preguntas frecuentes en las siguientes direcciones:

- ☒ victorjimenezdb@gmail.com
- ☒ vjdiaz-benito@ucjc.edu

REFERENCIAS DE INTERÉS

- ☒ American College of Sport Medicine. Manual de consulta para el control y la prescripción del ejercicio. Editorial Paidotribo, 2008.
- ☒ González-Gross Marcela, Gutiérrez Angel, Mesa José Luis, Ruiz-Ruiz Jonatan, Castillo Manuel J. La nutrición en la práctica deportiva: Adaptación de la pirámide nutricional a las características de la dieta del deportista. ALAN [revista en la Internet]. 2001 Dic [citado 2014 Abr 04] ; 51(4): 321-331. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222001000400001&lng=es.
- ☒ Shirreffs SM. Hydration in sport and exercise: water, sports drinks and other drinks. Review by British Nutrition Foundation, Nutrition Bulletin, 2009;34:374-379.

11.4 ANEXO 4: PROPIEDADES DEL ESPACIO

El espacio fue no convencional. La sala tuvo una superficie de 120 m² de acuerdo con las recomendaciones de espacio de ocupación de 1,5 m² por usuario (Martínez del Castillo et al., 1993). La sala se encontraba ubicada en la cuarta planta del edificio y poseía dos ventanas al exterior. El suelo lo conformó un material sintético y había una columna en el centro de la sala. Las paredes estaban forradas de una tarima de madera en las zonas más altas estaban pintadas desde la construcción. En la parte de arriba había una nueva ventana que permitía, junto con las otras dos, el paso de luz natural. Las mesas de material se encontraban a la derecha del acceso principal. En las esquinas se conformó el aprovisionamiento de los equipamientos. La temperatura de la sala preservó unos valores medios de 18°C y una humedad aproximada del 60%. El horario en el que se realizó el programa fue habitualmente de 13:00 a 14:00 horas en días no consecutivos para los grupos.

Propiedades de la sala y equipamientos

Propiedades de los equipamientos utilizados

11.5 ANEXO 5: EJEMPLOS DE EJERCICIOS REALIZADOS ESTRUCTURA DE CARGAS DE PRODET

Calentamiento

Objetivo: Preparar a los participantes hacia la consecución de los objetivos de la parte principal de la sesión.

Contenidos principales: Ejercicios de activación y movilidad articular individual o en grupo, juegos motores y trabajo propioceptivo. Seguidamente, se realizaban ejercicios de estiramientos y ejercicios explosivos.

Duración: 10 minutos.

Representación gráfica de los ejercicios:

Ejercicios de movilidad articular extremidades superiores

Ejercicios de movilidad articular extremidades inferiores

Fuerza

Objetivo: Fortalecer la musculatura empleando de 2 a 4 series entre 8 y 10 ejercicios con una carga de 8 a 12 repeticiones por ejercicio.

Contenidos principales: Fuerza muscular específica sobre los miembros superiores e inferiores, control corporal, agilidad y reacción, trabajo de core, abdominales y fortalecimiento de zonas sensibles para puestos de trabajo en oficina.

Duración: Desarrollo habitual durante la parte principal de las sesiones (40 minutos).

Representación gráfica de los ejercicios:

Sentadilla con *fitball*, trabajo en estático

Fuerza específica miembros superiores e inferiores

Trabajo abdominal: plancha

Estiramientos y ejercicios de fortalecimiento

Trabajo abdominal: plancha

Fortalecimiento de extremidades inferiores y plancha

Ejercicios de fortalecimiento

Circuito funcional

Plancha abdominal

Capacidad aeróbica (fitness cardiorrespiratorio)

Objetivo: Desarrollar la condición física de los participantes empleando ejercicios individuales, circuitos combinados y juegos grupales.

Contenidos principales: Circuitos combinados, ejercicios grupales y juegos adaptados a las necesidades de cada participante, evaluado por el entrenador a través de entrevistas individuales. Las intensidades comprendieron entre el 35 y el 60 % de HRR.

Duración: Desarrollo habitual durante la parte principal de las sesiones (40 minutos).

Representación gráfica de los ejercicios:

Juegos grupales

Trabajo aeróbico por parejas

Circuito combinado

Flexibilidad

Objetivo: Elongar los músculos y tendones para readaptar la musculatura a la vuelta a la calma y la ocupación diaria del participante.

Contenidos principales: Ejercicios estáticos y dinámicos, individuales o por parejas que comprenden estiramientos de toda la musculatura empleada durante la parte principal de la sesión. Se realizaron de 2 a 4 repeticiones con una duración de 12 a 15 segundos por ejercicio.

Duración: En la fase de vuelta a la calma (10 minutos).

Representación gráfica de los ejercicios:

Estiramientos grupales miembros inferiores

Estiramientos miembros superiores e inferiores

Salud en la espalda

Objetivo: Trabajar la higiene postural de los empleados en prolongadas posiciones de sedestación.

Contenidos principales: Ejercicios posturales en silla, control y aptitud postural.

Duración: Durante la fase principal de la sesión, principalmente en el último mes.

Representación gráfica de los ejercicios:

Progresión de sentadilla con goma elástica

Síntesis general del programa:

INICIO

FUERZA: 3x15 (1' rec)

ZONAS SENSIBLES

SILLA

CIRCUITO COMBINADO

FUERZA MUSCULAR

JUEGOS GRUPALES

CIRCUITO
6 (4 x 10 rep)

FLEXIBILIDAD

FUERZA ESPECÍFICA
MMSS

El programa tuvo una frecuencia de 2 sesiones semanales con una duración que osciló entre los 50 y los 55 minutos cada una. El total de sesiones fue de 22 de acuerdo con el calendario de la empresa. Todos los participantes dieron su consentimiento para la utilización de imágenes con una finalidad éticamente científica (Art. 5 LOPD).

11.6 ANEXO 6: PROGRAMA DE FORMACIONES PRODET

Aitor Martín Merino (Nº Col 55261)

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, UPM-Máster Entrenamiento Personal, NSCA-CPT, CSCS

Víctor Jiménez Díaz Benito

Graduado y Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Doctorando en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

HIDRATACIÓN RELATIVA AL ENTRENAMIENTO

El agua, como bien se sabe, es un componente principal en la dieta de las personas tanto en el día a día como durante el ejercicio físico.

Es fundamental empezar la actividad física con unos niveles de hidratación adecuados. Para ello, es recomendable ingerir 0.5 litros de líquido 2 horas antes del entrenamiento. De esta forma, aseguramos unos niveles óptimos de hidratación con el suficiente tiempo para orinar el exceso de líquido.

Además, durante la actividad es necesario empezar a reponer las pérdidas antes de llegar a tener la sensación de sed. La mejor opción para entrenamientos que no superan la hora de duración es agua fría.

Por último, la reposición de líquidos continúa después de acabar el entrenamiento. Se estima que debe ingerirse alrededor de 0.5l de líquido por cada 0.45kg de peso perdido.

Para monitorizar esto puede usarse una báscula común y calcular la cantidad a ingerir. Si se ha producido una sudoración abundante durante la actividad es recomendable introducir líquidos que contengan cloruro de sodio (sal), de forma que se reduzca la producción de orina, acelerando la rehidratación y la recuperación de electrolitos en el medio celular.

"Para llevar a casa"	
☒	Medio litro de líquido 2 horas antes de entrenar
☒	Reponer con agua fría durante el entrenamiento. Con sudoración elevada son interesantes las bebidas energéticas
☒	Reponer 0.5l de líquido por cada 0.45kg de peso perdido e incluso más si se orina durante el proceso de rehidratación
☒	No basarse en la sensación de sed para beber

RECOMENDACIONES HIDRATACIÓN EN ADULTOS

Como puede observarse en la tabla que sigue, el porcentaje de agua en nuestro cuerpo fluctúa en función de la edad, el sexo, el ambiente, el nivel de actividad física, ejercicio, etc.

Tabla I. Agua corporal total (ACT) como porcentaje del peso total corporal en las diferentes edades y sexos.

Etapa vital	ACT en % del peso total (valor medio)
0 – 6 meses	74
6 meses – 1 año	60
1 – 2 años	60
Varones, 12 – 18 años	59
Mujeres, 12 – 18 años	56
Varones, 19 – 50 años	59
Mujeres, 19 – 50 años	50
Varones, 51 años y más	56
Mujeres, 51 años y más	47

• Fuente: Altman PL. 1961. *Blood and Other Body Fluids*. Washington, DC: Federation of American Societies for Experimental Biology.

Debe evitarse a toda costa que se produzca una deshidratación, ya que por mínima que sea, tendrá efectos agudos o crónicos en nuestra salud, dependiendo del grado de deshidratación alcanzado.

Parece ser que la sensación de sed aparece, si los mecanismos fisiológicos funcionan correctamente, con un 1% de pérdida de peso corporal debido a la deshidratación. Si la deshidratación alcanza el 2% de pérdida de peso corporal se reduce drásticamente la función y el rendimiento cognitivo y físico. Si este porcentaje sigue aumentando, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial se ve alterada. Una deshidratación superior al 4% es considerada como un grave factor de riesgo para la salud y si se alcanzan porcentajes de entre el 10-15% pueden provocar la muerte.

Por ello, es altamente recomendable seguir las directrices en cuanto a hidratación, de forma que se reponga debidamente las pérdidas de agua corporal sufridas a lo largo del día.

Es complicado establecer un estándar general de ingesta, ya que hay muchos factores que pueden influir. Aun así, se recomienda que hombres y mujeres adultos consuman alrededor de 3 y 2.2 litros de agua diaria. Esta ingesta se hace a través de agua pero también de alimentos sólidos o bebidas refrescantes.

Las necesidades de una mayor ingesta son necesarias en adultos mayores, embarazadas o en situaciones de aumento de fiebre, problemas digestivos, ambientes calurosos o tras ejercicio físico, como ya vimos en la Formación 1.

"Para llevarse a casa "
Consume entre 2.2-3 litros diarios de agua
La mejor opción es el agua mineral natural por su alto contenido en minerales y oligoelementos
Consumir progresivamente a lo largo del día
Acompañar cada ingesta alimenticia (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) con un vaso de agua
Aumentar las cantidades en situaciones de enfermedad, aumento de temperatura corporal, ejercicio físico, etc. Para casos particulares seguir recomendaciones específicas

EL SEDENTARISMO MATA

Afortunadamente, cada día somos más conscientes sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables que ayudan a mejorar la calidad de nuestra vida. Las sociedades avanzan y, con ello, la esperanza de vida se alarga, haciéndose necesaria esta preocupación para no pasar una gran cantidad de años incapacitados por nuestra salud.

Sin embargo, esto no es suficiente ya que según la pasada Encuesta Nacional de Salud, un gran porcentaje de los españoles (44%) se declara totalmente sedentario, mientras que de los que practican ejercicio el 33 y el 38% no llegan a alcanzar los mínimos recomendados o lo hacen de forma moderada. De hecho, en la última encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles publicada en 2015, se concluye que solamente el 53% de los españoles ha hecho deporte en el último año.

Por otro lado, los esfuerzos de la comunidad científica han revelado los fatales efectos del sedentarismo sobre la salud de las personas y la necesidad de cambiar esta tendencia.

Figure 2 UK CMOs' schematic representation of the dose-response relationship between physical activity level and risk of disease.

Buckley JP, et al. *Br J Sports Med* 2015;0:1-6. doi:10.1136/bjsports-2015-094618

Concretamente, los estudios han verificado que las personas que pasan la mayor parte del día sentadas, ya sea durante el trabajo, durante el tiempo libre o ambas, tienen el doble de riesgo de desarrollar diabetes tipo II y enfermedad cardíaca, aumentando también la incidencia de cáncer. Además, a partir de las 7 horas diarias sentado, aumenta un 5% el riesgo de muerte por cada hora adicional que se pase sentado.

Lo malo de este hecho es que el ejercicio físico, aunque conlleva grandes beneficios, no puede borrar los efectos de pasar tanto tiempo sentado. Esto quiere decir que el sedentarismo es un factor de riesgo por sí mismo, y aunque realices una hora de ejercicio al día, pasas las otras 23 horas inactivo. Por ello, es fundamental mantenerse lo más activo posible durante todo el día.

Para conseguir esto, algunas estrategias son interrumpir los largos intervalos que pasamos sentados en el trabajo, viendo la televisión o descansando. Las recomendaciones indican que son muy beneficiosos los parones cada 30-60 minutos para dar un pequeño paseo, subir escaleras, ir al baño o realizar algunos ejercicios de relajación o estiramiento.

Otras estrategias que también pueden hacerse es desplazarse activamente (bicicleta o andando), dejar de lado ascensores y escaleras mecánicas, aparcar un poco más lejos de tu destino o bajarte varias paradas antes si vas en transporte público, etc.

Todo suma y pequeños gestos diarios que podamos adquirir en forma de hábito nos ayudarán y mucho a mejorar nuestro bienestar.

RETO “No más sedentarismo”

Aprovechando la temática abordada en la anterior formación, voy a lanzaros un reto muy saludable que os va ayudar a reducir vuestras molestias recurrentes y que mejorará vuestros niveles de fatiga y cansancio mientras estéis trabajando.

Como ya sabéis, si rompemos con los largos intervalos inactivos cada 30-60 minutos para activarnos y movernos, nuestra salud lo agradecerá notablemente. Pero si además, utilizamos estos pequeños parones en nuestro trabajo para hacer 1-2 minutos de estiramiento o ejercicio, nuestras dolencias musculares se verán reducidas.

Por ello, os propongo 4 breves ejercicios que ya hemos practicado en las sesiones y que os llevará menos de 2 minutos realizar. Mi propuesta, y la que dictan las evidencias científicas hasta el momento, es que romper los intervalos sentado cada 30 minutos realizando este tipo de actividades mejorará las áreas que ya he mencionado.

Mi consejo es que, si queréis seguirlo, os coloquéis una alarma en el móvil o reloj para que cada 30-45’ os avise y os recuerde que tenéis que moveros, aunque sea durante 1’ para subir o bajar escaleras, ir a por agua, hacer los ejercicios o incluso realizar 15 de nuestras adoradas sentadillas.

En cuanto a los ejercicios, probablemente serán más efectivos si los realizáis 2-3 veces a lo largo del día, coincidiendo con estos pequeños descansos.

EJERCICIOS ESTIRAMIENTO DURANTE EL TRABAJO			
Ejercicio	Detalles	Ejercicio	Detalles
Inclinar suave y continuamente la cabeza lateralmente, manteniendo la posición 20’’ en cada sentido 3 repeticiones por lado		Encoger de forma continuada y con un movimiento suave los hombros. Deshacer el movimiento de la misma manera 10 repeticiones
Ejercicio	Detalles	Ejercicio	Detalles
Realizar el movimiento de sacar y encoge pecho, centrando el movimiento en los hombros y escápulas. Acompañar el movimiento con la respiración. 15 repeticiones		Desde la posición de retracción escapular, inclinar el tronco manteniendo la zona lumbar recta como en la imagen. Mantener la posición 20’’ 3 repeticiones por pierna

¡Probadlo y me contáis!

ENTRENAR LA FUERZA. ¿POR QUÉ?

Tradicionalmente, el entrenamiento de fuerza se ha considerado solamente apto para aquellos que quieren hacer crecer sus músculos y mejorar su apariencia física.

Por contra, cuando alguien empieza a hacer ejercicio para mejorar su salud, la actividad más recurrente es andar, correr o salir en bici.

Estas falsas creencias han establecido los ejercicios aeróbicos como los más saludables y han relegado el entrenamiento de fuerza solamente a las salas de musculación y al crecimiento muscular.

Nada más lejos de la realidad.

El entrenamiento de fuerza tiene un gran abanico de posibilidades en cuanto a mejora de la salud se trata. De hecho, existen muy pocos factores que limiten la participación de una persona en un programa de fuerza. Ni la edad, ni el peso, ni las enfermedades son excluyentes.

Un programa de entrenamiento de fuerza bien diseñado, supervisado y aplicado por un profesional del movimiento, aumenta los niveles de fuerza, lo cual se traduce en:

- ☒ Mejora el perfil de riesgo frente a enfermedades cardíacas y metabólicas.
- ☒ Reduce el riesgo de muerte por cualquier causa
- ☒ Reduce eventos cardíacos (infartos, angina de pecho, etc)
- ☒ Reduce las limitaciones funcionales

- ☒ Mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los niveles de glucosa en sangre
- ☒ Mejora la presión sanguínea en personas con pre-hipertensión o hipertensión 1
- ☒ Previene enfermedades metabólicas (Síndrome Metabólico)
- ☒ Previene o incluso mejora la pérdida de masa ósea
- ☒ Mejora la composición corporal (pérdida de grasa)
- ☒ Reduce la fatiga emocional, estrés, estados de ansiedad
- ☒ Aumenta la energía

Los músculos son órganos que bien estimulados pueden convertirse en nuestros mayores aliados. De ellos depende nuestra capacidad de movernos presente y futura. Por lo que ante la duda...¡COGE LA GOMA AZUL!

MAREOS, NÁUSEAS O VÉRTIGOS DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA

La participación en actividades de ejercicio físico conlleva en mayor o menor medida una implicación aumentada de órganos y sistemas que deben nutrirse y conseguir energía mientras que el esfuerzo continúa o mientras que el efecto residual del mismo continúa presente.

Esto afecta directamente al sistema cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y alteraciones en la presión arterial. También el sistema respiratorio se ve alterado, observándose aumentos de la frecuencia respiratoria y del volumen respiratorio corriente y residual.

Por otro lado, el nivel de hidratación o de glucosa sanguínea puede afectar al desarrollo del ejercicio.

Todos estos eventos pueden afectar negativamente, llegando a provocar mareos o náuseas, debido a falta de una hidratación adecuada, niveles bajos de azúcar en sangre, o debido a las alteraciones sufridas en el sistema cardio-respiratorio, sobre todo ante INTENSIDADES que no se han experimentado antes o ante una baja condición física. Por ello, para reducir la posibilidad de que esto suceda, es conveniente escuchar las recomendaciones que se dan y ser sensible a las sensaciones corporales que recibimos.

- ☒ Los cambios BRUSCOS de posición de la cabeza puede desencadenar estos eventos, debido a que gran parte de la capacidad de equilibrio se encuentra en esta parte del cuerpo.
- ☒ Los cambios BRUSCOS de intensidad o volumen de los entrenamientos también pueden ocasionar mareos. Por ello, la progresión, el control del movimiento y el patrón respiratorio debe ser la base sobre la cual aumentar el esfuerzo.
- ☒ Los cambios en el PH sanguíneo debido a las sustancias de deshecho que se producen durante el ejercicio pueden derivar en sensaciones de náuseas y mareos fuertes.
- ☒ La falta de energía debido a una MALA alimentación puede provocar estados de hipoglucemia durante los cuales la actividad física va a ocasionar mareos. También la deshidratación puede ser desencadenante de esta situación.
- ☒ Las condiciones de CALOR, alto porcentaje de HUMEDAD o estados de CANSANCIO mental o físico previo a la actividad puede conllevar estos eventos.

Algunas recomendaciones que podéis seguir, además de afrontar los entrenamientos bien hidratados y bien alimentados son:

- Refrescaros con agua la nuca o el pelo antes de entrenar.
- Respiraciones profundas y relajadas antes de comenzar los entrenamientos. Nos sirven para desconectar del trabajo y pensar en el entrenamiento que vamos a realizar.
- Comenzar desde el minuto 1 centrados en el entrenamiento, siguiendo las indicaciones para hacer un buen calentamiento
- Reducir la intensidad. Coger una goma de menor resistencia, realizar menos repeticiones, realizar mayores descansos, avisar al entrenador.

Insisto en que me hagáis saber cualquier incidencia, sensación o malestar que hayáis tenido durante el entrenamiento o durante vuestro día.

ALIMENTACIÓN RELATIVA AL ENTRENAMIENTO

Cuando nos referimos a la alimentación hay que distinguir, en primer lugar, el ámbito de aplicación o el objetivo que se persigue.

La modificación de la composición corporal, la pérdida de grasa o la ganancia de masa muscular puede ser en muchos casos aplicable también a un entorno de SALUD, pero no siempre es así.

Dicho de otra manera, perder peso o perder grasa no es siempre sinónimo de salud y, por tanto, los métodos utilizados para ese fin no siempre son saludables.

De aquí en adelante, cuando se hable de alimentación se va a hacer referencia a una aplicación saludable, en la cual se busca que el aporte energético y la calidad del mismo sea conseguir un estado óptimo para la realización de actividad física.

A la hora de afrontar una hora de ejercicio físico el cuerpo debe tener una alta disponibilidad de energía que poder utilizar para aguantar con garantías el entrenamiento. El sustrato o componente principal que utiliza el cuerpo durante la actividad física de una duración e intensidad habitual en nuestras sesiones es la glucosa, la cual se consigue directamente de los Hidratos de Carbono.

Para que durante el entrenamiento no falte energía para nutrir nuestros músculos y sistemas, es necesario comenzar la actividad con unos niveles óptimos de este sustrato. Para ello, es fundamental realizar un desayuno correcto, el cual puede estar compuesto por una fuente de energía principal de cada nutriente: frutas (Hidratos de Carbono), frutos secos (Grasas) y jamón/pavo/lácteos (Proteína).

Además, dado que nuestros entrenamientos se realizan antes de la hora de comer, es aconsejable siempre que se pueda retrasar la hora del almuerzo para no llegar al entrenamiento con sensación de hambre o, al menos, reducir esta sensación. En este caso, una opción muy buena puede ser incluir sobre todo fuentes de energía de Hidratos de Carbono, como las frutas, pequeños bocadillos de panes integrales o centeno, etc.

De esta forma, nos aseguramos empezar el entrenamiento en unas condiciones energéticas muy buenas para poder dar el 200%!!

PIRÁMIDE NUTRICIONAL

Durante muchos años distintas agencias internacionales se han esforzado por confeccionar una serie de recomendaciones aplicables a la mayoría de la población en materia de alimentación y salud.

De esta forma, son conocidas las famosas pirámides nutricionales, que muestran la base sobre la cual debemos guiar nuestra alimentación diaria, así como cuales alimentos debemos consumir solamente de manera ocasional.

Sin embargo, el conocimiento avanza más rápido que estas pirámides y esto ha provocado que la mayoría de ellas estén ya obsoletas, aunque sigan sin sufrir modificaciones.

Lo cierto es que la base de cualquier alimentación saludable debe ser unas conductas diarias saludables, como practicar ejercicio físico, llevar un equilibrio energético (no consumir una cantidad de calorías mayor de las que gastamos), hidratación adecuada y prioridad a los métodos de cocción saludables. A partir de aquí, los alimentos que deben primar en nuestro día a día deben ser aquellos de alto valor nutricional, con alto contenido en minerales y vitaminas, como las frutas, las verduras y las hortalizas. En el siguiente escalón, debería situarse aquellos alimentos que aportan principalmente proteínas, como la carne o pescado blanco (pollo, pavo, conejo, merluza, bacalao, etc), los huevos o los lácteos. Siguiendo el ascenso en la pirámide, nos encontramos alimentos cuyo principal aporte son Hidratos de Carbono pero con un contenido en azúcar bajo, como pastas y cereales integrales, centeno, legumbres, o algunos alimentos novedosos como la quinoa y avenas. En este mismo escalón podrían situarse también alimentos que aporten Grasas no saturadas ni de origen transgénico o procesado, como frutos secos no salados ni fritos. Finalmente, en el último escalón

deben situarse alimentos con altos contenidos de azúcar, sal y grasas saturadas, como alimentos procesados tipo bollería y comidas precocinadas, además de las bebidas alcohólicas.

En resumen, las recomendaciones generales se deben a su nombre y, por tanto, probablemente no puedan aplicarse a todo el mundo, por lo que la individualización es primordial. Además, la base de la alimentación diaria en las sociedades que tenemos relativamente fácil acceso a la comida, debe ser alimentos lo menos procesados y tratados industrialmente para asegurar que la mayor calidad del mismo.

¿PÉRDIDA DE PESO?

Siguiendo con la temática iniciada acerca de las recomendaciones sobre alimentación, tocamos en esta ocasión algunos detalles sobre la pérdida de peso.

En primer lugar, dejar claro que las competencias del entrenador cualificado son muchas, pero entre ellas no está la elaboración de dietas ni su especialidad son las necesidades nutricionales. Esto es muy específico de cada persona y debe realizarlo un nutricionista o dietista especializado.

Dicho esto, creo que es interesante definir conceptos que suelen confundirse fácilmente.

Cuando la gran mayoría de personas nos referimos a perder peso por estética o salud, estamos haciendo referencia al peso total de nuestro cuerpo. Ello incluye: musculatura, huesos, ligamentos y tendones, volemia, líquidos corporales, sistema digestivo, sistema cardiovascular, productos de deshecho, piel, cuero cabelludo, etc. Por ello, ateniéndonos fielmente a este concepto, cuando el objetivo es perder peso podemos escoger muchas estrategias válidas.

Por el contrario, aunque usemos el término “perder peso” nos estamos refiriendo a reducir la masa grasa y, dependiendo de cada caso, probablemente nos estamos refiriendo a la cantidad de grasa visceral, la cual se acumula entre órganos en el interior del cuerpo y se relaciona con riesgo de diferentes enfermedades. Para este fin, las estrategias se ven reducidas y hay que ser sumamente específico para conseguirlo.

[Obes Rev.](#) 2016 May 23. doi: 10.1111/obr.12406. [Epub ahead of print]

A systematic review and meta-analysis on the effects of exercise training versus hypocaloric diet: distinct effects on body weight and visceral adipose tissue.

[Verheggen RJ](#)¹, [Maessen MF](#)¹, [Green DJ](#)^{2,3}, [Hermus AR](#)⁴, [Hopman MT](#)¹, [Thijssen DH](#)^{1,2}.

En el primer caso, hay personas que efectivamente pueden perseguir perder peso corporal a toda costa, como el caso de deportistas que compiten por categorías de peso. Pero esto no es lo habitual cuando nos centramos en un público general.

En el segundo caso, según se está mostrando actualmente, la pérdida de peso graso tiene que abordarse de una manera muy específica. Son muchos los factores que han podido llevarnos a acumular una pequeña o gran cantidad de grasa en nuestro cuerpo y no todas pasan por ingerir una cantidad de calorías muy por encima de lo recomendado. Aquí también afecta la calidad de las calorías, relacionado directamente con la calidad alimentaria, la frecuencia de comidas, la educación nutricional, factores genéticos, niveles de actividad física diaria, cantidad y calidad de ejercicio físico, etc.

Las mejores dietas que se realizan hoy en día ya no usan el término “dieta” ya que hacen referencia a una obligación cerrada que hay que seguir a toda costa. Actualmente esto se está sustituyendo de forma satisfactoria por recomendaciones y

hábitos a adquirir, así como educación sobre la mejor estrategia de alimentación para cada persona. Tenemos que adquirir una conciencia sobre la calidad de la alimentación que seguimos generalmente a lo largo del año.

Por ello, las dietas milagro no existen, precisamente porque probablemente te hagan perder PESO, pero no el que tú quieres perder para no volver a recuperarlo.

Por último, mencionar que aunque la alimentación parece tener mayor impacto sobre la pérdida de PESO total, la combinación alimentación+ ejercicio+ actividad física diaria es la que mayores beneficios puede alcanzar a la hora de modificar la composición corporal y mejorar los porcentajes de peso muscular y peso graso, además de los programas multidisciplinarios que también incluyan trabajo con psicólogo.

¿ESTIRAR ANTES DE SESIONES DE FUERZA?

La flexibilidad es una de las capacidades que componen y deben desarrollarse en cualquier programa de entrenamiento cuyo fin sea mejorar la salud de los participantes. Los diferentes tipos de estiramientos son una de las herramientas que se han utilizado tradicionalmente para este fin. No obstante, actualmente existe una controversia acerca de su uso y sus efectos en diferentes aspectos relacionados con el entrenamiento, como la potencia, la fuerza muscular, el daño muscular y la recuperación, la resistencia, etc.

En cuanto a sus efectos en relación a la fuerza muscular, mientras algunos autores han encontrado reducciones de los niveles de fuerza máxima y resistencia muscular de forma aguda tras estiramientos estáticos dirigidos a los miembros inferiores, otros autores no han constatado estos cambios cuando se realizan estiramientos dinámicos, o cuando se realizan en los miembros superiores.

Según parece es un área complicada de analizar debido a la gran variedad de combinaciones que pueden resultar entre tipos de estiramientos utilizados, duración de los mismos, parte del cuerpo a la que va dirigida, objetivo del entrenamiento posterior, interés de los cambios a nivel agudo o crónico, formas de analizar los cambios, etc.

No obstante, se van conociendo datos que permiten mostrar cuales son las estrategias más recomendadas para algunos fines.

En el caso que nos ocupa, los estiramientos estáticos pasivos y estiramientos balísticos no parecen ser la mejor estrategia a elegir cuando posteriormente vamos a realizar un entrenamiento de fuerza muscular con el objetivo de mejorar la resistencia muscular, la hipertrofia muscular o la fuerza máxima con alta implicación neural.

Según las últimas publicaciones, estrategias como calentamientos específicos semejantes al entrenamiento a realizar permiten obtener un mayor rendimiento para estos fines en comparación con estiramientos estáticos pasivos y balísticos en miembros inferiores.

Los cambios en las propiedades visco-elásticas del músculo, en la disposición de las fibras musculares y una reducción de la actividad neural inducidos por este tipo de estiramientos son los causantes del descenso del rendimiento muscular.

Por ello, siempre que queráis afrontar un entrenamiento de fuerza con garantías, es preferible calentar con movimientos similares a los que realizaréis posteriormente que estiramientos tradicionales.

DESCANSOS, ESTIRAMIENTOS ESTÁTICOS Y PRODUCCIÓN DE FUERZA

Si en la anterior formación os comentaba acerca de los efectos de estirar antes de una sesión de fuerza, en esta formación os hablaré sobre los efectos de estirar mientras se descansa entre las distintas series de un mismo ejercicio.

Antes de meternos de lleno en la materia, es necesario mostrar las diferentes posibilidades a escoger cuando se realiza el descanso entre series del mismo ejercicio.

En primer lugar, se puede realizar un descanso pasivo, simplemente esperando que pase el tiempo de descanso, que generalmente puede ir desde 30 segundos hasta 5 o más minutos, dependiendo del objetivo de entrenamiento. Por otro lado, también puede realizarse un descanso activo, mediante una actividad aeróbica como montar en bici para aumentar el riego sanguíneo y el aporte de nutrientes al músculo ejercitado. Otra alternativa es realizar estiramientos para relajar la musculatura implicada en el ejercicio realizado, conocido como músculo agonista. Por último, puede realizarse estiramiento para relajar la musculatura que realiza la acción contraria a la que se ejecuta con el ejercicio, conocido como músculo antagonista.

Según se muestra en los recientes estudios al respecto, estas diferentes estrategias pueden potenciar o derrumbar el rendimiento de un entrenamiento donde la fuerza tenga un papel principal.

La realización de estiramientos del músculo que se ejercita en un ejercicio, una práctica muy habitual y extendida, parece ser lo menos recomendable cuando se pretende mantener un alto nivel de intensidad y exigencia del entrenamiento.

Concretamente, se han descritos reducciones de los niveles de resistencia muscular, actividad muscular eléctrica y fuerza pico a distintas intensidades de entrenamiento. Estas reducciones se deben, principalmente, a que el estiramiento modifica la rigidez y la longitud de las fibras musculares, reduce el reclutamiento de fibras musculares en cada contracción muscular, lo cual resulta en un estado menos favorable a alcanzar altas tasas de rendimiento muscular.

Frente a esta estrategia, parece que realizar descansos pasivos es una mejor alternativa que estirar los músculos implicados en la acción.

No obstante, los descansos activos mediante actividades aeróbicas, como subir a la bici durante dos minutos, e incluso realizar estiramientos estáticos de la musculatura antagonista puede ser una mejor idea para rendir más. Esto se debe a que podría mejorarse las características elásticas de la musculatura implicada en el ejercicio, reduciendo la co-activación de músculos que interfieren en la contracción muscular.

Cada variable del entrenamiento (intensidad, volumen, descanso, selección ejercicio, activación muscular, etc) influye de manera determinante en el mismo, por lo que es importante conocer sus efectos para poder rendir al máximo.

DESENTRENAMIENTO

Al principio del programa se hizo referencia a las consecuencias que acarrea las conductas sedentarias y la falta de actividad física diaria y ejercicio.

En este caso, vamos a observar cómo afecta el sedentarismo desde otra perspectiva. ¿Qué sucede cuando una persona entrenada y que sigue hábitos saludables deja de hacerlo y se vuelve sedentaria?

Según Iñigo Mujika, fisiólogo internacionalmente conocido por sus logros y trabajo a nivel competitivo y académico, el proceso de desentrenamiento “conlleva la pérdida parcial o total de las adaptaciones anatómicas, fisiológicas producidas por el entrenamiento como consecuencia de una reducción o cese del mismo”.

En cuanto a los programas de entrenamiento similares al que estáis realizando vosotros, dentro del entorno laboral, el conocimiento científico ha verificado que todas las mejoras obtenidas por los protocolos seguidos, ya sean a nivel físico, emocional, psicológico o social, se revierten tras terminar estos programas.

Por ello, se estima que los mejores programas planteados deben ser, entre otras cosas, longevos en el tiempo.

Por otro lado, se ha documentado, por ejemplo, cómo afecta una sola semana de reducción de los niveles de actividad física diaria en personas físicamente activas sanas en normopeso y con sobrepeso.

Esta reducción ha demostrado un empeoramiento del perfil metabólico e inflamatorio tanto de personas sanas como con sobrepeso. De hecho, el impacto es mayor en personas con sobrepeso ya que de partida comienzan con tasas más elevadas de glucosa e insulina sanguínea, entre otras.

No obstante, estos cambios pueden solventarse aún en períodos de reducción de la actividad, como durante la recuperación de lesiones o las vacaciones que se avecinan, realizando 1 o 2 sesiones semanales que estimule las ganancias obtenidas.

11.7 ANEXO 7: RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO DEL ESTUDIO 2

PRODUCTO	REPRESENTACIÓN	UNIDADES
Loops O'Live Ruberband intensidad media (rojo)		8
Loops O'Live Ruberband intensidad fuerte (verde)		13
Body-Toner resistencia ligera		2
Body-Toner resistencia media		2

Body-Toner resistencia fuerte		3
Tubo de resistencia 1,2 metros resistencia media		7
Tubo de resistencia 1,2 metros resistencia fuerte		5
Tubo de resistencia con cinta central 1,2 metros resistencia ligera		5
Tubo de resistencia con cinta central 1,2 metros resistencia media		5

<p>Ministep profesional con 2 pies ministepMedidas: 71x36x15 cm</p>		<p>8</p>
<p>Banda Elásticas Kinefis 1,5 metros baja resistencia</p>		<p>7</p>
<p>Banda Elásticas Kinefis 1,5 metros media resistencia</p>		<p>8</p>

Banda Elásticas Kinefis 1,5 metros fuerte resistencia		7
Balon tipo Bobbath 65 cm		9

Reloj y cinturón pulsómetro codificado onrhythm 310 access geonaute		22
--	---	----

11.8 ANEXO 8: RESULTADOS DE LA ESCALA PEDro ESTUDIO 3

Referencia	Tipo de Estudio	PEDro													Conflicto de interés
		E	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL		
Giubilei et al. 2007	Estudio randomizado	s	s	s	s	s	s	-	s	s	s	s	9	-	
Bartoletti et al. 2009	Estudio observacional analítico de cohorte	s	-	-	s	s	-	-	s	-	s	s	5	-	
Serdà et al. 2009	Estudio cuasiexperimental	s	s	-	s	-	-	-	s	s	s	s	6	No	
Serdà et al. 2010	Estudio cuasiexperimental	s	s	-	s	-	-	-	s	s	s	s	6	No	
Wu et al. 2013	Estudio de prevalencia	s	-	-	s	-	-	-	s	s	s	s	5	No	
Zhang R. et al. 2014	Estudio prospectivo de cohorte	s	-	-	s	-	s	-	s	s	s	s	6	No	
Zhang Z. et al. 2015	Estudio de prevalencia	s	-	-	s	-	-	-	s	s	s	s	5	No	
Hållmarker et al. 2014	Estudio de cohorte	s	s	-	s	-	-	-	s	s	s	s	6	No	

Referencia	Tipo de Estudio	PEDro												Conflicto de interés	
		E	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL		
Zhang R. et al. 2015	Estudio prospectivo de cohorte	s	-	-	s	-	s	-	s	s	s	s	s	6	No
Awad et al. 2017	Estudio longitudinal	s	-	-	s	s	-	-	s	s	s	s	s	6	No

1: criterios de elección; 2: grupos al azar; 3: asignación oculta; 4: grupos similares al inicio; 5: sujetos cegados; 6: terapeutas cegados; 7: evaluadores cegados; 8: >85% resultados de los sujetos iniciales; 9: análisis por "intención de tratar"; 10: comparaciones estadísticas entre grupos; 11: medidas puntuales y de variabilidad.

11.9 ANEXO 9: INSTRUCCIONES PREVIAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIO 2

INSTRUCCIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS TEST

Lugar _____

Fecha _____

Hora _____

A pesar de que los riesgos físicos asociados con la realización de los test son mínimos, las siguientes consideraciones son importantes con el fin de no comprometer la seguridad y ayudar a optimizar el resultado.

- 1.- Evitar actividad física extenuante durante el día o dos días previos a la realización de los test.
- 2.- Evitar la ingesta de alcohol las 24 horas previas a la realización de los test.
- 3.- Ingerir una comida ligera una hora antes de la realización de los test.
- 4.- Utilizar ropa y calzados adecuados durante la realización de los test físicos.
- 5.- Llevar consigo un gorro y unas gafas de sol por si la prueba de los 6 minutos andando se desarrollara al aire libre, así como unas gafas de leer (si se necesitan) para completar los cuestionarios.
- 6.- Firmar el consentimiento informado antes de realizar la batería de test físicos.
- 7.- Comunique al instructor o persona responsable de las pruebas cualquier aspecto relacionado con enfermedades o medicación que se estén utilizando y que podrían influir en su rendimiento.

CONSENTIMIENTO INFORMADO (TOMADO DE LA RED EXERNET)

Ha sido usted invitado a participar en la realización de un programa de ejercicio físico en el lugar de trabajo que incluye una serie de test para evaluar su condición física. Su participación es totalmente voluntaria. Si usted accede a participar, se le pedirá que realice una serie de test diseñados para la evaluación de su fuerza (extremidades superiores e inferiores), resistencia aeróbica, flexibilidad y agilidad. Estas evaluaciones incluyen actividades como andar, permanecer de pie y estirarse. El riesgo de llevar a cabo estas actividades es similar al riesgo de desarrollar ejercicios moderados y por tanto podría llegar a provocar fatiga, agujetas, esguinces, lesión muscular, mareos o desvanecimientos. Así mismo, existe el riesgo de sufrir una parada cardíaca, infarto o muerte súbita.

Si actualmente sufre alguno de los siguientes casos, usted no debería tomar parte en los test físicos a menos que un facultativo le autorizara por escrito a hacerlo:

- 1.- Su médico le ha desaconsejado la realización de ejercicio como consecuencia de alguna enfermedad.
- 2.- Ha sufrido recientemente un fallo cardíaco.
- 3.- Actualmente cuando realiza ejercicio sufre dolor articular, dolor en el pecho, mareos o angina de pecho (incluyendo los siguientes síntomas: rigidez- opresión en el pecho, dolor o sensación de pesadez).
- 4.- Tiene presión arterial descontrolada (160/100 o superior)

Durante la realización de los test se le pedirá que los realice dentro de su “zona de confort” y nunca se le presionará hasta un punto de sobre-solicitud o por encima de lo que usted crea es seguro. Comunique a la persona que le evalúa si tiene algún síntoma o sensación extraña como pérdida de aliento, mareo, dolor en el pecho, taquicardias, entumecimiento, pérdida de equilibrio, náuseas o visión borrosa.

Si como consecuencia de la realización de los test sufriera cualquier lesión, el personal que lleva a cabo los test únicamente está autorizado a darle los primeros auxilios y atenciones básicas. Posteriormente será usted mismo quien deberá buscar tratamiento en su propio médico si lo necesitara.

Recuerde que siempre puede dejar de realizar las pruebas en el momento que usted lo desee y así lo solicite. Mediante la firma de este consentimiento usted asume:

- 1.- Que ha leído el contenido completo de este documento. Que conoce el propósito de los test y los posibles riesgos que puede sufrir.
- 2.- Está de acuerdo en controlar su esfuerzo físico durante la realización de los test y está de acuerdo en parar y comunicar al instructor cualquier anomalía o síntoma inusual.
- 3.- Asume toda la responsabilidad de una posible lesión o muerte como resultado de la realización de los test. Así como la necesidad de buscar los medios propios para curar cualquier tipo de lesión.

Mi firma abajo indica que he tenido la oportunidad de preguntar y recibir contestación a cualquier pregunta y que libremente decido dar consentimiento para realizar las pruebas para la evaluación de mi condición física.

Firma _____ Fecha _____

Nombre _____

Adaptado de *Exernet* (2014).

11.10 ANEXO 10: SPANISH CENTER FOR EPIDEMIOLOGIC STUDIES DEPRESSION SCALE (CES- D)

Nombre y Apellidos:

Grupo

Spanish Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES- D)

Te rogamos que seas lo más sincera posible. Estos datos serán utilizados de forma anónima.

Lea las frases que describen cómo pudo haberse sentido o comportado. Por favor marque el número que representa con qué frecuencia se ha sentido de esta manera.

- **Raramente o ninguna vez** (Menos de un día)
- **1 Alguna o pocas veces de tiempo moderado** (1-2 días)
- **' Ocasionalmente o una cantidad del tiempo** (3-4 días)
- **(La mayor parte del tiempo** (5-7 días)

1. Me molestaron cosas que usualmente no me molestan.....0 1 2 3
2. No me sentía con ganas de comer; no tenía apetito.....0 1 2 3
3. Me sentía que no podía quitarme de encima la tristeza aún con la ayuda de mi familia.....0 1 2 3
4. Sentía que yo era tan bueno como cualquier otra persona.....0 1 2 3
5. Tenía dificultad en mantener mi mente en lo que hacía.....0 1 2 3
6. Me sentía deprimido.....0 1 2 3
7. Sentía que todo lo que hacía era un esfuerzo.....0 1 2 3
8. Me sentía con esperanza sobre el futuro.....0 1 2 3
9. Pensé que mi vida había sido un fracaso.....0 1 2 3
10. Me sentía con miedo.....0 1 2 3
11. Mi sueño era inquieto.....0 1 2 3
12. Estaba contento.....0 1 2 3
13. Hablé menos de lo usual.....0 1 2 3
14. Me sentí solo.....0 1 2 3
15. La gente no era amistosa.....0 1 2 3
16. Disfruté de la vida.....0 1 2 3
17. Pasé ratos llorando.....0 1 2 3
18. Me sentí triste.....0 1 2 3
19. Sentía que yo no le caía bien (gustaba) a la gente.....0 1 2 3
20. No tenía ganas de hacer nada.....0 1 2 3

11.11 ANEXO 11: INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO (STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY, STAI)

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (State-Trait Anxiety Inventory, STAI)

ANSIEDAD-ESTADO

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se *siente usted ahora mismo*, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación presente.

	<u>Nada</u>	<u>Algo</u>	<u>Bastante</u>	<u>Mucho</u>
1. Me siento calmado	0	1	2	3
2. Me siento seguro	0	1	2	3
3. Estoy tenso	0	1	2	3
4. Estoy contrariado	0	1	2	3
5. Me siento cómodo (estoy a gusto)	0	1	2	3
6. Me siento alterado	0	1	2	3
7. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras	0	1	2	3
8. Me siento descansado	0	1	2	3
9. Me siento angustiado	0	1	2	3
10. Me siento confortable	0	1	2	3
11. Tengo confianza en mí mismo	0	1	2	3
12. Me siento nervioso	0	1	2	3
13. Estoy desasosegado	0	1	2	3
14. Me siento muy «atado» (como oprimido)	0	1	2	3
15. Estoy relajado	0	1	2	3
16. Me siento satisfecho	0	1	2	3
17. Estoy preocupado	0	1	2	3
18. Me siento aturdido y sobreexcitado	0	1	2	3
19. Me siento alegre	0	1	2	3
20. En este momento me siento bien	0	1	2	3

ANSIEDAD-RASGO

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor cómo se *siente usted en general*, en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa cómo se siente usted generalmente.

	<u>Casi nunca</u>	<u>A veces</u>	<u>A menudo</u>	<u>Casi siempre</u>
21. Me siento bien	0	1	2	3
22. Me canso rápidamente	0	1	2	3
23. Siento ganas de llorar	0	1	2	3
24. Me gustaría ser tan feliz como otros	0	1	2	3
25. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto	0	1	2	3
26. Me siento descansado	0	1	2	3
27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada	0	1	2	3
28. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas	0	1	2	3
29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia	0	1	2	3
30. Soy feliz	0	1	2	3
31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente	0	1	2	3
32. Me falta confianza en mí mismo	0	1	2	3
33. Me siento seguro	0	1	2	3
34. No suelo afrontar las crisis o dificultades	0	1	2	3
35. Me siento triste (melancólico)	0	1	2	3
36. Estoy satisfecho	0	1	2	3
37. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia	0	1	2	3
38. Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos	0	1	2	3
39. Soy una persona estable	0	1	2	3
40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales me pongo tenso y agitado	0	1	2	3

11.12 ANEXO 12: ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA EL TRABAJO

Índice de Capacidad para el Trabajo

1. Capacidad actual para el trabajo en comparación con la mejor de su vida

Piense que su capacidad óptima para el trabajo tiene un valor de 10 puntos.

¿Qué puntuación daría a su capacidad actual para el trabajo?

(Un 0 significa que actualmente no puede trabajar)

completamente incapaz de trabajar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	capacidad para el trabajo en el presente
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

2. Capacidad para el trabajo con respecto a las exigencias del puesto

¿Cómo calificaría su capacidad actual para el trabajo con respecto a las exigencias físicas de su puesto?

muy buena	5
bastante buena	4
moderada	3
bastante deficiente	2
muy deficiente	1

¿Cómo calificaría su capacidad actual para el trabajo con respecto a las exigencias mentales de su puesto?

muy buena	5
bastante buena	4
moderada	3
bastante deficiente	2
muy deficiente	1

3. Número de enfermedades en la actualidad diagnosticadas por un médico

En la siguiente lista, señale sus enfermedades o lesiones. Indique también si un médico ha diagnosticado o tratado dichas enfermedades. Para cada enfermedad, por tanto, puede rodear 2, 1 o ninguna opción.

	Sí, opinión propia	Sí, diagnóstico de un médico
Lesión por accidente		
01 espalda	2	1
02 brazo/mano	2	1
03 pierna/pie	2	1
04 otra parte del cuerpo, ¿ dónde y qué tipo de lesión ?	2	1
...		

Enfermedad músculo-esquelética

05 trastorno en la región superior de la espalda o columna cervical, dolor en repetidas ocasiones	2	1
06 trastorno en la región lumbar, dolor en		

	repetidas ocasiones	2	1
07	(ciática) dolor que irradia desde la espalda a la pierna	2	1
08	trastorno músculo-esquelético que afecta a las extremidades (manos, pies), dolor en repetidas ocasiones	2	1
09	artritis reumatoide	2	1
10	otro trastorno músculo-esquelético, ¿cuál?		
...			

		Sí, opinión propia	Sí, diagnóstico de un médico
Enfermedades cardiovasculares			
11	hipertensión (presión sanguínea alta)	2	1
12	cardiopatía coronaria, dolores en el pecho durante el ejercicio (angina de pecho)	2	1
13	trombosis coronaria, infarto de miocardio	2	1
14	insuficiencia cardíaca	2	1
15	otra enfermedad cardiovascular, ¿cuál?	2	1
...			

Enfermedad respiratoria

16	infecciones repetidas en las vías respiratorias (también amigdalitis, sinusitis aguda, bronquitis aguda)	2	1
17	bronquitis crónica	2	1
18	sinusitis crónica	2	1
19	asma bronquial	2	1
20	enfisema	2	1
21	tuberculosis pulmonar	2	1
22	otra enfermedad respiratoria, cuál	2	1
...			

Trastorno mental

23	enfermedad mental o problema de salud mental severo (por ejemplo, depresión severa, desorden mental)	2	1
24	trastorno o problema mental leve (por ejemplo, depresión leve, estrés, ansiedad, insomnio)	2	1

Enfermedad neurológica y sensorial

25	problema o lesión en el oído	2	1
26	enfermedad o lesión óptica (distinta al error refractivo)	2	1
27	enfermedad neurológica (por ejemplo derrame, neuralgia, migraña, epilepsia)	2	1
28	otra enfermedad neurológica o sensorial, ¿cuál?	2	1
...			

Enfermedad digestiva

29	cálculos biliares o enfermedad vesicular	2	1
30	enfermedad hepática o pancreática	2	1
31	úlceras gástricas o duodenales	2	1
32	gastritis o inflamación duodenal	2	1
33	inflamación del colon, colitis	2	1
34	otra enfermedad digestiva, ¿cuál?	2	1
...			

	Sí, opinión propia	Sí, diagnóstico de un médico
--	--------------------------	------------------------------------

Enfermedad genitourinaria

35	infección urinaria	2	1
36	enfermedad renal	2	1
37	enfermedad genital (por ejemplo infección de las trompas de Falopio en las mujeres o infección prostática en los hombres)	2	1
38	otra enfermedad genitourinaria, ¿cuál?	2	1
...			

Enfermedades cutáneas

39	sarpullido alérgico, eccema	2	1
40	otro sarpullido, ¿cuál?	2	1
...			
41	otra enfermedad cutánea, ¿cuál?	2	1
...			

Tumor

42	tumor benigno	2	1
43	tumor maligno (cáncer), ¿dónde?	2	1

...		
Enfermedades endocrinas y metabólicas		
44	obesidad	2 1
45	diabetes	2 1
46	bocio u otra enfermedad tiroidea	2 1
47	otra enfermedad endocrina o metabólica	
	¿cuál?	2 1
...		
Enfermedad sanguínea		
48	anemia	2 1
49	otra enfermedad sanguínea, ¿cuál?	2 1
...		
Anomalías congénitas		
50	anomalía congénita, ¿cuál?	2 1
...		
Otro trastorno o enfermedad		
51	¿Cuál?	2 1
...		

4. Deterioro estimado en el trabajo debido a enfermedades

¿Supone su enfermedad o lesión un impedimento en su trabajo actual?

Rodee más de una opción en caso de que sea necesario.

No supone ningún impedimento /No tengo ninguna enfermedad	6
Soy capaz de hacer mi trabajo, pero causa algunos síntomas	5
A veces debo ralentizar mi ritmo de trabajo o cambiar mi método de trabajo	4
A menudo debo ralentizar mi ritmo de trabajo o cambiar mi método de trabajo	3
Por mi enfermedad siento que solo soy capaz de hacer un trabajo a tiempo parcial	2
En mi opinión, soy totalmente incapaz de trabajar	1

5. Baja por enfermedad en el último año (12 meses)

¿Cuántos días completos ha estado de baja debido a un problema de salud (enfermedad o asistencia sanitaria o examen médico) en el último año (12 meses)?

ninguno	5
como máximo 9 días	4
10 - 24 días	3
25 - 99 días	2
100 - 365 días	1

6. Su propio pronóstico de capacidad para el trabajo dentro de dos años

¿Considera que – desde el punto de vista de su salud – será capaz de realizar su actual trabajo dentro de dos años?

es improbable 1

no es seguro 4

relativamente seguro 7

7. Recursos mentales

¿Ha sido capaz de disfrutar recientemente de sus actividades diarias habituales ?

frecuentemente 4

con bastante frecuencia 3

a veces 2

raramente 1

nunca 0

¿Ha estado recientemente activo y atento ?

frecuentemente 4

con bastante frecuencia 3

a veces 2

raramente 1

nunca 0

¿Se ha sentido recientemente lleno de esperanza para el futuro ?

continuamente 4

con bastante frecuencia 3

a veces 2

raramente 1

nunca 0

Consentimiento informado (promoción y mantenimiento de la capacidad para el trabajo en general)

¿Da usted su consentimiento para permitir que un resumen de los datos previos y la puntuación de su índice de capacidad para el trabajo sean incluidos en su historial médico?

Sí ☐

No ☐

firma

11.13 ANEXO 13: CUESTIONARIO SOBRE EL COSTE DE LA PRODUCTIVIDAD (iMTA PRODUCTIVITY COST)

Cuestionario sobre el coste de la productividad

Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment

Yes ☒ No ☐ Maybe ☐

Cuestionario

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
iMTA

Cuestionario sobre su salud y su trabajo

Los investigadores llaman a este cuestionario el iMTA PCQ.

Explicación

Por favor, lea esta parte primero

¿Para quién es este cuestionario?

Este cuestionario es para usted. Hay varias opciones:

- ☒ Ha recibido este formulario por parte de su médico (de cabecera) o del hospital.
- ☒ Ha recibido este formulario por correo en un sobre a su nombre.

¿No puede rellenar el formulario por sí mismo?

Si no puede rellenar el formulario por sí mismo, quizás alguien le pueda ayudar, como por ejemplo un miembro de su familia.

¿De qué trata el cuestionario?

El cuestionario trata sobre su salud y su trabajo durante las últimas cuatro semanas. Empezaremos con preguntas generales, por ejemplo su género y su fecha de nacimiento.

¿Cuánto se tarda en rellenar el formulario?

Se tarda alrededor de 10 minutos en rellenar el formulario.

¿Cómo debería rellenar el formulario?

- ☒ Empiece por la primera pregunta y siga la numeración.
- ☒ Ponga una **x** en la casilla de la pregunta, a menos que el enunciado especifique que puede poner más de una **x**.
- ☒ Algunas preguntas pueden ser rellenadas con un número o en la línea de puntos.
- ☒ No hay respuestas incorrectas.

¿Quiere cambiar una respuesta?

- ☒ Tache la respuesta anterior.
- ☒ Ponga una **x** en la casilla de la respuesta nueva.
- ☒ Ponga una flecha al lado de la respuesta nueva.

~~x~~—respuesta anterior

→ ☒ respuesta nueva

¿Qué pasará con sus respuestas?

Sus respuestas se usarán para investigación. Únicamente los investigadores verán sus respuestas, lo que significa, por tanto, que no lo hará nadie más.

Los investigadores no escribirán su nombre en ninguna parte ni informarán a nadie de que ha participado en este proyecto de investigación.

Agradecemos profundamente que esté dispuesto a rellenar este formulario para nosotros

Preguntas generales

Pregunta A1. ¿En qué fecha está rellenando este cuestionario?

día	mes	año
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pregunta A2. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

día	mes	año
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pregunta A3. ¿Cuál es su género?

- ☐ Hombre
☐ Mujer

Pregunta A4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha obtenido?

Busque su nivel educativo y rellene la casilla con una **x**.

- ☐ No tengo el graduado escolar ni he hecho ningún programa de formación
- ☐ Educación primaria o elemental
- ☐ Educación secundaria obligatoria (ESO)
- ☐ Ciclo formativo de grado medio
- ☐ Bachillerato
- ☐ Ciclo formativo de grado superior
- ☐ Enseñanzas no regladas
- ☐ Universidad
- ☐ He obtenido otra titulación, concretamente
-

Pregunta A5. ¿Qué hace? Rellene con una **x** la casilla de lo que hace normalmente.

- ☐ Voy al colegio, al instituto o a la universidad, estoy estudiando
- ☐ Estoy trabajando
- ☐ Soy trabajador autónomo
- ☐ Soy ama/o de casa

- ☐ Estoy desempleado
- ☐ No estoy capacitado para trabajar, en un %
- ☐ Estoy jubilado o prejubilado
- ☐ Hago otra cosa, concretamente.....
-

Pregunta A6. ¿Tiene un trabajo remunerado?

- ☐ No
- ☐ Sí

Las siguientes preguntas se refieren a su trabajo, un trabajo por el que le pagan.

¿No tiene un trabajo remunerado? Entonces, salte a la pregunta 10. *Por favor, lea primero la explicación que hay antes de la primera pregunta.*

Pregunta 1. ¿Cuál es su profesión?

.....

Pregunta 2. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? Cuente solamente las horas por las que le pagan.

..... horas

Pregunta 3. ¿Cuántos días a la semana trabaja?

..... días

Pregunta 4. ¿Ha faltado al trabajo en las últimas 4 semanas por estar enfermo?

☐ No

☐ Sí, he faltado días.

(Cuenta solo los días que ha faltado en las últimas 4 semanas)

¿Ha respondido “Sí”? Entonces vaya a la pregunta 5.
Si no, salte a la pregunta 7.

Pregunta 5. ¿Ha faltado al trabajo antes de este periodo de 4 semanas por haber estado enfermo? Esto se refiere a un periodo completo ininterrumpido faltando al trabajo como consecuencia de estar enfermo.

- ☐ No
☐ Sí

¿Ha respondido “Sí”? Entonces vaya a la pregunta 6.
 Si no, salte a la pregunta 7.

Pregunta 6. ¿Cuándo se puso enfermo?

día	mes	año
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Salte a la pregunta 10. *Por favor, lea primero la explicación que hay antes de la pregunta 10.*

Pregunta 7. Durante las últimas 4 semanas, ¿ha habido días en los que ha trabajado pero se sentía molesto debido a problemas físicos o psicológicos?

- ☐ No
☐ Sí

¿Ha respondido “Sí”? Entonces vaya a la pregunta 8 y 9.
 Si no, salte a la pregunta 10. *Lea primero la explicación que hay antes de la pregunta 10.*

Pregunta 8. ¿Cuántos días ha estado molesto en el trabajo debido a problemas físicos o psicológicos? (Cuenta sólo los días en el trabajo en las últimas 4 semanas)

..... días de trabajo

Pregunta 9. En los días en que estaba molesto por estos problemas, ¿le fue difícil quizás acabar tanto trabajo como acaba normalmente? Esos días, ¿cuánto trabajo pudo realizar de media? Mire los números que hay a continuación. Un 10 significa que fue capaz de realizar tanto trabajo como de costumbre. Un 0 significa que fue incapaz de realizar su trabajo esos días. Rodee con un círculo el número que mejor se adapte.

Esos días no
pude hacer
nada

Pude hacer la
mitad de lo que
hago
normalmente

Fui capaz de
hacer tanto
como hago
normalmente

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Explicación

Incluso al realizar trabajos no remunerados puede sentirse molesto por problemas físicos o psicológicos. A veces como consecuencia podría hacer menos. Por ejemplo, tiene problemas para cuidar de sus hijos o al hacer trabajo voluntario, es incapaz de hacer recados, coger la compra o arreglar el jardín. Las siguientes preguntas se refieren a esto.

Pregunta 10. ¿Hubo días en los que se vio forzado a realizar menos trabajo no remunerado debido a problemas físicos y psicológicos? Solo días en las cuatro últimas semanas.

- ☐ No
☐ Sí

¿Ha respondido “Sí”? Entonces vaya a la pregunta 11 y 12.
Si no, vaya al final del cuestionario.

Pregunta 11. ¿Cuántos días le ocurrió esto? Cuente sólo los días en las últimas 4 semanas.

..... días

Pregunta 12. Imagine que alguien, por ejemplo su pareja, un familiar o un amigo, le ayudó esos días y él o ella hizo por usted todo el trabajo no remunerado que usted fue incapaz de hacer. ¿Cuántas horas de media pasó esa persona haciendo esto durante esos días?

De media horas durante esos días

Esa es la última pregunta.

¿Tiene alguna duda o sugerencia?

Quizás tenga alguna duda o sugerencia, por favor escríbalas a continuación.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¿Qué debería hacer con este cuestionario ahora que está relleno?

¿Lo ha relleno todo? Por favor, meta el cuestionario en el sobre. No es necesario ningún franqueo. Por favor, mande el sobre por correo tan pronto como le sea posible y, en cualquier caso, antes de xxx.

¿Ha perdido el sobre? En ese caso puede meter el cuestionario en otro sobre sin franqueo y enviarlo a:

xxx

xxx

xxx

¡Muchas gracias!

11.14 ANEXO 14: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26 J.L. MELIÁ (1998)***CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26 J.L. Meliá (1998)***

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo presentan aspectos que nos resultan satisfactorios y otros que no lo son. A continuación encontrará una lista de afirmaciones relacionadas con su trabajo. Decida si estas afirmaciones son, en su caso, más bien verdaderas (V) o más bien falsas F. Para responder rodee con un círculo la respuesta V ó F que Ud. escoja.

Para su completa tranquilidad el cuestionario es absolutamente anónimo y los datos que Ud. aporte serán usados solo con fines de investigación sin que pueda nunca ser identificado Ud. o la organización en que trabaja. Por ello puede Ud. responder con toda sinceridad y confianza. Es preferible carecer de un dato que tener un dato falso.

Tal vez algún aspecto de la lista que le proponemos *no corresponde exactamente* a las características de su puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia a aquellas características de su trabajo más semejantes a la propuesta, y califique en consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce.

1. Me gusta mi trabajo	V	F
2. Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las cosas en las que yo destaco	V	F
3. Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me gustan	V	F
4. Mi salario me satisface	V	F
5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen	V	F
6. La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena	V	F
7. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien reguladas	V	F
8. El entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios	V	F
9. En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y ascenso	V	F
10. Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa	V	F
11. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes	V	F
12. La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre aspectos laborales me satisface	V	F
13. La supervisión que ejercen sobre mí es satisfactoria	V	F
14. Estoy satisfecho de como mi empresa cumple el convenio, y las leyes laborales	V	F
15. Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen	V	F
16. Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi departamento o sección.	V	F
17. Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea	V	F
18. Me satisface mi capacidad actual para decidir por mí mismo aspectos de mi trabajo	V	F
19. Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad.	V	F
20. Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores.	V	F
21. Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo de trabajo	V	F
22. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis compañeros.	V	F
23. Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan	V	F
24. Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y satisfactorios	V	F
25. Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos.	V	F
26. Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea	V	F

DATOS DESCRIPTIVOS

A.- ¿Cuál es su ocupación?. (Escríbala y detalle, por favor, su rama profesional o especialidad. Escriba sólo aquella ocupación que desempeña en su actual puesto de trabajo). En caso de que sean varias, la que le ocupe más tiempo. _____

B.- ¿Cuál es su categoría laboral? (P.e aprendiz, oficial 1º, Ayudante, etc.) _____

27.- Sexo: .Q 1. Varón .Q 2. Mujer

28.- Edad. (Escriba su edad en años). _____

29.- Señale aquellos estudios de mayor nivel que usted llevo a completar:

.Q 1) Ninguno

.Q 2) Sabe leer y escribir

.Q 3) Primarios (ESO, Certificado Escolaridad, Graduado)

.Q 4) Formación Profesional Primer Grado

.Q 5) Formación Profesional Segundo Grado

.Q 6) Bachiller (ES, BUP, COU)

.Q 7) Titulación Media (Esc. Técnicas, Prof. E.G.B., Graduados Sociales, A.T.S., etc.).

.Q 8) Licenciados, Doctores, Masters universitarios

30.- Situación laboral:

.Q 1) Trabajo sin nómina o contrato legalizado.

.Q 2) Eventual por terminación de tarea o realizando una sustitución,

.Q 3) Contrato de seis meses o menos.

.Q 4) Contrato hasta un año.

.Q 5) Contrato hasta dos años

.Q 6) Contrato hasta tres años

.Q 7) Contrato hasta cinco años.

.Q 8) Fijos.

31. ¿Qué tipo de horario tiene usted en su trabajo?:

.Q 1) Jornada partida fija.

.Q 4) Jornada parcial

.Q 2) Jornada intensiva fija.

Q 5) Turnos fijos.

.Q 3) Horario flexible y/o irregular.

.Q 6) Turnos rotativos

32. ¿Qué cantidad de horas le dedica cada semana a su trabajo?. _____

33.- Indíquenos en cuál de las siguientes categorías jerárquicas se sitúa usted, aproximadamente en su actual puesto de trabajo dentro de su empresa:

.Q 1) Empleado o trabajador

.Q 2) Supervisor o capataz

.Q 3) Mando intermedio

.Q 4) Directivo

.Q 5) Alta dirección o dirección general

34.- ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? Años _____ y Meses _____ (35).

Muchas gracias por su colaboración.

11.15 ANEXO 15: CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 (VERSIÓN 2)

11549035

Datos para el estudio			
Día:	Mes:	Año: (20...)	Número identificador:
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ Enero ☐ Julio	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10	☐ Febrero ☐ Agosto	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15	☐ Marzo ☐ Septiembre	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20	☐ Abril ☐ Octubre	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25	☐ Mayo ☐ Noviembre	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30	☐ Junio ☐ Diciembre	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ 31		6 ☐ ☐	6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		7 ☐ ☐	7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		8 ☐ ☐	8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		9 ☐ ☐	9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cuestionario de Salud SF-36 (versión 2)

Versión española de SF-36v2™ Health Survey © 1996, 2000
adaptada por J. Alonso y cols 2003.

Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM-IMAS)
Unidad de Investigación en Servicios Sanitarios
c/Doctor Aiguader, 80 E-08003 Barcelona
Tel. (+34) 93 225 75 53, Fax (+34) 93 221 40 02
www.imim.es

IMAS
Institut Municipal
d'Investigació Mèdica. IMIM

Este instrumento ha superado los estándares de calidad del **Medical Outcome Trust** y de la Red Cooperativa para la Investigación en Resultados de Salud y Servicios Sanitarios (**Red IRYSS**).
El cuestionario y su material de soporte están disponibles en BiblioPRO, la biblioteca virtual de la Red IRYSS (www.rediryss.net).

11549035

Su Salud y Bienestar

Por favor conteste las siguientes preguntas. Algunas preguntas pueden parecerse a otras pero cada una es diferente.

Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta, y marque con una ☒ la casilla que mejor describa su respuesta.

¡Gracias por contestar a estas preguntas!

1. En general, usted diría que su salud es:

☐ ¹	☐ ²	☐ ³	☐ ⁴	☐ ⁵
Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año?:

Mucho mejor ahora que hace un año	Algo mejor ahora que hace un año	Más o menos igual que hace un año	Algo peor ahora que hace un año	Mucho peor ahora que hace un año
☐ ¹	☐ ²	☐ ³	☐ ⁴	☐ ⁵

11549035

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto?

	Sí, me limita mucho	Sí, me limita un poco	No, no me limita nada
a Esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores.	☐ 1	☐ 2	☐ 3
b Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 1 hora.	☐ 1	☐ 2	☐ 3
c Coger o llevar la bolsa de la compra.	☐ 1	☐ 2	☐ 3
d Subir <u>varios</u> pisos por la escalera.	☐ 1	☐ 2	☐ 3
e Subir <u>un sólo</u> piso por la escalera.	☐ 1	☐ 2	☐ 3
f Agacharse o arrodillarse.	☐ 1	☐ 2	☐ 3
g Caminar <u>un kilómetro o más</u>	☐ 1	☐ 2	☐ 3
h Caminar varios centenares de metros.	☐ 1	☐ 2	☐ 3
i Caminar unos 100 metros.	☐ 1	☐ 2	☐ 3
j Bañarse o vestirse por sí mismo.	☐ 1	☐ 2	☐ 3

4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca
a ¿Tuvo que <u>reducir el tiempo</u> dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
b ¿Hizo <u>menos</u> de lo que hubiera querido hacer?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
c ¿Tuvo que <u>dejar de hacer algunas tareas</u> en su trabajo o en sus actividades cotidianas?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
d ¿Tuvo <u>dificultad</u> para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal)?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

11549035

5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca
a ¿Tuvo que <u>reducir el tiempo</u> dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas <u>por algún problema emocional</u> ? <small>Problema emocional, reducir tiempo</small>	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
b ¿Hizo <u>menos</u> de lo que hubiera querido hacer <u>por algún problema emocional</u> ? <small>Problema emocional, hacer menos</small>	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
c ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas <u>menos cuidadosamente</u> que de costumbre, <u>por algún problema emocional</u> ? <small>Problema emocional, menos cuidado</small>	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

Nada	Un poco	Regular	Bastante	Mucho
☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?

No, ninguno	Sí, muy poco	Sí, un poco	Sí, moderado	Sí, mucho	Sí, muchísimo
☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

Nada	Un poco	Regular	Bastante	Mucho
☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

11549035

9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante las últimas 4 semanas ¿con qué frecuencia...

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca
a se sintió lleno de vitalidad?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
b estuvo muy nervioso?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
c se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
d se sintió calmado y tranquilo?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
e tuvo mucha energía?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
f se sintió desanimado y deprimido?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
g se sintió agotado?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
h se sintió feliz?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
i se sintió cansado?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?

Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Sólo alguna vez	Nunca
☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases:

	Totalmente cierta	Bastante cierta	No lo sé	Bastante falsa	Totalmente falsa
a Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
b Estoy tan sano como cualquiera	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
c Creo que mi salud va a empeorar	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
d Mi salud es excelente	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

Gracias por contestar a estas preguntas

11549035

OBTENCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS PUNTUACIONES DEL CUESTIONARIO

Este cuestionario ha sido diseñado con un software de captura automática de las respuestas (TeleForm®), que hace posible obtener rápidamente y sin errores una base de datos con las puntuaciones mediante lectura por escáner.

Si desea utilizar este servicio de Obtención de las puntuaciones y entrada de datos póngase en contacto con :

BiblioPRO@imim.es

MUY IMPORTANTE

Si desea utilizar este servicio **no debe realizar modificaciones** del cuestionario (la impresión debe ser clara y absolutamente fiel al documento PDF descargado).

El **código digital** y los **puntos de anclaje** (los cuatro cuadrados negros de las esquinas) deben de estar **bien definidos** para poder escanear satisfactoriamente el cuestionario. Tenga mucho cuidado con los dos cuadrados inferiores, si quedaran recortados por un error de impresión no se podría capturar la información.

Para obtener más información sobre este servicio y sus tarifas consulte la sección de "Puntuaciones" de la página principal de BiblioPRO en **www.rediryss.net**

*Esta página **NO** es necesaria para el estudio ni para la captura de datos.
Aconsejamos no incluir ésta hoja en los cuestionarios del estudio.*

11.16 ANEXO 16: HOJA DE REGISTRO DE DATOS DE VALORACIONES DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y ANTROPOMÉTRICAS

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS FÍSICOS Y ANTROPOMÉTRICOS

CÓDIGO PARTICIPANTE: _____

EDAD: _____

SEXO: _____

PUESTO DE TRABAJO U OCUPACIÓN: _____

TEST	RESULTADO
UKK 2Km	Tiempo: FC:
Sit and Reach	cm:
Equilibrio unipodal	Nº ensayos:
Estatura	cm:
Peso	Kg:
Dinamometría manual	
Abdominales en 30 segundos	Nº:
Golpeo de placas	Nº ensayos:
Salto longitud	cm:
Salto vertical	cm:
IMC	
Perímetro cintura/cadera	cm:
Pliegue abdominal	
Pliegue cuádriceps	

Observaciones:

11.17 ANEXO 17: ESTUDIOS INCLUIDOS EN EL METAANÁLISIS DEL ESTUDIO 3

- Giubilei G, Mondaini N, Minervini A, Saieva C, Lapini A, Serni S, Bartoletti R, Carini M. Physical activity of men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome not satisfied with conventional treatments--could it represent a valid option? The physical activity and male pelvic pain trial: a double-blind, randomized study. *J Urol.* 2007 Jan;177(1):159-65.
- Bartoletti R, Cai T, Mondaini N, Giubilei G, Gavazzi A, Mazzoli S, Gontero P. Cycling and genitourinary symptoms: results from an observational analytical cohort study. *J Androl Sci.* 2009;16:98-103.
- Serdà B.C, Monreal P, del Valle A. Physical exercise as complementary treatment in prostate cancer. *Apunts Med Esport.* 2010;45:81-93.
- Wu C, Zhang Z, Lu Z, Liao M, Zhang Y, Xie Y, Guo X, Yu X, Yang X, Gao Y, Tan A, Mo Z. Prevalence of and risk factors for asymptomatic inflammatory (NIH-IV) prostatitis in Chinese men. *PLoS One.* 2013;8(8):e71298.
- Serdà B.C, Monreal P, del Valle A. Quality of life and prostate cancer: a progressive resistance strength program. *Rev int med cienc act fis deporte.* 2011;11(42):362-383.
- Zhang R, Chomistek AK, Dimitrakoff JD, Giovannucci EL, Willett WC, Rosner BA, Wu K. Physical activity and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Med Sci Sports Exerc.* 2015 Apr;47(4):757-64.
- Zhang Z, Li Z, Yu Q, Wu C, Lu Z, Zhu F, Zhang H, Liao M, Li T, Chen W, Xian X, Tan A, Mo Z. The prevalence of and risk factors for prostatitis-like symptoms and its relation to erectile dysfunction in Chinese men. *Andrology.* 2015 Nov;3(6):1119-24.
- Hållmarker U, James S, Michaëlsson K, Ärnlov J, Sandin F, Holmberg L. Cancer incidence in participants in a long-distance ski race (Vasaloppet, Sweden) compared to the background population. *Eur J Cancer.* 2015 Mar;51(4):558-68.
- Zhang R, Sutcliffe S, Giovannucci E, Willett WC, Platz EA, Rosner BA, Dimitrakoff JD, Wu K. Lifestyle and Risk of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome in a Cohort of United States Male Health Professionals. *J Urol.* 2015 Nov;194(5):1295-300.
- Awad MA, Gaither TW, Murphy GP, Chumnarnsongkhroh T, Metzler I, Sanford T, Sutcliffe S, Eisenberg ML, Carroll PR, Osterberg EC, Breyer BN. Cycling, and Male Sexual and Urinary Function: Results from a Large, Multinational, Cross-Sectional Study. *J Urol.* 2017 Oct 13. pii: S0022-5347(17)77722-1.

Fe de erratas: errores formales advertidos en el texto causados por la pérdida puntual de datos o información:

- Página 30. Párrafos 5 y 6. Líneas 4 y 5, respectivamente. Donde dice (Jiménez Gutiérrez y García López, 2012) debe decir (Jiménez, García y Cardona, 2011).
- Página 31. Párrafo 1. Línea 6. Donde dice "...de acuerdo con la definición ofrecida por Jiménez Gutiérrez y García López (2012)" debe decir: "de acuerdo con **las definiciones** ofrecidas **en la obra coordinada por** Jiménez Gutiérrez y García López (2011)".
- Página 41. Párrafo 3. Líneas 2 y 7, debe añadirse en las correspondientes citas (citado en Rongen et al., 2013).
- Página 80. Párrafo 5. Línea 2. Donde dice "A nivel mundial son muchas las entidades..." debe entrecomillarse el texto hasta "Motorola" y precisar la siguiente cita: (Carballo, Lage y Jiménez, 2011, p. 50; citados en Jiménez, 2014).
- Página 81. Párrafo 2. Línea 4. Donde dice "Por su parte, otras revisiones...", debe decir "Por su parte, otras revisiones, **referidas anteriormente**..."
- Página 81. Párrafo 4. Línea 1. Donde dice "Gutiérrez y Jiménez", debe decir Carballo, Lage y Jiménez (2011).
- Página 81. Párrafo 4. Línea 2. Donde dice "...el punto de situación en el que nos encontramos..." debe entrecomillarse el texto hasta "beneficios" y precisar la cita (Carballo, Lage y Jiménez, 2012, p. 43; citado en Jiménez, 2014).
- Página 81. Párrafo 5. Línea 1. Donde dice "...un programa de salud corporativa..." debe entrecomillarse el texto hasta "personales" y precisar la cita (Altimira y Muñoz, 2011, p. 62).
- Página 110. Párrafo 4. Debe entrecomillarse hasta "...cuestionarios validados existentes" y añadir la cita (Bouwman, et al., 2015, p. 753).
- Página 110. Párrafo 4. Línea 7. Debe añadirse: El procedimiento de corrección se describió de acuerdo con el Manual del instrumento (Bouwman et al., 2013, pp. 4-38).

Referencias indicadas como capítulos de libro en las citas señaladas de las páginas 30, 31, 80 y 81:

- Altimira, R. y Muñoz, X., (2011). El impacto social de los programas de promoción de ejercicio en el ámbito empresarial. En Jiménez y García (coord.), *Actividad física y ejercicio: una inversión segura* (pp. 59-89). Madrid: Universidad Europea de Madrid y Sanitas.
- Carballo, O., Lage, A., y Jiménez, A. (2011). Impacto económico de la promoción de actividad física y ejercicio en el entorno laboral: evidencias actuales. En Jiménez y García (coord.), *Actividad física y ejercicio: una inversión segura* (pp. 33-59). Madrid: Universidad Europea de Madrid y Sanitas.
- Jiménez, A., García, O., Cardona, C. (2011). ¿Por qué el ejercicio físico mejora nuestra salud (y nuestro rendimiento laboral)? En Jiménez y García (coord.), *Actividad física y ejercicio: una inversión segura* (pp. 9-33). Madrid: Universidad Europea de Madrid y Sanitas.

Referencia citada partiendo del Trabajo Fin de Máster del autor de la presente tesis doctoral:

- Jiménez, V. (2014). *Metaanálisis de los programas de promoción de actividad física y salud en las empresas y organizaciones europeas* (Trabajo Fin de Máster, Universidad Politécnica de Madrid).

Nota del autor:

En el momento en el que se concluyó la presente tesis doctoral fue sometido a revisión por pares, para su futura publicación, el primero de los estudios. Asimismo, fue aceptado para su publicación el tercero de ellos:

Hervás-Pérez, J. P., **Jiménez, V.**, Guodemar-Pérez, J., Ruiz-López, M., García-Fernández, P., Rodríguez-López, E. S., y Pérez-Manchón, D. (2019). La influencia de la actividad física como tratamiento alternativo a la prostatitis crónica: un metaanálisis. [in press]

Asimismo, se han derivado varios textos en forma de artículos divulgativos o entrevistas, además de dos participaciones en congresos internacionales, cuyas actas se encuentran publicadas:

Jiménez, V., Martínez del Castillo, J. y Barriopedro, M.I. Los programas de actividad física y salud en las empresas europeas como modelo de negocio. Madrid, Octubre, 2014. Inaugural Conference World Association for Sport Management (WASM), Universidad Europea de Madrid.

Jiménez, V., Barriopedro, M.I., Martínez del Castillo, J. Intervenciones de actividad física en el lugar de trabajo: una revisión de los estudios europeos. Cáceres, Noviembre 2014. VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura.

Por último, quisiera agradecer a todas las personas que han leído el documento de tesis y han realizado –con sumo rigor y acierto– observaciones, correcciones o apreciaciones sobre el mismo. En especial, quisiera darles las gracias a mis dos directores de tesis, Jesús Martínez del Castillo y María Isabel Barriopedro Moro, así como a todos los profesores, compañeros y amigos que han realizado observaciones formales o correcciones sobre el contenido o los aspectos formales de orden tipográfico u ortográficos de la presente tesis doctoral. El resto de los errores latentes que no han sido advertidos en esta página, son, evidentemente, mi responsabilidad.

El doctorando,
Víctor Jiménez Díaz-Benito