Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

**Desarrollo e implantación de herramientas
para el registro y análisis de datos y el soporte
a la decisión como base para la medicina de
precisión en Oncología**

Tesis Doctoral

Juan Luis Cruz Bermúdez, Ingeniero Superior de
Telecomunicación

2019

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e
Ingeniería de Software

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

**Desarrollo e implantación de herramientas
para el registro y análisis de datos y el soporte
a la decisión como base para la medicina de
precisión en Oncología**

Memoria de Tesis Doctoral presentada por:

Juan Luis Cruz Bermúdez

Ingeniero Superior de Telecomunicación, para optar al grado de

Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid

Directores de la Tesis:

Dra. Ernestina Menasalvas Ruíz

Catedrática de Universidad UPM

Dr. Mariano Provencio Pulla

Profesor Titular UAM

2019

A mi Familia

“sólo el que sabe es libre, y más libre el
que más sabe. [...] No proclaméis la
libertad de volar, sino dad alas [...]”

Discurso de D. Miguel de Unamuno en el Ateneo de Valencia

24 de abril de 1902

AGRADECIMIENTOS

Todo trabajo importante se realiza con la ayuda de otros. Y este ha sido un trabajo importante, así que considero necesario dar las gracias a todos aquellos que han contribuido al mismo, de una forma directa o indirecta.

En primer lugar, gracias a mis directores de tesis, Ernes y Mariano. Vuestra orientación ha sido clave para llegar al puerto correcto.

Gracias a todo el equipo del Servicio de Informática del Hospital Universitario Puerta de Hierro, que tuve el honor de dirigir durante buena parte de esta tesis doctoral. Gracias Manolo. Gracias Javi. Sin vuestra capacidad para resolver los problemas del día a día este trabajo habría sido imposible. Gracias Consuelo. Hay gente que habla y gente que hace. Tú trabajo silencioso ha hecho posible nuestro marco de trabajo.

Gracias al Servicio de Oncología Médica, y a los miembros de la Comisión de Historias Clínicas, que se han preocupado estos años por avanzar en este difícil camino del valor de los datos clínicos. Gracias a su presidente, Arturo, por poner a disposición sus amplios conocimientos. Gracias a los estadísticos que me ayudaron a orientarme dónde es fácil desorientarse. Gracias Ana, gracias Paco.

Gracias también al equipo de dirección del hospital en aquellos primeros años. Gracias Jorge, José Antonio, Mercedes. Me disteis las alas para poder volar alto. Y a los equipos directivos que pusieron palos en las ruedas, gracias también. Sin quererlo, lo habéis hecho posible.

Gracias a mis padres que me dieron todo sin pedir nada a cambio. Ahora que soy padre, espero seguir vuestros pasos. Gracias Papá. Gracias Mamá. Gracias a mis hermanos. Gracias Ana. Gracias Alberto. Gracias por tu ayuda en el camino que recorriste antes que yo.

Por último, gracias a mi mujer e hijos. Gracias por haber aceptado de buen grado todo ese tiempo que no os he dedicado. Gracias por estar siempre ahí. Gracias Encarni, gracias Carlos, gracias Diego.

J. R. R. Tolkien

ÍNDICE

RESUMEN.....	13
ABSTRACT	14
1. INTRODUCCIÓN.....	17
1.1. PROBLEMÁTICA ABORDADA	17
1.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS PLANTEADOS	18
1.2.1. Hipótesis.....	18
1.2.2. Objetivo principal	18
1.2.3. Objetivos secundarios	19
1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO.....	19
1.4. CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO	20
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	25
2.1. GESTIÓN ASISTENCIAL DEL CÁNCER.....	25
2.1.1. El cáncer como problema sanitario de primera magnitud.....	25
2.1.2. Rasgos distintivos de la gestión asistencial del cáncer	26
2.2. NUEVOS PARADIGMAS ASISTENCIALES	34
2.2.1. Medicina Personalizada y de Precisión	34
2.2.2. Asistencia sanitaria basada en el valor	37
2.3. TECNOLOGÍA APLICABLE AL ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS.....	38
2.3.1. Concepto de análisis de datos clínicos.....	38
2.3.2. Sistemas de Historia Clínica Electrónica.....	38
2.3.3. Almacenamiento y consulta de datos	41
2.3.4. <i>Big Data</i> , Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial	42
2.3.5. Procesado del Lenguaje Natural (NLP).....	46
2.3.6. Metodologías para el análisis de datos: CRISP-DM.....	46

2.3.7.	Herramientas para el análisis de datos	49
2.3.8.	Sistemas de soporte a la decisión clínica	50
2.4.	ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS EN ONCOLOGÍA.....	51
2.5.	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	55
2.5.1.	Nuevo marco legal y normativo	55
2.5.2.	Ciberseguridad	65
3.	ESTABLECIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA.....	67
3.1.	AUSENCIA DE UN MARCO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS	67
3.2.	NATURALEZA Y GOBERNANZA DE LOS DATOS CLÍNICOS ONCOLÓGICOS.....	68
3.3.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO	71
3.4.	FRAGMENTACIÓN DEL MAPA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO.....	72
3.5.	AMENAZAS A LA CIBERSEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	73
4.	METODOLOGÍA	77
4.1.	SELECCIÓN DE UN PROBLEMA CLÍNICO CONCRETO Y RELEVANTE.....	77
4.2.	COMPRENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	78
4.3.	PROPUESTA DE UN MARCO DE TRABAJO	78
4.4.	IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO.....	79
4.5.	APLICACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO	81
5.	SOLUCIÓN PROPUESTA.....	83
5.1.	SELECCIÓN DE UN PROBLEMA CLÍNICO CONCRETO Y RELEVANTE.....	83
5.2.	COMPRENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	84
5.2.1.	Dispersión de los datos en los distintos sistemas de información.....	85
5.2.2.	Gobernanza de los datos clínicos del cáncer de pulmón	87
5.2.3.	Seguridad y protección de datos.....	91
5.2.4.	Aspectos tecnológicos	93

5.3.	PROPUESTA DE UN MARCO DE TRABAJO	97
5.3.1.	Modelo conceptual y arquitectura asociada.....	97
5.3.2.	Método común: procesos y herramientas asociadas	112
5.4.	IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO.....	118
5.4.1.	Estructuración de la Historia Clínica Electrónica.....	118
5.4.2.	Elaboración del registro integrado de casos de cáncer de pulmón	125
5.4.3.	Análisis de datos clínicos y de actividad asistencial	133
5.5.	APLICACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO	143
5.5.1.	Resultados de la aplicación del marco de trabajo propuesto al estudio de la asistencia sanitaria del cáncer de pulmón en el hospital.....	143
5.5.2.	Otros resultados de la aplicación del marco de trabajo propuesto.....	189
6.	CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO.....	203
6.1.	CONCLUSIONES	203
6.2.	PROPUESTA DE LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO.....	208
7.	BIBLIOGRAFÍA	209

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Proceso asistencial genérico del cáncer.	27
Figura 2 – Correspondencia entre los valores TNM y los estadios agrupados (8ª edición).	30
Figura 3 – Ejemplo de algoritmo de decisión para la elección de terapia en pacientes de cáncer de pulmón estadio IV.	32
Figura 4 – Mapa de procesos de trabajo hospitalarios típicamente correspondientes a sistemas de información.	40
Figura 5 - Tendencia de búsquedas en Google del término Big Data.	43
Figura 6 – Data Science como convergencia de disciplinas.	43
Figura 7 – Conceptos relacionados en el ámbito del análisis de datos.	44
Figura 8 – Fases de la metodología CRISP-DM.	47
Figura 9 – Comparación de Start-ups en el campo de los chatbots basados en AI en el ámbito sanitario.	54
Figura 10 – Actores introducidos por el RGPD en el marco de la protección de datos personales.	57
Figura 11 – ENS: Determinación de la categoría de los sistemas en función del impacto de los incidentes sobre las distintas dimensiones de seguridad.	64
Figura 12 - ENS: Extracto del Anexo II en el que se determinan las medidas de seguridad aplicables de acuerdo a la categoría de los sistemas.	65
Figura 13 – Funcionalidades típicas de los sistemas de Historia Clínica Electrónica y de las aplicaciones departamentales.	72
Figura 14 – Contexto de la ciberseguridad: activos, servicios, amenazas y sus circunstancias.	73
Figura 15 – Circunstancias asociadas a las amenazas a la ciberseguridad.	74
Figura 16 – Extracto de los resultados de la encuesta realizada por HIMSS en 2018 en materia de seguridad IT.	76
Figura 17 – Fases de la metodología aplicada para la realización del trabajo de tesis doctoral.	77
Figura 18 – Análisis del uso de registros estructurados de datos en la HCE del HUPHM (2018).	90
Figura 19 – Mapa de sistemas informacionales en el HUPHM como parte de la arquitectura regional.	95
Figura 20 - Estimación del volumen de información generada en el HUPHM por los pacientes con cáncer en el periodo 2009-2018 (generada para el proyecto BigMedilytics).	96

Figura 21 – Arquitectura planteada para el análisis de datos clínicos en oncología.	98
Figura 22 – HCEO: Variables de la 1ª consulta de Oncología Médica.....	101
Figura 23 - HCEO: Variables de las consultas sucesivas de Oncología Médica.....	102
Figura 24 – Componentes del Modelo de Datos Oncológico planteado.....	104
Figura 25 – MDO: Variables del Conjunto de Datos Mínimos Oncológicos (CMDO) del Registro de Casos.	105
Figura 26 – Relación entre los componentes del Registro de Casos y la Historia Clínica Electrónica.	106
Figura 27 – Sucesión de ciclos CRISP-DM a lo largo del tiempo con una distribución no homogénea de los esfuerzos en sus distintas fases.....	114
Figura 28 – AEPD: Estructura con las diferentes etapas de una EIPD y el flujo a seguir en la ejecución de una EIPD.	116
Figura 29 – Etiquetas diagnósticas para los procesos asistenciales en Oncología Médica.	124
Figura 30 – Formulario de introducción de datos del registro de casos de Oncología Médica utilizado como punto de partida.....	126
Figura 31 – Variables del registro de casos de Oncología Médica utilizado como punto de partida.....	127
Figura 32 – Análisis del porcentaje de informado de las variables del registro de casos elaborado para los proyectos FIS y PIE.....	129
Figura 33 – Formularios creados en REDCap para el registro de casos de cáncer de pulmón.....	132
Figura 34 – Ejemplo de formato del diccionario de datos REDCap del registro de casos de cáncer de pulmón implementado.	133
Figura 35 – Descripción de los ciclos CRISP-DM realizados.	134
Figura 36 – Relación de las 56 variables descargadas del registro de pacientes con cáncer de pulmón para la realización de las tareas de análisis.	136
Figura 37 – Principales variables derivadas generadas en el proceso de análisis.	139
Figura 38 – Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Evolución histórica de la incorporación de resultados moleculares a la práctica clínica en los estadios IV.	140
Figura 39 - Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Relación decreciente entre el estadio al diagnóstico y el número de asistencias ambulatorias previas al diagnóstico realizadas en el hospital...141	
Figura 40 - Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Evolución histórica de los estadios al diagnóstico de los pacientes tratados de cáncer de pulmón en Oncología Médica.	141

Figura 41 – Distribución de tipos de tumor (órganos) en el registro inicial de casos de pacientes con cáncer (muestra de 223 casos del total de registros). Desglose y agrupación realizada. En color rojo, los pacientes llamantes.	144
Figura 42 – Variación de la proporción de pacientes llamantes con el número de asistencias recibidas en urgencias.	145
Figura 43 – Perfil de los clusters identificados en el análisis de pacientes llamantes que acuden a urgencias.	145
Figura 44 – Ejemplo de árbol de decisión para la clasificación de pacientes llamantes y no llamantes. .	145
Figura 45 – Estudio de costes: Principales características al diagnóstico de la cohorte de pacientes analizada.....	147
Figura 46 – Estudio de costes: Número y coste anual de las asistencias ambulatorias, de urgencias y de hospitalización según sexo, Charlson, ECOG-PS y Estadio.	149
Figura 47 – Estudio de costes: Distribuciones univariantes del coste de las asistencias ambulatorias, de urgencias e ingresos en hospitalización según el índice de comorbilidad de Charlson, ECOG-PS y estadio al diagnóstico.	149
Figura 48 – Estudio de utilización: Variables categóricas de las cohortes de pacientes analizadas.....	154
Figura 49 – Estudio de utilización: distribución de las condiciones de comorbilidad de los pacientes analizados.....	155
Figura 50 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las cohortes de pacientes analizadas.....	156
Figura 51 – Estudio de utilización: Comparación de la cohorte analizada con el registro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Pulmón (GECP).	157
Figura 52 – Estudio de utilización. Evolución histórica de la incidencia del cáncer de pulmón en hombres y mujeres.....	158
Figura 53 – Estudio de utilización: Variables categóricas de las asistencias ambulatorias.	159
Figura 54 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las asistencias ambulatorias.....	160
Figura 55 – Estudio de utilización: asistencias ambulatorias en función del estadio al diagnóstico del paciente y del tipo de asistencia prestada.	160
Figura 56 - Estudio de utilización: asistencias ambulatorias realizadas por el Servicio de Oncología Médica.	161
Figura 57 - Estudio de utilización: evolución histórica del número de consultas sucesivas por paciente atendido en el Servicio de Oncología Médica según el estadio del paciente.....	162

Figura 58 – Estudio de utilización: Distribución univariante de la actividad ambulatoria en función del estadio y ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson.	163
Figura 59 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de asistencias ambulatorias por año de seguimiento.	164
Figura 60 - Estudio de utilización: Variables categóricas de las asistencias en urgencias.	165
Figura 61 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las asistencias en urgencias.	166
Figura 62 – Estudio de utilización: destinos al alta en función del nivel de gravedad en el triaje de urgencias.	166
Figura 63 - Estudio de utilización: Distribución univariante de las asistencias en urgencias en función del estadio y ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson.	167
Figura 64 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de asistencias en urgencias por año de seguimiento.	169
Figura 65 - Estudio de utilización: Variables categóricas de los ingresos en hospitalización.	170
Figura 66 - Estudio de utilización: Variables numéricas de los ingresos en hospitalización.	170
Figura 67 - Estudio de utilización: Distribución univariante del número de ingresos en hospitalización por año de seguimiento en función del estadio y ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson.	171
Figura 68 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de ingresos en hospitalización por año de seguimiento.	173
Figura 69 – Estudio del final de la vida: descripción de la cohorte de pacientes analizada.	179
Figura 70 - Estudio del final de la vida: descripción de las asistencias ambulatorias realizadas.	180
Figura 71 - Estudio del final de la vida: descripción de las asistencias en urgencias realizadas.	182
Figura 72 - Estudio del final de la vida: descripción de los ingresos en hospitalización realizados.	184
Figura 73 - Estudio del final de la vida: distribución temporal de la asistencia sanitaria al final de la vida (días hasta el fallecimiento).	185
Figura 74 - Estudio del final de la vida: distribución temporal de la asistencia sanitaria al final de la vida (días hasta el fallecimiento).	186
Figura 75 - Estudio del final de la vida: Coste de las asistencias sanitarias (163 pacientes fallecidos a 31/12/2014).	187
Figura 76 – Estructuración de procesos en la HCE: datos de procesos creados y etiquetados.	190

Figura 77 - Estructuración de procesos en la HCE: volumen de procesos etiquetados y porcentaje del total de procesos creados por servicio y sección hospitalaria.....	191
Figura 78 - Estructuración de procesos en la HCE: servicios con mayor volumen de procesos etiquetados (porcentaje sobre el total de procesos etiquetados).	192
Figura 79 - Estructuración de procesos en la HCE: porcentaje de procesos etiquetados por ámbito asistencial hospitalario.	193
Figura 80 - Estructuración de procesos en la HCE: etiquetas más frecuentes en las Urgencias Pediátricas.	194
Figura 81 - Estructuración de procesos en la HCE: etiquetas más frecuentes en las Urgencias Generales.	194
Figura 82 - Estructuración de procesos en la HCE: Porcentaje de procesos de migraña o cefalea etiquetados en las Urgencias Generales con peticiones de TC de Cerebro.	195
Figura 83 – Aplicación de la arquitectura NLP: Ejemplo de contenido de un informe clínico.....	197
Figura 84 - Aplicación de la arquitectura NLP: Distribución geográfica de la relación entre pacientes llamantes y no llamantes.....	198

RESUMEN

El cáncer continúa siendo un problema de salud y económico de primera magnitud. Específicamente el cáncer de pulmón es el que más fallecimientos provoca y el que mayor impacto económico ocasiona. Los pacientes atraviesan fases de cuidados agudos, y crónicos en muchos casos, participando de un complejo proceso asistencial que implica necesariamente la intervención de distintos profesionales en distintos ámbitos asistenciales, lo que provoca dificultades de comunicación y coordinación entre los distintos implicados, y una elevada fragmentación de los datos generados en cada una de las intervenciones sanitarias realizadas sobre el paciente. La posibilidad de conocer y predecir, para un paciente individual o para grupos de pacientes, aspectos como la eficacia del tratamiento y la probabilidad de respuesta o progresión, la toxicidad experimentada, la posibilidad de una recaída en la enfermedad, la supervivencia libre de progresión y supervivencia global o el consumo de recursos asistenciales es clave para la gestión óptima del paciente con cáncer. En este contexto, nuevos paradigmas asistenciales como la Medicina Personalizada y de Precisión o la Medicina Basada en el Valor ofrecen la esperanza de mejores resultados para los pacientes y una mayor eficiencia para el sistema sanitario, basándose para ello en los datos y en su análisis. En este sentido, distintas tecnologías como *Big Data*, *Data Science*, *Machine Learning* o *Artificial Intelligence* pueden ser aplicadas en la asistencia oncológica en ámbitos como la prevención y detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento posterior, o el soporte a la investigación y a la gestión. Sin embargo, existen distintos motivos por los cuales su implementación real en el ámbito hospitalario aún es escasa, entre los que se encuentran motivos organizativos y de disponibilidad de recursos, la elevada fragmentación del mapa de sistemas de información hospitalario, problemas de gobernanza y relativos a la propia naturaleza de los datos clínicos oncológicos y la necesidad de garantizar la protección de los datos personales. Sin los datos adecuados, y sin la orientación a problemas clínicos relevantes, las distintas técnicas y algoritmos disponibles carecen de utilidad práctica en el ámbito sanitario.

Así pues, en este trabajo de tesis doctoral abordamos la siguiente problemática: ¿cómo podríamos aplicar de forma efectiva estas tecnologías de análisis de datos para obtener nuevo conocimiento de interés clínico y para la gestión y habilitar paradigmas como la Medicina Personalizada y de Precisión y la Medicina Basada en el Valor con el fin último de mejorar los resultados en salud en el ámbito oncológico hospitalario?

Para dar solución a esta problemática, una vez revisado el estado de la cuestión y profundizado en la problemática existente, definimos una metodología *ad hoc* a través de la que seleccionamos el cáncer de pulmón como patología de referencia, comprendemos la

problemática concreta en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM) en relación al análisis de los datos clínicos en esta patología y proponemos como solución un marco de trabajo, consistente en un modelo conceptual, una arquitectura funcional asociada y un método común, para el registro y análisis de datos y el soporte a la toma de decisiones. Una vez definido e implementado, se aplicó el marco de trabajo al estudio del cáncer de pulmón, produciendo unos resultados de interés clínico y de gestión que demuestran su utilidad. Así pues, en el presente trabajo de tesis hemos desarrollado e implantado herramientas que facilitan el registro y el análisis de datos, incorporadas en un marco de trabajo integral, que constituyen una aportación relevante, en nuestra opinión, para el ámbito clínico y de gestión y para el desarrollo de la Medicina Personalizada y de Precisión y la Medicina Basada en el Valor en el ámbito oncológico.

ABSTRACT

Cancer is still a first order health and economic problem worldwide. Specifically, lung cancer causes the most deaths and causes the greatest economic impact. Patients undergo acute care, and chronic care phases in many cases, participating in a complex care process that necessarily involves the intervention of different professionals in different care settings, which causes communication and coordination difficulties among the different professionals involved, and a high fragmentation of the data generated in each of the health interventions performed on the patient. The possibility of knowing and predicting, for an individual patient or for groups of patients, aspects such as the effectiveness of the treatment and the probability of response or progression, the toxicity experienced, the possibility of a relapse in the disease, progression-free survival and global survival, or the consumption of healthcare resources, is key to the optimal management of cancer patients. In this context, new care paradigms such as Personalized and Precision Medicine or Value-Based Healthcare offer the hope of better results for patients and greater efficiency for the healthcare system, based on the data and their analysis. In this sense, different technologies such as Big Data, Data Science, Machine Learning or Artificial Intelligence can be applied in cancer care in areas such as prevention and early detection, diagnosis, treatment and subsequent monitoring, research and management. However, there are different reasons why its real implementation in the hospital environment is still scarce, among which are organizational reasons and availability of resources, a highly fragmented map of hospital information systems, governance problems and problems related to the very nature of oncological clinical data, and the need to guarantee the protection of personal data. Without

the appropriate data, and without the orientation to clinically relevant problems, the different techniques and algorithms available lack practical utility in healthcare.

Thus, in this doctoral thesis we address the following problem: how could we effectively apply these data analysis technologies to obtain a new knowledge of clinical and managerial interest and to enable paradigms such as Personalized and Precision Medicine and Value-Based Healthcare with the ultimate goal of improving health outcomes in oncology?

To solve this problem, once the state of the matter has been reviewed and the existing problem deepened, we have defined an *ad hoc* methodology through which we have selected lung cancer as our reference pathology, we have understood the specific problem at the University Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM) in relation to the analysis of clinical data in this pathology, and we have proposed as a solution a framework, consisting of a conceptual model, an associated functional architecture and a common method, for the registration and analysis of data and the support for decision making. Once defined and implemented, the framework has been applied to the study of lung cancer, producing results of clinical and management interest that demonstrate its usefulness. Thus, in this thesis work we have developed and implemented tools that facilitate the registration and analysis of data, incorporated into a comprehensive framework, which constitute a relevant contribution, in our opinion, for the management and improvement of healthcare provided to these patients and for the development of Personalized and Precision Medicine and Value-Based Healthcare in oncology.

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. PROBLEMÁTICA ABORDADA

La gran cantidad de datos clínicos que se generan en el ámbito hospitalario permite imaginar las posibilidades que ofrecería su análisis. Distintas tecnologías como *Big Data*, *Data Science* (DS), *Machine Learning* (ML) o *Artificial Intelligence* (AI) pueden ser aplicadas con el fin de mejorar la prevención y detección temprana, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, o el soporte a la investigación y a la gestión, en múltiples patologías de elevada incidencia y alto coste humano y económico. Si bien estas tecnologías prometen revolucionar la medicina tal y como la conocemos, la realidad que podemos observar actualmente en los centros sanitarios, y específicamente en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, nos muestra que aún no estamos siendo capaces de implementar estas tecnologías de una forma efectiva y amplia. Existen distintos motivos por los cuales su implementación real en el ámbito hospitalario es aún escasa, entre los que se encuentran motivos organizativos y de disponibilidad de recursos, la elevada fragmentación del mapa de sistemas de información hospitalario y por tanto de los datos clínicos, problemas de gobernanza y relativos a la propia naturaleza de los datos clínicos y la necesidad de garantizar la protección de los datos personales. Sin embargo, a pesar de la importancia de todas estas cuestiones, **consideramos que el problema clave es la falta de un marco de trabajo, entendido como un conjunto de conceptos, procedimientos y herramientas adicionales, que facilite la disponibilidad de los datos adecuados y el análisis multidisciplinar de problemas clínicos relevantes.** Sin disponer de este marco de trabajo implantado en el hospital, las distintas técnicas y algoritmos (desde regresiones lineales hasta *Deep Learning*) carecen de utilidad práctica.

El cáncer continúa siendo un problema de salud y económico de primera magnitud. Específicamente el cáncer de pulmón es el que más fallecimientos provoca y el que mayor impacto económico ocasiona. Los pacientes atraviesan fases de cuidados agudos, y crónicos en muchos casos, participando de un complejo proceso asistencial que implica necesariamente la intervención de distintos profesionales en distintos ámbitos asistenciales, lo que provoca dificultades de comunicación y coordinación entre los distintos implicados, y una elevada fragmentación de los datos generados en cada una de las intervenciones sanitarias realizadas sobre el paciente. La posibilidad de predecir, para un paciente individual, aspectos como la

eficacia del tratamiento y la probabilidad de respuesta o progresión, la toxicidad experimentada por el paciente, la posibilidad de una recaída en la enfermedad, la supervivencia libre de progresión y global, o el consumo de recursos asistenciales, es clave para la gestión del paciente con cáncer. En este contexto, **nuevos paradigmas asistenciales como la Medicina Personalizada y de Precisión o la Medicina Basada en el Valor ofrecen la esperanza de mejores resultados para los pacientes y una mayor eficiencia para el sistema sanitario. Sin embargo, se basan fuertemente en los datos y en su análisis.**

Así pues, en este trabajo de tesis doctoral nos planteamos responder a la siguiente pregunta: **¿cómo podríamos aplicar de forma efectiva estas tecnologías de análisis de datos para obtener nuevo conocimiento de interés clínico y para la gestión y habilitar paradigmas como la Medicina Personalizada y de Precisión y la Medicina Basada en el Valor con el fin último de mejorar los resultados en salud en el ámbito oncológico hospitalario?**

1.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS PLANTEADOS

1.2.1. Hipótesis

La realización de los análisis de datos clínicos necesarios para obtener nuevo conocimiento de interés clínico y para la gestión en el ámbito oncológico, y aplicar la Medicina Personalizada y de Precisión y la Medicina Basada en el Valor, se facilitaría con un conjunto de conceptos, procedimientos y herramientas previamente establecidos en el ámbito hospitalario.

1.2.2. Objetivo principal

Elaborar e implantar un marco de trabajo que incorpore un conjunto de conceptos, procedimientos y herramientas capaces de facilitar la disponibilidad de los datos clínicos y su análisis en el ámbito oncológico hospitalario por parte de los profesionales clínicos y gestores del Sistema Nacional de Salud, y específicamente en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

1.2.3. Objetivos secundarios

Para la consecución del objetivo principal se han identificado los siguientes **objetivos secundarios** que deberán ser alcanzados en el desarrollo de la tesis:

1. Seleccionar una patología oncológica sobre la que desarrollar el marco de trabajo y analizar la situación actual de la gestión de los datos y su procesado en dicha patología.
2. Definir un marco de trabajo, consistente en un modelo conceptual, una arquitectura (al menos en su descripción general, incluyendo elementos de gobernanza, funciones y datos) y un método común (que establezca procesos de trabajo y herramientas informáticas).
3. Desarrollar e implantar el marco de trabajo previamente definido en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
4. Aplicar el marco de trabajo a la patología oncológica seleccionada para obtener resultados de interés clínico y de gestión que permitan validar el marco de trabajo propuesto y comprobar la hipótesis planteada.

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Una vez establecido en este **primer capítulo** el problema que nos planteamos abordar, junto con nuestra hipótesis y los objetivos que nos proponemos alcanzar, describiremos en el **capítulo 2** el estado de la cuestión, tanto en lo referente al cáncer y su gestión asistencial actual, como a los nuevos paradigmas asistenciales surgidos con fuerza en los últimos años (Medicina Personalizada y de Precisión y Medicina basada en el Valor). Describiremos así mismo el estado del arte del análisis de datos clínicos oncológicos, indicando sus aplicaciones y la tecnología asociada. Por último, describiremos los aspectos principales de la nueva normativa en materia de seguridad y protección de datos personales con plena aplicación a nuestro ámbito.

El **capítulo 3** estará dedicado a profundizar en los principales problemas identificados para la consecución de los objetivos planteados. En este sentido, abordaremos la ausencia de un marco de trabajo, la naturaleza y gobernanza de los datos clínicos oncológicos, la estructura organizativa existente en el ámbito hospitalario, la fragmentación del mapa de sistemas de información y las amenazas a la ciberseguridad y la protección de datos personales.

Teniendo en cuenta el estado del arte de la cuestión y la problemática identificada, describiremos en el **capítulo 4** la metodología seguida para la consecución de los objetivos propuestos.

A través de la aplicación de la metodología planteada, describiremos en el **capítulo 5** los resultados del trabajo realizado, que permiten la consecución de los objetivos planteados. Así, en primer lugar, seleccionaremos como patología oncológica el cáncer de pulmón y describiremos la situación en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM) del análisis de datos clínicos en esta patología. A continuación, propondremos un marco de trabajo y describiremos su desarrollo e implantación en el HUPHM. Finalmente aplicaremos el marco de trabajo implantado al ámbito del cáncer de pulmón.

Finalizaremos nuestro trabajo con el **capítulo 6**, sintetizando las conclusiones del mismo y proponiendo líneas futuras de trabajo que permitan avanzar en mayor medida en el ámbito del análisis de datos clínicos en el ámbito hospitalario. La bibliografía se recoge en el **capítulo 7**.

1.4. CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO

Relacionamos a continuación el conjunto de resultados científicos del presente trabajo de tesis que han sido publicados en revistas indexadas (indicando el factor de impacto recogido en el JCR 2017 y el cuartil al que corresponden), han sido comunicados a congresos nacionales o internacionales, han sido publicados en otras revistas no indexadas o bien están en proceso de publicación a fecha de redacción de este documento, en orden cronológico ascendente.

1. Publicaciones en revistas indexadas JCR a fecha de publicación:

- 1.1. Menasalvas Ruiz, E., Tuñas, J.M., Bermejo, G., Gonzalo Martín, C., Rodríguez-González, A., Zanin, M., Pedro, C.G. De, Méndez, M., Zaretskaia, O., Rey, J., et al. (2018). Profiling Lung Cancer Patients Using Electronic Health Records. *J. Med. Syst.* 42, 1–10. [JCR 2017: FI 2,098, Q2].
- 1.2. Cruz-Bermúdez, J.L., Parejo, C., Martínez-Ruiz, F., Sánchez-González, J.C., Ramos Martín-Vegue, A., Royuela, A., Rodríguez-González, A., Menasalvas-Ruiz, E., and Provencio, M. (2019). Applying *Data Science* methods and tools to unveil healthcare use of lung cancer patients in a teaching hospital in Spain. *Clin. Transl. Oncol.* 1–10. [JCR 2017: FI 2,392, Q3].
- 1.3. López-Sánchez, P., Portolés, J., Martín Rodríguez, L., Tornero, F., Ramos Martín-Vegue, A.J., Herrero, J.A., and Cruz-Bermúdez, J.L. (2019). Impacto del primer año de

tratamiento sustitutivo renal en la hospitalización de una comunidad autónoma. Nefrología 1–11. [JCR 2017: FI 1,167, Q4].

2. Comunicaciones a congresos:

- 2.1. Codificación y *Big Data*: el valor de los datos en un gran hospital. Congreso: Jornada Transición a CIE-10 Oportunidades y Retos. Ciudad: Madrid, Comunidad de Madrid, España. Fecha de inicio: 23/04/2015. Fecha de fin: 23/04/2015. Organizador: 3M ESPAÑA, S.A.
- 2.2. Análisis de la Información Clínica: del hospital a la región, del presente al futuro. Congreso: HIMSS Chile. Ciudad: Santiago de Chile, Chile. Fecha de inicio: 01/12/2015. Fecha de fin: 01/12/2015. Organizador: Health Information Management Systems Society (HIMSS).
- 2.3. Cáncer de pulmón de células no pequeñas: análisis de las variaciones temporales e influencia real de los nuevos tratamientos en la supervivencia de los pacientes. Congreso: SEOM 2016. Ciudad: Madrid, España. Fecha de inicio: 26/10/2016. Fecha de fin: 28/10/2016. Organizador: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
- 2.4. *Big Data* en el ámbito hospitalario. Aspectos prácticos. Congreso: XV Congreso de Documentación Médica. Ciudad: Valencia, España. Fecha de inicio: 8/06/2017. Fecha de fin: 10/06/2017. Organizador: Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM).
- 2.5. Los datos de salud en el nuevo reglamento de protección de datos 2016/679 de la unión europea. Congreso: XV Congreso de Documentación Médica. Ciudad: Valencia, España. Fecha de inicio: 8/06/2017. Fecha de fin: 10/06/2017. Organizador: Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM).
- 2.6. Estructuración de la historia clínica electrónica mediante el concepto de proceso para la mejora de la calidad, seguridad y eficiencia asistencial. Congreso: XV Congreso de Documentación Médica. Ciudad: Valencia, España. Fecha de inicio: 8/06/2017. Fecha de fin: 10/06/2017. Organizador: Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM).
- 2.7. OncoCall: analyzing the outcomes of the oncology telephone patient assistance. Congreso: 30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (IEEE CBMS2017). Ciudad: Thessaloniki, Greece. Fecha de inicio: 22/06/2017. Fecha de fin: 24/06/2017. Organizador: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
- 2.8. Cytomegalovirus (CMV) impact on clinical outcomes and resource use after allogeneic hematopoietic cell transplantation: the influence of recurrent episodes of CMV infection. Congresos: BMT Tandem Meeting, Salt Lake City, Utah, February 2018 / 44th Annual Meeting of the EBMT, Lisbon, March 2018 / 28th ECCMID Congress, Madrid, April 2018 / 23th Congress of EHA, Madrid, April 2018.

- 2.9. Aplicación de métodos y herramientas de *Data Science* al análisis del consumo de asistencias de urgencias de los pacientes con cáncer de pulmón en un hospital terciario en España. Congreso: SEOM 2018. Ciudad: Madrid, España. Fecha de inicio: 25/09/2018. Fecha de fin: 28/09/2018. Organizador: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
- 2.10. Tratamiento oncológico activo o cuidados paliativos al final de la vida. ¿Cumplimos nuestras recomendaciones?. Congreso: SEOM 2018. Ciudad: Madrid, España. Fecha de inicio: 25/09/2018. Fecha de fin: 28/09/2018. Organizador: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
- 2.11. Applying *Data Science* methods and tools to unveil healthcare use and costs of lung cancer patients in a Spanish hospital. Congreso: 2nd *Big Data* for Precision Medicine Symposium (BDPM 2019). Ciudad: Córdoba, España. Fecha de inicio: 04/06/2019. Fecha de fin: 04/06/2019. Organizador: BDPM Symposium (IASIS & PULSE H2020 projects).
- 2.12. An analysis of healthcare use and the cost associated to end-of-life care of lung cancer patients in a Spanish hospital. Congreso: 2019 World Conference on Lung Cancer. Ciudad: Barcelona, España. Fecha de inicio: 07/09/2019. Fecha de fin: 10/09/2019. Organizador: IASLC: International Association for the Study of Lung Cancer.
- 3. Otras publicaciones realizadas en revistas clínicas y de gestión:**
- 3.1. Provencio, M., Pérez-Callejo, D., Torrente, M., Martín, P., Calvo, V., Gutiérrez, L., Franco, F., Coronado, M.J., Cruz-Bermúdez, J.L., Ruiz-Valdepeñas, A.M., et al. (2017). Concordance between circulating tumor cells and clinical status during follow-up in anaplastic lymphoma kinase (ALK) non-small-cell lung cancer patients. *Oncotarget* 8. [JCR 2016: FI 5,168, Q1]
- 3.2. Provencio, M., Torrente, M., Calvo, V., Gutiérrez, L., Pérez-Callejo, D., Pérez-Barrios, C., Barquín, M., Royuela, A., Rodríguez-Alfonso, B., Sotelo, M., Cruz-Bermúdez, J.L. et al. (2017). Dynamic circulating tumor DNA quantification for the individualization of non-small-cell lung cancer patients treatment. *Oncotarget* 8, 60291–60298. [JCR 2016: FI 5,168, Q1].
- 3.3. Cruz-Bermúdez, J.L., Parejo, C., Martínez-ruíz, F., Cristóbal, J., Gómez-bravo, R., Martín-vegue, A.R., Royuela, A., Rodríguez-González, Menasalvas-Ruiz, E., Provencio, M. (2019). Aplicación de métodos y herramientas de la ciencia de datos para el análisis del coste de la asistencia sanitaria de los pacientes con cáncer de pulmón en un hospital universitario de tercer nivel en España. *Rev. Española Econ. de la Salud* 14, 2–17.

4. Otras publicaciones en revistas indexadas JCR, en proceso de revisión y aceptación:

- 4.1. Unveiling emergency service and hospitalization use of lung cancer patients in a teaching hospital in Spain through *Data Science*. BMC Health Services Research (fecha de envío: 05/06/2019). Primer autor: Cruz-Bermúdez, Juan Luis.
- 4.2. An analysis of healthcare use and the cost associated to end-of-life care of lung cancer patients in a Spanish tertiary university hospital. European Journal of Cancer Care (fecha de envío: 10/09/2019). Primer autor: Cruz-Bermúdez, Juan Luis.
- 4.3. Reconstructing the Patient's Natural History from Electronic Health Records. Artificial Intelligence in Medicine (en proceso de envío).

Capítulo 2

ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. GESTIÓN ASISTENCIAL DEL CÁNCER

2.1.1. El cáncer como problema sanitario de primera magnitud

El cáncer continúa siendo un problema de salud y económico de primera magnitud. De acuerdo con Eurostat, el cáncer causa una de cada cuatro muertes en Europa (European Union, 2014). Específicamente el cáncer de pulmón es el que más fallecimientos provoca, un 20.8% de todas las muertes por cáncer, con más de 266.000 fallecidos en Europa en 2011. Desde un punto de vista económico, el cáncer costó a la UE 126.000 millones de euros en 2009, siendo el coste de la asistencia sanitaria para estos pacientes de 51.000 millones de euros (40%). La pérdida de productividad derivada de la muerte prematura del paciente ascendió a 42.600 millones y la pérdida de días de trabajo 9.430 millones. De todos los tipos de cáncer, el cáncer de pulmón tuvo el impacto económico más alto (18.800 millones de euros, un 15% del total). En España, se estima que el coste total del cáncer fue de 9.016 millones de euros (un 0.86% del PIB) en 2009, siendo el coste del cáncer de pulmón de 1.258 millones de euros (un 13.95%) (Luengo-Fernandez *et al.*, 2013). En un estudio reciente (Badía *et al.*, 2018) los autores estiman que el coste total del cáncer en España en 2015 ascendió a 5.458 millones de euros, representando un 8.3% del gasto sanitario público y un 0.51% del PIB.

El cáncer de pulmón es el que mayor incidencia presenta a nivel mundial, 1.824.701 nuevos casos en 2012 de acuerdo al estudio GLOBOCAN 2012 (Ferlay *et al.*, 2013), y el que mayor número de muertes produce (una tasa de mortalidad de 33,3/100.000 habitantes en 2017, lo que supone 183.400 fallecimientos). En España, de acuerdo a los datos publicados en 2018 por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) (Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 2018), se estiman 28.645 nuevos casos en 2017, de los cuales un 81.68% se producen en hombres y un 18.32% en mujeres. Estos datos, sin embargo, no proceden de un registro de casos nacional, sino de la extrapolación a los datos de población española de los datos de GLOBOCAN 2012. En España, el número de fallecimientos en 2016 por cáncer de pulmón ascendió a 22.187, siendo el tumor que más muertes produjo.

2.1.2. Rasgos distintivos de la gestión asistencial del cáncer

De acuerdo a la web cancer.gov (Instituto Nacional del Cáncer, 2019a) el cáncer “es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del alrededor.”. Es además “una enfermedad genética— es decir, es causada por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen.”. El cáncer se trata por tanto de un concepto agrupador de distintas enfermedades, que típicamente se clasifican de acuerdo al órgano en el que se originan (p. ej.: cáncer de pulmón) o al tipo de células que las producen (p. ej.: adenocarcinoma), y que además tienen un desarrollo potencialmente distinto en cada persona de acuerdo no sólo a su genética, sino a las condiciones de su entorno y estilo de vida (Biden, 2016). Esta complejidad, inherente a la propia enfermedad, se incrementa con el proceso requerido para su asistencia sanitaria.

De acuerdo al modelo genérico del proceso asistencial del cáncer establecido en (Levit *et al.*, 2013), como puede verse en la Figura 1, se identifican al menos los siguientes procesos en la atención del cáncer:

- Prevención.
- Detección o cribado (*screening*).
- Diagnóstico.
- Tratamiento.
- Supervivencia.
- Cuidados en la fase final de la vida.

Adicionalmente, los autores identifican otros procesos clave para la asistencia sanitaria de alta calidad, tales como:

- Planificación de los cuidados.
- Cuidados paliativos.
- Soporte psicosocial.
- Prevención y gestión de los efectos secundarios tardíos y a largo plazo.
- Soporte a los cuidadores y familiares.

El paciente atraviesa una fase de cuidados agudos, así como en muchos casos de asistencia a una condición crónica (pacientes denominados “largos supervivientes”) y, desgraciadamente en aquellos casos en los que no ha podido alcanzarse la curación, de cuidados paliativos al final de la vida.

Este complejo proceso asistencial implica necesariamente la intervención de distintos profesionales en distintos ámbitos asistenciales, incluyendo no sólo la Atención Primaria o la Atención Hospitalaria, sino también en el propio domicilio. Esto provoca dificultades de comunicación y coordinación entre los distintos implicados, y una elevada fragmentación de los datos generados en cada una de las intervenciones sanitarias realizadas sobre el paciente.

FIGURE S-1 Domains of the cancer care continuum with examples of activities in each domain. The blue arrow identifies components of high-quality cancer care that should span the cancer care continuum from diagnosis through end-of-life care. The green arrow identifies three overlapping phases of cancer care, which is a way of conceptualizing the period of the cancer care continuum that is the focus of this report.

Figura 1 – Proceso asistencial genérico del cáncer.

Describimos a continuación, de forma breve, algunos aspectos clave de los distintos procesos que intervienen en la asistencia oncológica, específicamente en el cáncer de pulmón, y que serán de interés en el desarrollo del presente trabajo.

2.1.2.1. Prevención

El cáncer es una enfermedad prevenible en gran medida. Distinta evidencia científica demuestra que muchos cánceres son causados por la exposición a factores del entorno o bien por factores relacionados con el estilo de vida (Cogliano *et al.*, 2010) (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research, 2007). Un estudio en Australia (Wilson *et al.*, 2018) estimó que un 38% de las muertes por cáncer, y un 33% del total de casos registrados en 2013 en Australia, podían ser atribuidos a 20 factores causales potencialmente modificables. Entre estos factores se encuentran el hábito tabáquico (y la exposición al humo de tabaco por los denominados “fumadores pasivos”), la dieta (especialmente el bajo consumo de frutas, de verduras y de fibra

y el alto consumo de carnes rojas y procesadas), el sobrepeso y la obesidad, el alcohol, los hábitos sedentarios, la radiación ultravioleta, distintos tipos de infecciones y de factores relacionados con la reproducción. De acuerdo al estudio mencionado, en total podrían evitarse 16.700 muertes y 41.200 casos de cáncer al año en Australia si la exposición a estos factores causales fuera evitada o reducida a los niveles recomendados.

2.1.2.2. Detección o cribado

Además de la prevención primaria descrita en el capítulo anterior, se puede realizar una prevención secundaria del cáncer a través de procesos de cribado poblacional (*screening*). La evidencia demuestra que el cáncer de pulmón a menudo es detectado en fases avanzadas de su evolución, lo que implica que la enfermedad no pueda ser curada y la supervivencia de los pacientes se vea mermada. Desde este punto de vista, la posibilidad de detectar la enfermedad en sus fases más tempranas con una alta sensibilidad y especificidad supondría una mejora dramática en la gestión de la enfermedad, tanto desde el punto de vista de los resultados clínicos para el paciente como de los costes para los sistemas sanitarios. Para ello, se han desarrollado múltiples ensayos clínicos en los que probar herramientas diagnósticas como la Tomografía Computarizada de baja dosis (LDCT) o el análisis de esputos y más recientemente aproximaciones basadas en la detección de ADN tumoral en la sangre (biopsia líquida) y que pretenden alcanzar este objetivo. Sin embargo, revisiones sistemáticas han establecido que los métodos basados en LDCT o análisis de esputos no han conseguido reducir las muertes por cáncer de pulmón, salvo en el caso de pacientes de muy alto riesgo, observando además en el caso de LDCT un alto número de falsos positivos y de sobre diagnóstico (detección de tumores que no hubieran progresado hasta provocar la muerte durante la vida restante del paciente) (Manser *et al.*, 2013). En el caso de los métodos basados en biopsia líquida, es necesario seguir profundizando en su investigación, dado que no se dispone actualmente de pruebas validadas en uso en la práctica clínica (Calabrese *et al.*, 2019). Sin embargo, la aplicación de técnicas de Ciencia de Datos (*Data Science*) e Inteligencia Artificial (AI) podría suponer una revolución en este ámbito a través de la selección de pacientes en riesgo y de la construcción de modelos predictivos, que incorporen no sólo la información del LDCT, sino también variables demográficas y clínicas de la Historia Clínica Electrónica (HCE). Por ejemplo, un estudio reciente ha demostrado una mejora de un 30% en la tasa de falsos positivos del cribado mediante LDCT (Raghu *et al.*, 2019).

2.1.2.3. Diagnóstico

El diagnóstico, tal y cómo define el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española en su tercera acepción, consiste en la “determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante

la observación de sus síntomas”. En el ámbito del cáncer de pulmón implica un proceso complejo de clasificación en el que intervienen distintas especialidades médicas y que habitualmente no es un proceso lineal ni único para los distintos pacientes, en función de cómo se haya producido la sospecha diagnóstica. El diagnóstico se asocia típicamente al proceso de estadificación (o estudio de extensión) mediante el que se establece hasta qué punto la enfermedad se ha extendido por el organismo. Un correcto diagnóstico y estadificación es determinante para el planteamiento posterior de un tratamiento y su eficacia para obtener los mejores resultados para el paciente.

El diagnóstico en cáncer de pulmón implica la realización de múltiples actos clínicos, entre los que se encuentran los siguientes:

- Cumplimentación de la HCE, incluyendo la historia familiar y laboral y el hábito tabáquico del paciente (y su cuantificación).
- Exploración física y neurológica del paciente.
- Pruebas analíticas, incluyendo hemograma y coagulación y pruebas bioquímicas.
- Pruebas de imagen, incluyendo radiología simple de tórax, Tomografía computarizada (TC) torácico y abdominal y Tomografía por emisión de positrones (PET-TC).
- Evaluación del estado cardiopulmonar del paciente.
- Broncoscopia, incluyendo biopsia, cepillado y broncoaspirado (BAS).
- Pruebas de anatomía patológica sobre las muestras biológicas obtenidas del paciente, bien a través de la biopsia obtenida mediante broncoscopia o incluso mediante cirugía, o bien citologías de esputo y del resto de fluidos obtenidos en las pruebas invasivas. Estas pruebas permiten clasificar al tumor, entre otros aspectos, desde un punto de vista histológico, incluyendo sus dos variantes principales: el cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP o NSCLC) y sus distintas histologías (adenocarcinomas, carcinomas escamosos y de células grandes) y el cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP o SCLC).
- Pruebas moleculares (pruebas genéticas sobre el ADN del tumor) que permitan detectar mutaciones propias de los tumores que pueden ser tratadas de forma diferenciada (EGFR, ALK, ROS1, PD-L1, etc.). La importancia de estas determinaciones serán desarrolladas en mayor medida en el capítulo 2.2.
- Otras pruebas complementarias en función de las circunstancias del caso concreto, incluyendo la afectación del mediastino, ósea, neurológica, etc.).

En lo relativo al estudio de extensión, se utiliza típicamente el sistema TNM de la Union for International Cancer Control (UICC). Desde su introducción en los años 70 del siglo XX, se encuentra ya en su octava edición (efectiva desde 2018) (Brierley, Gospodarowicz and Wittekind, 2016). El sistema TNM clasifica el cáncer de acuerdo al tamaño y extensión del tumor

principal (T), a la extensión del cáncer diseminado a los ganglios linfáticos cercanos (N) y a la existencia de metástasis (extensión a otros órganos del cuerpo) (M) (Instituto Nacional del Cáncer, 2015) (Piñeros *et al.*, 2019). Esta clasificación tan detallada, a menudo es agrupada en cinco estadios por simplicidad (0, I, II, III, IV) o incluso en siete estadios (IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV), correspondientes a los valores de clasificación TNM (Lim *et al.*, 2018):

TNM 8ª edición	N0	N1	N2	N3	M1a	M1b	M1c
T1a (1cm)	IA1	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVA	IVB
T1b (>1-2cm)	IA2	IIB	IIIA	IIIB			
T1c (>2-3cm)	IA3	IIB	IIIA	IIIB			
T2a (>3-4cm)	IB	IIB	IIIA	IIIB			
T2b (>4-5cm)	IIA	IIB	IIIA	IIIB			
T3 (>5-7cm)	IIB	IIIA	IIIB	IIIC			
T4 (>7 cm)	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC			

Figura 2 – Correspondencia entre los valores TNM y los estadios agrupados (8ª edición).

2.1.2.4. Tratamiento

Como se ha indicado previamente, el tratamiento del cáncer de pulmón depende del resultado del diagnóstico y el estudio de extensión o estadificación. Sin embargo, la selección del tratamiento óptimo es de nuevo un proceso complejo y variable en el tiempo, a medida que se desarrolla la asistencia del paciente y se observa la evolución de la enfermedad. En general, se distingue entre los siguientes casos:

- **Estadios iniciales (I y II)** en los que la cirugía con intención curativa es el tratamiento de elección. En determinadas circunstancias, está indicada además la quimioterapia como tratamiento adyuvante y la radioterapia.
- **Enfermedad localmente avanzada (estadio III)**, que integra un conjunto heterogéneo de pacientes y con decisiones de tratamiento difíciles de tomar dada la falta de evidencia

científica concluyente respecto de la mejor opción en cada caso. En general se distingue entre pacientes operables (resecables), pacientes potencialmente resecables (en los que se busca un tratamiento neoadyuvante que permita una cirugía posterior) y pacientes inoperables, con tratamiento radioterápico y quimioterápico combinado.

- **Enfermedad diseminada (estadio IV)**, en la que las determinaciones moleculares son claves para la selección de terapias dirigidas o inmunoterapias, tanto en el tratamiento inicial como ante la progresión de la enfermedad por resistencia a estas primeras líneas de tratamiento. En los casos sin mutaciones tumorales conocidas, se indica la quimioterapia como única opción. Además, para la selección del esquema de tratamiento óptimo se valoran aspectos como la histología del tumor o la situación del paciente, evaluada a través de la escala ECOG-PS (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status) (Oken *et al.*, 1982) que describe la capacidad funcional del paciente, en términos de su capacidad de autocuidado, de llevar a cabo tareas cotidianas y actividades físicas básicas (andar, trabajar, etc.). La variable toma valores desde 0, indicando que el paciente está plenamente activo y es capaz de desenvolverse de forma equivalente a la situación previa a la enfermedad, hasta un valor 4, indicando que el paciente está completamente impedido, no pudiendo realizar ningún autocuidado y permaneciendo en cama o silla de ruedas.

El gran número de variables intervinientes en la selección del tratamiento, y su variación temporal (tanto por la propia evolución del paciente y de la enfermedad, como de la propia evidencia disponible), así como la dificultad para predecir el resultado del tratamiento en cada paciente individual, causan que la selección del tratamiento óptimo se configure como el nudo gordiano de la gestión del paciente con cáncer. La siguiente figura ilustra, a modo de ejemplo, un algoritmo de decisión para la selección de tratamiento óptimo en pacientes de cáncer de pulmón con estadio IV (ASCO, 2017).

*EGFR+: cannot recommend for or against immune checkpoint inhibitor therapy vs. single-agent chemotherapy after progression on platinum doublet therapy.

ASCO | GUIDELINES

This algorithm is derived from recommendations in the Systemic Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer: American Society of Clinical Oncology Practice Guideline Update. This is a tool based on an ASCO guideline and is not intended to substitute for the independent professional judgment of the treating physician. Practice guidelines do not account for individual variation among patients. This tool does not purport to suggest any particular course of medical treatment. Use of the guideline and this tool are voluntary.

www.asco.org/lung-cancer-guidelines © 2017 by the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved

Figura 3 – Ejemplo de algoritmo de decisión para la elección de terapia en pacientes de cáncer de pulmón estadio IV.

La gestión asistencial del paciente con cáncer durante el tratamiento y en el seguimiento posterior determina en gran medida los resultados del paciente y su calidad de vida. Una gestión sub óptima puede evitar mejores resultados para el paciente, degradar su calidad de vida y generar costes evitables para el sistema sanitario (Barbera *et al.*, 2015) (Manzano *et al.*, 2014). En función del estadio y por tanto del tratamiento, el paciente es seguido típicamente por un servicio médico distinto (servicios de Cirugía Torácica en el caso de pacientes intervenidos quirúrgicamente o servicio de Oncología Médica en el caso de pacientes con tratamiento farmacológico sistémico). Sin embargo, no está adecuadamente establecido por la evidencia cuál es el seguimiento óptimo en cuanto a su periodicidad, contenido y necesidad de adaptación a cada paciente individual (Levit *et al.*, 2013), siendo frecuente la estandarización mediante protocolos de seguimiento, de aplicación general para todos los pacientes, según si se trata de enfermedad diseminada o no.

Queda claro por tanto que la posibilidad de predecir, para un paciente individual, aspectos como la eficacia del tratamiento y la probabilidad de respuesta o progresión, la toxicidad experimentada por el paciente, la posibilidad de una recaída en la enfermedad, la supervivencia libre de progresión y global y el consumo de recursos asistenciales óptimo son aspectos clave para la gestión del paciente con cáncer.

2.1.2.5. Supervivencia

La definición de supervivencia (*survivorship*) en el cáncer de pulmón es variable. Algunas fuentes indican que aquellos pacientes con una supervivencia superior a 5 años tras el diagnóstico son denominados largos supervivientes (Molina *et al.*, 2008). Otras sin embargo establecen una definición más abierta del concepto de superviviente, partiendo desde el mismo momento del diagnóstico y hasta el final de la vida de ese paciente, e incluyendo así mismo a familiares, amigos y cuidadores en la definición (Hewitt, M; Greenfield, 2015). Algunas páginas web para pacientes también establecen una definición amplia, identificando como supervivientes a los pacientes que han finalizado su tratamiento activo, se encuentran en tratamiento de mantenimiento e incluso siguen con la enfermedad, bien sea estabilizada o en remisión (Canadian Cancer Society, 2019). Además de las dificultades relativas a establecer la pauta más adecuada para el seguimiento, la situación de supervivencia conlleva típicamente una serie de complicaciones derivadas del tratamiento recibido, tanto físicas como psicológicas (Hewitt, M; Greenfield, 2015) e incluso sociales (por ejemplo, en lo relativo al empleo de estos pacientes) (Vayr *et al.*, 2019). El cuidado de estos supervivientes requiere un esfuerzo adicional de planificación y coordinación entre niveles asistenciales y sociales que requiere de capacidades de integración y análisis de datos actualmente no disponibles en el entorno sanitario.

2.1.2.6. *Cuidados en la fase final de la vida*

Distintos estudios apuntan a que el consumo de recursos asistenciales y, por tanto, el coste asistencial, se incrementa en el periodo final de la vida de estos pacientes (Langton *et al.*, 2014) (Yabroff *et al.*, 2008). Existe, pues, un elevado interés en estudiar la asistencia prestada en esta fase de la enfermedad, no sólo desde un punto de vista económico, sino de su eficacia y humanidad, con el fin de mejorar la calidad de vida y evitar un sufrimiento innecesario al paciente (Barbera *et al.*, 2015). Sin embargo, no se dispone de suficientes estudios en nuestro ámbito nacional que se focalicen en cáncer en general y en el cáncer de pulmón, en particular.

Para analizar la calidad de la asistencia al final de la vida se han propuesto algunos indicadores, tales como la administración de tratamientos muy próximos al fallecimiento, un elevado número de asistencias en urgencias hospitalarias o el ingreso en hospitalización y UCI en los últimos días (Earle *et al.*, 2003). De nuevo, la integración de información clínica y de actividad asistencial es clave para la toma de decisiones en este ámbito de gestión del paciente con cáncer.

2.2. NUEVOS PARADIGMAS ASISTENCIALES

2.2.1. Medicina Personalizada y de Precisión

El Diccionario del Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute, NCI) de los EE.UU. define la Medicina Personalizada de Precisión como el “tipo de medicina que usa la información de los genes, las proteínas y el ambiente de una persona para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad. En la Medicina Personalizada de Precisión para el cáncer, se usa información específica del tumor de una persona con el fin de facilitar el diagnóstico, planificar el tratamiento, determinar si el tratamiento es eficaz o dar un pronóstico.” (Instituto Nacional del Cáncer, 2019b). De una forma similar, el informe elaborado por la Fundación Instituto Roche sobre la Medicina Personalizada de Precisión en España (Fundación Instituto Roche, 2019) define el concepto de Medicina Personalizada de Precisión (MPP) de la siguiente forma: “la integración de los datos genómicos y de otras ciencias “ómicas” con el conjunto de datos clínicos del paciente y su entorno, permite una práctica clínica adaptada a las características individuales de cada paciente, en lo que se denomina Medicina Personalizada de Precisión (MPP)”.

La MPP permite establecer una nueva taxonomía de la enfermedad basada en la biología molecular, de forma que facilite un diagnóstico más preciso, un tratamiento dirigido y en definitiva unos mejores resultados en salud (National Research Council, 2011). La iniciativa

lanzada por el Presidente Barack Obama sobre Medicina de Precisión en los EE.UU. (Collins and Varmus, 2015) es un claro ejemplo del desarrollo de este concepto a gran escala y de su singular beneficio potencial para el tratamiento del cáncer.

Por ejemplo, en el cáncer de pulmón la clasificación tradicional de la enfermedad se ha basado en su histología (incluyendo el cáncer de pulmón de célula pequeña y el cáncer de pulmón de célula no pequeña y sus respectivos subtipos). Sin embargo, actualmente se clasifican también en función de la presencia de mutaciones genéticas que contribuyen a su generación y proliferación (mutaciones driver) (National Research Council, 2011). A partir de 2004 el éxito de tratamientos como Gefitinib y Erlotinib sobre tumores mutados EGFR supuso un cambio de paradigma y el inicio de la medicina personalizada y de precisión en el cáncer de pulmón. Además de las conocidas mutaciones en KRAS y EGFR, en los últimos años han sido muchas las mutaciones driver descubiertas para las que se han desarrollado terapias dirigidas (ALK, HER2, BRAF, PIK3CA, AKT1, MAP2K1 o MET entre otras) (Pao and Girard, 2011) y las correspondientes resistencias (Lin and Shaw, 2016) para las que nuevas terapias dirigidas han sido desarrolladas.

Conscientes de esta revolución en el campo médico, el Consejo Europeo publicó en 2015 recomendaciones para los estados miembros y para la Comisión Europea relativas a la implementación efectiva de la Medicina Personalizada, específicamente a través de la aplicación de *Big Data* (Council of the European Union, 2015). La Comisión Europea, en una comunicación de abril de 2018 relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad indica que “La medicina personalizada es una tendencia emergente que emplea datos generados por nuevas tecnologías con el fin de comprender mejor las características de un paciente y ofrecer la asistencia correcta a la persona adecuada en el momento oportuno” reconociendo que “Es primordial acordar las especificaciones técnicas aplicables al acceso e intercambio de datos sobre salud con fines de investigación y salud pública, abordando, por ejemplo, la recopilación de datos sobre salud, su almacenamiento, compresión, tratamiento y acceso en toda la UE.” (Comisión Europea, 2018). En el ámbito nacional, el Informe de la Ponencia de Estudio sobre Genómica del Senado Español (Ponencia de estudio sobre genómica, 2019), aprobado el pasado 15 de Enero de 2019, establece la necesidad de elaborar “una Estrategia en Medicina Genómica, Personalizada y de Precisión para el Sistema Nacional de Salud, que posicione a España en la vanguardia de la sanidad, con planes y objetivos a corto, medio y largo plazo para los próximos diez años.”. Según se indica, “La Estrategia deberá asegurar la incorporación de la Medicina Genómica, Personalizada y de Precisión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de atención primaria y atención hospitalaria, con criterios de coordinación, refuerzo de la capacidad de prevención y mejora continua de la asistencia y de los resultados clínicos en la salud de los pacientes [...]”. Así mismo “deberá incorporar objetivos para asegurar la secuenciación genómica de los pacientes con enfermedades raras y de sus

familiares; de los pacientes con neoplasias y de sus familiares” y se indica que “deberá integrarse la información generada con los datos clínicos almacenados en la historia clínica electrónica”. Se hace así mismo una mención especial al ámbito de la seguridad, indicando que “Los poderes públicos deberán asegurar la aplicación estricta y rigurosa de la normativa nacional y europea de protección de datos personales en el campo de la Medicina Genómica, Personalizada y de Precisión, tanto en la asistencia clínica como en la investigación [...]” y que “Es imprescindible una gestión de la aplicación de la inteligencia artificial y del acceso a esas bases de datos y de los Big Data para la clínica y la investigación con una fuerte protección legal y una enorme vigilancia continua desde los poderes públicos”. En lo relativo a los recursos, se introduce la necesidad de cambios organizativos: “Se recomienda la creación de la especialidad de Genética clínica y la incorporación de profesionales de Bioinformática y otros perfiles profesionales necesarios con un enfoque multidisciplinar para la adecuada oferta de los servicios de la Medicina Genómica, Personalizada y de Precisión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y para la gestión de los Big Data orientada a la asistencia y la investigación”. La elaboración de esta Estrategia Nacional es clave para asegurar la equidad en la asistencia del cáncer, actualmente comprometida por las diferencias existentes en esta materia en las distintas Comunidades Autónomas (Fundación Instituto Roche, 2019).

Más allá de los resultados positivos de los distintos ensayos clínicos realizados, nuevos estudios con los denominados “datos del mundo real” (*Real World Data* o RWD), basados en el análisis retrospectivo de datos genéticos ligados a datos clínicos de grandes poblaciones no seleccionadas a priori, están demostrando que los pacientes que son tratados con terapias dirigidas a mutaciones *driver* específicas presentan una mejor supervivencia (Singal *et al.*, 2019). Tomamos la siguiente definición de RWD (Montouchet *et al.*, 2018): datos longitudinales del paciente capturados en su gestión rutinaria que pueden ser reutilizados para estudiar el impacto de las intervenciones sanitarias. Se ha propuesto incluso que los RWD puedan ser empleados para la generación de evidencia clínica como alternativa a los Ensayos Clínicos Aleatorizados convencionales en el ámbito oncológico (Khozin, Blumenthal and Pazdur, 2017). Este nuevo paradigma de generación de evidencia basada en datos del mundo real (*Real World Evidence* o RWE) está adquiriendo progresivamente una mayor relevancia derivada de las capacidades técnicas crecientes para la obtención de datos moleculares a través de nuevas técnicas de secuenciación genética (*Next Generation Sequencing* o NGS), muy especialmente en el cáncer de pulmón a través de la biopsia líquida (Provencio, Pérez-Barrios, *et al.*, 2019), y el procesamiento de grandes volúmenes de información (a través de técnicas de *Data Science*, *Machine Learning*, *Artificial Intelligence* y *Big Data Analytics*). En este sentido, la Food & Drug Administration (FDA) de los EE.UU. ha publicado recientemente un marco de trabajo para el empleo de RWE en la toma de decisiones regulatorias (FDA, 2018a). La utilización de RWD contenidos en la HCE permite una mejor comprensión del efecto real del tratamiento en los

pacientes, de la difusión real de la innovación sanitaria, permite un mejor diseño de ensayos clínicos a través de una estimación más certera de pacientes que cumplen criterios y de eventos clínicos de interés, e incluso para la generación de grupos de control sin necesidad de aleatorización (Basch and Schrag, 2019). Sin embargo, el concepto de RWD no se limita a los datos disponibles en la HCE, sino que incluye datos generados por el propio paciente (*Patient Reported Outcomes* o PROs), a través de páginas web, apps, redes sociales o dispositivos *wearables*, e incluso datos del paciente no generados por este, sino de una forma automatizada a través de sensores y dispositivos domésticos con conexión a internet (*Internet of Things* o IoT).

2.2.2. Asistencia sanitaria basada en el valor

La asistencia sanitaria basada en el valor (*Value-Based Healthcare* o VBHC) es una modalidad de prestación de servicios sanitarios en la que los proveedores de los mismos son compensados económicamente en función de los resultados en salud de los pacientes atendidos, y no por volumen de actos clínicos generados o mediante una cápita fija (Massachusetts Medical Society, 2016). Este nuevo paradigma surge en los EE.UU., principalmente a raíz del trabajo de Michael Porter en Harvard Business School (Porter and Teisberg, 2006) y del cambio legislativo que supuso la aprobación de la Medicare Access and CHIP Reauthorization Act (MACRA) (Government Printing Office, 2015) y está siendo fuertemente impulsado a nivel internacional por organizaciones como International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). De acuerdo a lo establecido por el Dr. Porter, la mejora del rendimiento en el ámbito sanitario depende, como en cualquier otro ámbito, del alineamiento de intereses y actividades de todos los implicados en torno a un objetivo común, que en el caso sanitario debe ser el valor aportado al paciente. Dicho valor se plantea como la relación entre el resultado clínico alcanzado por el paciente y el gasto incurrido por el sistema sanitario para ello (Porter, 2010). La medición del resultado clínico del paciente, como una integración compleja de distintos indicadores según la patología estudiada, y no sólo de la actividad realizada, es necesaria para la mejora del valor aportado y se convierte por tanto en un aspecto clave para el paradigma VBHC (Porter, Larsson and Lee, 2016). Con el fin de avanzar en su implementación, ICHOM ha elaborado una metodología de implementación y un conjunto de datos estándar (ICHOM standard sets) que integran resultados estandarizados, herramientas de medida en distintos puntos temporales de la asistencia y factores de riesgo ajustados para una determinada patología. Estos conjuntos de datos han sido elaborados por paneles de expertos y de pacientes, cubriendo hasta la fecha 26 patologías de alta prevalencia e impacto, estando entre ellas el cáncer de pulmón (International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), 2017), el cáncer colorrectal, el cáncer de mama y el cáncer de próstata.

2.3. TECNOLOGÍA APLICABLE AL ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS

2.3.1. Concepto de análisis de datos clínicos

En primer lugar, debemos definir el concepto de análisis de datos clínicos en el marco del presente trabajo de tesis. Hablaremos indistintamente de datos clínicos o información clínica, tomando para ello la definición de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (Jefatura del Estado Español, 2002). En su artículo 3 se indica que información clínica es “todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.”. Nótese que la definición no se limita a los datos obtenidos en un proceso asistencial en el ámbito de una institución sanitaria, de forma que los datos relativos a la salud obtenidos al margen de un proceso asistencial (por ejemplo, por el propio paciente en su domicilio) también son considerados información clínica. Así mismo, la Ley 41/2002 define el término documentación clínica como “el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.” y la historia clínica, de acuerdo al artículo 14.1, como “el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro.”. Así pues, la fuente primordial de la información clínica en el entorno hospitalario será la historia clínica y la documentación clínica que contiene, pero no será la única fuente.

El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define el término análisis en su tercera acepción como el “estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito.”. De esta forma, tomando las referencias previas, en el ámbito del presente trabajo **definimos el análisis de datos clínicos como el estudio detallado de los datos relativos al estado físico y la salud de las personas con el fin de adquirir o mejorar su conocimiento.**

2.3.2. Sistemas de Historia Clínica Electrónica

Las primeras experiencias con sistemas de información hospitalarios se remontan principalmente a los años 70 del siglo pasado (Buchanan, 1980), paralelas al desarrollo de la

informática e impulsadas en gran medida por la introducción de los programas Medicare y Medicaid de los EE.UU., en la medida en la que un registro fidedigno de la actividad era necesario para un reembolso de los gastos (Sewell and Thede, 2012). Sin embargo, hasta los años 90 los sistemas existentes tenían funciones de gestión administrativa, y estos nuevos sistemas que proporcionaban un soporte a los procesos clínicos para la recogida de información de actividad no tuvieron un despliegue masivo, siendo especialmente importante su desarrollo en la primera década del siglo actual, impulsados nuevamente por los EE.UU. a través de iniciativas (Bush, 2004) y cambios legislativos, como la Health Information Technology for Economic Clinical Health Act (HITECH Act) (U.S. Department of Health & Human Services, 2009). No sorprende por tanto que los principales proveedores de soluciones de historia clínica electrónica por cuota de mercado sean compañías de los EE.UU. (Landi, 2018).

En España la informatización de los hospitales tuvo un punto de inflexión gracias a la puesta en marcha del Plan DIAS (Dotación Informática de las Áreas Sanitarias) (El País, 1988) a finales de la década de los años 80 del siglo pasado, a partir del cual se informatizan los distintos hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). Sin embargo, el foco de estos sistemas se encontraba en los procesos clínico-administrativos y de gestión económica, y no tanto en los procesos clínicos (Ayuso and Grande, 2012). De acuerdo a esta fuente: “La aparición y extensión de “nuevas tecnologías” a finales del siglo pasado como los sistemas abiertos (en contraposición a los sistemas propietarios o Mainframe), los sistemas operativos Unix, Linux y Windows, las redes locales TCP/IP, los lenguajes de programación orientados a objetos o las arquitecturas de aplicación multicapa y web, por destacar algunas, supusieron un importante empujón a las posibilidades técnicas disponibles para implementar Sistemas de Información orientados a esos otros ámbitos, más clínicos, que quedaron inicialmente “abandonados” por el proceso informatizador. Así, se puede considerar que con el nuevo milenio comienzan a despegar los sistemas de información integrales, aportando soporte informático a procesos completos en el ámbito asistencial (inicialmente procesos departamentales, como Radiología o Laboratorios) y a la Historia Clínica (con el apellido “Electrónica” a partir de entonces, abreviadamente HCE). De nuevo, este impulso no llega a muchos centros. Las causas no están claras, pero podemos apuntar dos factores fundamentales: el alto coste (económico y organizativo) que supone su adopción y la falta de evidencia respecto del valor realmente aportado por estas nuevas soluciones.”

Hoy en día, los sistemas de Historia Clínica Electrónica, junto con las aplicaciones departamentales, son el núcleo de la arquitectura de sistemas presente en cualquier hospital, orientada a dar una adecuada cobertura a los procesos gerenciales, asistenciales y de soporte, tal y cómo se muestra en la Figura 4 (Ayuso and Grande, 2012).

Figura 4 – Mapa de procesos de trabajo hospitalarios típicamente correspondientes a sistemas de información.

Estos sistemas implementan las distintas funcionalidades necesarias para el desarrollo de los procesos mencionados. La arquitectura más habitual consiste en un sistema de HCE integrado con distintos sistemas departamentales que implementan funcionalidades específicas de un servicio hospitalario (típicamente de los Servicios Centrales, como Radiodiagnóstico, Laboratorio o Farmacia) y un conjunto de sistemas (típicamente ERP) para la gestión administrativa (Recursos Humanos, Gestión Económica, Compras, Contratación, Mantenimiento, etc.).

Dada la amplitud de procesos y funciones que deben ser cubiertas por los sistemas de información asistenciales, no es de extrañar que en un hospital convivan múltiples sistemas de información operacionales sin que estén plenamente resueltos aspectos clave como la experiencia de los usuarios (Friedberg *et al.*, 2013) (Sinsky *et al.*, 2016), la interoperabilidad entre sistemas (Kellermann and Jones, 2013) y el aprovechamiento de los datos para ofrecer un conocimiento de utilidad para la toma de decisiones allá dónde se requiera (incluso a pie de cama) (Murdoch and Detsky, 2013).

Si bien no existen estándares formales, de uso común en los hospitales, para establecer una única arquitectura de sistemas posible, tradicionalmente se han desarrollado modelos de referencia en base a su extensión en el mercado. Así, es típica la distinción entre soluciones completas de un único proveedor (denominadas *best-in-suite*, *best-in-class*, *best fit* o *all-in-one*) y soluciones integradas de distintos proveedores (*best-of-breed*). De acuerdo al informe elaborado por la consultora KLAS, dos proveedores de soluciones HCE (Epic y Cerner) copan el mercado internacional, sumando más camas hospitalarias que el resto de sus competidores juntos (KLAS, 2019). Sin embargo, no parece existir un acuerdo unánime respecto de qué

arquitectura es superior en términos generales, sino que es necesario estudiar aspectos como cobertura funcional, costes de adquisición, implementación y mantenimiento, esfuerzos de integración, política de actualizaciones o la dependencia de proveedores externos entre otros aspectos (Shelton, 2018) (Castillo, 2017). Sin embargo, sí disponemos de un estándar que permite realizar comparaciones del grado de informatización de los hospitales respecto de las mejores prácticas de la industria. El estándar EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model) de la organización HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) (HIMSS, 2017) establece 8 niveles (del nivel 0 al 7) de adopción de distintas tecnologías, sin establecer qué configuración concreta de sistemas debe implementarse en un hospital concreto.

2.3.3. Almacenamiento y consulta de datos

Desde los años 70 del siglo pasado, los sistemas de bases de datos relacionales (RDBMS) (Codd, 1970) y el lenguaje de programación asociado para su manipulación y consulta (*Structured Query Language* o SQL) (Chamberlin and Boyce, 1976) han sido y aún siguen siendo en sus distintas evoluciones (International Organization for Standardization, 2016) las soluciones dominantes para el almacenamiento de datos estructurados y su explotación posterior, bien de forma directa o a través de aplicaciones informáticas. Entre las principales soluciones RDBMS operacionales, esto es, orientadas a soportar las transacciones que se producen en los procesos de trabajo de un determinado negocio, se encuentran soluciones como Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL o IBM DB2 (Gartner, 2018). Sin embargo, estos sistemas no están específicamente diseñados para el análisis de datos, lo que ha favorecido a lo largo del tiempo el desarrollo de soluciones alternativas para abordar esta problemática de una forma más eficiente, especialmente en un entorno de análisis masivo de datos con las características específicas que trataremos en el siguiente capítulo para el caso de *Big Data Analytics*. En este sentido, la introducción del concepto *Data Warehouse* (DW), definido como un “conjunto de datos orientados por temas, integrados, variantes en el tiempo y no volátiles, que tienen por objetivo dar soporte a la toma de decisiones”, y del *Data Mart* (DM), como un conjunto de datos estructurado específicamente para las necesidades de un departamento o área de negocio (Inmon, 2002), revolucionaron este campo a través de un diseño específico de bases de datos relacionales orientado al análisis de datos, y no sólo al registro de transacciones. En este sentido, se distinguen dos aproximaciones distintas, la planteada por Inmon (*Corporate Information Factory* (CIF) o también conocida como descendente o *top-down*), que ha sido referida previamente, y la de Kimball (*dimensional models*, ascendente o *bottom-up*) (Kimball and Ross, 2013). En paralelo al desarrollo de los conceptos de *Data Warehouse* y *Data Marts*, la introducción del concepto de análisis de datos multidimensional o procesamiento de bases de datos OLAP (*On-Line Analytical Processing*) (Codd and Codd, 1993), basado en la configuración

de datos en forma de cubos (matrices multidimensionales) que contienen medidas y dimensiones (variables en función de las cuales varían las medidas) y en un conjunto de operaciones estándar (*Dice, Slice, Drill down / up, Pivot*) permitió abordar el análisis de grandes volúmenes de información con elevado rendimiento. Típicamente, los sistemas OLAP se implementan directamente sobre RDBMS o sobre un *Data Warehouse* basado a su vez en RDBMS con un modelo de datos en forma de estrella o copo de nieve. A pesar de su antigüedad, estas soluciones son las más extendidas en el ámbito hospitalario del SNS, si bien en los últimos años la tendencia es la utilización de soluciones *cloud* con un abordaje integral del almacenamiento, la gestión, el procesamiento y la entrega de los datos, independientemente de la tecnología subyacente para su almacenamiento (bases de datos relacionales, XML, JSON, grafos, etc.) (Gartner, 2019).

2.3.4. *Big Data*, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

De acuerdo a la definición elaborada por la plataforma tecnológica europea NESSI (Networked European Software and Services Initiative), “*Big Data*” es un término que abarca el uso de técnicas para capturar, procesar, analizar y visualizar conjuntos de datos potencialmente grandes en un marco temporal razonable no accesible a las TI (Tecnologías de la Información) estándar. Dicha plataforma elaboró en diciembre de 2012 un documento (Networked European Software and Services Initiative (NESSI), 2012) con una visión muy completa desde un punto de vista técnico, legal, social y de mercado respecto del *Big Data*, incluyendo los principales retos identificados para conseguir una adecuada implementación que permita aprovechar las oportunidades que surgen en los distintos sectores industriales.

Si bien el término *Big Data* ha sido el que ha acaparado una mayor repercusión mediática, su uso ha decaído (o al menos se ha estabilizado) en los últimos tiempos en favor de otros términos que intentan recoger de una manera más adecuada la orientación actual en el ámbito del análisis de la información. Prueba de ello es la tendencia histórica de búsquedas del término “*Big Data*” en Google desde 2008 hasta 2018 y artículos que directamente afirman su caducidad (Park, 2019).

Figura 5 - Tendencia de búsquedas en Google del término *Big Data*.

En los últimos tiempos, el término Ciencia de Datos (*Data Science* o DS) se ha popularizado en detrimento del término *Big Data* por ofrecer cabida a un mayor número de conceptos relacionados con el análisis de datos y la conversión de los mismos en información para la toma de decisiones, no necesariamente en los elevados volúmenes de datos en los que se ubica el *Big Data*. *Data Science* es un término que surge de la convergencia de distintos ámbitos científicos, como se resume en la siguiente figura.

Figura 6 – *Data Science* como convergencia de disciplinas.

Data Science integra conceptos provenientes de las matemáticas, la programación y el conocimiento sectorial específico en cada ámbito productivo (el cáncer en nuestro caso). De esta forma, conceptos como la investigación con métodos estadísticos, el procesamiento de datos (del que el concepto *Big Data* forma parte, junto con otros como la minería de datos o *Data Mining*) y el aprendizaje automático o *Machine Learning*, forman parte de este concepto.

Sin embargo, de nuevo la mediatización de esta cuestión y su rápida evolución ha provocado que los términos que más impacto estén teniendo sean aquellos que hacen referencia a una rama específica de *Data Science*, como el aprendizaje automático o *Machine Learning* (ML), que forma parte así mismo del campo de la Inteligencia Artificial (*Artificial Intelligence* o AI). El gran número de conceptos asociados, que hemos plasmado en la siguiente figura, y que además evolucionan en importancia mediática a lo largo del tiempo en función de los distintos desarrollos y resultados que obtienen, provoca en ocasiones una cierta confusión y complica su implementación en el ámbito sanitario.

Figura 7 – Conceptos relacionados en el ámbito del análisis de datos.

Para evitar esta confusión y manejar unas definiciones operativas en este trabajo de tesis, utilizaremos el término *Data Science* (DS) para referirnos al cuerpo de conocimiento científico que se centra en analizar los datos para obtener un conocimiento, a través de la descripción de los datos o la búsqueda de patrones ocultos (no evidentes) en los mismos, en línea con lo expresado en publicaciones de referencia (Provost & Fawcett, 2013). La minería de datos (*Data Mining*) sería parte de este campo, facilitando la extracción de conocimiento a través de la identificación de patrones, tales como asociaciones entre variables, identificación de sujetos similares a uno dado y poblaciones con un comportamiento homogéneo (*clustering*).

Machine Learning (ML), también denominado aprendizaje automático, ofrece métodos para extraer de los datos aquellos patrones que permitan clasificar nuevos datos recibidos. Se ha definido ML como un subconjunto de la AI que usa algoritmos que proporcionan a los computadores la capacidad de aprender sin ser explícitamente programados para ello (USAID, 2019). En este ámbito de ML, *Deep Learning* ofrece unos algoritmos avanzados de clasificación basadas en el concepto de red neuronal que ofrecen unos resultados muy prometedores (Rajkomar *et al.*, 2018).

En lo relativo a la Inteligencia Artificial (*Artificial Intelligence* o AI), se trata de un término que con el tiempo ha ido difuminando su definición, llegando incluso a englobar procesos típicos de DS. Se ha definido la AI como el uso de computadores para la automatización de la toma de decisiones con el fin de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana (USAID, 2019). Para ello, se requieren en muchos casos otros desarrollos adicionales, como puede ser el procesamiento de imagen y la visión artificial (*computer vision*), el procesamiento de lenguaje natural (NLP), las infraestructuras inteligentes (habilitadas por la interconexión vía internet de objetos cotidianos, el llamado *Internet of Things* o IoT) y las herramientas para la potenciación de las capacidades humanas (como la realidad aumentada o AR). Las orientaciones más recientes del concepto de AI amplían notablemente su alcance, incluyendo no sólo el ámbito de los datos sino también de la robótica y de otras tecnologías inteligentes (BDVA, 2019), e identifican esta tecnología como un componente más de un concepto más amplio de salud digital (*digital health*) (USAID, 2019).

Big Data ofrece un soporte tecnológico a los ámbitos de *Data Science*, *Machine Learning* y AI mediante métodos y herramientas que permiten el procesamiento de los grandes volúmenes de información heterogénea que se producen (y son requeridos por los algoritmos que dan soporte a los ámbitos indicados), y que además se generan y se procesan a una alta velocidad para que el conocimiento extraído, la toma de decisión y la acción resultante pueda tomarse en tiempo real (o en un corto espacio de tiempo).

La necesidad de acción en el mínimo tiempo posible es una característica inherente de la asistencia sanitaria, y es de esperar que la velocidad de respuesta sea una de las características fundamentales en un futuro próximo, como algunas experiencias en el ámbito pediátrico están demostrando a través de la realización de secuenciación masiva para informar el tratamiento en el menor plazo temporal posible (Clark *et al.*, 2019).

En resumen, para poder obtener conocimiento, predecir y tomar acciones en consecuencia a partir de los datos a través de técnicas de DS, ML y AI, hemos de tener en cuenta los requisitos de volumen, variedad y velocidad de los mismos. Si bien la definición de los distintos conceptos es dinámica, evolucionando notablemente en los últimos años, es necesario conocer

adecuadamente las posibilidades y los requisitos de estas tecnologías para imaginar sus posibles aplicaciones médicas, y en concreto en el ámbito oncológico.

2.3.5. Procesado del Lenguaje Natural (NLP)

El Procesado del Lenguaje Natural (*Natural Language Processing* o NLP) se ocupa de la construcción de modelos computacionales para el entendimiento del lenguaje natural, esto es, de cualquier lenguaje usado por los seres humanos (en contraposición a los lenguajes de programación usados por los computadores). Específicamente, la Extracción de Información (*Information Extraction* o IE), como sub campo del NLP, permite obtener información del texto escrito a través de una serie de procesos que típicamente se ejecutan en serie, y que pueden estar basados en reglas predefinidas o en técnicas estadísticas y de ML (Meystre *et al.*, 2008). El entrenamiento de los modelos requiere no sólo de la incorporación de textos (corpus) como entrada, sino de los metadatos necesarios para su adecuada interpretación (lo que se conoce como “anotación del texto”). Así pues, el desarrollo de sistemas de NLP requiere no sólo de la realización de distintos procesos sobre el texto (separación de palabras o *tokens*, detección de oraciones, detección del tipo de palabra, análisis sintáctico de estructuras, etc.) (Meystre *et al.*, 2008), sino de la existencia de corpus anotados que permitan entrenar los modelos necesarios para la extracción de información del texto. Esto supone, en nuestro ámbito, disponer de corpus anotados de textos clínicos procedentes de la HCE en nuestro idioma. Los textos clínicos presentan además una serie de características específicas, como frases cortas, abreviaciones, acrónimos y errores de ortografía, que complican la aplicación de NLP (Meystre *et al.*, 2008) (Liu, Lussier and Friedman, 2001) (Ruch, Baud and Geissbühler, 2003). Si bien la disponibilidad de corpus anotados en español es escasa, podemos mencionar AnCora como un corpus de más de 500.000 palabras (Recasens and Martí, 2010). Sin embargo, está elaborado a partir de textos periodísticos y no de textos clínicos.

2.3.6. Metodologías para el análisis de datos: CRISP-DM

Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) surge a finales de los años 90 del siglo XX, desde el ámbito empresarial, con el objetivo de unificar las distintas aproximaciones existentes para la realización de proyectos de minería de datos (*Data Mining* o DM) y evitar un aprendizaje de todos aquellos que se incorporaban a este ámbito basado en la mera prueba y error (Chapman *et al.*, 2000). A lo largo de los años, CRISP-DM se ha convertido en la metodología más usada para el desarrollo de proyectos de descubrimiento de conocimiento y minería de datos y el estándar de facto de la industria (Marbán, Mariscal and Segovia, 2012).

Mostramos a continuación las principales fases y tareas genéricas del proceso CRISP-DM descritas en la metodología:

http://es.wikipedia.org/wiki/Cross_Industry_Standard_Process_for_Data_Mining

Figura 8 – Fases de la metodología CRISP-DM.

1. **Comprensión del negocio (*Business Understanding*).** El objetivo de esta fase es describir objetivos (metas) concretos del negocio (preguntas de investigación) y transformarlos en problemas que pueden ser resueltos mediante técnicas de *data mining*. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas:
 - a. Determinar los objetivos del negocio.
 - b. Evaluar la situación.
 - c. Determinar los objetivos a realizar mediante *data mining*.
 - d. Elaborar el plan del proyecto.
2. **Comprensión de los datos (*Data Understanding*).** En esta fase el objetivo principal es adquirir un conocimiento inicial sobre los datos a través de su descripción y exploración, identificando posibles problemas de calidad. El resultado de esta fase permite informar nuevamente la fase anterior, propiciando la identificación y priorización de las preguntas o metas de negocio. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas:
 - a. Realizar una obtención inicial de los datos.
 - b. Describir y explorar los datos.

- c. Comprobar la calidad de los datos.
- 3. **Preparación de los datos (*Data Preparation*)**. En esta fase se realizan las tareas necesarias para obtener el conjunto de datos (*dataset*) que servirá para el modelado posterior. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas:
 - a. Seleccionar y obtener los datos de las distintas fuentes disponibles.
 - b. Limpiar los datos.
 - c. Generar datos necesarios (variables derivadas).
 - d. Integrar los datos de distintas fuentes.
 - e. Dar el formato requerido a los datos.
- 4. **Modelado (*Modeling*)**. En esta fase se seleccionan y se aplican óptimamente los distintos modelos posibles. Dado que las distintas técnicas disponibles pueden tener distintos requerimientos sobre los datos, a menudo es necesario volver a la fase anterior de preparación de datos. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas:
 - a. Seleccionar las técnicas de modelado.
 - b. Generar un diseño de prueba.
 - c. Elaborar los modelos a partir de los datos.
 - d. Evaluar los modelos.
- 5. **Evaluación (*Evaluation*)**. En esta fase se comprueba si los modelos elaborados cumplen adecuadamente con los objetivos de negocio especificados y se define cómo serán usados los modelos elaborados. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas:
 - a. Evaluación de resultados.
 - b. Revisión del proceso seguido.
 - c. Determinación de los próximos pasos.
- 6. **Despliegue (*Deployment*)**. En esta fase se ponen a disposición del negocio los resultados obtenidos, ya sean modelos que pasan a un entorno productivo con nuevos datos para soportar la toma de decisiones o nuevo conocimiento generado en el proceso, que debe ser organizado y presentado para su aprovechamiento efectivo por el negocio. Se realizan por tanto las siguientes tareas genéricas:
 - a. Elaboración del plan de despliegue.
 - b. Planificación de la monitorización y el mantenimiento de los modelos.
 - c. Informe final del proyecto.
 - d. Revisión y documentación del proyecto.

CRISP-DM asume una naturaleza cíclica del proceso de *Data Mining*, dado que las lecciones aprendidas en una iteración del proceso pueden ser aplicadas en subsiguientes iteraciones, facilitando en muchos casos la aparición de nuevos (o más enfocados) objetivos de negocio.

CRISP-DM prevé además la complejidad inherente a la implementación del proceso en distintos ámbitos y circunstancias, flexibilizando su definición y guiando la correspondencia entre las fases y tareas genéricas descritas y las tareas específicas a desarrollar. Para ello establece el concepto de contexto de acuerdo a distintas dimensiones, que serán concretadas en cada aplicación de la metodología a unos objetivos concretos:

- Dominio en el que se aplicará el proceso de *Data Mining*.
- Tipos de problemas de *Data Mining* (de objetivos a resolver).
- Aspectos técnicos.
- Herramientas y técnicas a utilizar.

2.3.7. Herramientas para el análisis de datos

La gran evolución de las posibilidades para el almacenamiento y consulta de datos permitió la aparición de herramientas software específicas para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones empresariales basados en estos. En este sentido, destacamos las arquitecturas y soluciones de *Business Intelligence* (BI), que tuvieron su gran eclosión en los años 80 del siglo pasado con la aparición del concepto de *Data Warehouse* y las soluciones para la obtención de informes (*reporting*) y análisis de datos (p. ej.: Crystal Reports, MicroStrategy). De acuerdo a la definición de Howard Dresner (Gartner), BI agrupaba conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones de negocio a través del uso de sistemas de soporte basados en los hechos (Lago, 2018). A pesar de la enorme evolución tecnológica de las últimas décadas, que ha permitido mejoras radicales en el rendimiento y usabilidad de las aplicaciones de BI, el concepto subyacente y su funcionalidad se mantienen muy similares a los planteados en su origen. En los últimos años, han proliferado herramientas con una mayor funcionalidad y usabilidad, que facilitan su utilización por usuarios no técnicos (de áreas de negocio) en una modalidad *self-service* y que permiten no sólo la realización de visualizaciones de datos complejas de una forma ágil (*visual analytics*) sino la gestión completa del proceso de análisis de datos, desde la obtención y preparación de los datos hasta la exploración visual y la obtención de nuevos conocimientos basados en los datos, utilizando herramientas como ML y NLP (*augmented analytics*) (Howson *et al.*, 2019). La introducción de estas nuevas capacidades se observa como un hecho disruptivo en el mercado de las soluciones de análisis de datos que marcará su evolución futura (Idoine, Howson and Sallam, 2017).

En paralelo al desarrollo de estos sistemas modernos de BI, las herramientas tradicionales de análisis de datos procedentes del ámbito estadístico (como por ejemplo SAS, SPSS o STATA entre otras) han evolucionado para incorporar algoritmos de ML y otras funciones que automatizan la realización de análisis de datos (IBM Corporation, 2012). Sin embargo la auténtica disrupción en

esta materia ha sido el desarrollo de lenguajes de programación orientados a la estadística y el análisis de datos, como el lenguaje R (Ihaka and Gentleman, 1996), y muy especialmente el desarrollo de librerías de funciones de código abierto por una creciente comunidad de usuarios, tanto para R como para otros lenguajes generalistas, principalmente en Python, hasta el punto de convertirse en los últimos años en la principal plataforma de programación en el ámbito de ML (Tung, 2019) (Piatetsky, 2018).

2.3.8. Sistemas de soporte a la decisión clínica

Los primeros sistemas de soporte a la decisión (*Decision Support Systems* o DSS) fueron introducidos a principios de los años 70 del siglo XX, inicialmente bajo el término *Management Decision Systems* (Scott Morton, 1971). Desde entonces hasta nuestros días su definición ha sido un asunto controvertido, generalizándose casi desde su inicio hasta el punto de incluir a cualquier sistema que contribuyera de alguna manera a la toma de decisiones (esto es, incluyendo los sistemas informacionales y descartando los sistemas transaccionales) (Sprage, 1980). En nuestro trabajo consideraremos sistemas de soporte a la decisión clínica (CDSS) a aquellas aplicaciones informáticas con capacidad para facilitar información, realizar predicciones o realizar prescripciones que faciliten la toma de decisiones clínicas por el humano (Zikos and Delellis, 2018). Existe por tanto un solape evidente con las definiciones de *Data Science* (DS), *Machine Learning* (ML) y *Artificial Intelligence* (AI) tratadas previamente (ver capítulo 2.3.4), hasta el punto que se ha considerado el soporte a la decisión clínica como un caso de uso de la AI (USAID, 2019). Nótese que en la definición que proponemos, no es requisito la existencia de una relación probabilista entre la información disponible y la predicción o prescripción que realice el sistema, sino que puede estar determinada a priori de una forma determinista, en base a reglas. Por ejemplo, un sistema que alerte ante la prescripción de una medicación si el paciente tiene registrada una alergia al principio activo que contiene, sería considerado un CDSS aun cuando no maneja modelos matemáticos o probabilísticos basados en ML o AI. Sin embargo, respecto a los sistemas de análisis retrospectivo de datos, sí consideramos que el análisis de datos en tiempo real (o en un corto espacio de tiempo tras la generación del dato) es una característica única de los CDSS y que los distingue del resto de soluciones orientadas al análisis retrospectivo de datos. La capacidad de los CDSS para integrarse con la HCE y proporcionar un impacto favorable en los resultados en salud sobre pacientes individuales es otro de sus rasgos distintivos frente a otras soluciones de análisis de datos clínicos (Scott *et al.*, 2018).

2.4. ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS EN ONCOLOGÍA

A través de la informatización de los procesos relacionados con la salud de las personas (autogestión, promoción, prevención, asistencia, investigación, docencia) obtenemos unas mejoras operativas, en eficiencia, y unos datos (socioeconómicos y demográficos, epidemiológicos y de salud pública, valores y preferencias, hábitos y conductas, clínicos, moleculares). El objetivo de la aplicación de las tecnologías descritas en el capítulo 2.3.4 (DS, ML, AI, *Big Data*) debe ser por tanto mejorar los resultados en salud a través de los datos generados, produciendo un “retorno de inversión” del proceso de informatización.

Para ello es necesario establecer las aplicaciones concretas, los “casos de uso”, a través de los cuales la aplicación de las tecnologías de análisis de datos podrá devolvernos un beneficio cuantificable en la salud de las personas. Si bien hay mucha literatura al respecto, en general se tiende a indicar aplicaciones genéricas (Murdoch and Detsky, 2013) (USAID, 2019), y es difícil encontrar aplicaciones específicas en patologías concretas. En el ámbito del cáncer, la introducción del concepto *rapid-learning health care* implica realizar, de forma rutinaria e iterativa, la obtención de datos de forma planificada y estratégica, el análisis de los datos, la generación de evidencia a través de datos retrospectivos y prospectivos, la implementación del nuevo conocimiento generado en la práctica asistencial, la evaluación de los resultados obtenidos y la generación de nuevas hipótesis para investigación (Abernethy *et al.*, 2010). En los últimos años, distintas iniciativas han establecido posibles aplicaciones concretas, como Cancer LinQ de ASCO (Sledge, Miller and Hauser, 2013) (Sledge *et al.*, 2013) o la iniciativa Cancer Moonshot, que en su informe del grupo de trabajo de octubre de 2016 (Biden, 2016) establece múltiples medidas relacionadas con las tecnologías descritas.

Para la definición sistemática de aplicaciones de interés en el ámbito oncológico hemos repasado las distintas fases del proceso asistencial y sus principales procesos de trabajo descritos en el capítulo 2.1.2, realizando una búsqueda bibliográfica. De esta forma, identificamos las siguientes aplicaciones en el ámbito del cáncer de las distintas tecnologías de análisis de datos:

Prevención y detección temprana

- Identificación de poblaciones en riesgo (hereditario, social, ocupacional, por hábitos, entorno o dieta) (Ming *et al.*, 2019) y poblaciones sin medidas preventivas aplicadas.
- Información específica dirigida a personas en riesgo para que tomen un papel activo y modifiquen factores de riesgo o decidan acudir a una revisión médica (Coletta *et al.*, 2019).

- Desarrollo de un sistema de vigilancia de aspectos clínicos (reportados por el paciente, registrados en Atención Primaria o en visitas a los hospitales) que puedan sugerir que el paciente que ya pertenece a población en riesgo tiene un riesgo alto de estar desarrollando la enfermedad (Healy, Thirumurthi and You, 2019).
- Desarrollo de un sistema para la evaluación frecuente en el domicilio o en centros de salud de biomarcadores del cáncer en fases tempranas en pacientes de alto riesgo mediante técnicas de biopsia líquida. Existen publicaciones relativas a dispositivos PCR portátiles (Ahrberg *et al.*, 2016), e incluso pueden ser adquiridos a través de internet (por ejemplo, en compañías como Biomeme: <http://biomeme.com>).
- Diagnóstico de sospecha de la patología en base al sistema de vigilancia y los biomarcadores obtenidos. Compañías como Quantgene (<http://www.quantgene.com/>) o Grail (<https://grail.com/>) ya están trabajando en esta línea. Recientemente la FDA ha aprobado incluso la primera herramienta diagnóstica basada en AI que no requiere del concurso humano para el diagnóstico de retinopatía diabética (FDA, 2018b) .

Diagnóstico, tratamiento y seguimiento

Soporte al facultativo en la atención a un paciente individual:

- Medicina Personalizada y de Precisión: Soporte a toma de decisiones para la elección del mejor tratamiento en cada momento para cada paciente, comparando los datos del paciente con guías existentes y con estándares de atención sanitaria (Sledge, Miller and Hauser, 2013). Para ello, puede ser necesaria la obtención de variables de la HCE mediante tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (Becker *et al.*, 2019). Recientemente se han presentado nuevos datos acerca de la utilidad en esta aplicación de la herramienta IBM Watson for Oncology (Somashekhar *et al.*, 2017) (Somashekhar *et al.*, 2018) que, si bien son prometedores, han generado un fuerte escepticismo (Gyawali, 2018).
- Predicción de resultados del tratamiento para el paciente: respuesta, progresión, recaída, supervivencia, toxicidad y detección temprana de estos eventos (Rutherford *et al.*, 2019).

Soporte al facultativo en la atención al conjunto de la población a su cargo:

- Monitorización remota de los pacientes, generando alertas ante la detección de tendencias en los datos analizados (como constantes vitales) potencialmente peligrosas para el paciente (USAID, 2019).

- Obtención y análisis de los datos registrados por los pacientes (PROs), obtenidos mediante dispositivos conectados (IoT) y mediante otras fuentes de información, para identificar situaciones que pueden resultar en un pobre resultado clínico (p. ej.: indicación incorrecta, baja adherencia, efectos adversos, interacción con otros fármacos, formación inadecuada, sedentarismo, etc.) (LeBlanc and Abernethy, 2017).
- Intervención remota sobre los pacientes según su riesgo, la información de monitorización domiciliaria y sus necesidades personalizadas de acuerdo a su perfil (Mooney *et al.*, 2017).

Soporte a pacientes individuales:

- Asistentes basados en AI para la resolución de dudas del paciente y la autogestión de síntomas (USAID, 2019), derivando al paciente al servicio atendido por humanos en segundo nivel sólo en caso necesario. Actualmente ya hay experiencias para ofrecer soluciones online que permitan a los pacientes resolver dudas (por ejemplo, sobre sus síntomas), tales como la app móvil OncoApp (www.oncoapp.es), desarrollada en el HUPHM. Sin embargo, todavía no se ha extendido la posibilidad de disponer de un asistente dotado de AI que pudiera asesorar al paciente y derivarle al humano cuándo no pudiera ofrecerle una respuesta válida. En este sentido, el diseño de los *chatbots* (aplicaciones software capaces de mantener una conversación con el paciente) está dando pasos de gigante para disponer de un comportamiento y aspecto similar al humano. Compañías como Soul Machines (<https://www.soulmachines.com/>) disponen de avatares ultra realistas, y son varias las compañías que están teniendo un fuerte desarrollo en este campo de los *chatbots*, como puede verse en la siguiente figura (Sennaar, 2019):

	Your.MD	Sensely	Buoy Health	Infermedica	Florence
Funds raised	\$17.3 MM	\$11.8 MM	\$9 MM	\$5 MM	Unspecified
Year founded	2012	2013	2014	2012	2016
HQ location	London, UK	San Fran., CA	Boston, USA	Wroclaw, POL	Dortmund, DEU
Staff size	49	20	23	26	Unspecified
Target user	Patient, Clinician	Patient, Clinician	Patient	Patient, Clinician	Patient
Types of data processed	Chat (text)	Chat (text), image, video	Chat (text)	Chat (text), image, video	Chat (text)
Est. current users	Unspecified	Unspecified	Unspecified	Unspecified	2,000+?

Data collected from Crunchbase and LinkedIn, March 2018

Figura 9 – Comparación de Start-ups en el campo de los chatbots basados en AI en el ámbito sanitario.

Soporte a la investigación y a la gestión:

- Estructuración automática o semiautomática del texto libre contenido en la HCE a través de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo para la identificación de casos de cáncer de mama en el ámbito de la investigación clínica (Xie *et al.*, 2017).
- Predicción y planificación de necesidades de recursos asistenciales a través del análisis de los datos previamente recabados de actividad asistencial (USAID, 2019).
- Descripción de la asistencia sanitaria efectivamente prestada a los pacientes en función de sus características clínicas, y caracterización de su coste, para informar decisiones clínicas y de gestión (Skinner *et al.*, 2018) (Reeve *et al.*, 2018) (Knust *et al.*, 2017).
- Soporte para la implementación de paradigmas como la asistencia sanitaria basada en el valor (VBHC, ver capítulo 2.2.2) a través de la medición de los resultados clínicos de los pacientes y del coste efectivamente incurrido en su asistencia sanitaria.
- Conocimiento exacto de la base de pacientes (número y características) que permitan una mayor fiabilidad y credibilidad en el proceso de captación de Ensayos Clínicos con la industria farmacéutica (USAID, 2019).

- Realización masiva de ensayos clínicos $N = 1$ (*N-of-1 trials*), integrando la información de miles de pacientes (Schork, 2015).
- Identificación de predictores moleculares y clínicos de eventos de interés (diagnóstico, respuesta, recaída, toxicidad, fallecimiento) (Project IASIS, 2019).

2.5. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

2.5.1. Nuevo marco legal y normativo

El marco legal y normativo ha sufrido numerosos cambios en los últimos años, y específicamente durante el desarrollo de este trabajo de tesis, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Sólo desde 2018 se han identificado en este trabajo 11 normas y guías, que se unen a las 17 normas y guías vigentes identificadas anteriores a 2018, con aplicación al ámbito de la protección de datos personales. Entre las normas recientes más relevantes, podemos mencionar las siguientes:

- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos - RGPD) (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016b).
- Transposición del RGPD al marco normativo nacional a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD o L.O. 3/2018) (Boletín Oficial del Estado, 2018).
- DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI - NIS). Transposición al marco normativo nacional a través del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016a).
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula

el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (Boletín Oficial del Estado, 2010). Si bien no se trata de una normativa reciente, la disposición adicional primera de la nueva LOPDGDD indica que las entidades del sector público “deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad”.

2.5.1.1. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

El RGPD, con vigencia plena desde el 25 de mayo de 2018, es una norma directamente aplicable, que no requiere de normas internas de trasposición ni tampoco, en la mayoría de los casos, de normas de desarrollo o aplicación. De esta forma la norma de referencia es el RGPD y no las normas nacionales. Desde un punto de vista práctico, implica distintas novedades frente a la legislación previa en el ámbito hospitalario:

- Necesidad de mantener y publicar un Registro de Tratamientos frente a la obligación previa de declarar ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- Nuevas figuras: Responsable del Tratamiento (RT), Encargado del Tratamiento (ET) y Delegado de Protección de Datos (DPD), que se constituye como un Comité Delegado de Protección de Datos en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para todos los hospitales de la red sanitaria pública. Se introduce además la figura de los corresponsables del tratamiento (CoRT) y del personal con acceso a datos (PAD).
 - Responsable del Tratamiento (RT): persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. Esta figura es asumida por el Gerente del Hospital en la red de hospitales públicos del SERMAS.
 - Encargado del Tratamiento (ET): persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Esta figura es asumida por todos aquellos proveedores que tratan datos personales por cuenta del Hospital.
 - Delegado de Protección de Datos (DPD): Figura que realizará funciones de información, asesoramiento y supervisión, de acuerdo a lo especificado en la sección 4 del RGPD.

Figura 10 – Actores introducidos por el RGPD en el marco de la protección de datos personales.

- Se introducen nuevos derechos, superando los especificados por la LOPD española (ARCO):
 - Supresión (olvido): derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales que le conciernan.
 - Oposición: derecho a oponerse a que los datos personales sean objeto de tratamiento.
 - Portabilidad: derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
 - Limitación: derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos (por inexactitud, ilicitud del tratamiento, para el ejercicio de derechos, cautelarmente).
 - Acceso: derecho que ostenta el interesado a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y en su caso, se deberá facilitar la información que se tenga sobre su persona.
 - Rectificación: derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del tratamiento, la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.

- Se introduce el principio de responsabilidad proactiva y enfoque según el riesgo:
 - El RT debe aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD
 - Se requiere analizar qué datos se tratan, con qué finalidades y qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo. En consecuencia, se determinarán qué medidas de seguridad aplicar y cómo demostrar su aplicación a los interesados y autoridades.
 - Se requiere una actitud consciente, diligente y proactiva.
 - Las medidas para el cumplimiento del RGPD deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas. Por tanto, no serán iguales en todas las organizaciones y tratamientos.
 - El RGPD condiciona la adopción de las medidas de responsabilidad activa al riesgo que los tratamientos puedan suponer para los derechos y libertades de los interesados.
 - Deberá realizarse una evaluación de Impacto sobre la Protección de Datos (EIPD) con carácter previo a la puesta en marcha de aquellos tratamientos con alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados, y también para los tratamientos de alto riesgo existentes.
- Se introduce el concepto de “seudonimización” como el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Si bien “Los datos personales pseudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable.” y por tanto están bajo la regulación del RGPD, se reconoce que “La aplicación de la pseudonimización a los datos personales puede reducir los riesgos para los interesados afectados y ayudar a los responsables y a los encargados del tratamiento a cumplir sus obligaciones de protección de los datos.”.
- Otros cambios respecto de la Directiva 95/46 y la LOPD.

- Consentimiento inequívoco: El consentimiento debe ser inequívoco, esto es, se ha prestado mediante una manifestación del interesado o mediante una clara acción afirmativa. No es válido el consentimiento tácito o por omisión.
- La información a los interesados deberá proporcionarse de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. LOPD: de modo expreso, preciso e inequívoco.
- El RT deberá garantizar y estar en condiciones de demostrar que el ET seleccionado cumple con el RGPD en los tratamientos que realiza. Es necesario por tanto un nuevo contrato entre el RT y el ET.
- Los ET tienen obligaciones propias más allá del contrato que los une al RT y pueden adherirse a códigos de conducta o certificaciones previstas en el RGPD.
- Nuevo régimen sancionador, con mayores cuantías económicas.

El RGPD tiene un impacto importante en el ámbito de la investigación y ha sido motivo de numerosos análisis (Chico, 2018) (Rumbold and Pierscioneck, 2017). La Agencia Española de Protección de Datos emitió un informe de posicionamiento en este sentido, indicando que “el Reglamento General de Protección de Datos y el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, no sólo mantienen inalterado el régimen contenido en la normativa reguladora de la investigación biomédica, sino que permiten realizar una interpretación más flexible del alcance que puede darse al consentimiento prestado de conformidad con la misma, superando, a título de ejemplo, la interpretación más restrictiva contenida en el artículo 60 de la Ley de Investigación Biomédica.” (Agencia Española de Protección de Datos, 2018b)

2.5.1.2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)

La LOPDGDD adapta y complementa el Reglamento (UE) 2016/679 en cumplimiento del artículo 18.4 de la Constitución. Entre otros aspectos de interés para nuestro trabajo, establece lo siguiente:

- Artículo 82. Derecho a la seguridad digital. Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos.
- Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en el ámbito del sector público. Se explicita la plena aplicación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el sector público, y por tanto a los hospitales públicos del SNS dependientes de las

administraciones de las comunidades autónomas. Se indica así mismo que el ENS aplica también cuando un tercero preste un servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato.

- Disposición adicional decimoséptima. Tratamientos de datos de salud.
 - Los tratamientos de datos de salud deben estar basados en el consentimiento en el ámbito de la investigación biomédica, a excepción de las autoridades sanitarias e instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud pública, que podrán llevar a cabo estudios científicos sin el consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública.
 - Es lícito reutilizar datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas, con aprobación del Comité Ético del centro y la información correspondiente a los afectados.
 - Es lícito el uso de datos personales seudonimizados. Para ello se requiere la separación técnica y funcional entre los equipos (las personas con capacidad para reidentificar a los pacientes y los investigadores), el compromiso de confidencialidad y de no reidentificación por parte del equipo de investigación y la aplicación de medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación no autorizada.
 - Se requiere la evaluación de impacto que determine los riesgos derivados del tratamiento en los supuestos previstos en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679, y específicamente los riesgos de reidentificación.
 - El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica deberá ser sometido al informe previo del comité de ética de la investigación previsto en la normativa sectorial.

2.5.1.3. Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información

La DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI - NIS) ha sido traspuesta al marco normativo nacional a través del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. Su objeto es regular la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales y

específicamente establecer un sistema de notificación de incidentes. Destacamos los siguientes aspectos de aplicación a nuestro ámbito:

- Art.2. Alcance
 - Los servicios esenciales dependientes de las redes y sistemas de información comprendidos en los sectores estratégicos definidos en el anexo de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
 - Aplica a redes, aplicaciones, dispositivos y datos.
 - La Salud es un servicio esencial (Art 2.1 y anexo ley 8/2011, Art. 3 y 6).
- Art.3. Definiciones
 - Seguridad de las redes y sistemas de información: la capacidad de las redes y sistemas de información de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, toda acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad o confidencialidad de los datos almacenados, transmitidos o tratados, o los servicios correspondientes ofrecidos por tales redes y sistemas de información o accesibles a través de ellos.
 - Riesgo: toda circunstancia o hecho razonablemente identificable que tenga un posible efecto adverso en la seguridad de las redes y sistemas de información. Se puede cuantificar como la probabilidad de materialización de una amenaza que produzca un impacto en términos de operatividad, de integridad física de personas o material o de imagen.
 - Incidente: suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento de la seguridad de las redes y sistemas de información.
- Art 16. Obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales.
 - Gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados en la prestación de los servicios
 - Notificar incidentes.
 - Establecer medidas adecuadas para prevenir y reducir al mínimo el impacto de los incidentes. La definición de dichas medidas está pendiente de desarrollo reglamentario.

- Designar y comunicar la persona, unidad u órgano colegiado responsable de la seguridad de la información
- Art. 19. Obligación de notificar.
 - Los operadores de servicios esenciales notificarán a la autoridad competente, a través del CSIRT de referencia, los incidentes que puedan tener efectos perturbadores significativos en dichos servicios.
 - Las autoridades competentes y los CSIRT de referencia utilizarán una plataforma común para facilitar y automatizar los procesos de notificación, comunicación e información sobre incidentes.
- Artículo 20. Protección del notificante.
 - Las notificaciones consideradas en este título no sujetarán a la entidad que las efectúe a una mayor responsabilidad.
 - Los empleados y el personal [...] no podrán sufrir consecuencias adversas en su puesto de trabajo o con la empresa, salvo en los supuestos en que se acredite mala fe en su actuación.
- Disposición adicional tercera: La plataforma común para la notificación de incidentes prevista en este real decreto-ley podrá ser empleada para la notificación de vulneraciones de la seguridad de datos personales según el Reglamento (UE) 2016/679.

2.5.1.4. *Esquema Nacional de Seguridad (ENS)*

El ENS fue creado por el artículo 42.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Por tanto, procede del ámbito de la Administración Electrónica, y convivió con el Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, que fue la normativa de aplicación en el ámbito sanitario. No obstante, la disposición adicional primera de la LOPDGDD ha cambiado esta situación, siendo ahora el ENS la normativa de referencia en materia de medidas de seguridad y protección de datos en el ámbito sanitario. Esto supone la integración de la seguridad de los datos personales del ámbito sanitario en el marco global de ciberseguridad recogido en el ENS.

Destacamos a continuación los principales aspectos de aplicación del ENS a nuestro ámbito:

- **Principios básicos:**
 - **Art. 5: Seguridad integral.** “La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por todos los elementos técnicos, humanos, materiales y

organizativos, relacionados con el sistema”. “Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas que intervienen en el proceso y a sus responsables jerárquicos, para que, ni la ignorancia, ni la falta de organización y coordinación, ni instrucciones inadecuadas, sean fuentes de riesgo para la seguridad.”

- **Art. 6: Gestión de la seguridad basada en los riesgos.** “La gestión de riesgos permitirá el mantenimiento de un entorno controlado, minimizando los riesgos hasta niveles aceptables. La reducción de estos niveles se realizará mediante el despliegue de medidas de seguridad, que establecerá un equilibrio entre la naturaleza de los datos y los tratamientos, los riesgos a los que estén expuestos y las medidas de seguridad.”.
- **Art. 7: Prevención, reacción y recuperación.** “La seguridad del sistema debe contemplar los aspectos de prevención, detección y corrección, para conseguir que las amenazas sobre el mismo no se materialicen, no afecten gravemente a la información que maneja, o los servicios que se prestan.”.
- **Art. 8: Líneas de defensa.** “El sistema ha de disponer de una estrategia de protección constituida por múltiples capas de seguridad”. “Las líneas de defensa han de estar constituidas por medidas de naturaleza organizativa, física y lógica.”.
- **Art. 9: Reevaluación periódica.** “Las medidas de seguridad se reevaluarán y actualizarán periódicamente, para adecuar su eficacia a la constante evolución de los riesgos y sistemas de protección, llegando incluso a un replanteamiento de la seguridad, si fuese necesario.”.
- **Art. 10: Función diferenciada.** “[...] se diferenciará el responsable de la información, el responsable del servicio y el responsable de la seguridad.”.
- **Requisitos mínimos:**
 - **Art. 11. Política de Seguridad:** “Todos los órganos superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política de seguridad [...]”.
 - **Art. 13. Gestión de riesgos:** “Cada organización que desarrolle e implante sistemas para el tratamiento de la información y las comunicaciones realizará su propia gestión de riesgos. Esta gestión se realizará por medio del análisis y tratamiento de los riesgos a los que está expuesto el sistema. Sin perjuicio de lo

dispuesto en el anexo II, se empleará alguna metodología reconocida internacionalmente”, como por ejemplo Magerit / PILAR.

- **Art. 14, 15. Personal.** “Todo el personal relacionado con la información y los sistemas deberá ser formado e informado de sus deberes y obligaciones en materia de seguridad.”. “La seguridad de los sistemas estará atendida, revisada y auditada por personal cualificado, dedicado e instruido en todas las fases de su ciclo de vida: instalación, mantenimiento, gestión de incidencias y desmantelamiento.”
- **Auditorías de Seguridad. Art. 34:** cada 2 años y en función de la categoría del sistema.
- **Categorización de los sistemas de información. Art. 43 y Anexo I. Categorías de los sistemas.** “[...] modulará el equilibrio entre la importancia de la información que maneja, los servicios que presta y el esfuerzo de seguridad requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del principio de proporcionalidad”.

Figura 11 – ENS: Determinación de la categoría de los sistemas en función del impacto de los incidentes sobre las distintas dimensiones de seguridad.

- **Relación detallada de medidas de seguridad. Anexo II.** El ENS define hasta 75 medidas de seguridad que son definidas en detalle de acuerdo a la categoría establecida para el sistema de información.

«Dimensiones				Medidas de seguridad	
Afectadas	B	M	A		
				org	Marco organizativo
categoría	aplica	=	=	org.1	Política de seguridad
categoría	aplica	=	=	org.2	Normativa de seguridad
categoría	aplica	=	=	org.3	Procedimientos de seguridad
categoría	aplica	=	=	org.4	Proceso de autorización
				op	Marco operacional
				op.pl	Planificación
categoría	aplica	+	++	op.pl.1	Análisis de riesgos
categoría	aplica	+	++	op.pl.2	Arquitectura de seguridad
categoría	aplica	=	=	op.pl.3	Adquisición de nuevos componentes
D	n.a.	aplica	=	op.pl.4	Dimensionamiento/Gestión de capacidades
categoría	n.a.	n.a.	aplica	op.pl.5	Componentes certificados
				op.acc	Control de acceso
AT	aplica	=	=	op.acc.1	Identificación
ICAT	aplica	=	=	op.acc.2	Requisitos de acceso
ICAT	n.a.	aplica	=	op.acc.3	Segregación de funciones y tareas
ICAT	aplica	=	=	op.acc.4	Proceso de gestión de derechos de acceso
ICAT	aplica	+	++	op.acc.5	Mecanismo de autenticación
ICAT	aplica	+	++	op.acc.6	Acceso local (<i>local login</i>)
ICAT	aplica	+	=	op.acc.7	Acceso remoto (<i>remote login</i>)

Figura 12 - ENS: Extracto del Anexo II en el que se determinan las medidas de seguridad aplicables de acuerdo a la categoría de los sistemas.

2.5.2. Ciberseguridad

La seguridad de la información y la protección de datos personales han sido tradicionalmente aspectos críticos para permitir el desarrollo de iniciativas basadas en el análisis de los datos clínicos. El incremento en el grado de informatización de los centros sanitarios, y por tanto de los datos disponibles, unido al incremento en la intensidad de las amenazas, está provocando que la importancia de ambos conceptos, que unificaremos bajo el término “ciberseguridad”, sea cada vez mayor. Como ejemplo, podemos destacar el ataque del *ransomware* WannaCry, ocurrido en mayo de 2017, que supuso el mayor incidente de ciberseguridad en el National Health Service (NHS) de su historia (National Audit Office, 2018). Este ciberataque afectó a un 34% de los *trusts* (hospitales) y un 8% de los GP (centros de Atención Primaria), ocasionando más de 19.000 citas canceladas y unos costes estimados en 92 millones de libras (unos 107 millones de euros), sin contar unos enormes costes reputacionales (Department of Health & Social Care, 2018). Lejos de ser una anécdota, en el informe sobre el Estado de la Unión de 2017 (European Commission, 2017) se indica que se registraron en la Unión Europea más de 4000 ataques diarios en 2016, con un incremento en 2015 de un 38% del número de incidentes de seguridad y con un 80% de las compañías europeas afectadas en el año anterior al informe. Y no es un problema ajeno a nuestra realidad nacional: de acuerdo al informe anual de ciberamenazas y tendencias 2018 del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) en 2017 se gestionaron 26.500 incidentes (un 26,5% más incidentes que en 2016) (Centro Criptológico

Nacional, 2018). En dicho informe se resalta que en un futuro inmediato se incrementarán los ataques contra dispositivos sanitarios.

Capítulo 3

ESTABLECIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

Describimos a continuación los principales problemas identificados en nuestro ámbito hospitalario para la consecución de los objetivos planteados.

3.1. AUSENCIA DE UN MARCO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CLÍNICOS

El análisis de datos clínicos es una actividad habitual en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, consustancial con la triple misión asistencial, investigadora y docente de los mismos. Sin embargo, el análisis de datos clínicos carece de un marco de trabajo que facilite su realización y reproducibilidad en el ámbito hospitalario, estableciendo para ello un conjunto de conceptos, una arquitectura de funciones y datos, y un método para la realización del análisis de datos clínicos de una forma sistemática. Por el contrario, identificamos las siguientes características del análisis de datos clínicos realizado en los hospitales en la actualidad:

- **Ámbito local.** Los análisis típicamente se circunscriben a un entorno departamental (Servicio Médico, Quirúrgico o Central) e incluso a una patología determinada, lo que ocasiona que por lo general los profesionales clínicos se enfrenten a la problemática de una forma individual, o al menos que no se beneficien del aprendizaje en la materia que se haya obtenido en otros departamentos. Adicionalmente, esto impide por lo general la realización de análisis compartidos entre distintos departamentos implicados en la asistencia del paciente, y que podrían proporcionar una visión más amplia centrada en el paciente, así como la realización de análisis multicéntricos que incrementen el volumen de datos analizados.
- **Bajo grado de documentación de la metodología.** Si bien los resultados suelen ser publicados en revistas científicas o mediante comunicaciones a congresos, los aspectos metodológicos y técnicos, especialmente en lo relativo a la obtención y procesamiento de los datos, suelen simplificarse en beneficio de la descripción de los resultados obtenidos y sus implicaciones (lo que es lógico, dado que tienen un interés clínico mayor, al menos en el corto plazo). Esto ocasiona nuevamente que el conocimiento generado en el

proceso no esté plenamente disponible para otros profesionales que se planteen realizar análisis de datos clínicos en sus ámbitos respectivos.

- **Sobreesfuerzo.** La realización de proyectos de análisis de datos implica un esfuerzo importante, especialmente en las fases iniciales de obtención y depuración de datos, que típicamente se aborda como una actividad complementaria a la actividad asistencial de los profesionales clínicos de los hospitales. El hecho de que no se disponga de un marco de trabajo como el indicado supone un desarrollo del proyecto sub óptimo que incrementa esfuerzo a realizar.
- **Dificultad para aplicar en el entorno clínico la innovación basada en los datos.** Más allá de la realización de estudios clínicos observacionales o de Ensayos Clínicos, cuya realización es bien dominada por los profesionales clínicos, otras aplicaciones innovadoras del análisis de datos clínicos que requieren de equipos multidisciplinares tienden a no contemplar el problema en su globalidad, afrontando dificultades adicionales que pueden acabar en fracaso. Así, es típico encontrar iniciativas orientadas al soporte a la toma de decisiones (p. ej.: detección de pacientes en riesgo de sepsis) que no focalizan los esfuerzos necesarios en disponer de datos clínicos estructurados de calidad o en la adecuada integración con la estación clínica del facultativo.
- **Bajo grado de integración de otros perfiles profesionales.** La dinámica establecida en esta materia supone en muchos casos la participación del profesional clínico en la obtención manual de los datos y del estadístico del centro en la realización de los análisis de datos, con un bajo nivel de interacción entre ambos, en un modelo cliente - proveedor. La integración masiva de datos y la aplicación de las técnicas de DS, ML o AI descritas previamente (ver capítulo 2.3.4) requieren en muchos casos de la incorporación de otros perfiles (como los ingenieros informáticos). De nuevo, disponer de un marco de trabajo como el indicado podría facilitar su incorporación a este tipo de proyectos.

3.2. NATURALEZA Y GOBERNANZA DE LOS DATOS CLÍNICOS ONCOLÓGICOS

Como hemos visto en el capítulo 2.1.2, las distintas fases en el proceso asistencial del cáncer generan datos clínicos que pueden ser analizados. Independientemente del momento de su generación, los datos clínicos oncológicos comparten una serie de características, que enumeramos aquí basándonos en referencias internacionales en esta materia como ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), 2017) o el reciente

informe elaborado para EPFIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) (Montouchet *et al.*, 2018). Así pues, son características comunes de los datos clínicos oncológicos las siguientes:

- Están asociados a entidades clínicas distintas:
 - Paciente: datos demográficos (incluyendo fecha de nacimiento, sexo o raza), hábitos (especialmente el hábito tabáquico y el consumo de alcohol), datos clínicos asociados al paciente (peso, comorbilidades, antecedentes personales y familiares, datos recogidos en la exploración física, resultados de pruebas complementarias, incluyendo pruebas analíticas y de imagen, estado de salud del paciente y capacidad funcional), datos relativos a la actividad asistencial realizada con el paciente (consultas externas, tratamientos ambulatorios administrados, pruebas complementarias, atenciones en urgencias, ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas), datos de secuenciación genética del paciente o datos relativos al fallecimiento.
 - Tumor: fecha del diagnóstico, histología, estadio, evaluación de la respuesta al tratamiento, mutaciones genéticas presentes (*driver*), secuenciación genética del tumor (tanto procedentes de tejido como de biopsia líquida).
 - Tratamiento: tipos de tratamiento aplicados, fechas de los tratamientos, complicaciones y efectos adversos de los tratamientos, coste de los tratamientos.
- Presentan variaciones temporales, siendo también habitual su registro en distintos momentos de interés clínico que no están siempre pre especificados por un protocolo:
 - En el momento inicial, al diagnóstico (*baseline*).
 - En cada uno de los contactos asistenciales (actos clínicos o episodios) del paciente.
 - Al inicio, fin o durante eventos de interés de cada tratamiento aplicado (líneas de tratamiento). Por ejemplo, ante la aparición de efectos adversos.
 - Durante el seguimiento del paciente (fase de supervivencia).
 - En los últimos días de vida del paciente (*end-of-life*) y tras su fallecimiento.
- Son registrados tanto de forma estructurada (datos categóricos o continuos) como no estructurada, esto es, como texto escrito en lenguaje natural (texto libre):
 - Como texto libre, en las notas clínicas e informes redactados por los facultativos y enfermeras en los distintos contactos asistenciales (consultas y tratamientos ambulatorios, urgencias, hospitalización).
 - Como datos estructurados, en los registros automatizados (datos de citas o ingresos, pruebas analíticas, datos genéticos de secuenciación) o en los registros

manuales a través de formularios que contienen las variables a registrar y sus posibles valores.

- Son registrados por distintos profesionales (médicos de distintas especialidades, enfermeras, farmacéuticos, genetistas, etc.) en distintos servicios, unidades y ámbitos asistenciales (hospital, atención primaria) lo que genera dispersión de los datos en múltiples sistemas de información, a menudo no integrados.
- Presentan distintos problemas relativos a la falta de una adecuada gobernanza de la información, tales como:
 - Falta de normalización y ausencia de estándares. Las mismas variables, aun registrándose de una forma categórica, contienen valores distintos en función del centro, servicio o unidad e incluso de la persona que realiza el registro. Esta falta de normalización tiene su origen en la ausencia de estándares de datos oncológicos de uso común y en la falta de coordinación entre países y regiones en esta materia (Montouchet *et al.*, 2018) y genera importantes problemas para la integración de datos de distintos centros para su análisis conjunto y para una efectiva interoperabilidad, que permitiría implementar procesos de trabajo entre centros.
 - Disparidad de criterios (definiciones). Incluso más allá de la falta de normalización, la ausencia de diccionarios de datos comunes implica la aparición de diferentes interpretaciones acerca del contenido de variables, de acuerdo a las diferentes interpretaciones del concepto que se pretende representar (por ejemplo, ¿la fecha del diagnóstico es la fecha en la que se realiza la primera visita en Oncología tras la disponibilidad del informe de Anatomía Patológica? ¿Es la fecha de realización del informe de Anatomía Patológica? ¿La fecha de obtención de la muestra que permite la realización de dicho informe?).
 - Dificultad para establecer responsabilidades en cuanto al registro y la actualización de los datos. Si bien los datos registrados en la HCE tienen una autoría clara (la del usuario autenticado en el sistema de HCE) y una dinámica de recogida protocolizada (típicamente coincidiendo con actos clínicos, como las primeras visitas o las visitas de seguimiento), las bases de datos clínicas y de investigación que típicamente complementan la información de la HCE, y que en muchas ocasiones se implementan mediante herramientas ofimáticas, carecen de una regulación apropiada en ambos aspectos. Las bases de datos clínicas y de investigación constituyen hasta un 75% de los registros de datos oncológicos existentes (Montouchet *et al.*, 2018), siendo por lo general cumplimentadas por distintos profesionales en distintos momentos

temporales. Su cumplimentación depende en muchos casos de las cargas de trabajo y la voluntad individual de cada profesional a la hora de registrar datos clínicos de interés para futuros usos no asistenciales, a menudo no especificados a priori por el protocolo de un estudio concreto.

- Baja calidad de los datos. Los aspectos anteriores impactan notablemente sobre la calidad de los datos registrados, tanto desde un punto de vista semántico como formal. Esto se materializa tanto en una incorrecta organización de los datos (variables en columnas, observaciones en filas y tablas que representan un único concepto, o en otras palabras, bases de datos que no cumplen la 3ª forma normal de Codd (Codd and F., 1990)) como en variables con datos perdidos, con valores equivalentes registrados de forma distinta o con valores extremos derivados de errores de recogida (Baclawski, 2009). Estos problemas de calidad tienen un impacto muy importante en el desarrollo de proyectos basados en el análisis de los datos, dado que se ha estimado que un 80% del esfuerzo requerido en los mismos se destina a la depuración y limpieza de los datos (Dasu and Johnson, 2003).

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

La estructura organizativa de los hospitales del SNS sigue estando regulada por el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (Boletín Oficial del Estado, 1987). En su artículo 9.1 establece que quedan adscritas a la Gerencia del Hospital las áreas de Control de gestión, Análisis y Planificación e Informática entre otras. Si bien a continuación establece que “Lo dispuesto en el número anterior se entiende sin perjuicio de la adaptación a las condiciones específicas de cada hospital y a las necesidades del área de salud del número, composición y denominación de los diferentes servicios y unidades de la Gerencia.”, la realidad es que esta estructura se ha perpetuado en la mayoría de los centros hasta nuestros días. Por tanto, como puede observarse en el Real Decreto 521/1987 y en los organigramas vigentes de la mayoría de los hospitales del SNS (publicados en sus respectivas memorias), no se identifica un área específicamente encargada del análisis de datos clínicos. Y sin embargo, está reconocido que una causa de la falta de innovación en materia de tecnologías de la información en sanidad está relacionada con la desconexión existente entre los desarrolladores de soluciones y los usuarios (Rudin, Bates and MacRae, 2016). Sin una unidad organizativa capaz de facilitar el trabajo conjunto de ingenieros y científicos de datos y del personal clínico

(oncólogos en el caso que nos ocupa), las posibilidades de desarrollar iniciativas en el ámbito del análisis de datos clínicos se reducen drásticamente, quedando a expensas de la consecución de proyectos competitivos de investigación que puedan aportar fondos para la contratación de los perfiles necesarios. Sin embargo, en nuestra experiencia, establecer una estructura permanente con estos fondos, cuyo suministro no está garantizado en el medio plazo, es también una tarea muy compleja y no permite cubrir las necesidades en esta materia para toda la institución.

3.4. FRAGMENTACIÓN DEL MAPA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Los sistemas de información hospitalarios deben cubrir un elevado número de funcionalidades para sus usuarios. En la siguiente figura mostramos un inventario, no exhaustivo, de los principales bloques funcionales que pueden encontrarse habitualmente en los sistemas de información hospitalarios.

Bloques Asistenciales	Diagnóstico por Imagen	Hospital de Día	Bloques de Gestión y Soporte
Admisión Gestión de las Solicitudes y Órdenes de Ingreso Registro y Filiación de los Pacientes Agendas Gestión de agendas Anatomía Patológica Corte de Bloques Estudio Macroscópico y Microscópico Explotación de la Información Gestión de la Actividad Preparación de Bloques Recepción de Muestras Sesiones Clínico-patológicas Solicitud de Biopsias y Citologías Tallado de las Muestras Técnicas a Realizar Archivo y Documentación Apertura y gestión del dossier Gestión de Pasivos Gestión de Prestamos Gestión de solicitudes de dossier Área Quirúrgica Anestesia en quirófano Gestión de los Quirófanos Partes quirúrgicos Preadmisión Preoperatorio Recuperación post anestésica (URPA) Ayuda y Soporte a la Decisión Médica Gestión de Incidencias Clínicas Alertas por riesgo: Sepsis, TEV Seguimiento de tratamientos Banco de Sangre Asignación de productos (reserva) Estadísticas Gestión de productos hemoderivados Necesidades especiales Prescripción de la transfusión Pruebas cruzadas Recepción de envases Recepción de hemoderivados Retirada de hemoderivados Solicitud de hemoderivados a centros externos Solicitud de reserva de hemoderivados Transfusiones masivas Citación Ciclos de Tratamiento Citación convencional Codificación y Agrupación Soporte a la codificación y agrupación Consultas Externas Gestión de los Pacientes de CCEE Interconsultas Captura de actividad	Enfermería Actuaciones de Enfermería Balance de Líquidos Base de Conocimiento de Enfermería Fluidoterapia Gestión de Turnos Mapa visual de camas Medicación Parte de Enfermería Registro de Cuidados de Enfermería Ensayos Clínicos Desarrollo del Proyecto Evaluación del Proyecto Solicitud del Proyecto Especialidades y pruebas (no exhaustivo) Audiometrías Calorimetrías Electrocardiogramas (ECG) Equilibrios Ácido-Base Espirometrías Flebología Litotricias Neurología Polisonnografías Radiología quirúrgica (arcos) Rehabilitación Rinomanometrías Rinometrías Farmacología Administración Dispensación Errores de medicación Estadísticas e informes de Farmacia Fabricación de mezclas y citostáticos Farmacocinética Gestión de botiquines Gestión de carros de parada cardiopulmonar (PCR) Intervenciones farmacológicas Nutrición Parenteral Política de antibióticos Prescripción Reacciones adversas a medicamentos (RAMs) Riesgo nutricional Validación Hemodilisis Alta del Plan Terapéutico Datos de la sesión Seguimiento del paciente Historia Clínica Electrónica Notas Formularios Gestión de diagnósticos Gestión de Peticiones de pruebas Visor de Historia Clínica Electrónica Informes	Hospitalización Gestión de Camas Gestión de Neonatos Gestión de Pacientes Hospitalizados Laboratorio Autoanalizadores Catálogo de pruebas Comunicación con otros departamentos Configuración Control de calidad Estadísticas e informes Extracción a pacientes ambulatorios. Extracción a pacientes hospitalizados Realización de las pruebas Recepción de Muestras Laboratorio Trazabilidad Validación de Pruebas Microbiología Estadísticas e informes Microbiología Gestión Microbiología Interpretación de pruebas e informado Mantenimiento de antibióticos Mantenimiento de microorganismos Mantenimiento de técnicas Realización de técnicas y registro de resultados Recepción de muestras Microbiología Seguridad y trazabilidad Órganos, Tejidos y Terapia Celular Gestión de donantes Gestión de membranas amnióticas Gestión de órganos Gestión de receptores Gestión de tejidos (huesos y aloinjertos) Laboratorio GMP Lista de Espera de Trasplante Renal Trazabilidad de reactivos Radioterapia Plan terapéutico Sesiones de radioterapia Registro de Tumores Registro de Tumores UCI Balance de Fluidos UCI Cuidados de Enfermería UCI Estadísticas e informes Gestión de pacientes UCI Hoja de administración de medicación UCI Hoja de constantes UCI Hoja de fluidos UCI Monitorización Urgencias Gestión de Pacientes de Urgencias Estación clínica de Urgencias	Área de Compras y Aprovisionamiento Almacén Control de gastos Estadísticas e informes de Compras Mantenimiento de productos sanitarios y medicación Pedidos Validación de facturas Área Económica Financiera Análisis de la Rentabilidad Definición de Concursos Facturación Gestión de Cobros Gestión de Costes Integraciones con Contabilidad Integraciones con Costes Aviso entre Usuarios Envío de avisos Recepción de avisos Call Center Gestión de Lista de Espera de Consultas Registro de Llamadas Capellania Capellania Configuración y soporte Configuración de Usuarios Correos Correos Dieta y Alimentación Gestión de Dietas y Cocina Petición de Dietas Información y Atención al Paciente Gestión de Reclamaciones Información a pacientes y familiares Lavandería Compras de Lavandería y Vestuarios Gestión de Carros de Lavandería Gestión de Vestuarios Gestión del Catálogo de Maestros de Lavandería Gestión del Catálogo de Maestros de Vestuarios Mantenimiento Electromedicina Órdenes de trabajo Pedidos de material Solicitudes de reparación externa Mecanografía de Informes Mecanografía de Informes Relaciones Externas Relaciones Externas Sanitarios Control de Sanitarios Petición de Sanitarios Bloques Gerenciales Planificación Estratégica Definición de Indicadores de Calidad Derivaciones Externas Operaciones Soporte a la Toma de Decisiones (Cuadros de Mando)

Figura 13 – Funcionalidades típicas de los sistemas de Historia Clínica Electrónica y de las aplicaciones departamentales.

El gran volumen de funcionalidades presentes supone que en la mayoría de los casos sean cubiertas por sistemas de información distintos. De esta forma, la fragmentación de los sistemas informáticos operacionales en el ámbito hospitalario supone la generación de silos de información que complican en gran medida la realización de análisis de datos clínicos integrados. En el caso de los sistemas informacionales (para la obtención y análisis de la información generada en los sistemas operacionales o transaccionales) la situación no es mejor. Una evolución histórica incremental, típicamente no basada en una estrategia en esta materia, la diversidad de tecnologías y la ausencia de estándares han generado una situación muy heterogénea en los distintos servicios de salud y centros hospitalarios.

3.5. AMENAZAS A LA CIBERSEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Como analizamos en el capítulo 2.5, la ciberseguridad y la protección de datos en el ámbito de la salud son una prioridad y un motivo de preocupación constante, dado el impacto potencial de los incidentes y las amenazas existentes. Para profundizar en dichas amenazas, es necesario identificar previamente el contexto en el que se desenvuelve la ciberseguridad, y que representamos en la siguiente figura.

Figura 14 – Contexto de la ciberseguridad: activos, servicios, amenazas y sus circunstancias.

Podemos agrupar las amenazas en cuatro categorías principales: el acceso indebido a la información, la alteración de la información (incluyendo la alteración de la información de

autoría, o suplantación de identidad), la destrucción de la información o el sabotaje de los procesos de negocio. Estas amenazas se desarrollan a través de una serie de circunstancias de motivación, agentes que las ejecutan a través de una serie de métodos que aprovechan vulnerabilidades de la víctima. Una visión resumida de las principales circunstancias asociadas a las amenazas descritas puede verse en la siguiente figura, adaptada del “Informe CCN-CERT IA-09/18. Ciberamenazas y Tendencias Edición 2018” (Centro Criptológico Nacional, 2018):

Figura 15 – Circunstancias asociadas a las amenazas a la ciberseguridad.

La ciberseguridad trata por tanto de evitar estas amenazas a través de una serie de servicios de seguridad, como la confidencialidad, la integridad y autenticidad y la disponibilidad y continuidad, protegiendo los activos informáticos de la organización, entre los que se encuentran los datos, los servicios que se prestan (externa o internamente) a través de medios informáticos y la infraestructura de redes y sistemas de información.

De acuerdo a la Estrategia de Ciberseguridad Nacional (Departamento de Seguridad Nacional, 2013) los ciberataques comparten una serie de características, como son:

- Bajo coste de ejecución.
- Ubicuidad y fácil ejecución.

- Efectividad e impacto, dadas las carencias existentes en materia de políticas de ciberseguridad, la falta de recursos y de sensibilización y formación en muchas organizaciones.
- Reducido riesgo para el atacante, siendo difícil la atribución de la comisión del ataque y la persecución de la acción debido a las disparidades legales entre países.

En el ámbito hospitalario, las amenazas provienen tanto de acciones maliciosas como de otras causas no intencionadas, como fenómenos naturales, errores humanos o en la cadena de suministro o de errores en los propios sistemas de información (ENISA, 2017). De acuerdo a este informe, los errores humanos y las acciones malintencionadas suponen las mayores amenazas y las que mayor probabilidad de ocurrencia presentan.

La carencia de recursos destinados específicamente al ámbito de la ciberseguridad es uno de los principales problemas en el ámbito sanitario. De acuerdo a la encuesta realizada por HIMSS en 2018 entrevistando a 239 responsables en materia de seguridad IT en el ámbito sanitario (HIMSS, 2018) se considera que la inversión realizada en ciberseguridad ha aumentado respecto del año anterior y se espera que siga incrementándose en el año siguiente. Sin embargo, la falta de personal adecuadamente formado y de recursos siguen siendo las principales barreras para evitar y mitigar el impacto de posibles incidentes. Los principales resultados de la encuesta se reproducen en la siguiente figura.

Table 14: Biggest barriers for remediating & mitigating cybersecurity incidents

Actions	N	percent
Lack of appropriate cybersecurity personnel	99	52.4%
Lack of financial resources	88	46.6%
Too many application vulnerabilities	54	28.6%
Too many endpoints (e.g., user devices, computers, etc., connected to the network)	52	27.5%
Too many new and emerging threats	51	27.0%
Not enough cyber threat intelligence to stay ahead of threats	44	23.3%
Network infrastructure too complex to secure	39	20.6%
Sufficient cyber threat intelligence, but lack of technologies/tools for effective use and deployment	32	16.9%
Sufficient cyber threat intelligence, but lack of know-how for effective use and deployment	27	14.3%
Too many users for timely and effective provisioning and de-provisioning of accounts	26	13.8%
Other	20	10.6%
Don't know	3	1.6%
None of the above	9	4.8%

Q. What are the biggest barriers your organization faces to remediating and mitigating cybersecurity incidents? Please select all that apply.

Table 15: Cybersecurity staffing ratios

Ratios	N	percent
No cybersecurity staff	24	13.3%
1:10	29	16.0%
1:100	40	22.1%
1:500	20	11.1%
1:1000	26	14.4%
More than 1:1000	32	17.7%
Don't Know	10	5.5%

Q. What is the approximate ratio of cybersecurity staff to IT users in your organization? Please choose the best answer.

Table 16: Cybersecurity budget

Percentage of Current IT Budget	N	percent
1-2 percent	38	21.0%
3-6 percent	38	21.0%
7-10 percent	13	7.2%
11-13 percent	7	3.9%
14-17 percent	3	1.7%
More than 17 percent	2	1.1%
No specific carve out of cybersecurity within IT budget (but, money is spent on cybersecurity)	48	26.7%
No money is spent on cybersecurity	5	2.8%
Don't know	27	14.9%

Q. What percentage of your organization's current IT budget is allocated to cybersecurity?

Figura 16 – Extracto de los resultados de la encuesta realizada por HIMSS en 2018 en materia de seguridad IT.

Si bien se ha publicado que la seguridad IT supone un 22% del presupuesto global IT de las empresas en España (Expansión Economía Digital, 2017), en el ámbito sanitario público, y específicamente en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), el presupuesto destinado a esta materia es muy inferior. Sin disponer de cifras públicas integradas del presupuesto IT del SERMAS, sí podemos observar cómo su principal iniciativa de gobernanza en esta materia, la Oficina de Seguridad de Sistemas de Información Sanitaria (adjudicada mediante concurso público, (Comunidad de Madrid, 2018) fue adjudicada por 1.706.839€ + IVA para una duración del contrato de 24 meses. Estimando un techo de presupuesto IT en el SERMAS de 100 millones de euros, este gasto supone un 0,008% del presupuesto IT.

Capítulo 4

METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos descritos, que permiten abordar la problemática identificada, se ha seguido una metodología con cinco fases diseñada *ad hoc* para nuestro propósito, y que se describe a continuación:

Figura 17 – Fases de la metodología aplicada para la realización del trabajo de tesis doctoral.

4.1. SELECCIÓN DE UN PROBLEMA CLÍNICO CONCRETO Y RELEVANTE

Una de las primeras decisiones a tomar consiste en plantear la investigación en un ámbito clínico concreto, con voluntad de que los resultados sean posteriormente generalizables a otros problemas clínicos. Esto nos permitiría profundizar lo suficiente para demostrar una utilidad clínica y de gestión de los resultados que validaran el marco de trabajo, sin sacrificar a cambio la capacidad de generalización de dicho marco de trabajo. Para ello, es necesario seleccionar una patología con los siguientes criterios:

- Alta complejidad y tratamiento multidisciplinar, de forma que pueda beneficiarse especialmente de la aplicación intensiva del análisis de datos clínicos y de los nuevos paradigmas asistenciales (ver capítulos 2.2 y 2.4).
- Alto impacto social, tanto desde un punto de vista de salud como económico.
- Disponibilidad de información clínica estructurada en nuestro ámbito (HUPHM).
- Liderazgo clínico y disponibilidad para participar en el desarrollo, implementación y aplicación del modelo a los datos clínicos de la patología.

4.2. COMPRENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Aunque puede parecer obvio, la adecuada comprensión de la problemática es un paso imprescindible para la consecución del objetivo planteado. Y sin embargo, una de las principales causas de la falta de adopción de soluciones innovadoras en el ámbito sanitario es la falta de conexión entre los distintos actores implicados en el desarrollo de soluciones digitales, especialmente entre los usuarios (profesionales sanitarios) y los desarrolladores (Rudin, Bates and MacRae, 2016). Como se ha introducido previamente en el capítulo 3.3, no disponemos en general de estructuras organizativas que posibiliten este acercamiento. No obstante, la circunstancia de haber sido Jefe de Servicio de Informática del HUPHM en el periodo 2009 – 2017 ha permitido disponer de la posibilidad de comprender la problemática existente en el ámbito del análisis de datos clínicos, tanto desde un punto de vista técnico como de las necesidades de los profesionales clínicos. Disponer de la situación real de los datos, de los procesos de gobernanza de los mismos y de la tecnología que los soporta es clave para desarrollar un marco de trabajo con posibilidades reales de implementación, que maximice las probabilidades de ofrecer resultados de utilidad clínica.

4.3. PROPUESTA DE UN MARCO DE TRABAJO

Como planteamos en la hipótesis y los objetivos de nuestro trabajo, consideramos necesario disponer de un marco de trabajo, entendido como un conjunto de conceptos, procedimientos y herramientas, que facilite la disponibilidad de los datos adecuados y el análisis multidisciplinar de problemas clínicos relevantes.

Entre las características deseadas para el marco de trabajo, identificamos las siguientes:

- **Factible.** El marco de trabajo debe poder ser implementado con un esfuerzo razonable. Consideramos por tanto fundamental completar la transición desde el plano conceptual a la realidad de una implementación en el ámbito hospitalario que permita ofrecer resultados concretos.
- **Útil.** La aplicación del marco de trabajo debe servir para obtener unos resultados que además aporten un valor añadido para los profesionales clínicos y para la toma de decisiones en el ámbito sanitario. La medida de la utilidad será obtenida a través los siguientes mecanismos:

- Opinión de los propios profesionales clínicos, tanto de los implicados en los trabajos como de aquellos a los que se dirijan distintas acciones de difusión durante el desarrollo del trabajo.
- Publicación de los resultados concretos obtenidos que validen el planteamiento realizado, tanto a través de congresos especializados como en revistas científicas revisadas por pares.
- **Práctico.** Los planteamientos realizados deben ser **factibles**, esto es, deben poder ser implementados con las condiciones de contorno y limitaciones que nos encontramos habitualmente en el ámbito hospitalario público, tomando como referencia en este sentido la situación del HUPHM a fecha de realización de este trabajo. Al mismo tiempo, deben ser **replicables**. Esto es, deben ser lo suficientemente generales para que puedan aplicarse a otras patologías, especialidades médicas o centros del sistema sanitario con unas mínimas modificaciones que no desvirtúen el planteamiento global.
- **Abierto.** El marco de trabajo debe permitir acomodar distintas tecnologías, independientemente de su fabricante, facilitando así su aplicación en distintos centros.
- **Integrador.** Para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo de tesis doctoral resulta imprescindible abordar múltiples tareas en distintos ámbitos, lo que requiere necesariamente de la **colaboración multidisciplinar** entre personal técnico informático y personal clínico. A diferencia de otros trabajos, nuestra tesis no puede realizarse como un trabajo individual, sino que requiere de la concurrencia de distintos perfiles profesionales y del reaprovechamiento de esfuerzos previamente iniciados o realizados por la organización.

Para la selección de modelos de referencia, que pudieran servir de ayuda en la definición de este marco de trabajo, la herramienta principal que proponemos es la búsqueda de bibliografía. En caso de que no se identifique un marco de trabajo como el planteado, específicamente diseñado para nuestro ámbito hospitalario y que pudiéramos reutilizar en nuestro trabajo de tesis, propondremos nuestro propio marco de trabajo. Dicho marco de trabajo podrá ser ajustado de acuerdo a los resultados parciales obtenidos, refinándose hasta concluir en el modelo propuesto finalmente (ver capítulo 5.3).

4.4. IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO

Dado que el marco de trabajo que planteamos requiere de actuaciones en el HUPHM, es imprescindible contar con la autorización y recursos del hospital. Así pues, para la implementación debemos contar no sólo con el trabajo del Servicio de Informática del HUPHM

en los aspectos de implementación técnica, sino también con el soporte de los sucesivos Directores Gerentes del HUPHM y del Jefe de Servicio de Oncología Médica (codirector de esta tesis) que consideren oportuno el desarrollo y puesta en marcha en el hospital de distintos proyectos, dotándolos con los recursos necesarios para ello, y que se corresponden con distintos elementos de la arquitectura planteada. Para el desarrollo de algunas funciones, como las relativas a la HCE del centro, se debe contar con el trabajo de la Comisión de Historias Clínicas y Documentación Clínica del HUPHM (CHC). Las Comisiones Clínicas se fundamentan en el Real Decreto 521/1987 que regula la estructura, organización y funcionamiento de los hospitales que eran gestionados por el Instituto Nacional de la Salud (Boletín Oficial del Estado, 1987), y que en este momento está todavía vigente, y tienen como función principal el asesoramiento a la Dirección del hospital en distintos ámbitos especializados. La CHC, de acuerdo a lo establecido en su normativa de funcionamiento, tiene como misión el diseño e implementación de medidas para velar por el buen uso de la Historia Clínica y su documentación asociada, ya sea en soporte electrónico o en papel. Entre sus objetivos específicos se encuentran los siguientes:

- Elaborar un Manual de Uso de la Documentación Clínica y su actualización permanente para garantizar su adaptación a las necesidades del centro.
- Establecer la política documental del centro en cuanto a la definición de activos, pasivos, modelos de historia clínica, archivado, custodia y perdurabilidad de la documentación clínica.
- Velar por el cumplimiento de las normas legales, en vigor en cada momento, que regulan la documentación clínica.
- Normalizar, diseñar y aprobar los documentos y formularios de la historia clínica, con independencia de su formato.
- Velar por la calidad de la documentación clínica realizando auditorías periódicas.
- Participar y fomentar el objetivo institucional del trabajo en calidad a todos los niveles de la organización.

Por tanto, la adecuada implementación en los hospitales del SNS de ciertos aspectos del marco de trabajo planteado, en concreto de aquellos que requieren de intervenciones sobre la arquitectura de la HCE, debe sustentarse en el trabajo que realice la Comisión de Historias Clínicas de cada centro.

Un aspecto clave para la implementación del marco de trabajo propuesto consiste en la adecuada delimitación previa del alcance de la misma. En primer lugar, es necesario identificar los esfuerzos necesarios para la implementación completa, evaluando los recursos necesarios, las necesidades derivadas de su implementación real en un entorno productivo, y la necesaria implicación de terceros. En el caso de que el esfuerzo necesario exceda el alcance posible para

esta tesis doctoral, será necesario limitar y planificar la implantación de un conjunto de elementos clave del marco de trabajo que puedan ser validados posteriormente, identificando todos aquellos aspectos que no tuvieran encaje en la planificación del trabajo para proponerlos como futuras líneas de desarrollo.

4.5. APLICACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO

La aplicación del marco de trabajo a una patología, y a una problemática clínica concreta dentro de esta patología, permite obtener y evaluar sus resultados, tanto internamente como sobre todo externamente. Esta aplicación, además de unos resultados concretos, nos permite plantear una validación del marco de trabajo en tanto que los resultados obtenidos sean novedosos y tengan un interés clínico y de gestión que se sustancie en su publicación en revistas científicas de prestigio y en congresos técnicos y médicos.

Para realizar la aplicación del marco de trabajo es necesario contar con el visto bueno del Comité Ético de Investigación con Medicamentos del HUPHM para el uso secundario de datos procedentes de la asistencia sanitaria.

La validez del marco de trabajo en lo relativo a su capacidad de generalización a otras problemáticas y patologías, y en otros centros del SNS, deberá ser demostrada en futuros trabajos de investigación. No obstante, la validez en el HUPHM puede ser un indicador válido de su posible validez en otros ámbitos, dado que el HUPHM dispone de un mapa de sistemas relativamente moderno (implantado para su apertura en 2008, lo que implica que es relativamente joven en el estándar de los hospitales) y fue reconocido en 2013 con la acreditación del nivel 6 en el modelo de madurez en historia clínica electrónica EMRAM, elaborado por la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Así pues, dado que el HUPHM disponía de la certificación EMRAM nivel 6 durante el desarrollo de este trabajo, puede considerarse que dispone de un nivel alto de informatización que es homogéneo con el resto de hospitales a nivel mundial que siguen esta certificación (en 2015 un 17,9% de los 5.467 hospitales que se habían evaluado a nivel mundial con el estándar EMRAM disponían de un nivel 6, esto es 979 hospitales (Hoyt, 2015)).

Capítulo 5

SOLUCIÓN PROPUESTA

5.1. SELECCIÓN DE UN PROBLEMA CLÍNICO CONCRETO Y RELEVANTE

De acuerdo a la metodología planteada, el primer paso consistió en seleccionar la patología oncológica a estudiar.

Se escogió el **cáncer de pulmón** como la patología sobre la que desarrollar y validar el marco de trabajo, fundamentalmente, por los siguientes motivos:

- Por las **características** de la patología: el cáncer de pulmón es una enfermedad altamente compleja (ver capítulo 2.1.2) que por tanto podría beneficiarse especialmente de la aplicación intensiva del análisis de datos clínicos (ver capítulos 2.2 y 2.4):
 - Se trata de una enfermedad que integra múltiples enfermedades genéticas distintas, hasta el punto de ser potencialmente distintas en cada individuo.
 - Es gestionada desde un punto de vista clínico por múltiples especialistas en distintos ámbitos asistenciales, lo que fragmenta los procesos de trabajo y genera silos de información.
 - La selección del tratamiento óptimo es altamente compleja, dado que se realiza a través de evidencia generada en ensayos clínicos que sin embargo no siempre se ajustan a la variabilidad existente en la práctica clínica real, con distintos individuos y distintos momentos del curso de la enfermedad.
 - En consecuencia, la predicción de los resultados es altamente compleja, tanto en lo relativo a la eficacia del tratamiento (grado de respuesta o de progresión) como de otros aspectos relacionados, como la toxicidad, la probabilidad de recaída, la supervivencia o el consumo de recursos asistenciales necesarios y su coste.
- Por el **impacto** social de la patología:
 - Alta mortalidad: supone un 20,8% de todas las muertes por cáncer en la Unión Europea (266.000 muertes en 2011).
 - Impacto económico: es el cáncer con el impacto económico más alto, suponiendo un coste de 18.800 millones de euros en la Unión Europea en 2009. En España supuso un coste de 1.258 millones de euros.

- Incidencia creciente: De acuerdo a las estimaciones se diagnosticaron 28.645 nuevos casos en España en 2017.
 - Rápida evolución de las opciones de tratamiento, fuertemente impulsadas por la industria: cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia, etc.
- Por la **disponibilidad de información estructurada**: el Servicio de Oncología Médica ha mantenido históricamente un registro asistencial de casos de cáncer, en el convencimiento de su utilidad clínica y de investigación. Prueba de ello son los resultados de investigación obtenidos históricamente a través de estos datos estructurados. En el caso de los linfomas, analizando aspectos como la mortalidad a largo plazo de estos pacientes frente a la población general (Provencio *et al.*, 1999), la relación entre el virus de la Hepatitis C y los linfomas (Mariano Provencio *et al.*, 2006) y la diversa influencia de factores pronósticos en la supervivencia de los enfermos con linfoma Hodgkin (Provencio *et al.*, 2004), siendo especialmente relevante el artículo publicado sobre sus causas de muerte (Provencio *et al.*, 2008). Estos estudios no sólo se han centrado en sacar consecuencias epidemiológicas sino implicaciones terapéuticas (Provencio *et al.*, 2003) (Carcereny, España and Provencio, 2004) (M. Provencio *et al.*, 2006) (Rueda *et al.*, 2008). Así, para la realización del estudio se parte de los datos del registro asistencial de pacientes con cáncer, elaborado y mantenido históricamente por el Servicio de Oncología Médica del HUPHM. Dicho registro se elabora manualmente a partir de los datos de las primeras consultas con los pacientes y contiene de inicio 12.834 registros de todos los tipos de cáncer vistos en el centro desde 1992.
- Por el **liderazgo clínico** encontrado en el Servicio de Oncología Médica: La participación de los clínicos en el proceso planteado es imprescindible para la consecución de los objetivos buscados. Sin un fuerte liderazgo clínico que promueva la adopción de un nuevo marco de trabajo en el ámbito del análisis de datos clínicos, nuestro trabajo no pasaría de ser un planteamiento teórico, y no una nueva forma de trabajar en el día a día.

5.2. COMPRENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Profundizamos a continuación en la problemática existente en el HUPHM en lo relativo al análisis de datos en el ámbito del cáncer de pulmón.

5.2.1. Dispersión de los datos en los distintos sistemas de información

Desde el punto de vista de los datos, y realizando una correspondencia con los datos identificados en el capítulo 3.2, la distribución de las funcionalidades entre distintos sistemas de información implica su dispersión y la existencia de distintos grados de estructuración. Tomando como ejemplo la situación del HUPHM, enumeramos, de forma no exhaustiva, la ubicación y el grado de estructuración de los principales datos clínicos en el cáncer de pulmón:

- Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE):
 - Datos estructurados: datos demográficos (incluyendo fecha de nacimiento, sexo), datos clínicos asociados al paciente (peso, comorbilidades, resultados de pruebas analíticas), datos relativos a la actividad asistencial realizada con el paciente (consultas externas, pruebas complementarias, atenciones en urgencias, ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas y procedimientos realizados), prescripciones de tratamientos y tratamientos farmacológicos administrados en hospitalización.
 - Datos no estructurados: raza, hábitos (especialmente el hábito tabáquico y el consumo de alcohol), datos clínicos asociados al paciente (diagnósticos, comorbilidades, antecedentes personales y familiares, datos recogidos en la exploración física, resultados de pruebas complementarias, estado de salud del paciente y capacidad funcional), datos relativos al fallecimiento (sólo si se produce en el hospital), fecha del diagnóstico, histología, estadio, evaluación de la respuesta al tratamiento, mutaciones genéticas presentes (mutaciones *driver*), tipos de tratamiento aplicados, fechas de los tratamientos, complicaciones y efectos adversos de los tratamientos.
- Agrupador GRD y Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD):
 - Datos estructurados: Datos correspondientes al CMBD Hospitalario y de Atención Ambulatoria Especializada. De acuerdo al Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (Ministerio de Sanidad, 2015) y que prevé la incorporación de datos correspondientes a hospitalización, hospitalización a domicilio, hospital de día médico, cirugía ambulatoria, procedimientos ambulatorios de especial complejidad y urgencias, se deberán recoger los siguientes datos:
 - 1. Tipo de código de Identificación Personal.
 - 2. Código de Identificación Personal.

- 3. Número de historia clínica.
- 4. Fecha de nacimiento.
- 5. Sexo.
- 6. País de nacimiento.
- 7. Código postal del domicilio habitual del paciente.
- 8. Municipio del domicilio habitual del paciente.
- 9. Régimen de financiación.
- 10. Fecha y hora de inicio de la atención.
- 11. Fecha y hora de la orden de ingreso.
- 12. Tipo de contacto.
- 13. Tipo de visita.
- 14. Procedencia.
- 15. Circunstancias de la atención.
- 16. Servicio responsable de la atención.
- 17. Fecha y hora de finalización de la atención.
- 18. Tipo de alta.
- 19. Dispositivo de continuidad asistencial.
- 20. Fecha y hora de intervención.
- 21. Ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos.
- 22. Días de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos.
- 23. Diagnóstico principal.
- 24. Marcador POA1 del diagnóstico principal.
- 25. Diagnósticos secundarios.
- 26. Marcador POA2 de los diagnósticos secundarios.
- 27. Procedimientos realizados en el centro.
- 28. Procedimientos realizados en otros centros.
- 29. Códigos de morfología de las neoplasias.
- 30. Centro sanitario.
- 31. Comunidad autónoma del centro sanitario.

Los diagnósticos están codificados en España mediante CIE-10-ES, modificación clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la CIE-10. Adicionalmente se disponen de datos correspondientes a la agrupación de la casuística a través de AP-GRD v27 (hasta 2015) y APR-GRD v32 (a partir de 2016) (Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, 2019).

- Registros asistenciales de casos y bases de investigación:

- Datos estructurados: raza, hábitos (especialmente el hábito tabáquico y el consumo de alcohol), datos clínicos asociados al paciente (comorbilidades, antecedentes personales y familiares, datos recogidos en la exploración física, resultados de pruebas complementarias, estado de salud del paciente y capacidad funcional), datos relativos al fallecimiento (en el hospital), fecha del diagnóstico, histología, estadio, evaluación de la respuesta al tratamiento, mutaciones genéticas presentes (*driver*).
- Sistema departamental de Farmacia:
 - Datos estructurados: tratamientos farmacológicos administrados ambulatoriamente, tratamientos farmacológicos dispensados en hospitalización y a pacientes externos, coste de los tratamientos.
- Sistema departamental de Radioterapia:
 - Datos estructurados: tratamientos radioterápicos administrados ambulatoriamente y a pacientes ingresados.
- Plataforma de secuenciación masiva:
 - Datos estructurados: Secuenciación genética, mutaciones identificadas.
- Datos clínicos no generados en el hospital:
 - Datos estructurados: Datos sobre el estado de salud del paciente comunicados por el propio paciente (PROs) o generados en Atención Primaria o los Servicios Sociales, datos relativos al fallecimiento (fuera del hospital o en otros hospitales) como la causa del fallecimiento y la fecha del fallecimiento, datos de secuenciación genética realizados en otros centros.

5.2.2. Gobernanza de los datos clínicos del cáncer de pulmón

Si bien las características de los datos y de su gobernanza, descritos previamente en el capítulo 3.2, son posiblemente aplicables a cualquier centro hospitalario, es necesario también identificar algunas especificidades que hemos podido constatar en nuestro hospital. Si bien estas características específicas es probable que se den en otros centros, no podemos afirmarlo sin un estudio específico en este sentido y que proponemos como un trabajo futuro. Así, hemos identificado la siguiente problemática en el HUPHM relativa al manejo de los datos en el ámbito del cáncer de pulmón:

1. El proceso de registro de datos asistenciales en la HCE está desligado del proceso de registro de datos con fines de mejora asistencial e investigación, de esta forma se duplica el trabajo de registro, induciendo diferencias de interpretación y errores.

2. Más allá de la HCE, no existe un registro estructurado, único y actualizado que contenga una referencia única de cada uno de los pacientes pertenecientes al servicio de oncología con fines de mejora asistencial o investigación. Existe una base de datos de pacientes nuevos (1ª consulta) de cumplimentación manual, fragmentado en distintas bases a lo largo del tiempo, y no siempre actualizado de forma puntual. Tampoco se dispone de un registro longitudinal estructurado con la información clínica de seguimiento de los pacientes.
3. Se dispone de datos de actividad en aquellos ámbitos asistenciales que están organizados por la HCE (citas en Consultas Externas, ingresos en hospitalización, hospital de día y urgencias, pruebas e interconsultas solicitadas). En los ámbitos en los que se codifica la actividad (como en la hospitalización a través del CMBD) se dispone además de datos clínicos asociados a dicha actividad. En el resto de ámbitos sólo se dispone de datos clínicos en los registros de la HCE (habitualmente en texto libre) y en muchos casos no se dispone siquiera de datos de actividad (p. ej.: pacientes oncológicos vistos en urgencias, contabilizados sólo a través de las interconsultas que se registran en la HCE).
4. Los registros no estructurados de la HCE (en texto libre) requieren de un trabajo manual muy intensivo para obtener las variables de interés y así alimentar las bases de investigación.
5. No existe una codificación estándar de los valores estructurados, ni una definición clara, escrita y compartida por todos los usuarios que introducen datos en las bases. Esto impacta sobre la calidad de los datos y sobre las posibilidades de interoperar (integrar) con otros registros.
6. Las bases de datos de investigación (BDI) se crean con objetivos concretos y por tanto con modelos específicos de datos para sus fines. No obstante, contienen datos generales del paciente, y comunes con otras BDI que pueden estar duplicados (y ser incoherentes) entre distintas bases de investigación. Estas bases no disponen de una base de referencia unificada que aglutine un conjunto mínimo de datos oncológicos (demográficos y clínicos).
7. Se distinguen 2 tipos de BDI:
 - BDI creadas *ad hoc* para una investigación concreta. Típicamente se crean a posteriori de la definición del proyecto (hipótesis → variables necesarias). Deberían contener un conjunto de variables específico de las que no se dispusiera en otras bases, pero no siempre es así.

- BDI que contienen registros asistenciales que agrupan pacientes con unos criterios concretos de selección, pero sin una definición cerrada a priori de la información que se requerirá para posteriores investigaciones. Se crean por la imposibilidad de localizar a estos pacientes de otra manera, si no es registrando todos los casos que cumplen criterios en una base de datos. Tienen uso asistencial, pero pueden ser usados para una posterior investigación, sirviendo como relación de pacientes a estudiar (obteniendo posteriormente un consentimiento informado para ello y nuevas variables una vez se determina la investigación a realizar).
 - En ambos casos la ausencia de definiciones de datos comunes y de valores estandarizados, de responsabilidades claras en cuanto a la creación y mantenimiento de datos posterior, junto con el diseño no técnico, hace que la calidad de los datos sea baja en la mayoría de los casos, especialmente en el caso de los registros asistenciales. Esto exige un trabajo extra de depuración de datos cuando se decide realizar finalmente una investigación.
8. En la mayoría de los casos, disponer de una base de pacientes suficientemente estructurada (un registro de casos) evitaría la necesidad de elaborar distintos registros asistenciales por patología. Cuando se necesitase conducir una investigación, se realizaría una consulta al registro de casos y se seleccionarían los que cumplan criterios. A partir de ahí se podrían añadir nuevos campos de información específicos para la investigación deseada, que no estuvieran a priori en el registro de casos.
 9. Si bien la función del registro de casos podría ser asumida por el sistema HCE del hospital, la realidad es que el sistema existente (en el HUPHM y en otros muchos hospitales españoles, siendo además muy similar a otras soluciones nacionales e internacionales) no dispone de las facilidades para la gestión autónoma de las variables a recoger ni para la explotación de datos que requeriría este registro de casos unificado. Si bien puede proponerse como una posibilidad futura, es necesario plantear una alternativa a corto plazo que permita avanzar en esta materia.
 10. Realizado un estudio en 2018 acerca de la cumplimentación de los registros de datos estructurados en la HCE (formularios Selene) se obtuvieron los datos mostrados en la siguiente figura:

	N	%
Total Formularios	846	100%
Formularios con menos de 10 tomas	504	60%
Formularios con CERO tomas	338	40%
Formularios con CERO tomas provenientes del HFLR (% del total de CERO tomas)	98	29%
Formularios (ant > 1 año)	479	100%
Formularios (ant > 1 año) con menos de 10 tomas	148	31%
Formularios (ant > 1 año) con UNA toma (SIN USO)	46	10%
Formularios con primera toma en 2018	29	100%
Formularios con primera toma en 2018 con menos de 10 tomas	18	62%
Formularios con primera toma en 2018 con UNA toma (SIN USO)	8	28%
Total Formularios creados 2010-2016	166	100%
Formularios 2010-2016 con menos de 10 tomas	46	28%
Formularios 2010-2016 con UNA toma (SIN USO)	14	8%
Total Formularios creados antes de 2010	282	100%
Formularios anteriores a 2010 con menos de 10 tomas	93	33%
Formularios anteriores a 2010 con UNA toma (SIN USO)	29	10%
Formularios anteriores a 2010 con CERO o UNA toma (SIN USO) (% del total creado antes del 2010, con CERO o UNA toma)	127	33%

Figura 18 – Análisis del uso de registros estructurados de datos en la HCE del HUPHM (2018).

Como puede observarse, a pesar de existir un número elevado de plantillas de formularios en la HCE (846), hasta un 60% de los mismos han sido cumplimentado menos de 10 veces. Es significativo cómo se observan variaciones en distintos periodos históricos (con distintas Direcciones Gerencias gobernando el hospital). Analizando el volumen de registros realizados por plantilla de formulario, se observó cómo sólo 4 formularios acumulaban el 73% del total de registros estructurados de la HCE. Estos

datos sugieren el bajo volumen efectivo de datos clínicos que son estructurados en la HCE por los propios usuarios, más allá de los datos que se generan de forma estructurada de una forma automática o semiautomática y de aquellos que se capturan como parte imprescindible de un proceso de trabajo establecido. Para obtener mejores resultados en la estructuración de los datos por los usuarios en la HCE es necesario que dichos usuarios estén dispuestos a ello, bien porque obtienen un retorno del esfuerzo adicional que supone frente a un registro no estructurado, o bien porque dicho registro forma parte de un proceso de trabajo establecido y reforzado por la Dirección del centro. En todo caso, siempre la primera opción será la deseable, dado que la segunda puede llevar a situaciones de descontento e incluso de *burnout* (Friedberg *et al.*, 2013).

11. Los costes de la asistencia sanitaria se han calculado históricamente mediante sistemas de contabilidad analítica (García Cornejo, 2004), bien basados primero en el reparto del coste real observado entre los distintos servicios (centros de coste o grupos funcionales homogéneos, GFH), bien posteriormente a través del cálculo del coste por paciente y por proceso (proyecto Geclif del Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto Nacional de la Salud, 2001)). Mediante Geclif se realiza la asignación de recursos y la imputación de productos generados y de costes de los GFH implicados a los pacientes, para posteriormente realizar el cálculo del coste por Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD). Sin embargo, el coste por paciente se ha considerado un producto intermedio para obtener un coste por GRD, mucho más manejable. Por otra parte, no ha sido objeto de estos sistemas de costes el estudio de los factores clínicos con influencia en el coste asistencial de patologías (diagnósticos) concretas, como el cáncer de pulmón. A fecha de realización de este trabajo de tesis, el HUPHM no dispone de una contabilidad analítica en funcionamiento que permita facilitar al menos datos de coste por GRD a los Servicios Médicos y Quirúrgicos, a diferencia de lo que ocurre en otros centros con un menor nivel de informatización.

5.2.3. Seguridad y protección de datos

La normativa vigente en materia de protección de datos personales ha sufrido cambios importantes durante el desarrollo del presente trabajo. Durante la mayor parte del desarrollo del trabajo la legislación vigente fue la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo contenido en el REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. No obstante, tras la entrada en vigor del nuevo RGPD (el 25 de Mayo de 2018) puede considerarse,

a través de los artículos 9.2 y 89.1 del RGPD, que el capítulo 2 de la disposición adicional decimoséptima de la L.O. 3/2018 es la norma de derecho interno que regula el tratamiento de datos para fines de investigación en salud (Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 2019).

Sin embargo, tal y cómo se pone de manifiesto en un reciente informe jurídico de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), 2019) existen importantes lagunas legales, tales como el “régimen de la protección de datos de salud en la investigación observacional con datos de registros”, las “modalidades de consentimiento informado, supuestos en los que pueden utilizarse y excepciones”, las “circunstancias concurrentes en estudios o investigaciones por las que debe acudir a la anonimización y por las que puede utilizarse la seudonimización” o los “requisitos y condiciones para el acceso a los datos codificados y a la reidentificación”. Como se indica en este informe, “falta el complemento legislativo que el RGPD encomienda elaborar a los Estados miembros”, instando “a las autoridades competentes, así como al conjunto de formaciones políticas, a que promuevan la elaboración y promulgación de una ley específica sobre protección de datos personales de salud y genéticos”.

Desde el punto de vista de las amenazas a la ciberseguridad, identificamos las siguientes como las más frecuentes en nuestro hospital, de acuerdo al histórico de incidentes de seguridad mantenido por el Servicio de Informática:

- Intencionadas:
 - Virus / *Ransomware*.
 - Suplantación (*Phishing*).
 - Robo de equipos.
 - Acceso no autorizado a datos por los trabajadores.
- No intencionadas:
 - Abandono o pérdida.
 - Acceso o comunicación accidental.
 - Error de configuración técnica.
 - Fallo de software o hardware.

Estas amenazas son ejecutadas habitualmente por los siguientes actores a través de una serie de mecanismos (vectores):

- Actores:
 - Trabajadores.
 - Pacientes y acompañantes.

- Atacantes externos (local).
- Atacantes externos (remoto).
- Vectores:
 - Interacción física con activos IT.
 - Conexión cableada / inalámbrica con los activos IT.
 - Interacción con profesionales del hospital (Ingeniería social).

5.2.4. Aspectos tecnológicos

5.2.4.1. *Tecnología disponible en el hospital para el análisis de datos clínicos en oncología*

Sistemas operacionales

Si bien el HUPHM dispone de 56 aplicaciones operacionales que tratan datos clínicos, resumiremos a continuación aspectos de interés de los principales sistemas en el ámbito oncológico.

El sistema operacional principal, que contiene la HCE, es el sistema Selene de Cerner Corporation. Dicho sistema contiene un elevado volumen de funcionalidades, en línea con los sistemas de HCE hospitalarios típicos (ver capítulo 2.3.2). La información clínica se incorpora en la HCE a través de los siguientes objetos clínicos, con distintos grados de estructuración: notas, peticiones, formularios, informes, prescripciones e imágenes. La definición y puesta en marcha de formularios estructurados de datos sólo puede ser realizada por administradores de Selene, habilitados específicamente para ello. Durante el desarrollo de la tesis, ningún facultativo del hospital disponía de esta posibilidad. El sistema tampoco permite la descarga de datos clínicos para su procesamiento en otras herramientas.

El sistema de HCE dispone múltiples integraciones con otros sistemas departamentales. Identificamos a continuación (en orden alfabético) aquellas con uso en la gestión del paciente con cáncer de pulmón:

- Alert: Sistema de triaje en Urgencias Generales mediante la aplicación del algoritmo Manchester.
- ARIA: Sistema de gestión de radioterapia, junto con los sistemas de planificación de radioterapia contienen los datos de actividad y de tratamientos administrados a los pacientes.
- Aurora: Sistema de dietética y nutrición para pacientes ingresados.

- eBlue y Gricode: Sistemas de gestión de Banco de Sangre. La integración permite la prescripción y la transfusión de componentes sanguíneos de forma segura para el paciente.
- Endobase: Sistema para la gestión de las pruebas endoscópicas. Permite la petición, realización y devolución de resultados a la HCE de las pruebas diagnósticas realizadas por Neumología (p. ej.: Broncoscopias).
- Farmatools: Sistema de gestión de la Farmacia Hospitalaria. Permite la prescripción de citostáticos y de otra medicación de dispensación y administración ambulatoria.
- ISCV (IntelliSpace CardioVascular) y TracemasterVue: Sistemas para la gestión de pruebas cardiológicas, ecocardiografías y electrocardiogramas respectivamente.
- Novopath: Sistema para la gestión de las pruebas de anatomía patológica.
- PICIS (suite): Sistemas para la gestión del paciente crítico, tanto quirúrgico como postquirúrgico y en UCI Médica.
- Servolab: Sistema para la gestión de los laboratorios de análisis clínicos: bioquímica, hematología, microbiología, inmunología.
- Syngo: Sistema de gestión del Servicio de Radiodiagnóstico (RIS) y de la imagen radiológica generada (PACS).
- TSNU (TRANSPORTE SANITARIO NO URGENTE): Sistema para la petición de transporte sanitario (ambulancias) no urgentes.

No se dispone de integración de la HCE con los sistemas de secuenciación masiva (NGS) y dPCR utilizados por el Servicio de Oncología para las determinaciones moleculares.

Sistemas informacionales y para el análisis de datos

Tomando como referencia los sistemas informacionales del HUPHM en relación a los sistemas de la Consejería de Sanidad, podemos observar la heterogeneidad de sistemas apuntada previamente (capítulo 3.4) (Cruz-Bermúdez, 2015):

Figura 19 – Mapa de sistemas informacionales en el HUPHM como parte de la arquitectura regional.

Esta arquitectura de sistemas informacionales está orientada fundamentalmente a la explotación de datos de actividad (ambulatoria, de ingresos, de intervenciones quirúrgicas, de lista de espera, etc.) y no dispone apenas de mecanismos para favorecer una explotación de la información clínica.

El sistema informacional principal del hospital es el *data warehouse* (DATA), basado en la solución Oracle Business Intelligence Discoverer 10g Versión 2 (10.1.2.1). Fundamentalmente provee de información de actividad asistencial así como de descargas de formularios, procedentes en ambos casos de la HCE Selene a través de unas descargas programadas y un procesamiento posterior (ETL). Adicionalmente, el hospital genera, de una forma semiautomática, una serie de cuadros de mando que organizan la información de actividad en distintos indicadores de interés para la gestión. De igual forma, genera las descargas de datos oficiales requeridas por los servicios centrales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Por último, se dispone de aplicaciones específicas para el análisis de datos (SPSS, Stata), si bien dichas herramientas son utilizadas exclusivamente desde el ámbito de la investigación, y a título individual por los facultativos.

5.2.4.2. Requisitos tecnológicos para el análisis de datos clínicos en oncología

Un hospital informatizado como el HUPHM genera anualmente un gran volumen de información. Estimamos que se generan 2.5 millones de notas clínicas en texto libre y 25.000 altas hospitalarias codificadas en el CMBD al año. Analizando el volumen de información clínica generada (excluida la imagen médica) en el periodo 2009-2018 para el proyecto europeo BigMedilytics (Horizonte 2020), obtuvimos las cifras que se indican en la figura:

Figura 20 - Estimación del volumen de información generada en el HUPHM por los pacientes con cáncer en el periodo 2009-2018 (generada para el proyecto BigMedilytics).

Como se observa en la figura, se dispone tanto de datos estructurados (*structured data* o SD) como de datos no estructurados (*unstructured data* o UD).

En lo relativo al volumen de datos, observamos que el número de pacientes de una patología concreta como el cáncer de pulmón, en un solo centro, podría no tener el volumen suficiente para realizar análisis de datos clínicos aplicando técnicas de ML, especialmente en caso de seleccionar subpoblaciones específicas. Sin embargo, la gran cantidad de entidades relacionadas (consultas, tratamientos, ingresos, urgencias, etc.) y de variables que describen a cada una de ellas a lo largo del tiempo (fecha de realización, realizador, principio activo, dosis, fecha de alta,

diagnóstico, etc.) sí permiten disponer de una elevada dimensionalidad y por tanto de un volumen alto de datos para la aplicación de técnicas avanzadas de análisis. En todo caso, la integración de la información de distintos centros es fundamental para que estas tecnologías ofrezcan todo su potencial.

En lo relativo a la variedad de los datos, otra de las características habitualmente evaluadas en el ámbito de *Big Data* y *Data Science*, observamos que fundamentalmente tratamos con datos clínicos recogidos como texto o imagen. Sin embargo, podemos integrar otras fuentes de información. Recientemente el desarrollo de la medicina personalizada en oncología ha impulsado la incorporación de información molecular (genética), con la perspectiva próxima de crecimiento exponencial, al disponer de mecanismos de secuenciación masiva y de análisis de proteínas o microbioma, por ejemplo, que podrían ser de interés para establecer un perfil único del paciente en cada momento temporal. Al mismo tiempo, es previsible la integración en un futuro de otros datos del individuo, derivados de su ubicación en un contexto poblacional, como son los culturales, socioeconómicos y demográficos, los datos epidemiológicos y de salud pública, de hábitos y conductas o de valores y preferencias.

Por último, en lo relativo a la velocidad de generación de los datos, o de la generación de una respuesta ante los mismos (ya sea un conocimiento generado, una predicción o una acción), observamos una necesidad creciente. Sin embargo, el grueso de los datos identificados en nuestro trabajo no tiene unos requisitos especiales de velocidad de procesado.

A tenor de lo observado, concluimos que por el momento no es requisito imprescindible disponer de infraestructura *Big Data* para la aplicación de técnicas de análisis de datos basadas en ML.

5.3. PROPUESTA DE UN MARCO DE TRABAJO

5.3.1. Modelo conceptual y arquitectura asociada

En base al análisis de situación realizado, y tras la búsqueda bibliográfica correspondiente, **se plantea un modelo conceptual y una arquitectura funcional asociada (que comprende funciones y datos) que facilite el análisis de datos clínicos en oncología, y específicamente en el ámbito del cáncer de pulmón.** Es necesario destacar que, si bien la arquitectura se plantea en su totalidad, el grado de definición e implantación posterior de cada bloque funcional es distinto debido a las limitaciones temporales lógicas de este trabajo de tesis. Se han priorizado por tanto

aquellos elementos de la arquitectura que podrían ser desarrollados, implementados y validados posteriormente en el ámbito del presente trabajo, dejando para futuros trabajos el desarrollo del resto de elementos de la arquitectura. Es importante destacar que, si bien la arquitectura planteada contiene bloques funcionales, datos y flujos de los mismos, no define necesariamente qué sistemas de información deben soportar dichos bloques funcionales. Esta definición de sistemas podrá adaptarse a las características de cada centro y de los sistemas de información de los que disponga, haciendo así más flexible el marco de trabajo planteado.

La arquitectura planteada puede verse en la siguiente figura.

Figura 21 – Arquitectura planteada para el análisis de datos clínicos en oncología.

En la arquitectura planteada identificamos los siguientes bloques funcionales (cajas azules en la figura):

- Historia Clínica Electrónica (HCE).
- Modelo de Datos Oncológico (MDO).
- Análisis de datos clínicos (ADC).
- Soporte a la decisión clínica (SDC).

Los bloques funcionales se agrupan en dos tipos principales de acuerdo a su función principal: repositorio de datos (HCE y MDO) o análisis de datos (ADC, SDC). Los bloques disponen además de sub-funciones (indicadas como cajas de color más intenso dentro de las cajas que corresponden al bloque) y que describiremos en capítulos específicos más adelante.

Adicionalmente se identifican otros bloques funcionales que, no siendo parte de la arquitectura, interaccionan con la misma (cajas verdes en la figura).

Por último, se identifican acciones de intercambio o procesamiento de datos entre los distintos bloques funcionales (representadas mediante flechas azules en la figura, con un texto rojo entre corchetes que identifica la acción en cada caso). Distinguimos entre intercambio o procesamiento de datos clínicos generales (variables disponibles para todo paciente) y datos clínicos específicos (propios de una patología oncológica concreta, como el cáncer de pulmón). Si bien describiremos de forma genérica los datos intercambiados, no entramos a establecer y validar la utilización de modelos de referencia en esta materia, como los modelos duales basados en el estándar CEN/ISO EN13606 (International Organization for Standardization (ISO), 2008) o el estándar abierto OpenEHR (<https://www.openehr.org/>) que realizan una distinción entre la información clínica (inmutable) y el conocimiento clínico asociado (conjunto de conceptos de un determinado dominio clínico, y que por tanto pueden evolucionar en el tiempo) (Serrano *et al.*, 2009). Dichos modelos representan el conocimiento clínico mediante arquetipos (estructuras de metadatos) enlazados con terminologías previamente establecidas (como SNOMED-CT, (<http://www.snomed.org/>) facilitando de esta manera la interoperabilidad semántica entre sistemas y la representación homogénea de la información, independientemente de la institución que los genere. Propondremos como trabajo futuro avanzar en esta línea para el ámbito del cáncer de pulmón, y el ámbito oncológico en general.

Describimos a continuación cada uno de los bloques funcionales de la arquitectura planteada, incluyendo sus componentes y relaciones y sus mecanismos generales de gobernanza.

5.3.1.1. *Historia Clínica Electrónica (HCE)*

La Historia Clínica Electrónica (HCE) se corresponde con la versión digital (informatizada) de la Historia Clínica clásica, entendida como un conjunto documental con toda la información de utilidad para la asistencia sanitaria al paciente y que contiene una transcripción de las interacciones entre el profesional clínico y el paciente. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (Jefatura del Estado Español, 2002) define la Historia Clínica como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones

de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”. De acuerdo al artículo 15 de la Ley 41/2002, deberá contener como mínimo:

- La documentación relativa a la hoja clínicoestadística.
- La autorización de ingreso.
- El informe de urgencia.
- La anamnesis y la exploración física.
- La evolución.
- Las órdenes médicas.
- La hoja de interconsulta.
- Los informes de exploraciones complementarias.
- El consentimiento informado.
- El informe de anestesia.
- El informe de quirófano o de registro del parto.
- El informe de anatomía patológica.
- La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
- La aplicación terapéutica de enfermería.
- El gráfico de constantes.
- El informe clínico de alta.

Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO)

La HCE aporta, independientemente de su implementación concreta, y entre otras muchas ventajas, un conjunto de datos estructurados relativos tanto al paciente (datos demográficos) como a la actividad asistencial realizada. Sin embargo, no existe una definición del contenido mínimo de la HCE en función de la especialidad o la patología. De esta forma, y a partir del análisis realizado de otros modelos de referencia en este ámbito (International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), 2017) (Provencio, Carcereny, *et al.*, 2019), proponemos una Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO) integrada en el sistema de HCE general del hospital como un subconjunto de ésta, que contenga de forma estructurada un número mínimo de variables clave para la realización de los análisis posteriores. Disponer de un número mínimo de variables estructuradas permite que sean cumplimentadas en la dinámica asistencial habitual, sin que suponga una carga significativa de trabajo para el facultativo. Pretender un número superior de variables estructuradas en la HCEO, si bien sería a priori muy útil en la arquitectura planteada desde un punto de vista técnico, podría no ser un objetivo alcanzable a priori en función del análisis realizado (ver capítulo 5.2.2).

La HCEO deberá permitir al menos el registro de las variables relacionadas a continuación. Dichas variables deben ser definidas previamente en un diccionario de datos que debe estar a

disposición de todos los usuarios que realizarán el registro de datos en la HCEO, con el fin de unificar criterios para su registro.

1. **Registro de la primera consulta en Oncología Médica.** Además de los registros habituales (nota clínica no estructurada), deberá contener al menos las siguientes variables:

Variable	Tipo
Raza	Categórica
Hábito tabáquico	Categórica
Cuantificación del hábito tabáquico	Numérica
Órgano (tipo de cáncer)	Categórica
Síntomas observados	Categórica
Estadio inicial del paciente	Categórica
Fecha diagnóstico inicial	Fecha
ECOG-PS al diagnóstico	Categórica
Histología	Categórica
Subtipo histológico	Categórica
Grado histología	Categórica
Marcadores moleculares realizados	Categórica
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	Categórica
Cánceres previos del paciente	Categórica

Variable (específica del cáncer de pulmón)	Tipo
Resultado de marcadores moleculares (EGFR)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (ALK)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (KRAS)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (BRAF)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (HER2)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (ROS1)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (FGFR1)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (PDL1)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (RET)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (MET)	Categórica
Nº de familiares con cáncer de pulmón	Numérica

Figura 22 – HCEO: Variables de la 1ª consulta de Oncología Médica.

2. **Registro de seguimiento en Oncología Médica.** Además de los registros habituales (nota clínica no estructurada), deberá contener al menos las siguientes variables:

Variable	Tipo
Síntomas observados	Categórica
ECOG-PS en el contacto	Categórica
Estadio en el contacto	Categórica
Peso (Kg)	Numérica
Resultado de marcadores moleculares (EGFR)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (ALK)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (KRAS)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (BRAF)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (HER2)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (ROS1)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (FGFR1)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (PDL1)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (RET)	Categórica
Resultado de marcadores moleculares (MET)	Categórica
Fecha de inicio de tratamiento actual	Fecha
Línea de tratamiento actual	Categórica
Tipo de tratamiento actual	Categórica
Situación de progresión o recaída	Categórica
Fecha de progresión o recaída	Fecha
Método de detección de progresión o recaída	Categórica
Localización de progresión	Categórica
Situación de respuesta	Categórica
Método de detección de respuesta	Categórica
Toxicidad	Categórica
Nuevo tratamiento prescrito	Categórica

Figura 23 - HCEO: Variables de las consultas sucesivas de Oncología Médica.

Adicionalmente, formarán parte de la HCEO otras variables estructuradas que deben estar disponibles en el sistema de HCE (bien por ser generadas automáticamente o capturadas en otras funcionalidades de la HCE) y que por tanto no deben ser registradas manualmente en la HCEO:

- Variables relativas a la actividad asistencial realizada (tales como la fecha de realización, el servicio y el profesional que la realiza entre otras), incluyendo actividad ambulatoria (consultas, pruebas y tratamientos de hospital de día), intervenciones quirúrgicas, ingresos hospitalarios, asistencias en urgencias.
- Variables relativas a las pruebas complementarias realizadas al paciente, especialmente pruebas de imagen y pruebas analíticas.
- Variables relativas a los tratamientos farmacológicos prescritos y administrados: tipos de tratamiento aplicados, fechas de los tratamientos, complicaciones y efectos adversos de los tratamientos, coste de los tratamientos.

Estructuración de los datos

Para la cumplimentación de las variables planteadas, es necesario realizar un proceso de estructuración de la información disponible. Si bien la alternativa más inmediata consiste en la cumplimentación por el propio facultativo a través de un mecanismo apropiado (por ejemplo, un formulario de la HCEO), consideramos también en nuestra propuesta la posibilidad de disponer de tecnología NLP que realice dicha estructuración (ver capítulo 2.3.5). Para ello, planteamos tanto la realización de asistentes en la HCEO que permitan la estructuración en tiempo real (“transparente”), a través de sugerencias de términos mientras se escribe en texto libre, como la ejecución de estos procesos de estructuración de forma programada (*batch*), de forma que se obtengan variables estructuradas a partir del procesamiento del texto libre, una vez registrado.

Integración con el Modelo de Datos Oncológico

Planteamos la necesidad de una integración entre los bloques funcionales de la HCE (y específicamente de la HCEO) y del Modelo de Datos Oncológico (MDO) que definiremos a continuación, de forma que los datos estructurados recogidos en la HCEO puedan estar disponibles automáticamente en el MDO, mejorando la calidad de los datos y evitando trabajo redundante por parte de los profesionales.

5.3.1.2. *Modelo de Datos Oncológico (MDO)*

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 5.2.2, constatamos que en la actualidad se produce un registro de datos con fines de mejora asistencial e investigación desligado de la HCE. Sin embargo, no existe un registro estructurado, único y actualizado que contenga una referencia única de cada uno de los pacientes pertenecientes al servicio de oncología con fines de mejora asistencial o investigación, sino que se elaboran múltiples bases de datos inconexas, sin una codificación estándar de los valores estructurados, ni una definición clara, escrita y compartida por todos los usuarios que introducen datos en dichas bases. Como hemos podido observar, esto impacta sobre la calidad de los datos y sobre las posibilidades de interoperar (integrar) con otros registros. Por tanto, disponer de una base de datos de pacientes suficientemente estructurada (un registro de casos) evitaría la necesidad de elaborar distintos registros asistenciales por patología. Dado que la HCE del HUPHM no dispone de las facilidades necesarias para la gestión autónoma de las variables a recoger ni para la explotación de datos que requeriría este registro de casos unificado, planteamos un bloque funcional específico para resolver esta problemática que denominamos **Modelo de Datos Oncológico (MDO)**. Identificamos los siguientes componentes del MDO:

Figura 24 – Componentes del Modelo de Datos Oncológico planteado.

1. **Registro de Casos (REC):** El registro de casos recopila el conjunto longitudinal de datos asistenciales estructurados y no anonimizados que se consideren de interés para el seguimiento asistencial de los pacientes y para la localización de casos que cumplan unos criterios determinados. Así mismo tendrá un uso secundario para realizar actividades de mejora asistencial, investigadoras y docentes no especificadas a priori, en cuyo caso sus datos serán la base para la elaboración de bases de datos de investigación, previa aprobación por parte del Comité Ético, y cuyos datos serán anonimizados o seudonimizados. El REC se subdivide en los siguientes componentes:
 - **Conjunto mínimo de datos oncológicos (CMDO):** Datos estáticos, creados en el primer contacto asistencial del paciente en el ámbito ambulatorio (1ª consulta de Oncología Médica) del primer proceso oncológico tratado. Estos datos están disponibles en la HCE (demográficos) y en la HCEO (a través de un formulario de 1ª consulta de Oncología Médica), son comunes para todo paciente oncológico y se integrarán automáticamente en el CMDO. De esta forma, se garantiza que todo paciente seguido en el Servicio de Oncología Médica, independientemente de su patología concreta, tenga al menos estos datos en el REC:

Variable	Tipo	Origen
Número de Historia Clínica (NHC)	Numérica	HCE
NIF/NIE	Texto	HCE
Nombre y apellidos	Texto	HCE
Fecha de nacimiento	Fecha	HCE
Sexo	Categoría	HCE
Raza	Categoría	HCEO 1ª consulta
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	Categoría	HCEO 1ª consulta
Hábito tabáquico	Categoría	HCEO 1ª consulta
Cuantificación del hábito tabáquico	Numérica	HCEO 1ª consulta
Órgano (tipo de cáncer)	Categoría	HCEO 1ª consulta
Estadio inicial del paciente	Categoría	HCEO 1ª consulta
Fecha diagnóstico inicial	Fecha	HCEO 1ª consulta
Fecha de primera visita en Oncología Médica	Fecha	HCE
ECOG-PS al diagnóstico	Categoría	HCEO 1ª consulta
Histología	Categoría	HCEO 1ª consulta
Subtipo histológico	Categoría	HCEO 1ª consulta
Grado histología	Categoría	HCEO 1ª consulta
Marcadores moleculares realizados	Categoría	HCEO 1ª consulta
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	Categoría	HCEO 1ª consulta
Cánceres previos del paciente	Categoría	HCEO 1ª consulta

Figura 25 – MDO: Variables del Conjunto de Datos Mínimos Oncológicos (CMDO) del Registro de Casos.

- **Bases de Patologías:** Cada una de las patologías (órganos o tipos de cáncer, como por ejemplo cáncer de pulmón, cáncer de colon, linfoma, etc.) podrá disponer de su propio modelo de datos que sea de interés específico para la enfermedad, y que no sea contemplado por tanto en el CMDO. En todo caso se guardará integridad referencial con el número de historia clínica del paciente (NHC) contenido en el CMDO (no se podrán incluir datos de pacientes en una patología concreta que no estén previamente en CMDO) de forma que cada paciente en el CMDO podrá tener una o varias patologías registradas, con sus respectivas variables.
- **Base de eventos de seguimiento (BES):** Se dispondrá de un modelo de datos para contener el seguimiento evolutivo de los pacientes que contenga todos los eventos de interés registrados para un paciente en su curso asistencial: contactos asistenciales, procedimientos y pruebas complementarias, respuesta o progresión, toxicidades, etc. Dado que mantener esta base actualizada implica un trabajo elevado, se buscará integración en lo posible con aquellos datos que se registran en la HCE, como los datos de actividad asistencial. Actualmente estos datos se registran de forma no estructurada en la HCE, si bien se propone la introducción paulatina de un formulario en la HCE con el mismo contenido que la BES para su integración, en función de la madurez de la organización para la estructuración de la información en la HCE.

- **Base de tratamientos farmacológicos (BTF):** Contendrá la relación temporal de todos los tratamientos oncológicos administrados al paciente que han sido prescritos por el servicio de oncología. Se excluyen los tratamientos administrados en el hospital (urgencias, hospitalización), los prescritos para su recogida en hospital (pacientes externos) o los prescritos mediante receta (en Atención Primaria a Atención Hospitalaria). Esta información se obtendrá del sistema de prescripción y administración de medicación oncológica del hospital.

Integración del REC con la HCE y la HCEO

Se muestran a continuación las relaciones entre los distintos componentes del REC y el bloque funcional de HCE y HCEO introducido en el capítulo anterior:

Figura 26 – Relación entre los componentes del Registro de Casos y la Historia Clínica Electrónica.

De acuerdo al modelo establecido, en nuestro centro identificamos las siguientes integraciones necesarias:

- HCE (Selene) – CMDO: Los datos demográficos del paciente contenidos en la HCE deberán integrarse automáticamente en el CMDO (ver Figura 25).
- HCE (Farmatools) – BTF: Se deben obtener los tratamientos administrados con sus datos asociados (principio, vía, dosis) y sus fechas.
- HCE (Selene) – BES: Dado que BES es una base de datos longitudinal, su mantenimiento es costoso. Para evitar duplicar trabajo con los registros de la HCE se buscará integración con la HCE (Selene) en lo relativo a los datos de actividad asistencial.
- HCEO (Selene) – CMDO: La cumplimentación por primera vez de un formulario Selene de 1ª consulta en Oncología Médica generará una nueva entrada en el CMDO de forma automática. De esta forma se garantiza que todo paciente oncológico tiene una entrada en el CMDO.

- HCEO (Selene) – Bases de patologías (pulmón): De forma que los datos específicos de la patología cumplimentados en el formulario de la 1ª consulta en Oncología Médica se integren en la base de patología correspondiente (ver Figura 22)
 - HCEO (Selene) – BES: Las variables recogidas a través del formulario Selene de consulta de seguimiento en oncología pasarán a formar parte automáticamente de la base de eventos de seguimiento (ver Figura 23).
 - Adicionalmente, se identifica la necesaria integración del Índice Nacional de Defunciones (INDEF) con el CMDO para poder actualizar la situación de fallecimiento de los pacientes.
2. **Bases de datos de investigación (BDIs).** Se crearán exclusivamente para proyectos concretos, una vez conocidas las variables de estudio que se necesitan y comprobado que no están ya recogidas en el REC. Las variables que contengan deberán estandarizarse y añadirse a un diccionario único, y tendrán necesariamente integridad referencial con el CMDO durante su elaboración. Una vez elaboradas, se procederá a la anonimización o seudonimización para realizar el análisis correspondiente a la investigación aprobada.
 3. **Base de Ensayos Clínicos (BEC):** Contendrá datos actualizados de los Ensayos Clínicos con medicamentos en el centro, en sus distintos estados de desarrollo, así como de los pacientes reclutados, disponiendo de integridad referencial al CMDO.

Gobernanza del MDO

En lo relativo a la **gobernanza del MDO**, es necesario establecer:

- Una normativa de uso del MDO (procesos de gobernanza de la información) de obligado cumplimiento para todo el personal adscrito al Servicio de Oncología.
- Responsabilidades sobre el registro de datos y niveles de acceso al MDO, incluyendo tareas como el registro de los formularios de la HCEO que alimentan el CMDO, la creación manual de entradas en el CMDO, la modificación o eliminación de datos, la designación de propietarios de las BDI o los responsables de actualizar los datos evolutivos.
- Un diccionario de datos, de forma que cada variable que se incluya en el MDO debe tener una entrada única en este diccionario que incluya una definición que facilite que todos los usuarios entienden lo mismo cuando la cumplimentan, el rango de valores posibles y sus unidades. En caso de seguir un estándar, se indicará en el diccionario. La existencia del diccionario permitirá además evitar variables duplicadas o muy similares a otras existentes.

- Aspectos de seguridad y confidencialidad, y en concreto el cumplimiento de los requisitos legales (ver capítulo 5.3.2.2).
- Mecanismos de garantía de la calidad de datos, incluyendo aspectos como campos obligatorios, valores máximos o mínimos, desplegables, campos encadenados o explotaciones descriptivas que permitan evaluar su calidad por parte de los responsables designados para ello.

Aspectos relativos a la implementación del MDO

En lo relativo a la **implementación** del modelo de datos oncológico (MDO) sobre los sistemas de HCE disponibles en los hospitales, y específicamente sobre el sistema existente en el HUPHM, observamos que no es una solución óptima. Entre los motivos identificados que desaconsejan esta aproximación destacamos los siguientes:

1. Si bien es posible introducir registros de datos asociados al paciente con un cierto grado de estructuración (por ejemplo, formularios o informes) no es factible incorporar un modelo de datos relacional específico para distintas patologías, dado que la HCE disponible habitualmente es un paquete de software comercial, y no un desarrollo propio.
2. Los datos necesarios para integrar un MDO se generan en distintos sistemas informáticos en el Hospital, incluyendo distintas bases de datos ofimáticas utilizadas como registros de casos, de forma que se requiere en todo caso una consolidación adicional en un único repositorio. El desarrollo de estas integraciones con el sistema de HCE sería probablemente más complejo y costoso que la consolidación de los datos en un nuevo sistema.
3. Los cambios en los registros de datos de la HCE requieren típicamente de la participación de personal del proveedor de dicho sistema de HCE (analistas funcionales del sistema), de forma que el proceso de creación y modificación posterior de los mismos puede llegar a ser poco ágil. Esto puede ser especialmente crítico durante una implementación inicial, en tanto esté consolidado el conjunto de datos que se pretende recoger.
4. La exportación de datos clínicos para su análisis posterior con otras herramientas es un proceso, por lo general, poco usable, y que de nuevo requiere el concurso de personal del proveedor del sistema de HCE.

Por tanto, planteamos que la función MDO descrita en la arquitectura sea implementada preferentemente (en función de las particularidades del sistema de HCE disponible en el centro) como un sistema independiente e integrado con la HCE y el resto de sistemas necesarios. En esta implementación independiente, es necesario distinguir claramente dos ámbitos diferenciados:

- El **Registro de Casos (REC)**, como un sistema con un uso asistencial, y que contiene por tanto datos identificativos de los pacientes. Contendrá adicionalmente las correspondencias entre los datos identificativos y las claves de seudonimización que se utilicen en las bases de investigación. Dicho sistema por tanto debe cumplir con todos los requisitos de seguridad y protección de datos establecidos para los sistemas de HCE.
- Las **Bases de Investigación (BDI y BEC)**, como sistemas destinados a la investigación que reutilizan datos asistenciales y que contendrán datos seudonimizados o completamente anonimizados según el caso. Sobre la infraestructura disponible, la elaboración de una base de datos concreta se realizará previa aprobación de la investigación por parte del Comité de Ética correspondiente.

Por último, es necesario plantear la migración de los registros de casos preexistentes en el Servicio de Oncología Médica al MDO, de acuerdo a un plan de priorización que tenga en cuenta si dichos registros están activos o son históricos y la calidad de sus datos (coste/beneficio de la migración).

5.3.1.3. *Análisis de datos clínicos (ADC)*

De acuerdo a la definición inicial realizada (capítulo 2.3.1) el bloque funcional de análisis de datos clínicos (ADC) facilita el estudio detallado de los datos relativos al estado físico y la salud de las personas con el fin de adquirir o mejorar su conocimiento. Para ello, se aplicarán las tecnologías y técnicas de análisis existentes (DS, ML y AI, de acuerdo a su definición y estado del arte, ver capítulo 2.3.4), contando con los siguientes medios:

- **Datos:** Se obtendrán los datos clínicos a través de descargas, de procesos de ETL o mediante otros mecanismos de integración con las herramientas de análisis, del MDO, de la HCE y de fuentes externas de datos. Dichos datos serán seudonimizados en el proceso de obtención, de forma que se proteja en mayor medida la confidencialidad de la información (ver capítulo 5.3.2.2) y se habilite la posibilidad de participación de investigadores no directamente involucrados en la asistencia del paciente.
- **Metodología:** Se propone la aplicación de la metodología CRISP-DM, adaptada de acuerdo a lo establecido más adelante (ver capítulo 5.3.2.1).
- **Herramientas:** Nuestra propuesta permite libertad completa a la hora de seleccionar las herramientas tecnológicas más adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. No obstante, realizamos algunas recomendaciones sobre herramientas en el capítulo 5.3.2.3.

El producto final del ADC será:

- Un **conocimiento** respecto de los datos analizados (una evidencia) que en muchos casos puede ser el punto de partida para nuevas hipótesis de investigación o para el soporte a la toma de decisiones clínicas.
- Unos **modelos matemáticos**, entrenados sobre los datos disponibles, que pueden ser desplegados en el entorno clínico (producción) para el soporte a la toma de decisiones clínicas.

5.3.1.4. *Soporte a la Decisión Clínica (SDC)*

Como vimos en el capítulo 2.3.8, consideraremos sistemas de soporte a la decisión clínica (CDSS) a aquellas aplicaciones informáticas con capacidad para facilitar información, realizar predicciones o realizar prescripciones que faciliten la toma de decisiones clínicas por el humano.

En nuestro modelo, no planteamos restricciones respecto de la tipología de CDSS a emplear en el bloque funcional de SDC. Los sistemas a emplear deberán ser seleccionados de acuerdo al caso de uso específico que se plantee en cada caso. Si bien existen múltiples categorizaciones de los CDSS, más allá del objetivo al que se destinan (informar, predecir o prescribir una acción), en nuestro modelo añadimos las siguientes (Kubben, Dumontier and Dekker, 2019):

- De acuerdo a la interacción requerida con el usuario, distinguimos entre **sistemas pasivos (reactivos) y activos (proactivos)**. En los primeros es el usuario el que demanda el soporte a la decisión de forma manual, mientras que en los segundos es el propio sistema el que sugiere el soporte al usuario. Ambos tipos tienen ventajas e inconvenientes, siendo el principal inconveniente de los sistemas pasivos su falta de eficacia debido a la dependencia humana, y el principal inconveniente de los sistemas activos la generación excesiva (innecesaria) de alertas que causa fatiga en el usuario, y causa que sean ignoradas a la larga.
- De acuerdo al proceso interno de toma de decisiones (al modelo), distinguimos entre **sistemas deterministas (basados en reglas) y sistemas probabilistas (basados en probabilidades calculadas a partir de la aplicación de modelos matemáticos)**. De nuevo, tienen ventajas e inconvenientes, de forma que no planteamos la superioridad a priori de un tipo respecto del otro. Dependerá del caso de uso concreto y de la calidad de las reglas y modelos que sirven de base a unos y otros.

Independientemente del tipo de CDSS, identificamos dos sub bloques funcionales que deben estar presentes en nuestro bloque de SDC:

1. **Modelo**, procedente del ADC o de otra evidencia previa generada mediante investigación clínica, y que permite analizar nuevos datos de entrada para facilitar un

resultado (una información, predicción o prescripción) capaz de soportar la toma de decisiones.

2. **Acción**, que consiste en la ejecución de las tareas derivadas de la decisión indicada por el modelo. La implementación de la acción puede tener distintas manifestaciones, como la información al usuario (por ejemplo, mostrando un mensaje) o la realización de una acción en un sistema de información, siendo preferidas en nuestro planteamiento aquellas acciones que se integren en el sistema de información utilizado por el usuario en su dinámica de trabajo habitual (ya sea la HCE o un sistema externo, como podría ser una aplicación móvil para el paciente).

La separación funcional entre modelo y acción facilita realizar una validación previa del modelo antes de su puesta “en producción”, algo que típicamente es un proceso complejo y costoso, dado que se requiere la realización de una investigación clínica para su validación.

5.3.1.5. *Sistemas externos*

La integración de la arquitectura planteada con sistemas externos es un aspecto clave para maximizar el valor que puede aportar en el ámbito hospitalario. Así, identificamos como integraciones de alto interés las siguientes:

- HCE / MDO - Fuentes externas de datos: Disponer de integraciones bidireccionales con fuentes de datos externas, y especialmente con registros nacionales de patologías, permitiría tanto obtener variables clínicas estructuradas de interés, no disponibles en el sistema local, como contribuir a dichos registros con los datos recogidos. La integración con los datos de otros niveles y ámbitos asistenciales (Atención Primaria, Servicios Sociales), con los datos recabados por el propio paciente (PROs) y con registros oficiales como el Índice Nacional de Defunciones (INDEF) también es de alto interés para completar la información clínica de los pacientes para usos asistenciales y de investigación. Dependiendo de las circunstancias concretas de los centros y sus sistemas de HCE, y de los objetivos buscados, podrá plantearse este tipo de integraciones con la HCE o con el MDO.
- SDC – Sistemas de información externos: La acción indicada desde el SDC puede ser facilitada a sistemas externos en la medida en la que contribuya a facilitar el soporte a la toma de decisiones en el momento y lugar en el que sea requerido. En especial, la integración con sistemas de seguimiento remoto domiciliario y con dispositivos móviles y apps, puede contribuir a ello.

5.3.2. Método común: procesos y herramientas asociadas

5.3.2.1. Adaptación de CRISP-DM para el análisis de datos clínicos

Disponiendo de los bloques funcionales establecidos previamente en la arquitectura planteada, es necesario establecer una metodología de trabajo que complete el marco de trabajo planteado para posibilitar el análisis de los datos clínicos oncológicos (en el bloque funcional ADC) con el enfoque propuesto. Si bien la aproximación habitual desde el punto de vista de la investigación clínica consiste en plantear una hipótesis y a continuación obtener los datos que permitan validarla, observamos cómo en nuestro planteamiento disponemos de datos asistenciales en primer lugar, y nos planteamos cómo obtener un valor adicional de los mismos. Por tanto, partimos de la necesidad de realizar un análisis de datos clínicos oncológicos sin especificar una hipótesis previa ni una serie de objetivos concretos, sino múltiples áreas de interés a explorar a través de una metodología que nos permita realizar este proceso de una forma óptima y sistemática. Por tanto, para la realización de los análisis de datos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto, se ha utilizado como marco metodológico CRISP-DM (ver capítulo 2.3.6). Durante nuestro estudio hemos aplicado esta metodología adaptándola a las necesidades del entorno sanitario y del problema de análisis planteado, tomando como referencia estudios previos que aplican esta metodología al análisis de datos clínicos y asistenciales (Rivo *et al.*, 2012) (Pérez *et al.*, 2015). Así, planteamos la adopción de CRISP-DM con unas fases adaptadas y desarrolladas en un ciclo de vida iterativo hasta la obtención de los resultados deseados y que describimos a continuación:

1. Comprensión del negocio (*Business Understanding*). El objetivo de esta fase es describir objetivos (metas) concretos del negocio (preguntas de investigación). Se realizan distintas entrevistas y consultas con el personal médico del Servicio de Oncología del HUPHM para focalizar los esfuerzos de análisis en aquellos aspectos de mayor interés clínico. Proponemos que en las iteraciones iniciales, en las que los objetivos no están todavía claros, se haga más hincapié en comprender la problemática del negocio y menos en la traducción de los objetivos planteados en problemas de *data mining*.
2. Comprensión de los datos (*Data Understanding*). En esta fase el objetivo es obtener los datos disponibles y prepararlos para realizar una descripción detallada y una exploración de los mismos. Se realiza conjuntamente con la fase anterior, informándola y propiciando la identificación y priorización de las preguntas o metas de negocio. Utilizamos herramientas estadísticas y de análisis visual para facilitar la exploración de los datos, su comprensión, y la detección de aspectos de interés para el Servicio de Oncología.

3. Preparación de los datos (*Data Preparation*). Se realizan tareas de selección, formateo, depuración y limpieza de datos. Esta fase se realiza conjuntamente con la fase posterior de modelado, de forma que, en función de los análisis a realizar, se verifica que se tienen los datos necesarios para cada uno de ellos y si están adecuadamente preparados, generando las variables derivadas necesarias. Estimamos que, una vez salvadas las primeras iteraciones, más centradas en la definición de objetivos, la preparación de los datos puede consumir entre un 70% y un 80% del tiempo empleado en la realización del ciclo completo de análisis. Consideraremos que disponemos de datos de calidad para la realización de los análisis si nuestros datos están resumidos en grado adecuado, están adecuadamente formateados para la utilización de las herramientas previstas, es sencilla su manipulación y uso, reflejan adecuadamente los datos obtenidos en los procesos asistenciales subyacentes, los posibles sesgos están adecuadamente identificados y documentados y contienen todas aquellas variables necesarias para responder a las preguntas de investigación planteadas (Leek, 2019).
4. Modelado (*Modeling*). En una primera etapa se trasladan los objetivos de negocio en problemas concretos de análisis de datos y *data mining* a resolver. En función de esta primera etapa se informa la fase de preparación de datos. En una segunda etapa se elaboran los análisis y modelos.
5. Evaluación (*Evaluation*). Se realiza la evaluación de los resultados por parte del área de negocio (el Servicio de Oncología en este caso) para validar los resultados e informar de nuevo las fases iniciales de la metodología, de forma que se siga profundizando en la cuestión y refinando los modelos.
6. Despliegue (*Deployment*). Los resultados obtenidos se ponen a disposición de los clínicos, tanto a través de modelos que pueden pasar al entorno productivo para el soporte a la toma de decisiones como de nuevo conocimiento generado, que en nuestro ámbito se sustanciará en publicaciones científicas de los resultados.

Planteamos una distribución no homogénea de los esfuerzos del proyecto de análisis de datos en las distintas iteraciones del ciclo CRISP-DM. Así, las primeras iteraciones estarán más centradas en obtener unos objetivos de análisis claros y comprenderlos adecuadamente para obtener los datos necesarios de las fuentes disponibles. Las siguientes iteraciones se focalizarán más en la preparación de los datos y en la elaboración de modelos iniciales para su evaluación por el personal clínico. Por último, las últimas iteraciones tratarán de volcar sus esfuerzos en refinar los modelos y evaluarlos en detalle, así como en obtener unos resultados que puedan ser aprovechados en el ámbito clínico. Gráficamente, representamos esta sucesión de ciclos CRISP-DM con distintos esfuerzos en las distintas fases, a través de la siguiente figura:

Figura 27 – Sucesión de ciclos CRISP-DM a lo largo del tiempo con una distribución no homogénea de los esfuerzos en sus distintas fases.

5.3.2.2. Aplicación práctica de medidas de ciberseguridad y protección de datos personales

Desarrollamos a continuación un conjunto de medidas prácticas a tomar para la protección de datos personales en el marco de trabajo planteado, de acuerdo a lo establecido en el RGPD, la LOPDGDD y el ENS. No obstante, cada implantación del marco de trabajo deberá revisarse de acuerdo a las indicaciones del DPD del centro correspondiente, adaptando las medidas necesarias al conocimiento en ese momento de la aplicación práctica de la normativa y a la política de seguridad específica de la que se disponga.

Cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales

Inicialmente, el planteamiento en materia de protección de datos y su implementación en el marco de este trabajo de tesis se realizó de acuerdo a la legislación vigente en ese momento (ver capítulo 5.2.3). No obstante, consideramos que en el diseño del método común que forma parte del marco de trabajo propuesto debía contemplarse el nuevo marco normativo surgido de la entrada en vigor del RGPD (ver capítulo 2.5.1), a pesar de ser reciente y por tanto carecer de referencias suficientes de implementación en nuestro ámbito. Considerando este contexto, planteamos en nuestro marco de trabajo las siguientes medidas para asegurar el cumplimiento normativo, especialmente en lo relativo al Modelo de Datos Oncológico (MDO) como elemento posiblemente no pre existente en el mapa de sistemas del hospital:

1. El bloque funcional correspondiente al MDO debe desarrollarse documentando desde el inicio los siguientes aspectos:
 - a. Finalidad y base de legitimación.

- b. Funcionalidad de la aplicación.
 - c. Tipos de datos registrados y alcance de los posibles tratamientos posibles.
 - d. Integración con otras aplicaciones.
 - e. Identificación de roles de acuerdo al RGPD (RT, ET, subencargados, etc.).
 - f. Medidas de seguridad técnica:
 - i. Cifrado de comunicaciones.
 - ii. Control de accesos.
 - iii. Traza.
 - iv. Perfiles de seguridad. Mínimo privilegio.
 - v. Copias de respaldo y pruebas de recuperación.
 - vi. Ubicación del CPD.
 - vii. Exportación de datos.
 - g. Medidas de seguridad organizativa:
 - i. Posibilidad de transferencias nacionales o internacionales de datos.
 - ii. Análisis del deber de información al interesado.
 - iii. Análisis de la necesidad de consentimiento.
 - iv. Necesidad de contratos de encargo de tratamiento en caso de que existan proveedores encargados del mantenimiento de los sistemas que soporten el RCP.
 - v. Compromisos de confidencialidad del personal que pudiera tener acceso al RCP más allá del personal sanitario implicado directamente en su cumplimentación.
2. Realización de una Evaluación de Impacto sobre Protección de Datos (EIPD), de acuerdo a las recomendaciones de la AEPD en su “Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de los datos sujetas al RGPD” (Agencia Española de Protección de Datos, 2018a). Tal y cómo se establece en dicha guía, la EIPD “permite determinar el nivel de riesgo que entraña un tratamiento, con el objetivo de establecer las medidas de control más adecuadas para reducir el mismo hasta un nivel considerado aceptable”.

Figura 28 – AEPD: Estructura con las diferentes etapas de una EIPD y el flujo a seguir en la ejecución de una EIPD.

Recientemente, la AEPD ha publicado una relación de los tratamientos que requieren una EIPD, incluyendo los criterios indicativos de su necesidad (Agencia Española de Protección de Datos, 2019b), y que confirma la necesidad de realización de una EIPD en el marco de trabajo propuesto.

3. Previamente a su implementación, el diseño del MDO debe ser remitido al Delegado de Protección de Datos (DPD) de la organización para su aprobación.
4. Inclusión del nuevo tratamiento de datos en el registro de tratamientos de la organización, si procede. Dada la orientación como registro de casos del REC, posiblemente podrá ser acomodado dentro del tratamiento de datos asistenciales previamente registrado.
5. El análisis de los datos clínicos procedentes del MDO y la HCE debe ampararse en una base de legitimación (de acuerdo al artículo 6 del RGPD) y hacer uso de la excepción

sobre la prohibición del tratamiento de datos de categoría especial que se indica en el artículo 9.2 del RGPD (como se indica en su capítulo j, que ampara el uso con fines de investigación científica). El acceso a estos datos, que contienen datos identificativos de los pacientes, estarán restringidos al equipo médico de Oncología Médica que trata a los pacientes y a los investigadores y técnicos de la institución que colaboren con los mismos, siempre bajo compromiso de confidencialidad.

6. Previamente a la elaboración de bases de investigación concretas (BDI), deberá aprobarse el protocolo de la investigación por parte del Comité Ético de Investigación correspondiente, que podrá eximir según el caso de la necesidad de recabar el consentimiento informado. En todo caso, se procurará que las BDI contengan datos seudonimizados o anonimizados.

Recomendaciones técnicas

Desde un punto de vista técnico, realizamos las siguientes propuestas en el ámbito de nuestro marco de trabajo:

1. Seguir las recomendaciones de implementación del ENS, contenidas en la Guía de Seguridad de las TIC. CCN-STIC 804. (Centro Criptológico Nacional, 2017).
2. En lo relativo a los procesos de anonimización y seudonimización, seguir las recomendaciones de la AEPD, tanto en su documento “Orientaciones y garantías en los procedimientos de ANONIMIZACIÓN de datos personales” (Agencia Española de Protección de Datos, 2016) como en su nota técnica “LA K-ANONIMIDAD COMO MEDIDA DE LA PRIVACIDAD” (Agencia Española de Protección de Datos, 2019a) en lo relativo a la gestión de los riesgos de reidentificación. Estas recomendaciones deberán ser especialmente observadas en aquellos casos en los que los datos salgan del centro para su tratamiento en otros centros.
3. Ubicar los sistemas informáticos que implementen el MDO en una red segura, sin acceso desde el exterior del centro, con las medidas de seguridad previstas en el ENS. Específicamente, deberá disponer de mecanismos de autenticación, control de acceso basado en perfiles, y trazas de auditoría.

5.3.2.3. Herramientas propuestas

En lo relativo a las herramientas tecnológicas necesarias para la posterior implementación del marco de trabajo, nuestro planteamiento proporciona libertad a cada centro para seleccionarlas en función de su criterio. No obstante, proponemos considerar los siguientes factores a tener en cuenta en su selección:

- Disponibilidad: Las herramientas deben poder ser accedidas por los usuarios que lo requieran en el hospital. En caso de que deban ser adquiridas, minimizando el coste de adquisición o uso.
- Seguridad y calidad de las herramientas: Los resultados de la aplicación de las herramientas deben ser fiables y consistentes, y deben estar protegidos respecto de ataques a la seguridad de la información.
- Sencillez de uso: Las herramientas deben poder ser usadas sin una formación experta por parte del usuario, o al menos con una curva de aprendizaje que permita obtener resultados con rapidez.
- Prestaciones: Las herramientas deben proporcionar las funcionalidades más avanzadas con un rendimiento adecuado.

En la implementación realizada del marco de trabajo propuesto seleccionaremos herramientas que cumplirán con los criterios expuestos.

5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO

Describimos a continuación el alcance de lo efectivamente desarrollado e implantado como parte del marco de trabajo planteado. Los resultados obtenidos de la aplicación de estos desarrollos serán descritos en el capítulo 5.5, y trataremos en el capítulo 6.1 aquellos aspectos del marco de trabajo excluidos del alcance del presente trabajo de tesis y que proponemos como trabajos futuros.

5.4.1. Estructuración de la Historia Clínica Electrónica

5.4.1.1. *Manual de uso de la HCE y agrupación por Procesos*

La Comisión de Historias Clínicas del HUPHM ha trabajado la elaboración de un Manual de Uso de la HCE, de forma que se pudiera disponer de una convención de uso, previamente consensuada, de obligado cumplimiento por el conjunto de profesionales clínicos y administrativos del hospital. Reproducimos a continuación de forma literal, con el permiso de la Comisión de Historias Clínicas, una serie de artículos de dicho manual y que servirán de base para el desarrollo posterior:

“Artículo 46. Ámbitos asistenciales

1. *El primer nivel de acceso a la historia clínica electrónica (HCE) está representado por el ámbito asistencial donde se produce la atención al paciente. Se establecen tres ámbitos distintos: consulta, hospitalización y urgencias. Para llevar a cabo las peticiones adecuadamente el profesional sanitario ha de elegir siempre correctamente el ámbito en el que está llevando a cabo una solicitud.*
2. *El ámbito asistencial de Consulta incluye toda la actividad realizada al paciente de forma ambulatoria en el centro y engloba las consultas externas, las pruebas diagnósticas, la hemodiálisis y los hospitales de día.*
3. *El ámbito asistencial de Hospitalización incluye la actividad realizada al paciente que ingresa en el centro en una Unidad de Hospitalización con independencia de la duración de la estancia, a excepción de las exploraciones ambulatorias que se realizan durante la noche.*
4. *El ámbito asistencial de Urgencias incluye la actividad realizada al paciente que acude al Servicio de Urgencias del Hospital.*

Artículo 47. Proceso de salud

1. *La Comunidad de Madrid establece la utilización de la norma provisional UNE EN 13940 como marco conceptual para la agrupación de información en la historia clínica electrónica, con el fin de disponer de una terminología común respecto al uso de la información.*
2. *La HCE del hospital se organiza en base a los Problemas de salud de la población que atiende.*
3. *Desde el punto de vista de la arquitectura informática de la HCE, el Proceso es un agrupador de los contactos que un paciente mantiene con la organización sanitaria, cuyo objetivo es organizar toda la información asistencial.*
4. *Desde el punto de vista asistencial, el Proceso constituye el primer nivel de clasificación y organización de la HCE en base a los diferentes problemas de salud de un paciente. El Proceso representa un problema de salud concreto y agrupa toda la información clínica y asistencial que genera la asistencia del paciente para la resolución de dicho problema. El Proceso agrupa todos los Actos Clínicos.*

Artículo 48. Denominación de los Procesos

Los Procesos se nombrarán de forma normalizada en función del ámbito donde se realice la asistencia y en función del tipo de Proceso.

1. *Proceso Clínico Integrado (PCI): Una de las líneas de desarrollo del Plan Estratégico del hospital establece el Proceso Clínico Integrado (PCI) como el modelo de atención sanitaria más*

eficiente para el tratamiento integral de los procesos de salud de los pacientes. El PCI establece la figura del médico responsable y coordinador de cada proceso integrado quien será el encargado de crear en la HCE del paciente el PCI correspondiente al problema de salud y organizar los correspondientes procesos hijos dependientes. Los distintos servicios que atiendan en cualquier ámbito asistencial a un paciente que tiene en su HCE un PCI deberán hacer depender de éste los diferentes procesos hijo.

2. Los procesos de Urgencia se denominarán de la siguiente manera:

<URG> <Diagnóstico principal> <Fecha>

Actualmente el programa informático nombra los procesos de urgencias como URGENCIA NO INGRESADA <Fecha>. Al alta del paciente en urgencias el médico responsable del mismo deberá renombrar el proceso con el diagnóstico principal motivo de la urgencia.

Ejemplo: URG Gastroenteritis aguda 21/10/2008

3. Los procesos de Consulta Externa se denominarán de la siguiente manera:

<SER> <Etiqueta normalizada del Problema> <Fecha>

Por defecto, el programa informático nombra los procesos de consulta como CEX <Servicio> <Fecha>. Una vez establecido el diagnóstico del proceso por el que el paciente acude a la consulta el médico responsable deberá renombrar el proceso con una de las 20 etiquetas diagnósticas de su especialidad, precedidas de la inicial normalizada de su servicio y la fecha de creación del proceso.

Ejemplo: MIR Insuficiencia cardiaca 21/10/2008

4. Los Proceso de Hospitalización se denominarán de la siguiente manera:

<HOS> <SER> <Problema de salud normalizado> <Fecha>

Los procesos de hospitalización pueden heredar la denominación del proceso establecida por defecto del cual se derivan, como en el caso de la urgencia, o demanda asistencial. Y han de ser renombrados al alta del paciente con una de las 20 etiquetas diagnósticas de su especialidad, seguida de la inicial normalizada de su servicio y la fecha de creación del proceso.

Ejemplo: HOS GIN Mioma 21/10/2008

5. *Tabla normalizada de servicio: En el Anexo I de este Manual se establecen las iniciales oficiales que identifican a los diferentes servicios del hospital en función de la nomenclatura estándar del Servicio Madrileño de Salud.*

6. *Tablas de Problemas de Salud por especialidades: Los servicios asistenciales del hospital deberán establecer la terminología de los 20 Problemas de Salud Normalizados más frecuentes de su servicio con los que se renombrarán los diferentes procesos en los que puede ser atendido un paciente.*

Es función de la Comisión de Historias Clínicas la actualización de los Problemas de Salud Normalizados y la aprobación de los mismos.

Artículo 56. Tipos de organización

1. *Cualquier tipo de organización por la que se opte en el hospital deberá contener la información a la que obliga la Ley 41/2002 en los distintos tipos documentales obligatorios de la historia clínica.*

2. *Cualquier tipo de organización por la que opte un servicio debe proporcionar al resto del hospital una información mínima del paciente, de forma que pueda obtener con facilidad, al menos, el o los Problemas de Salud activos, las comorbilidades y el tratamiento actualizado.*

3. *Modelos de organización:*

a. *A través de notas clínicas.*

b. *A través de formularios.*

c. *A través de informes.*

4. *La incorporación de nuevos formularios en la HCE ha de ser aprobada por la Dirección Médica, previa solicitud al Servicio de Informática del Hospital, presentando una solicitud con los parámetros que ha de contener el formulario.”*

De esta forma, podemos resumir el planteamiento de organización de la HCE en el HUPHM de la siguiente forma:

- La Historia Clínica Electrónica (HCE) constituye el conjunto de documentos que contienen la información útil y necesaria para una correcta atención al enfermo a lo largo del proceso asistencial, con independencia del soporte en el que consten: papel, audiovisual, informático o de otro tipo. Su contenido está regulado por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- Selene es el sistema informático principal (no el único) que da soporte a la HCE. La HCE en Selene se organiza por Procesos y Actos Clínicos asociados a cada paciente, que dispone de un Número de Historia Clínica único (NHC).

- El Proceso es un agrupador de los contactos que un paciente mantiene con la organización sanitaria, cuyo objetivo es organizar toda la información asistencial. El Proceso constituye el primer nivel de clasificación y organización de la HCE en base a los diferentes problemas de salud de un paciente. El Proceso representa un problema de salud concreto y agrupa toda la información clínica y asistencial que genera la asistencia del paciente para la resolución de dicho problema. El Proceso agrupa todos los Actos Clínicos.
- Los procesos se agruparán en jerarquías (proceso padre y procesos hijos) cuando estén relacionados. La creación de nuevos procesos debe poder realizarse por los facultativos, tanto en la citación de consultas, como en la realización de las mismas o al atender interconsultas.
- Dentro de cada proceso, podrán existir diversas modalidades de organización del contenido clínico de acuerdo a las necesidades de cada especialidad. Así, podrán establecerse las siguientes:
 - Organización por formularios, con informes elaborados a partir de estos cuando sea necesario.
 - Organización por informes, que son actualizados en cada visita médica.
 - Organización por notas, con informes elaborados a partir de estos cuando sea necesario. Se procurará en todo caso que aquellos datos clave del proceso sean incorporados en formularios con datos estructurados, evitando el texto libre y facilitando la explotación clínica de la información.
- No obstante, se deberá establecer un mínimo común entre especialidades de forma que la información básica y fundamental del paciente sea localizada siempre de la misma forma, independientemente de la especialidad.

El concepto de proceso es por tanto un elemento central de la arquitectura de la HCE del HUPHM y debe estar en el origen de los esfuerzos para la estructuración de los datos clínicos que planteamos en nuestra arquitectura funcional. Así pues, para la normalización de los procesos en la HCE se realizaron las siguientes tareas:

- Normalización en el uso de los procesos en Selene:
 - Definición del estándar de etiquetado.
 - Definición de 20 etiquetas más frecuentes por especialidad. Oncología Médica definió por tanto 20 etiquetas para agrupar su patología.
 - Implementación de una etiqueta por defecto en las Consultas Externas (CEX). Así, se pasó de la etiqueta “CEX PROCEDENTE DE AP” a <CEX> <Unidad de Gestión> <Fecha> (ej.: CEX MIR 25/02/2019).

- Elaboración y seguimiento de un plan de implantación, que incluyó a los servicios de Pediatría, Oncología Médica, Alergología y Psiquiatría, así como a las Urgencias Generales como servicios piloto.
- Elaboración de un Manual de Uso de la Documentación Clínica, y especialmente de la Historia Clínica Electrónica (HCE), incorporando entre otros aspectos los relativos a:
 - Derechos y deberes del paciente.
 - Deberes de los profesionales.
 - Archivo y conservación de la documentación clínica.
 - Arquitectura y organización de la HCE, incluyendo la normativa de uso de los procesos en Selene.
 - Definición y funcionamiento de la Comisión de HC.
 - Evaluación de la calidad de la HCE.
- Formación en el buen uso de la HCE, especialmente a los Médicos Internos Residentes (MIR) de nueva incorporación.

Para la extensión a los distintos servicios, una vez finalizado el piloto, se ha propuesto el siguiente esquema de trabajo:

- Realización de una sesión informativa para los Jefes de Servicio Médicos y Quirúrgicos, en la que se transmita la problemática existente, la solución propuesta y sus beneficios, solicitando una persona de contacto en cada servicio para facilitar la implantación el etiquetado de procesos. Se solicitará además a la Dirección Médica que el etiquetado de los procesos se incluya como objetivo para los servicios.
- Una vez realizada la sesión con los Jefes de Servicio, y disponible la persona de contacto en cada servicio, se coordinarán desde la Comisión, con el soporte del Servicio de Informática, las tareas para la obtención de las etiquetas de procesos de cada Servicio y su implementación en la HCE (Selene), que consisten en:
 - Obtención de las etiquetas diagnósticas de los procesos, en los ámbitos CEX y HOS, que tengan un mayor consenso en cada Servicio. Para ello se contará con la persona de contacto designada.
 - Revisión, depuración y carga de las etiquetas de CEX y HOS correspondientes a cada Servicio.
 - Establecimiento por defecto la visualización “Árbol de procesos” en el componente de HCE de Selene, actualmente configurado como una lista, para todo el personal. En todo caso, se trata de una preferencia de usuario que puede ser cambiada a título individual por los profesionales.
 - Habilitación de los permisos necesarios en Selene para la creación y modificación de procesos.

- El proyecto será presentado a cada Servicio, por un miembro de la Comisión de HC y la persona de contacto designada por el Servicio, en una sesión clínica acordada previamente. A partir de esta sesión se comenzará formalmente con el etiquetado de procesos en dicho Servicio.
- Una vez realizadas todas las sesiones en los Servicios, se realizará una Sesión General en el Hospital para informar al conjunto del personal clínico.
- Se continuará, en coordinación con la Comisión de Docencia, con la realización de un seminario obligatorio para los R1 que incluya los aspectos de buen uso de la HCE contenidos en el Manual.

En el ámbito específico oncológico, para la implementación de este proyecto el Servicio de Oncología del HUPHM acordó la implementación de las siguientes etiquetas descriptivas de los procesos de consultas externas:

Etiqueta del proceso	Descripción
ONC_CA_CÉRVIX	Cáncer de Cérvix
ONC_CA_COLORRECTAL	Cáncer Colorrectal
ONC_CA_CYC	Cáncer de Cabeza y Cuello
ONC_CA_GÁSTRICO	Cáncer Gástrico
ONC_CA_GERMINAL	Cáncer de Células Germinales
ONC_CA_MAMA	Cáncer de Mama
ONC_CA_ORIGEN_DESCONOCIDO	Cáncer de origen desconocido
ONC_CA_OVARIO	Cáncer de Ovario
ONC_CA_PRÓSTATA	Cáncer de Próstata
ONC_CA_PULMÓN	Cáncer de Pulmón
ONC_CA_RENAL	Cáncer Renal
ONC_CA_ÚTERO	Cáncer de Útero
ONC_CA_VEJIGA_VÍA_URINARIA	Cáncer de Vejiga y de las vías urinarias
ONC_CONSEJO_GENÉTICO	Proceso de atención en Consejo Genético
ONC_LINFOMA	Linfoma
ONC_PÁNCREAS_VÍA_BILIAR	Cáncer de Páncreas y de las vías biliares
ONC_SARCOMA_MELANOMA	Sarcomas y Melanomas
ONC_TUMOR_SNC	Tumores del Sistema Nervioso Central
ONC_TUMORES_RAROS	Tumores raros

Figura 29 – Etiquetas diagnósticas para los procesos asistenciales en Oncología Médica.

5.4.1.2. Estructuración de la HCE a través del procesado del lenguaje natural

En el ámbito del procesado del lenguaje natural (NLP), el alcance planteado ha permitido desarrollar y probar una arquitectura de minería de textos (*text mining*) para la extracción automática de variables a partir del texto libre contenido en la HCE.

Para ello se planteó una arquitectura denominada Clinical Knowledge Extraction System (C-liKES), basado en Apache UIMA y en el sistema H2A, y desarrollado en el Centro de Tecnologías Biomédicas de la Universidad Politécnica de Madrid (CTB) (Menasalvas Ruiz *et al.*, 2018). Dicha arquitectura permite la ingesta de ficheros de texto y la aplicación de los distintos procesos para la generación de datos estructurados que pueden ser posteriormente obtenidos mediante consultas. Entre los procesos realizados por la arquitectura destacamos los siguientes:

- Homogeneización de la HCE, que permite incorporar textos clínicos en distintos formatos, realizando las transformaciones necesarias para normalizar y armonizar la estructura, almacenando el resultado en una base de datos relacional.
- Anotación de documentos, que realiza la lectura de los textos desde la base de datos y realiza los procesos de anotación propios del NLP (ver capítulo 2.3.5). El resultado de este proceso se almacena en ficheros estructurados de intercambio de metadatos XML (documentos XMI).
- Incorporación a la base de datos de los ficheros XMI para su posterior consulta.
- Post procesado NLP, habilitando aspectos como la detección de negaciones y la detección del contexto y la relación entre las entidades detectadas.
- Integración en torno al paciente, de forma que los resultados obtenidos son analizados desde un punto de vista semántico para conformar una base de datos centrada en las características del paciente y su evolución temporal.

No se ha planteado en el alcance de este trabajo la incorporación de esta arquitectura al entorno productivo de la HCE.

5.4.2. Elaboración del registro integrado de casos de cáncer de pulmón

5.4.2.1. Depuración e integración de datos

Con el fin de elaborar un primer registro de casos consolidado de cáncer de pulmón (módulo REC en la arquitectura propuesta, ver capítulo 5.3.1.2), se parte de los datos del registro asistencial de pacientes con cáncer, elaborado y mantenido históricamente por el Servicio de Oncología Médica del HUPHM. Dicho registro se elabora manualmente a partir de los datos de las primeras consultas con los pacientes y contiene de inicio 12.834 registros de todos los tipos de cáncer vistos en el centro desde 1992. El registro estaba basado en Ms Access y los datos se introducían por los usuarios, principalmente administrativos del servicio, a través del siguiente formulario.

The screenshot shows a web-based data entry form for oncology cases. The form is titled 'ONCOLMED' and has a search bar at the top. The form contains various input fields for patient information, including name, sex, history number, DNI, address, date of birth, date of diagnosis, family history, first visit, treatment start, therapy start, organ affected, organ detail, histology, tumor grade, TNM staging, tumor stage, second tumor, third tumor, and a notes section. The form is organized into a grid-like structure with labels and input fields.

Figura 30 – Formulario de introducción de datos del registro de casos de Oncología Médica utilizado como punto de partida.

El registro contenía las siguientes variables:

Variable	Descripción
Apellido_1	Primer apellido del paciente
Apellido_2	Segundo apellido del paciente
Nombre	Nombre del paciente
Sexo	Sexo del paciente
Historia	Número de historia clínica del paciente
DNI	DNI del paciente
Calle	Calle del domicilio del paciente
Nº	Nº de la vivienda del domicilio del paciente
Ciudad	Ciudad del domicilio del paciente
Provincia	Provincia del domicilio del paciente
CP	Código postal del domicilio del paciente
Telefono	Telefono del paciente
Movil	Movil del paciente
Fecha_nac	Fecha de nacimiento del paciente
Fecha_dx	Fecha del informe de anatomía patológica en el que se informa del diagnóstico del paciente
Ca_familiar	Antecedentes familiares oncológicos del paciente
First_vis	Primera visita del paciente al servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Inicio_tto	Inicio del tratamiento del paciente
Terap_inic	Terapia inicial del tratamiento del paciente
Organo	Órgano afectado al diagnóstico del paciente
Organodetalle	Órgano detalle afectado al diagnóstico del paciente
Histología	Histología del tumor del paciente al diagnóstico
Grado_his	Grado histológico del tumor del paciente al diagnóstico
TNM	Estadificación TNM del tumor del paciente al diagnóstico
Estadio	Estadio del tumor del paciente al diagnóstico
Codigo_OMS	Código OMS del tumor del paciente al diagnóstico
Seg_tumor	Segundo tumor del paciente
Tumor3_oms	Tercer tumor del paciente según la oms

Fx_recaida	Fecha de la recaída del paciente
Ultima revision	Fecha de última revisión del paciente en el servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Situacion	Situación del paciente
Fx_exitus	Fecha de fallecimiento del paciente
notas	Notas

Figura 31 – Variables del registro de casos de Oncología Médica utilizado como punto de partida.

Una primera revisión de dicho registro reveló la existencia de los siguientes problemas:

- Información no estructurada: A pesar de que la información se recoge mediante un formulario, el registro cuenta con un elevado número de campos de texto libre, lo que genera falta de homogeneidad de los datos e imposibilita el análisis directo de los mismos.
- Baja calidad de los datos: La ausencia de reglas de validación de los valores introducidos en el formulario y la carencia de un diccionario de datos que defina inequívocamente el sentido de los campos de información solicitados genera problemas de incoherencia de los datos. Este problema se agrava por la introducción de datos por parte de personal no clínico, sin el conocimiento del dominio necesario para la adecuada interpretación de los datos a registrar.
- Falta de actualización: Dado que el registro no se actualiza automáticamente, se requiere de su actualización manual. Si bien existe un procedimiento informal para que las primeras consultas de cada día se registren, no existe un procedimiento formal ni se dispone de mecanismos de control y aseguramiento de dicho proceso. Esto, junto con la variación en las personas encargadas de realizar la tarea a lo largo del tiempo, provoca que no se recojan exhaustivamente todos los casos en el registro, dependiendo del momento temporal (estacionalidad y año de recogida fundamentalmente). Además, el gran volumen de campos de información existente complica la cumplimentación de registros y genera falta de homogeneidad y valores perdidos (no todos los pacientes se cumplimentan con un mismo nivel de detalle).

Un proceso de revisión exhaustiva reveló los siguientes errores, que fueron subsanados para continuar con el proceso de consolidación y creación del registro de casos de cáncer de pulmón:

- Registros que carecen de los campos identificativos (Apellido_1, Apellido_2, Nombre, NHC) o con caracteres numéricos y duplicados en el campo Nombre y NHC.
- El registro del sexo del paciente se realiza mediante un *check* que, por defecto, está marcado como No (Mujer). Se han detectado casos con pacientes masculinos marcados como femeninos y viceversa.
- Registros sin variables informadas o con variables numéricas informadas con valores alfanuméricos.

- Múltiples registros con que contienen variables fundamentales del registro con valores erróneos o vacíos (p. ej.: fecha de nacimiento, histología, grado, estadio, etc.).
- Valores de DNI erróneos.
- Duplicidades de valores en campos alfanúmericos de texto libre, como el órgano o la ciudad. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, detectándose valores como: M,ADRID, MADID, MADRD, MADRID, MADRIDÇ, MADRIDD, MADRIDF, MADRIDS, MADRIF, MADRIOD, MADRIS, MADRUID, MADTID, MADTRID, MAFDRID, MAFRID, etc.
- Valores de Código Postal, teléfono y móvil de longitudes erróneas o con el valor 0.
- Valores de fechas (como la fecha de diagnóstico) vacíos, con valor 0 o con valores incorrectos (00/10/2009, ? /2011, SEPT/2010...).
- Variables cumplimentadas con distintos criterios. Por ejemplo, en la variable Inicio_tto se recoge, según el caso, la fecha de inicio del tratamiento o la situación de inicio del tratamiento (iniciado, pendiente). Igualmente, en la variable Terap_inic se localizan fechas de inicio, medicaciones, referencias a ensayos o referencias a otros centros donde se ha administrado el tratamiento.

Para la depuración del registro, se realizaron cruces con el sistema de HCE para obtener datos demográficos (especialmente fecha de nacimiento y sexo) y con el Índice Nacional de Defunciones (INDEF) para actualizar los datos de fallecimiento, tomando como válidos los siguientes niveles de cruce:

- 1a : Coincidencia de primer apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento, sexo y DNI/Pasaporte/NIE del paciente
- 1b: Coincidencia de primer apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento y sexo
- 1c: Coincidencia de primer apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento y sexo
- 1d: Coincidencia de primer apellido, segundo apellido, inicial nombre, fecha de nacimiento y sexo
- 4a: Coincidencia de DNI

Una vez depurado este registro, se realiza una revisión exhaustiva con los miembros del Servicio de Oncología Médica para identificar otros posibles registros existentes de casos de pacientes con cáncer de pulmón. Se identifican los siguientes registros que podrían ser integrados en el registro consolidado:

- Registro de casos creado para los proyectos PI 13/01806 (FIS) denominado “*A study of image reanalysis and correlation between metabolic changes observed in PET/CT and known mutations in non-small-cell lung cancer (NSCLC)*” y PIE14/00064 (PIE)

denominado “*Personalized Medicine in Oncology: researching a model capable of improving and predicting the result treatment based in molecular mechanisms, tumor biology, images, IT, and murine model*”, ambos financiados por el ISCIII y que a fecha del análisis contenían 472 registros. Dicho registro fue implementado de forma nativa en la plataforma REDCap que describiremos más adelante. Analizando el porcentaje de informado de cada una de las 610 variables definidas en dicho registro, observamos que un grupo relativamente reducido de variables disponen de un alto porcentaje de cumplimentación, mientras que un grupo amplio de variables disponen de un bajo porcentaje de cumplimentación. En la siguiente figura se muestra esta circunstancia, limitando la cola de variables a las primeras 200 según su porcentaje de cumplimentación (porcentaje de los 472 registros que contienen informada dicha variable).

Figura 32 – Análisis del porcentaje de informado de las variables del registro de casos elaborado para los proyectos FIS y PIE.

Esta distinción entre variables soporta adicionalmente nuestro planteamiento de establecer un conjunto mínimo de datos (CMDO) y de datos propios de la patología que sean requeridos para todos los casos (consiguiendo así incrementar al máximo el porcentaje de cumplimentación), facilitando al tiempo la inclusión de variables adicionales para fines específicos de investigación cuya cumplimentación sea opcional de acuerdo al interés de aquellos profesionales que concretamente estén realizando la investigación y que por tanto dispongan de la motivación para invertir el esfuerzo extra que supone registrar estas variables. En estas variables, disponer de un bajo porcentaje de informado no supone *per se* un problema de calidad, dado que en muchas circunstancias clínicas de interés el número de pacientes afectado puede ser bajo.

- Registro de casos creado para el estudio “Cáncer de pulmón de células no pequeñas: análisis de las variaciones temporales e influencia real de los nuevos tratamientos en la supervivencia de los pacientes”. Dicho registro fue implementado igualmente mediante la plataforma REDCap y contenía 756 registros a fecha del análisis.

- Registros de resultados de los análisis de marcadores moleculares ALK IHQ, ALK FISH, ROS1 FISH, RET FISH, EGFR y BRAF realizados por el servicio de Anatomía Patológica de una serie de pacientes incluidos en los proyectos FIS/PIE.

5.4.2.2. Creación del registro unificado mediante REDCap

Los registros mencionados fueron integrados con el registro inicial, llegando a disponer de un registro de 991 pacientes de cáncer de pulmón diagnosticados desde el 01/01/2000. Dicho registro fue implementado empleando REDCap (Research Electronic Data Capture) (Harris *et al.*, 2009). REDCap es una aplicación web segura diseñada para el registro de datos para estudios de investigación, proporcionando un interfaz intuitivo para asegurar la validación de los datos en el momento de su registro, trazas de auditoría en las operaciones de edición y exportación de datos, procedimientos automatizados para la exportación de datos a las aplicaciones estadísticas habituales y procedimientos para la importación de datos de fuentes externas.

Se indican a continuación las principales características y funcionalidades de REDCap con interés para nuestros propósitos y que determinaron su selección como solución:

- Software libre, sin coste para los socios del consorcio REDCap, con una potente comunidad de desarrolladores y usuarios soportando el proyecto.
- Arquitectura web con acceso seguro (https).
- Cumple con estándares en materia de registros de datos clínicos y su seguridad tales como 21 CFR Part 11 (U.S. Food and Drug Administration, 2018), Federal Information Security Modernization Act (FISMA) (Department of Homeland Security, 2014) o HIPAA (U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights, 2013).
- Capacidades de software de gestión de contenidos, permitiendo el diseño offline de las bases de datos y los formularios asociados, así como su publicación para los usuarios una vez validado su diseño.
- Funcionalidades avanzadas para el aseguramiento de la calidad en los campos de los formularios diseñados, incluyendo campos derivados, calculados, obligatorios, con validación de contenido, etc.
- Mecanismos de autenticación y definición de perfiles de usuario con distintos niveles de acceso a los distintos registros creados en REDCap.
- Trazas de auditoría que registran todas las acciones realizadas por los usuarios sobre los datos.
- Posibilidad de exportación de datos sin variables identificativas directas de los pacientes (seudoninizados) para su análisis posterior.

Se realizó una instalación de REDCap utilizando los siguientes recursos:

- Máquina virtual: 1 core con 2GB de RAM asignados. Sistema operativo Debian Linux.
- Software base:
 - Sistema gestor de base de datos: MySQL database server.
 - Servidor web: Apache2 web server con php5. Módulo phpMyAdmin para acceso a la base de datos. Paquete msmtplib para cifrado TLS/SSL.

La instalación de REDCap se ubicó en la red sanitaria, y por tanto en una ubicación inaccesible desde el exterior (internet) y se sometió a las mismas políticas de seguridad y de copias de respaldo que el resto de aplicaciones del hospital. Aunque el acceso a los datos se realizaría en todo caso desde el interior de la red del hospital, se estableció una conexión segura HTTPS para cifrar los datos en tránsito. Las medidas de seguridad aplicadas se corresponden con las vigentes en el momento de la implantación, fundamentalmente aquellas recogidas en el RDLOPD.

Se crea por tanto en REDCap el proyecto correspondiente al registro de pulmón, que estará estructurado en distintos formularios para recoger los datos demográficos, de diagnóstico, antecedentes de tabaquismo, antecedentes personales de interés, antecedentes del paciente y familiares, tratamientos recibidos, tratamientos en progresión o recaída y supervivencia siguiendo el modelo de variables facilitado por el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Pulmón (GECP).

Demográficos

Adding new Historia 123

Historia 123

Tipo registro

Volcado a GECP

Fecha firma consentimiento informado

Nombre y apellidos

DEMOGRÁFICOS

Tipo de paciente

Fecha nacimiento

Sexo

Raza

Hábito tabáquico

Estadio inicial del paciente

Form Status

Complete?

Supervivencia

Adding new Historia 123

Historia 123

SUPERVIVENCIA

Fecha del último contacto documentado con el paciente

Situación actual

Fecha fallecimiento

Causa fallecimiento

Causas de muerte (no cáncer)

Observaciones

Form Status

Complete?

Diagnóstico

Adding new Historia 123

Historia 123

DIAGNÓSTICO (ter síntoma)

Fecha primera consulta por síntomas de la enfermedad

Síntomas

Fecha diagnóstico inicial

ECOG-PS

Histología

¿Se han realizado estudios de marcadores moleculares al paciente?

Estudios de marcadores moleculares realizados

Tipo de muestra para el diagnóstico

Técnicas de estadificación patológica (pTNM) Métodos diagnósticos

Biopsia

Broncoscopia

Ttos recibidos - QT / Inmunoterapia / Terapias orales dirigidas

Adding new Historia 123

Historia 123

TRATAMIENTOS RECIBIDOS

QT / RT / Inmunoterapia / Terapias dirigidas / Cirugía

Tipo de terapia

QT Inmunoterapia/terapias orales dirigidas

Tratamientos recibidos

Tratamiento 1

Tipo de terapia

Esquema tratamiento 1

Fecha de inicio tratamiento 1

Fecha de fin tratamiento 1

Nº ciclos tratamiento 1

¿Mantenimiento en tratamiento 1?

Mejor respuesta al tratamiento 1

Form Status

Figura 33 – Formularios creados en REDCap para el registro de casos de cáncer de pulmón.

Se realizó una labor de modelado de datos y creación de diccionarios, junto con la configuración de validaciones cruzadas de datos entre campos con el fin de incrementar la calidad de los datos que se registraran en el futuro.

El registro de casos de cáncer de pulmón así generado dispone de 720 variables, correspondientes a las variables propias del CMDO, a una base específica de cáncer de pulmón, y a una base concreta de investigación correspondiente a los proyectos FIS/PIE mencionados previamente, todo ello de acuerdo al modelo planteado en el capítulo 5.3.1.2. Las variables se agrupan de acuerdo a su contenido en distintos capítulos: demográficos, diagnóstico, antecedentes de tabaquismo, antecedentes personales y familiares, tratamientos recibidos (quimioterapia, radioterapia, cirugía), supervivencia, variables de Medicina Nuclear al diagnóstico, Biopsia Líquida, Anatomía Patológica, Valores analíticos al diagnóstico.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo del diccionario de datos generado por la propia herramienta REDCap en base a la definición de variables realizada. El documento completo (con 172 páginas) no se incluye en el presente trabajo, dado que su definición es propiedad

intelectual del Servicio de Oncología Médica del HUPHM y del GECP, si bien podría consultarse previa autorización.

1/7/2019

Base Pulmón (basada GECP) | REDCap

Base Pulmón (basada GECP)

Data Dictionary Codebook

01/07/2019 10:08

#	Variable / Field Name	Field Label <i>Field Note</i>	Field Attributes (Field Type, Validation, Choices, Calculations, etc.)				
Instrument: Demograficos							
1	nhc	Historia	text				
2	nombre	Nombre y apellidos	text, Required, Identifier				
3	firma	Firma consentimiento informado	dropdown <table border="1"><tr><td>1</td><td>NA</td></tr><tr><td>0</td><td>Aplica</td></tr></table>	1	NA	0	Aplica
1	NA						
0	Aplica						
4	fehaci Show the field ONLY if: [firma] = '0'	Fecha firma consentimiento informado	text (date_dmy)				
5	registro	Tipo registro	dropdown <table border="1"><tr><td>1</td><td>FIS</td></tr><tr><td>2</td><td>PIE</td></tr></table>	1	FIS	2	PIE
1	FIS						
2	PIE						

Figura 34 – Ejemplo de formato del diccionario de datos REDCap del registro de casos de cáncer de pulmón implementado.

5.4.3. Análisis de datos clínicos y de actividad asistencial

5.4.3.1. Aplicación de la versión adaptada de CRISP-DM

La aplicación de CRISP-DM supone realizar una aproximación iterativa para el desarrollo del análisis de datos clínicos oncológicos. Cada uno de los ciclos comprende las fases indicadas previamente (ver capítulo 5.3.2.1) y culmina con una evaluación por parte del facultativo de Oncología Médica que da paso a una nueva fase de definición de objetivos y análisis de los datos disponibles (fases 1 y 2 de la metodología CRISP-DM). Sin embargo, para facilitar la descripción de las tareas realizadas en el marco de este trabajo de tesis doctoral, hemos optado por indicarla de una forma secuencial (lineal). Debe entenderse en cualquier caso que dichas tareas se han repetido cíclicamente y en distintos grados de profundidad a medida que se avanzó en la aplicación de la metodología.

A lo largo del trabajo realizado se han realizado tres ciclos de la metodología CRISP-DM, partiendo de 34 preguntas de investigación (objetivos de negocio) definidos a priori. Describimos en la siguiente figura los tres ciclos realizados.

Ciclo	Preguntas de investigación activas		% preguntas conservadas	% Duración total
	Al inicio del ciclo	Al final del ciclo		
1	34	39	23%	27%
2	39	30	30%	27%
3	30	32	88%	45%

Figura 35 – Descripción de los ciclos CRISP-DM realizados.

Indicamos a continuación algunos aspectos de interés respecto de la aplicación de la metodología realizada:

- Se observó una gran variación en los objetivos planteados debido al desarrollo de cada ciclo de análisis. Si bien al inicio del ciclo 1 se partió de 34 objetivos y a su finalización disponíamos de 39 objetivos, cualitativamente existieron diferencias importantes entre ambos conjuntos de objetivos. Al finalizar el ciclo 1 sólo un 23% de las 39 preguntas de investigación disponibles se habían conservado respecto de las planteadas al inicio del ciclo. De igual forma, al finalizar el ciclo 2 un 30% de las 30 preguntas disponibles se mantenían respecto del inicio del ciclo. Sin embargo, en el ciclo 3 un 88% de las 32 preguntas disponibles a su finalización estaban presentes en el inicio del ciclo.
- En lo relativo a la duración de los ciclos, si bien ha sido dependiente de una dedicación disponible en cada periodo no homogénea, se observa un mayor esfuerzo en el último ciclo (un 45% del tiempo total dedicado). Este mayor esfuerzo coincide con la estabilización de los objetivos de negocio, lo que posibilita en mayor medida la profundización y la realización de análisis y modelos.

5.4.3.2. Descarga e integración de datos clínicos y de actividad

Disponemos de una cohorte de 991 pacientes descargada de la base de datos REDCap elaborada, de los cuales 778 pacientes tienen fecha de nacimiento y de diagnóstico informada y han sido diagnosticados desde el 01/01/2003 hasta 31/12/2016 (“cohorte completa”). Establecemos estas fechas como las óptimas para asegurar una mayor homogeneidad en los criterios de cumplimentación de los datos del registro, y por tanto de la calidad de los datos. De estos pacientes, 522 disponen del estadio al diagnóstico informado y han sido diagnosticados desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2016 y por tanto disponemos de todas las asistencias registradas en el sistema de Historia Clínica Electrónica, implantado en septiembre de 2008 (“cohorte

digital”). La descarga de datos obtenida del registro de casos de cáncer de pulmón dispone de 56 variables, entre las que se encuentran variables demográficas (fecha de nacimiento, sexo, raza), hábito tabáquico y su cuantificación, antecedentes personales de cáncer o en familiares de primer grado, situación de seguimiento y fallecimiento, y variables del diagnóstico (fecha, histología, grado histológico, estadio, realización de estudios moleculares o ECOG-PS). La relación completa de las variables descargadas para el proceso de análisis puede consultarse en la siguiente figura.

Variable	Tipo	Descripción
MEDICALRECORD	Númerica	Clave de seudonimización, ligada al NHC en la HCE
Fecha nacimiento	Fecha	Fecha de nacimiento del paciente
Sexo	Categórica	Sexo del paciente
Raza	Categórica	Raza del paciente
Hábito tabáquico	Categórica	Nunca fumador, ex fumador, fumador activo
Nº paquetes/año	Categórica	Consumo de tabaco en número de paquetes / año
Nº paquetes/año	Númerica	Cuantificación del consumo de tabaco
Nº cigarrillos día	Categórica	Consumo de tabaco en número de cigarrillos / día
Nº cigarrillos/día	Númerica	Cuantificación del consumo de tabaco
Consumo_cigarrillos	Categórica	Categorización del grado de consumo de tabaco
Estadio inicial del paciente	Categórica	Clasificación del estudio de extensión (7 estadios)
Fecha diagnóstico inicial	Fecha	Fecha del diagnóstico a través de Anatomía Patológica
ECOG-PS	Categórica	Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status
Histología	Categórica	Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Tipo carcinoide	Categórica	Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Tipo mesotelioma	Categórica	Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Especificar otra histología	Categórica	Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Subtipo histológico	Categórica	Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
Grado histología	Categórica	Clasificación del tumor mediante Anatomía Patológica
¿Se han realizado estudios de marcadores moleculares al paciente?	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=EGFR)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=ALK)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=KRAS)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=BRAF)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=HER2 Mut)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=ROS1)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=FGFR1)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=PDL1)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=HER2)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=RET)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=MET)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Estudios de marcadores moleculares realizados (choice=Otros)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=Negativo)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=T790M +)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=T790M -)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=Exón 19)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=Exón 21)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=NOS)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
EGFR resultado (choice=Otros)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Especificar otro resultado EGFR	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=IHQ negativo)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=IHQ positivo)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=FISH traslocado)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=FISH no traslocado)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=RNA se detecta)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
ALK Resultado (choice=RNA no se detecta)	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
KRAS Resultado	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
BRAF resultado	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
ROS1 resultado	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
RET resultado	Categórica	Realización de determinaciones genéticas
Situación actual	Categórica	Última situación clínica conocida del paciente
Fecha fallecimiento	Fecha	Fecha de fallecimiento del paciente
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	Categórica	Existencia de antecedentes del paciente
Nº de familiares con cáncer de pulmón	Númerica	Existencia de antecedentes del paciente
Nº de familiares con otro tipo de cáncer	Númerica	Existencia de antecedentes del paciente
¿Cánceres previos?	Categórica	Existencia de antecedentes del paciente

Figura 36 – Relación de las 56 variables descargadas del registro de pacientes con cáncer de pulmón para la realización de las tareas de análisis.

Adicionalmente se obtuvo la siguiente información de actividad procedente de la HCE a través del sistema *data warehouse* y del agrupador AP-GRD existente en el hospital (ver capítulo 5.2.4.1), filtrando las descargas con los datos de interés, y cruzándolas con el registro de casos de pacientes con cáncer de pulmón a través de la clave única (NHC: número de historia clínica):

- Datos de actividad citada (consultas y pruebas complementarias) desde el 30/07/2008 al 1/8/2017: 7.844.820 registros y 20 columnas.
- Datos de asistencias en urgencias desde el 01/09/2008 hasta el 25/10/2017: 1.317.145 registros y 23 columnas.
- Datos de episodios de hospitalización del 1/1/2009 al 31/12/2014 procedentes del CMBD hospitalario codificado mediante CIE-9-MC y agrupado mediante AP-GRD v27: 149.951 registros y 149 columnas.

Una vez realizados los cruces para asociar esta información a los pacientes del registro de cáncer de pulmón, se realizó una exportación Microsoft Excel con datos seudonimizados, de forma que posteriores adiciones de variables o manipulaciones de datos pudieran trazarse a los pacientes individuales en caso necesario. De esta forma se dispuso finalmente de cuatro conjuntos de datos (*datasets*) con las siguientes características:

1. Pacientes: tabla con 522 registros (pacientes) que disponen del estadio al diagnóstico informado y han sido diagnosticados desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2016 y por tanto disponemos de todas las asistencias registradas en el sistema de Historia Clínica Electrónica, implantado en septiembre de 2008 ("cohorte digital"). En la tabla de pacientes se incorporan variables derivadas, calculadas tanto a partir de otras variables de la misma tabla como calculadas a partir de los datos del resto de tablas de datos de actividad asistencial.
2. Asistencias ambulatorias: La cohorte digital de 522 pacientes genera 43.197 asistencias ambulatorias desde el 01/01/2009 hasta el 01/08/2017. De estas, 33.611 asistencias son posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón de 516 pacientes (6 pacientes, hasta los 522 de la serie analizada, no tienen registradas asistencias ambulatorias posteriores al diagnóstico). La tabla dispone de las 20 variables correspondientes a los distintos descriptores de la actividad asistencial obtenidos y se incorporan tanto variables derivadas (12 variables) como las procedentes de la tabla de pacientes.
3. Asistencias en urgencias: De la cohorte digital, 386 pacientes presentan actividad de urgencias (73.95%). En total generan 1.538 registros de asistencias en urgencias posteriores al diagnóstico entre el 12/02/2009 y el 23/10/2017. La tabla dispone de las 20 variables correspondientes a los distintos descriptores de la actividad asistencial

obtenidos y se incorporan tanto variables derivadas (16) como las procedentes de la tabla de pacientes.

4. Ingresos en hospitalización: De la cohorte digital, 288 pacientes generan 753 episodios de hospitalización posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón (o en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha de diagnóstico) entre los años 2009 y 2014. Restringimos los ingresos desde 2009 a 2014 dado que están codificados de una forma homogénea mediante CIE-9-MC y AP-GRD v27. En años posteriores se produjo la transición hacia CIE-10 y APR-GRD v32 y por tanto la codificación no es directamente comparable. La tabla dispone de las 149 variables correspondientes a los distintos descriptores de la actividad asistencial obtenidos y se incorporan tanto variables derivadas (36) como las procedentes de la tabla de pacientes.

5.4.3.3. Descripción inicial y depuración de datos

Para las tareas de descripción inicial de los datos se utilizaron principalmente las herramientas Stata 12.0 y SPSS Modeler v18.0. (IBM Corporation). Estos análisis permitieron fundamentalmente analizar las variables en los siguientes aspectos para evaluar la calidad de los datos disponibles:

- Variables categóricas: valores posibles, frecuencias absolutas y relativas (porcentaje del total de valores).
- Variables numéricas: número de registros, mediana, percentiles 25 y 75, media, desviación estándar, valor mínimo y máximo.

En lo relativo a tareas de imputación, normalización o estandarización se realizaron sólo en función de los requisitos que presentaran los métodos de análisis aplicados posteriormente. En concreto se realizaron las siguientes tareas:

- Revisión del conjunto de variables para evitar los valores nulos, imputando el valor "desconocido" o "0" en función de si tratábamos variables categóricas o numéricas.
- En el caso de la variable numérica “número de cigarrillos diarios” se realizó una imputación basada en el valor medio de los pacientes fumadores para los pacientes fumadores o exfumadores para los cuales no se disponía del dato. Los valores nulos en pacientes nunca fumadores fueron establecidos en 0, y para los pacientes para los que se desconocía su hábito tabáquico se imputó el valor medio de cigarrillos diarios del conjunto de pacientes (fumadores y no fumadores).

5.4.3.4. *Generación de variables derivadas*

Las variables disponibles fueron procesadas adicionalmente para obtener variables derivadas, hasta un total de 133 variables, necesarias para los distintos análisis realizados durante los ciclos de la metodología CRISP-DM. Entre estas variables derivadas se incluyen la edad al diagnóstico y en cada contacto asistencial, supervivencia, periodo de seguimiento, número de asistencias ambulatorias, de urgencias y de hospitalización previas y posteriores al diagnóstico y su cociente con el periodo de seguimiento (asistencias por año de seguimiento o *person-year*) y comorbilidades entre otras variables. En este sentido se calculó el índice de comorbilidad de Charlson (CCI o Charlson Comorbidity Index) (Charlson *et al.*, 1987) a partir de las 17 comorbilidades que define y que son obtenidas a partir de diagnósticos codificados mediante CIE-9-MC en todos los episodios de hospitalización de los pacientes posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón. Para ello se utilizó una herramienta desarrollada en Stata (Stagg, Stagg and Vicki, 2017) que implementa una versión mejorada (Enhanced ICD-9-CM Coding Algorithm) del algoritmo de Deyo (Deyo, Cherkin and Ciol, 1992) con un mejor resultado (Quan *et al.*, 2005). En 16 pacientes el índice de Charlson no contempló la condición de paciente de cáncer de pulmón, dado que el ingreso que se utiliza de base para obtener la información está dentro del margen de 30 días anteriores del diagnóstico (ingreso del diagnóstico) y todavía no se ha codificado al alta del episodio dicha condición. Esta situación se corrigió manualmente añadiendo 2 puntos en el índice Charlson para estos pacientes.

Los datos de costes se calcularon siguiendo una aproximación *bottom-up*, obteniendo los costes de las asistencias unitarias y multiplicando por su número, de acuerdo a lo realizado en otros estudios de referencia (Knust *et al.*, 2017). El coste de las asistencias unitarias fue obtenido de la definición de precios oficiales de la Comunidad de Madrid, recogidos en la Orden 731/2013 de precios públicos en el Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid, 2013).

Se relacionan a continuación las principales variables derivadas de las variables procedentes del registro de pacientes y de las variables de actividad asistencial:

Variable	Tipo	Descripción
Edad_dx	Númerica	Fecha de diagnóstico - Fecha de nacimiento
Edad_fallecimiento	Númerica	Fecha de fallecimiento - Fecha de nacimiento
Supervivencia	Númerica	Fecha de fallecimiento - Fecha de diagnóstico
Total_CEX	Númerica	Total de asistencias ambulatorias del paciente en el hospital
SRV_ULTASISTENCIA_dx	Catórica	Servicio de la última asistencia previa al diagnóstico
Dias_ULTASISTENCIA_dx	Númerica	Fecha de la última consulta previa al diagnóstico - Fecha de diagnóstico
Total_CEX antes DX	Númerica	Total de asistencias ambulatorias del paciente previas a la fecha de diagnóstico
NUM_Reingreso_menor7días	Númerica	Número de reingresos en Urgencias con menos de 7 días de diferencia entre ingresos
Reingresamenos7	Booleana	Indicador de la existencia de reingresos con menos de 7 días de diferencia para el paciente
NUM_Reingreso_entre7y30días	Númerica	Número de reingresos en Urgencias con una diferencia en días entre 7 y 30 días entre ingresos
Reingresa7y30	Booleana	Indicador de la existencia de reingresos con una diferencia entre 7 y 30 días entre ingresos
IND_URG antes_dx	Booleana	Indicador de que el paciente ha tenido urgencias en los 180 días previos al diagnóstico
MOTIVO_ULTURG_dx	Catórica	Motivo de asistencia en triaje de la última urgencia previa al diagnóstico
Dias_ULTURG_dx	Númerica	Fecha de la última urgencia previa al diagnóstico - Fecha de diagnóstico
Total_URG 180 días antes DX	Númerica	Número total de urgencias en los 180 días anteriores al diagnóstico
Total_URG posteriores DX	Númerica	Número total de urgencias posteriores al diagnóstico
NUM_LLAMADAS_ONCOCALL	Númerica	Número de llamadas al teléfono de atención del Servicio de Oncología Médica del HUPHM realizadas por el paciente
LLAMANTE	Booleana	Indicador de paciente usuario del teléfono de atención del Servicio de Oncología Médica del HUPHM
TOTAL_CEX TRAS DX	Númerica	Número total de asistencias ambulatorias realizadas tras el diagnóstico del paciente
FECHA_MAX SEGUIMIENTO	Fecha	Fecha que delimita el periodo de seguimiento del paciente: fecha de corte del estudio o fecha de fallecimiento del paciente
PERSON-DAYS	Númerica	Número de días de seguimiento del paciente
PERSON-YEARS	Númerica	Número de años de seguimiento del paciente
ASISTENCIAS-PERSON-DAYS	Númerica	Relación entre el número de asistencias ambulatorias realizadas tras el diagnóstico y el número de días de seguimiento del paciente
ASISTENCIAS-PERSON-YEARS	Númerica	Relación entre el número de asistencias ambulatorias realizadas tras el diagnóstico y el número de años de seguimiento del paciente
URGENCIAS_PERSON-DAYS	Númerica	Relación entre el número de asistencias en urgencias realizadas tras el diagnóstico y el número de días de seguimiento del paciente
URGENCIAS_PERSON-YEARS	Númerica	Relación entre el número de asistencias en urgencias realizadas tras el diagnóstico y el número de años de seguimiento del paciente
ESTANCIA_URG_DIAS	Númerica	Días de estancia acumulada en la urgencia por el paciente
ESTANCIA_URG-PERSON-DAYS	Númerica	Relación entre los días de estancia acumulada en la urgencia por el paciente y los días de seguimiento del paciente
ESTANCIA_URG-PERSON-YEARS	Númerica	Relación entre los días de estancia acumulada en la urgencia por el paciente y los años de seguimiento del paciente
ESTADIO_AGRUPADO	Catórica	Agrupación en cuatro valores (I-IV) del estadio del paciente
NUM_INGRESOS_HOSP	Númerica	Número total de ingresos hospitalarios del paciente tras el diagnóstico
NUM_INGRESOS_HOSP-PERSON-DAYS	Númerica	Relación entre el número total de ingresos hospitalarios del paciente tras el diagnóstico y los días de seguimiento del paciente
NUM_INGRESOS_HOSP-PERSON-YEARS	Númerica	Relación entre el número total de ingresos hospitalarios del paciente tras el diagnóstico y los años de seguimiento del paciente
ESTANCIA_HOSP	Númerica	Días de estancia acumulada en la hospitalización por el paciente
ESTANCIA_HOSP-PERSON-DAYS	Númerica	Relación entre los días de estancia acumulada en la hospitalización por el paciente y los días de seguimiento del paciente
ESTANCIA_HOSP-PERSON-YEARS	Númerica	Relación entre los días de estancia acumulada en la hospitalización por el paciente y los años de seguimiento del paciente
ESTANCIA_MEDIA_PAC	Númerica	Días de estancia media del paciente por ingreso hospitalario
AMI (Acute Myocardial Infarction)	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
CHF (Congestive Heart Failure)	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
PVD (Peripheral Vascular Disease)	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
CEVD (Cerebrovascular disease)	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Dementia	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Rheumatoid Disease	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
PUD (Peptic Ulcer Disease)	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Mild Liver Disease	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Diabetes	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Diabetes + Complications	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
HP/PAPL (Hemiplegia or Paraplegia)	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Renal Disease	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Cancer	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Moderate/Severe Liver Disease	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Metastatic Cancer	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
AIDS	Catórica	Presencia de comorbilidades derivadas del CMBD hospitalario para el cálculo del índice de Charlson
Charlson	Catórica	Índice de Comorbilidad de Charlson
Charlson_grupo	Catórica	Índice de Comorbilidad de Charlson agrupado (1-2, 3-4, 5-8, >8)
AsistenciasPD_altoconsumo	Booleana	Paciente alto consumidor de asistencias ambulatorias (percentil 75)
UrgenciasPD_altoconsumo	Booleana	Paciente alto consumidor de asistencias en urgencias (percentil 75)
EstanciaUrgPD_altoconsumo	Booleana	Paciente alto consumidor de estancias en urgencias (percentil 75)
EstanciaHosPD_altoconsumo	Booleana	Paciente alto consumidor de estancias en hospitalización (percentil 75)
COSTE_HOSP	Númerica	Coste total de la hospitalización del paciente
COSTE_URG	Númerica	Coste total de la asistencia en urgencias del paciente
COSTE_CEX	Númerica	Coste total de las consultas externas del paciente
COSTE_HOSP_PERSONDAYS	Númerica	Relación entre el coste total de la hospitalización y los días de seguimiento del paciente
COSTE_HOSP_PERSONYEARS	Númerica	Relación entre el coste total de la hospitalización y los años de seguimiento del paciente
COSTE_URG_PERSONDAYS	Númerica	Relación entre el coste total de las urgencias y los días de seguimiento del paciente
COSTE_URG_PERSONYEARS	Númerica	Relación entre el coste total de las urgencias y los años de seguimiento del paciente
COSTE_CEX_PERSONDAYS	Númerica	Relación entre el coste total de las consultas externas y los días de seguimiento del paciente
COSTE_CEX_PERSONYEARS	Númerica	Relación entre el coste total de las consultas externas y los años de seguimiento del paciente

Figura 37 – Principales variables derivadas generadas en el proceso de análisis.

5.4.3.5. Análisis descriptivo y visual de relaciones entre variables

Se realizó un análisis descriptivo inicial de todas las variables disponibles mediante Stata 12.0. En las variables categóricas se obtuvieron sus frecuencias, en términos absolutos y en porcentajes. En las variables numéricas se obtuvieron medias e intervalos de confianza del 95% o bien media, mediana, percentiles 25 y 75, desviación estándar y rango según el caso.

Los análisis exploratorios iniciales fueron realizados mediante Tableau 10.3, herramienta de análisis visual que permite de forma rápida la identificación de relaciones y tendencias entre los datos. Se empleó así mismo Joinpoint 4.5.0.1 para el análisis de tendencias (Joinpoint Regression Program, Version 4.5.0.1 - June 2017; Statistical Methodology and Applications Branch, Surveillance Research Program, National Cancer Institute.) y Epidat 4.2. Joinpoint permite realizar una regresión lineal ajustada a los datos y probar la significación estadística de la existencia de puntos de inflexión adicionales (“joinpoints”) que definan distintos segmentos lineales, de forma que se construya un modelo no lineal de regresión segmentada.

Se realizaron múltiples análisis, guiados por el conocimiento del negocio por parte de los facultativos de Oncología Médica, con el fin de identificar o corroborar posibles relaciones entre variables que pudieran ser estudiadas más en profundidad en fases posteriores del proceso. Si bien no es posible reproducir en este documento todos los análisis realizados, si mostramos algunos de ellos a modo de ejemplo, de forma que se pueda ilustrar el dinamismo de esta fase y la conveniencia de disponer de herramientas que faciliten la visualización con el mínimo esfuerzo posible.

Evolución histórica de la incorporación de los estudios moleculares (estadios IV)

Figura 38 – Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Evolución histórica de la incorporación de resultados moleculares a la práctica clínica en los estadios IV.

Estadio según Nº de CEX previas al Dx

Estadio según nº de CEX previas al Dx (2)

Figura 39 - Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Relación decreciente entre el estadio al diagnóstico y el número de asistencias ambulatorias previas al diagnóstico realizadas en el hospital.

Evolución histórica de los estadios al diagnóstico

Figura 40 - Ejemplo de análisis visual, descriptivo y de tendencias: Evolución histórica de los estadios al diagnóstico de los pacientes tratados de cáncer de pulmón en Oncología Médica.

5.4.3.6. *Análisis univariantes*

Para las variables cuantitativas, en la comparación de medidas centrales entre grupos se utilizaron pruebas paramétricas (t de student y ANOVA) o pruebas no paramétricas (U-Mann-Whitney y Kruskal-Wallis) utilizando las más adecuadas en cada caso en función del cumplimiento de la asunción de la normalidad de los datos y del número total de pacientes de cada grupo. Del mismo modo, la correlación entre variables cuantitativas se evaluó mediante la prueba de Pearson o Spearman, atendiendo al cumplimiento de la asunción de normalidad de los datos. Como medidas de la precisión de los efectos, se muestran los intervalos de confianza al 95% del correspondiente estimador. Para comparar proporciones de variables categóricas se aplicó el test ji-cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher, según el tamaño muestral.

Las pruebas con un valor de $p < 0.05$ fueron consideradas estadísticamente significativas, aplicando según el caso la corrección de Bonferroni en comparaciones entre múltiples grupos. Se utilizaron en todos los casos pruebas bilaterales.

La selección de las variables de interés para los análisis univariantes realizados se realizó utilizando a los expertos del dominio (facultativos de Oncología Médica), a través de las herramientas de análisis visual y de la herramienta de selección de características de SPSS v18.0. Esta funcionalidad nos permite explorar las variables de interés, de una forma rápida y automática en un entorno con muchas variables, sin necesidad de identificar las herramientas estadísticas más apropiadas en cada caso de acuerdo a un modelado previo de dichas variables. Para ello aplica un proceso de filtrado previo (eliminando variables con un alto número de valores nulos o con una mínima variación) y de ranking en función de la importancia para obtener información de la variable objetivo. Utilizamos los parámetros por defecto, que suponen descartar variables con un máximo del 70% de valores perdidos, de un 90% de registros en una misma categoría y con un coeficiente mínimo de variación (ratio entre la desviación típica de la variable y su media). Aquellos registros con valores perdidos para la variable objetivo son automáticamente excluidos para el cálculo del ranking de la selección de variables. De acuerdo a la documentación del producto (IBM Corporation, 2012), cuando todas las variables son categóricas, la herramienta selecciona las variables con influencia mediante test ji-cuadrado de Pearson o razón de verosimilitud (o bien, si son todas las variables implicadas categóricas, también mediante V de Cramer o test Lambda). En caso de que se encuentren variables categóricas y continuas, utiliza el estadístico F. Y en caso de que todas las variables sean continuas, usa el estadístico t basado en el coeficiente de correlación. En todo caso, se trata de un análisis univariante, en el que se analiza la influencia lineal sobre la variable dependiente de una variable independiente cada vez, sin analizar las relaciones entre variables independientes ni su contribución relativa.

5.4.3.7. *Análisis multivariantes*

Con el fin de determinar la influencia real de cada variable, teniendo en cuenta la interrelación entre variables (factores de confusión), realizamos análisis multivariantes mediante regresiones de Poisson o binomiales negativas, en los casos en los que se comprueba la existencia de sobre dispersión en la variable dependiente. La selección de variables se realiza mediante regresiones univariantes de Poisson, comparándolas mediante pruebas de razón de verosimilitud (Likelihood Ratio Test o LRT) frente al modelo nulo (sin variables). Incorporamos todas aquellas variables con una significación $p < 0.2$ en dichas pruebas. Se construyen distintos modelos según el número de variables incorporadas, que se evaluaron entre sí mediante pruebas LRT y mediante la minimización del valor del Criterio de Información de Akaike (AIC).

5.5. APLICACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO

Describimos a continuación los resultados, de interés clínico y de gestión en cáncer de pulmón, resultantes de la aplicación del marco de trabajo propuesto. Dicha aplicación contó con la aprobación del Comité Ético de Investigación con Medicamentos del HUPHM, que en su dictamen PI-136 del 2018 autorizó el protocolo presentado para realizar el análisis de la gestión del paciente con cáncer de pulmón a través del uso secundario de datos procedentes de la asistencia sanitaria.

5.5.1. Resultados de la aplicación del marco de trabajo propuesto al estudio de la asistencia sanitaria del cáncer de pulmón en el hospital

La principal muestra de validez del planteamiento realizado consiste en la generación de nuevo conocimiento a partir del análisis de datos clínicos oncológicos que resulte de la aplicación del marco de trabajo planteado. Así, podemos destacar los resultados que se describen en los siguientes capítulos.

5.5.1.1. *Análisis del servicio de atención telefónica a pacientes oncológicos y de su frecuentación de urgencias*

La primera aplicación del marco de trabajo planteado consistió en el análisis de una subpoblación de pacientes de cáncer de pulmón del registro que habían tenido asistencias en

urgencias en función del uso que realizaron del servicio de atención telefónica a pacientes que presta el Servicio de Oncología Médica del HUPHM. La disponibilidad de este servicio permitió reducir asistencias en urgencias y consultas imprevistas. De acuerdo a un estudio realizado por el Servicio de Oncología Médica, “los pacientes declararon que, ante la ausencia del servicio, probablemente habrían demandado atención sanitaria no programada, habiendo asistido a urgencias el 47,4%, al Servicio de Oncología sin cita previa el 46,8% o al médico de atención primaria el 5,5%.” (Jara González *et al.*, 2014).

Se realizó por tanto una integración de datos procedente del registro de casos de cáncer, del registro de llamadas telefónicas del servicio y de los datos de actividad asistencial de urgencias procedentes de la HCE aplicando la metodología CRISP-DM propuesta para su análisis. Se dispuso de una relación de 1242 llamadas procedentes de 568 pacientes distintos. De estos, 94 pacientes habían presentado asistencias en urgencias. Se obtuvieron datos adicionales de 129 pacientes no usuarios del servicio telefónico (no llamantes) que también habían tenido asistencias en urgencias.

La realización de los primeros análisis descriptivos arrojó datos de interés respecto de la calidad de los datos, como la existencia de valores nulos en determinadas variables (un 14% en la variable estadio), y la existencia de un elevado número de tipos de tumor (órganos) para los que apenas existían datos en el registro, lo que llevó a realizar agrupaciones en los datos y a plantear la necesidad de consolidar los registros de casos del Servicio de Oncología Médica priorizando aquellas patologías para las que se disponía de un mayor volumen de datos de partida.

Figura 41 – Distribución de tipos de tumor (órganos) en el registro inicial de casos de pacientes con cáncer (muestra de 223 casos del total de registros). Desglose y agrupación realizada. En color rojo, los pacientes llamantes.

El análisis inicial de los datos permitió apreciar patrones, como el aumento del uso del servicio de llamadas con el aumento del número de episodios en urgencias.

Value	Proportion	%	Count
1-2		30.46	46
3-4		29.8	45
5-6		20.53	31
7 ó +		19.21	29

Figura 42 – Variación de la proporción de pacientes llamantes con el número de asistencias recibidas en urgencias.

Se aplicaron algoritmos de *clustering* (k-means, 2-steps y Kohonen, con diferentes parámetros), resultando en el siguiente perfil para los seis *clusters* identificados:

Cluster	1	2	3	4	5	6
Organ	Lung (56.2%)	Breast (63.6%)	Breast (100%)	Unknown	Lung (100%)	Lung (57.1%)
Stadium	IV (56.2%)	IV (54.5%)	II (100%)	III (66.7%)	III (100%)	IV (100%)
Sex	F (100%)	F (100%)	F (100%)	M (100%)	M (100%)	M (100%)
Size	16 (24.6%)	11 (16.9%)	11 (16.9%)	9 (13.8%)	11 (16.9%)	7 (10.8%)

Figura 43 – Perfil de los clusters identificados en el análisis de pacientes llamantes que acuden a urgencias.

Adicionalmente se aplicaron algoritmos predictivos (clasificadores, incluyendo los siguientes algoritmos: C5, Regression Log, KNN, Discriminant, SVM, LSVM, Random Forest, CHAID, Quest y C&R tree usando distintos parámetros, con un total de 75 algoritmos aplicados) en los que los predictores más importantes del uso del servicio telefónico fueron las variables órgano, estadio y sexo del paciente.

Figura 44 – Ejemplo de árbol de decisión para la clasificación de pacientes llamantes y no llamantes.

La importancia de este primer trabajo radicó en que fue la primera aplicación del marco de trabajo planteado a datos clínicos oncológicos en el HUPHM. Desde un punto de vista clínico, los resultados fueron coherentes con el conocimiento existente y con el sentido común, generando nuevas hipótesis de investigación que de otra manera posiblemente no habrían sido identificadas.

Este trabajo fue admitido como comunicación en el 30th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (IEEE CBMS2017) con el título “OncoCall: analyzing the outcomes of the oncology telephone patient assistance” (Menasalvas-Ruiz *et al.*, 2017).

5.5.1.2. *Aplicación de métodos y herramientas de la ciencia de datos para el análisis del coste de la asistencia sanitaria de los pacientes con cáncer de pulmón en un hospital universitario de tercer nivel en España*

En este estudio tratamos de aplicar el marco de trabajo establecido para mejorar el conocimiento existente acerca del coste de la asistencia sanitaria de los pacientes de cáncer de pulmón en el HUPHM. Para ello se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, observacional y retrospectivo sobre el registro asistencial de pacientes con cáncer de pulmón y los datos de actividad asistencial correspondientes, en los ámbitos ambulatorio, de urgencias y de hospitalización, con las características descritas a continuación. Partiendo de los datos descritos previamente (ver capítulos 5.4.3.2 y 5.4.3.4) se calcularon los costes de la asistencia sanitaria a través de una aproximación *bottom-up*, obteniendo los costes de las asistencias unitarias y multiplicando por su número, de acuerdo a lo realizado en otros estudios de referencia (Knust *et al.*, 2017). El coste de las asistencias unitarias fue obtenido de la definición de precios oficiales de la Comunidad de Madrid, recogidos en la Orden 731/2013 de precios públicos en el Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid, 2013) que se basan en los resultados de métodos de contabilidad analítica como los descritos previamente (ver capítulo 5.2.2). Esta investigación fue publicada en la Revista Española de Economía de la Salud (Cruz-Bermúdez, Consuelo Parejo, *et al.*, 2019).

Descripción de la cohorte de pacientes

Conformamos una cohorte de 522 pacientes, cuyo diagnóstico se produce desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2016, para los cuales determinamos que sus datos han sido registrados con suficiente homogeneidad y calidad, y nuestra Historia Clínica Electrónica, implantada en septiembre de 2008, contiene todas sus asistencias sanitarias. En la Figura 45 se describen las principales características al diagnóstico recogidas para esta cohorte de pacientes.

	Total		Total
Total	522 (100%)	Total	522 (100%)
Sexo		Estadio al diagnóstico	
Hombre	392 (75,1%)	IA	59 (11,3%)
Mujer	130 (24,9%)	IB	51 (9,8%)
Edad al diagnóstico		IIA	31 (5,9%)
Media (DT)	65,9 (9,9)	IIB	30 (5,7%)
Mediana (Mín.-Máx.)	66 (33-92)	IIIA	129 (24,7%)

Raza		IIIB	67 (12,8%)
Caucásico	499 (95,6%)	IV	155 (29,7%)
Latino	14 (2,7%)	Antecedentes familiares de 1er grado	
Africano	9 (1,7%)	Sí	131 (25,1%)
Hábito tabáquico		No	124 (23,8%)
Ex fumador (>1 año)	322 (61,7%)	Desconocido	267 (51,1%)
Paquetes año. Mediana (P25-P75)	50 (37-70)	Antecedentes personales	
Cigarrillos día. Mediana (P25-P75)	20 (20-40)	Sí	104 (19,9%)
Fumador activo	129 (24,7%)	No	331 (63,4%)
Paquetes año. Mediana (P25-P75)	50 (40-65)	Desconocido	87 (16,7%)
Cigarrillos día. Mediana (P25-P75)	20 (20-40)	ECOG-PS al diagnóstico	
Nunca fumador	63 (12,1%)	0	289 (55,4%)
Desconocido	8 (1,5%)	1	181 (34,7%)
Histología		2	37 (7,1%)
Adenocarcinoma	268 (51,3%)	3	5 (1,0%)
Escamoso	190 (36,4%)	4	1 (0,2%)
Carcinoma de células grandes	32 (6,1%)	Desconocido	9 (1,7%)
NOS/Indiferenciado	9 (1,7%)	Índice de comorbilidad de Charlson	
Carc. neuroendocrino de cél. grande	6 (1,1%)	1-2	37 (7,1%)
Carc. de célula pequeña	6 (1,1%)	3-4	59 (11,3%)
Adenoescamoso	4 (0,8%)	>=5	192 (36,8%)
Sarcomatoide	1 (0,2%)	Desconocido	234 (44,8%)
Tumor carcinoide	1 (0,2%)		
Otros	5 (1,0%)		

Figura 45 – Estudio de costes: Principales características al diagnóstico de la cohorte de pacientes analizada.

Dichos pacientes fueron seguidos desde el diagnóstico hasta cierre del estudio (01/08/2017), pérdida de seguimiento o fallecimiento, con una mediana de seguimiento de 21,1 meses (rango 0,1-103,6 meses). Se registraron 226 muertes (43,3%) durante el seguimiento, con una mediana de supervivencia estimada de 51,6 meses (IC95% 32,7-70,5 meses). La mediana de la supervivencia para los pacientes fallecidos fue de 326 días, y la media de 441 días (IC95% 383 – 500).

Análisis del coste de consultas externas y pruebas

De la cohorte de 522 pacientes, 516 (98,9%) requirieron alguna asistencia ambulatoria en el hospital posterior al diagnóstico, con un total de 33.611 asistencias ambulatorias realizadas y una media de 40,2 asistencias por año.

La Orden 731/2013 de precios públicos en el Servicio Madrileño de Salud establece que las primeras consultas médicas tienen un coste de 130 euros, las consultas médicas sucesivas de 78 euros, y las consultas de enfermería 18 euros (aplicando el dato definido para las consultas de enfermería de Atención Primaria, dado que no está especificada la consulta en el ámbito hospitalario). De esta forma el coste total de las consultas para los 516 pacientes asciende a 1.396.524€.

Utilizando el periodo de seguimiento de los pacientes, obtenemos que el coste medio anual por paciente, para los 516 pacientes que presentan al menos una consulta ambulatoria, es de 1.714

euros (IC95% 1.591€ - 1.838€). En la Tabla 2 se compara el número de asistencia ambulatorias anual y el coste anual de las consultas según diferentes características al diagnóstico. En lo relativo al coste medio anual, no observamos diferencias significativas por sexo ($p = 0,297$), mientras que apreciamos diferencias significativas según el índice Charlson de comorbilidad ($p < 0,001$), el ECOG ($p = 0,019$) y el estadio al diagnóstico ($p < 0,001$). En la Figura 1 se muestran los costes medios anuales en función de estos tres factores al diagnóstico.

Los pacientes que presentan al menos una consulta ambulatoria con índice Charlson mayor o igual a 5 (coste medio 2.165€, N=190) presentan un 100% más coste medio anual que los pacientes con Charlson 1-2 (coste medio 1.078, N=37) y un 68% más coste que los pacientes con Charlson 3-4 (coste medio 1.287€, N=58). Los pacientes con ECOG-PS 2-4 (coste medio 2.648€, N=43) presentan un coste medio anual un 54% mayor que los pacientes con ECOG-PS 1 (coste medio 1.719€, N=178) y un 67% mayor que los pacientes con ECOG-PS 0 (coste medio 1.588€, N=286). Los pacientes con estadio IV (coste medio 2.252€, N=153) presentan un coste medio anual un 69% mayor que los pacientes con estadio II (coste medio 1.333€, N=60) y un 154% mayor (2,5 veces más) que los pacientes con estadio I (coste medio 885€, N=107).

Análisis del coste de las asistencia en urgencias

Tomando los 516 pacientes para los que hubo un seguimiento ambulatorio, 385 pacientes (74.6%) presentaron actividad de urgencias posterior al diagnóstico, con un total de 1.536 registros de asistencia en urgencias realizadas.

De acuerdo a la Orden 731/2013, obtenemos como precios para las urgencias generales 180 euros. De esta forma el coste total de las urgencias para los 385 pacientes asciende a 276.480 euros. La media para los 516 pacientes fue de 441€, mientras que fue de 536€ euros para los 385 que tuvieron al menos una asistencia en urgencias.

En la Figura 46 se compara el número de asistencia en urgencias anuales y el coste estimado anual de los 516 pacientes para los que hubo un seguimiento ambulatorio según diferentes factores al diagnóstico. Podemos ver que existen diferencias significativas en el coste medio anual de los pacientes que requieren asistencia de urgencias según índice de Charlson ($p < 0,001$), ECOG-PS ($p < 0,001$) o estadio ($p < 0,001$).

	Número de pacientes	Asistencias ambulatorias				Asistencias en urgencias				Asistencias en hospitalización			
		Número de asistencias por año		Coste estimado por año (sólo consultas)		Número de asistencias por año		Coste estimado por año		Número de ingresos por año		Coste estimado por año	
		Media (DT)	p-valor	Media (DT)	p-valor	Media (DT)	p-valor	Media (DT)	p-valor	Media (DT)	p-valor	Media (DT)	p-valor
Total	516	40,2 (30,4)		1714 (1428)		2,4 (3,3)		441 (596)		2,0 (6,5)		14251 (54440)	
Sexo del paciente			0,482		0,297		0,246		0,246		<0,001		<0,001
Mujer	126	36,7 (24,5)		1508 (970)		2,0 (2,7)		356 (493)		1,1 (3,2)		5981 (16144)	
Hombre	390	41,3 (32,1)		1781 (1543)		2,6 (3,5)		468 (623)		2,2 (7,2)		16923 (61731)	
Índice de Charlson			<0,001		<0,001		<0,001		<0,001		<0,001		<0,001
1-2	37	25,4 (28,6)		1078 (1037)		0,7 (1,2)		130 (212)		0,7 (0,7)		5078 (6377)	
3-4	58	29,1 (26,7)		1287 (1044)		2,0 (2,7)		356 (490)		1,8 (3,6)		26391 (78409)	
5-8	83	48,6 (26,1)		2094 (1820)		2,9 (3,2)		520 (578)		5,0 (13,5)		32015 (103920)	
>8	107	50,0 (30,0)		2221 (1501)		3,9 (4,2)		700 (754)		4,4 (5,8)		27829 (41707)	
ECOG-PS			0,060		0,019		<0,001		<0,001		0,021		<0,001
0	286	38,0 (30,4)		1588 (1209)		1,9 (2,9)		351 (531)		1,2 (2,8)		9695 (32751)	
1	178	41,9 (27,5)		1719 (1182)		2,9 (3,5)		531 (626)		2,0 (4,2)		11220 (23958)	
>=2	43	49,3 (38,4)		2648 (2788)		3,6 (3,7)		651 (665)		7,1 (19,0)		59465 (155997)	
Estadio			<0,001		<0,001		<0,001		<0,001		0,009		0,045
I	107	18,9 (19,1)		885 (831)		1,1 (2,5)		206 (443)		0,5 (1,4)		6625 (31807)	
II	60	30,0 (22,0)		1333 (910)		0,9 (1,1)		162 (208)		0,9 (1,6)		5690 (9109)	
III	196	45,6 (30,2)		1865 (1195)		2,3 (2,6)		416 (471)		1,7 (3,2)		12665 (40307)	
IV	153	52,0 (31,5)		2252 (1848)		4,1 (4,3)		747 (774)		3,7 (11,1)		24973 (83850)	

Figura 46 – Estudio de costes: Número y coste anual de las asistencias ambulatorias, de urgencias y de hospitalización según sexo, Charlson, ECOG-PS y Estadio.

En la Figura 47 se muestran los costes medios de las asistencias en urgencias según estos factores.

Figura 47 – Estudio de costes: Distribuciones univariantes del coste de las asistencias ambulatorias, de urgencias e ingresos en hospitalización según el índice de comorbilidad de Charlson, ECOG-PS y estadio al diagnóstico.

Los pacientes con Charlson > 8 (coste medio 700€, N=107) presentan un coste un 97% superior que los pacientes con Charlson 3-4 (coste medio 356€, N=58) y un 438% superior (5,38 veces más) que los pacientes con Charlson 1-2 (coste medio 130€, N=37). Frente a los pacientes con

Charlson 1-2, los pacientes con Charlson 5-8 (coste medio 520€, N=83) presentan un coste 4 veces mayor, y los pacientes con Charlson 3-4 un coste 2,7 veces mayor. Los pacientes con ECOG-PS 2-4 (coste medio 651€, N=43) presentan un coste un 85% superior a los ECOG-PS 0 (coste medio 351€, N=286), y los pacientes con ECOG-PS 1 (coste medio 531€, N=178) un coste un 51% superior a los ECOG-PS 0. Los pacientes con estadio IV (coste medio 747€, N=153) presentan un coste un 80% mayor que los pacientes con estadio III (coste medio 416€, N=196), 4,6 veces más coste que los pacientes estadio II (162€, N=60) y 3,6 veces más que los pacientes estadio I (206€, N=107).

Análisis de la actividad de hospitalización

Considerando los 516 pacientes que tuvieron seguimiento ambulatorio, 285 pacientes (55,2%) generaron 749 episodios de hospitalización posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón (o en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha de diagnóstico) entre los años 2009 y 2014. Los pacientes que ingresan lo hacen una media de 3,57 veces al año con una estancia media anual de 40,1 días, 1,97 veces en media para el conjunto de los 516 pacientes, con una estancia media anual de 22,1 días.

El coste medio del episodio de hospitalización, según la Orden 731/2013, fue 6.693€. El coste medio anual de los ingresos en hospitalización es de 14.251€, que asciende a 25.802€ considerando sólo los 285 pacientes con algún ingreso registrado.

En la Figura 46 observamos diferencias significativas en el coste medio anual de hospitalización de los pacientes según su índice de Charlson ($p < 0,001$), ECOG ($p < 0,001$) o estadio ($p = 0,045$). En la Figura 47 se muestran los costes medios anuales de los ingresos en hospitalización según estos tres factores.

Los pacientes con Charlson >8 (coste medio 27.829€, N=107) presentan un coste medio anual un 5% mayor que los pacientes con Charlson 3-4 (coste medio 26.391€, N=58) y 5,5 veces más coste que los pacientes con Charlson 1-2 (coste medio 5.078€, N=37). Los pacientes con ECOG-PS 2-4 (coste medio 59.465€, N=43) presentan un coste 5,3 veces superior a los pacientes con ECOG-PS 1 (coste medio 11.220€, N=178) y 6,1 veces superior a los pacientes con ECOG-PS 0 (coste medio 9.695€, N=286). Los pacientes con estadio III (coste medio 12.665€, N=196) presentan un coste un 91% mayor que los pacientes estadio I (6.625€, N=107).

Observamos también, a diferencia de los ámbitos ambulatorios y de urgencias, una diferencia estadísticamente significativa según el sexo del paciente ($p < 0,001$). Así, los pacientes hombres tienen un coste 2,8 veces superior a las mujeres.

Discusión

El estudio realizado demuestra que la aplicación del marco de trabajo propuesto, y en particular la integración de datos clínicos con datos de actividad asistencial, y su análisis mediante metodologías como CRISP-DM, permite obtener nuevo conocimiento de interés para la gestión. Hasta dónde conocemos, es el primer estudio acerca del coste de la asistencia sanitaria en el cáncer de pulmón, en todos sus estadios, en España.

En lo relativo al método aplicado, la aplicación de CRISP-DM ha permitido llegar a resultados de interés sin necesidad de establecer una hipótesis conocida previamente y favorece la participación de perfiles técnicos, sin un conocimiento profundo del dominio de negocio, en la realización de estudios en el ámbito médico. Consideramos que las herramientas y métodos empleados podrían ser aplicados a otras patologías para obtener un conocimiento de interés para la mejora de la gestión asistencial de los pacientes. Así mismo, consideramos que sería interesante en futuros trabajos aplicar métodos multivariantes para establecer la influencia real de cada variable clínica sobre el consumo de asistencias sanitarias y por tanto sobre el coste, teniendo en cuenta la posible interrelación entre variables (factores de confusión), así como aplicar otras técnicas en el ámbito del *Machine Learning* para la implementación de algoritmos predictivos y de soporte a la decisión que permitieran, por ejemplo, identificar pacientes con un perfil de alto consumo de asistencias sanitarias (y por tanto de alto coste) para ofrecerles proactivamente otras alternativas asistenciales.

Para la realización del estudio ha sido clave la integración de distintos orígenes de datos, fundamentalmente procedentes de la HCE, de la codificación de episodios hospitalaria (CMBD) y de los registros de casos cumplimentados manualmente por el Servicio de Oncología. No obstante, consideramos fundamental avanzar en la implementación del marco de trabajo propuesto a través de la integración del resto de fuentes disponibles, de la estructuración y codificación de la información en los distintos ámbitos asistenciales y de la automatización de la captura de datos en el ámbito hospitalario. En este sentido, el proceso manual de captura de datos en registros asistenciales paralelos a la HCE provoca errores que inciden en la calidad de los mismos para la realización de posteriores investigaciones. La integración de fuentes adicionales (como en nuestro caso los datos de prescripción y administración de medicación ambulatoria) y la mayor disponibilidad de datos estructurados nos permitiría disponer de más pacientes y más variables para su estudio mediante las distintas técnicas estadísticas y de *Data Mining* y *Machine Learning* existentes. Dado que un alto porcentaje del contenido clínico en la HCE se captura en texto libre por los profesionales, la aplicación de herramientas de procesamiento de lenguaje natural podría ser clave para avanzar en este campo, tal y cómo apuntan otros resultados obtenidos (Menasalvas Ruiz *et al.*, 2018).

En lo relativo a los resultados obtenidos, el coste medio total por paciente al año ascendió a 16.406 euros, siendo un 10,4% (1.714€) atribuible a las asistencias ambulatorias, un 2,7% (441€)

a las asistencias en urgencias y un 86,9% (14.251€) a los ingresos en hospitalización. No se consideran, por falta de datos durante la realización del estudio, los costes de la medicación administrada ambulatoriamente y de los tratamientos radioterápicos. En un estudio realizando en Holanda sobre 907 pacientes, seguidos una mediana de 20,7 meses, se obtuvo un coste medio total de 28.468€ incluyendo entre otros conceptos la quimioterapia ambulatoria, lo que supondría un coste anual medio de 16.503€ (van der Linden *et al.*, 2016). En un estudio realizado con 4.271 pacientes con cáncer en Australia (Langton *et al.*, 2016) se indicó que más del 90% de los pacientes fallecidos a causa del cáncer ingresaron al menos una vez en el hospital, y que dichos ingresos en hospitalización supusieron más del 80% del coste total en los últimos 6 meses de vida. En otro estudio de pacientes con cáncer de pulmón en estadio IIIB y IV, (Lang *et al.*, 2009) se indicó que la hospitalización y las consultas médicas supusieron un 85% de los costes durante todo el seguimiento del paciente, excluyendo los costes del tratamiento ambulatorio. De acuerdo a un amplio estudio realizado por Yabroff *et al.* (Yabroff, Warren and Brown, 2007) los costes de hospitalización en el último año de vida en cáncer de pulmón son cercanos al 70% del conjunto de costes, sin contemplar los costes de la medicación administrada ambulatoriamente. Las diferencias en la composición de las cohortes de pacientes, en la configuración de los sistemas sanitarios y en la metodología de los estudios impiden una comparación directa de estos resultados.

De acuerdo a nuestro análisis, se observan diferencias en el coste de la asistencia ambulatoria y de las asistencias en urgencias según el índice de comorbilidad de Charlson, el ECOG-PS y el estadio al diagnóstico (mayor cuanto mayor comorbilidad, mayor ECOG-PS y más avanzado el estadio). En lo relativo a la hospitalización, además de confirmar las diferencias observadas en el resto de ámbitos asistenciales, apreciamos diferencias según el sexo del paciente (un coste 2,8 veces mayor en los hombres que en las mujeres). Esto puede ser debido a las distintas características clínicas de ambos grupos: un 28% de las mujeres de la cohorte tienen ECOG-PS > 0 frente a un 43,5% en el caso de los hombres y un 24,6% de las mujeres tienen un índice Charlson >8 frente a un 40,5% en el caso de los hombres.

A tenor de estos resultados, podemos decir que todas estas relaciones son coherentes con el sentido común y el conocimiento clínico actual, si bien hemos podido cuantificarlas en nuestro estudio desde un punto de vista univariante, y pueden ser de utilidad para planificar recursos y mejorar la gestión de estos pacientes.

5.5.1.3. *Aplicación de métodos y herramientas de la ciencia de datos para el análisis del uso de la asistencia sanitaria de los pacientes con cáncer de pulmón en un hospital universitario de tercer nivel en España*

La adecuada gestión del paciente con cáncer durante el continuo asistencial determina en gran medida los resultados clínicos, la calidad de vida y permite generar ahorros económicos para el sistema sanitario. Desde el convencimiento de que la gestión asistencial del paciente con cáncer de pulmón puede mejorarse a través del análisis de datos de utilización asistencial disponibles en la HCE, aplicamos el marco de trabajo a esta cuestión.

Esta investigación ha producido distintos resultados, habiendo sido publicada en la revista *Clinical and Translational Oncology* (Cruz-Bermúdez, C. Parejo, *et al.*, 2019). Así mismo, se aceptó una comunicación como poster destacado (P. DEST-40) en el congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica del año 2018 con el título “APLICACIÓN DE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE DATA SCIENCE AL ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ASISTENCIAS DE URGENCIAS DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN EN UN HOSPITAL TERCIARIO EN ESPAÑA”. A fecha de elaboración de este documento de tesis, un manuscrito adicional está en fase de evaluación por la revista *BMC Health Services Research*.

Descripción de la cohorte de pacientes

Disponemos de una cohorte de 991 pacientes, de los cuales 778 pacientes tienen fecha de nacimiento y de diagnóstico informada y han sido diagnosticados desde el 01/01/2003 hasta 31/12/2016 (“cohorte completa”). Establecemos estas fechas como las óptimas para asegurar una mayor homogeneidad en los criterios de cumplimentación de los datos del registro, y por tanto de la calidad de los datos. De estos pacientes, 522 disponen del estadio al diagnóstico informado y han sido diagnosticados desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2016 y por tanto disponemos de todas las asistencias registradas en el sistema de Historia Clínica Electrónica, implantado en septiembre de 2008 (“cohorte digital”). Describimos en la siguiente figura las variables categóricas relativas a ambas cohortes de pacientes.

Variable	Valores	Cohorte completa (778 pacientes)		Cohorte digital (522 pacientes) Fec. Diag. > 01/01/2009	
		N	%	N	%
Sexo	Hombre	611	78,53%	392	75,10%
	Mujer	167	21,47%	130	24,90%
Raza	Caucásico	744	95,63%	499	95,59%
	Latino	21	2,70%	14	2,68%
	Africano	11	1,41%	9	1,72%
	Asiático	2	0,26%	0	0,00%
Hábito tabáquico	Ex fumador(>1 año)	545	70,05%	322	61,69%
	Fumador activo	137	17,61%	129	24,71%
	Nunca fumador	86	11,05%	63	12,07%
	Desconocido	10	1,29%	8	1,53%
Estadio al diagnóstico	IA	62	8,02%	59	11,30%
	IB	57	7,37%	51	9,77%
	IIA	44	5,69%	31	5,94%
	IIB	42	5,43%	30	5,75%
	IIIA	187	24,19%	129	24,71%
	IIIB	86	11,13%	67	12,84%
	IV	295	38,16%	155	29,69%
ECOG-PS al diagnóstico	0	357	45,89%	289	55,36%
	1	317	40,75%	181	34,67%
	2	74	9,51%	37	7,09%
	3	16	2,06%	5	0,96%
	4	1	0,13%	1	0,19%
	Desconocido	13	1,67%	9	1,72%
Histología	Adenocarcinoma	398	51,16%	268	51,34%
	Escamoso	260	33,42%	190	36,40%
	Carcinoma de células grandes	71	9,13%	32	6,13%
	NOS/Indiferenciado	18	2,31%	9	1,72%
	Otros	10	1,29%	6	1,15%
	Carcinoma neuroendocrino de célula grande	9	1,16%	6	1,15%
	Carcinoma de célula pequeña	6	0,77%	5	0,96%
	Adenoescamoso	4	0,51%	4	0,77%
	Sarcomatoide	1	0,13%	1	0,19%
	Tumor carcinoide	1	0,13%	1	0,19%
Antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	No	307	43,73%	193	43,08%
	Desconocido	211	30,06%	131	29,24%
	Sí	184	26,21%	124	27,68%
Cánceres previos	No	552	78,30%	331	73,56%
	Sí	137	19,43%	104	23,11%
	Desconocido	16	2,27%	15	3,33%
Situación actual	Fallecido	434	58,65%	226	46,69%
	Vivo con enfermedad	162	21,89%	156	32,23%
	Vivo sin enfermedad	112	15,14%	98	20,25%
	Pérdida de seguimiento	32	4,32%	4	0,83%
Charlson Comorbidity Index	1-2	-	-	47	9,00%
	3-4	-	-	56	10,73%
	>5	-	-	185	35,44%
	Unknown	-	-	234	44,83%

Figura 48 – Estudio de utilización: Variables categóricas de las cohortes de pacientes analizadas.

De acuerdo al cálculo realizado del índice de comorbilidad de Charlson (CCI), se indica a continuación la distribución de condiciones de comorbilidad en los 288 pacientes para los que disponemos de datos de comorbilidad codificados mediante CIE-9-MC al alta de hospitalización:

Cohorte digital (288 pacientes con diagnósticos de hospitalización) Fec. Diag. > 01/01/2009				
Comorbidities	Value	N	%	95% CI (Binomial Exact)
AMI (Acute Myocardial Infarction)	Absent	277	96,18%	93,27% - 98,08%
	Present	11	3,82%	1,92% - 6,73%
CHF (Congestive Heart Failure)	Absent	258	89,58%	85,46% - 92,86%
	Present	30	10,42%	7,14% - 14,54%
PVD (Peripheral Vascular Disease)	Absent	267	92,71%	89,07% - 95,43%
	Present	21	7,29%	4,57% - 10,93%
CEVD (Cerebrovascular disease)	Absent	267	92,71%	89,07% - 95,43%
	Present	21	7,29%	4,57% - 10,93%
Dementia	Absent	285	98,96%	96,99% - 99,78%
	Present	3	1,04%	0,22% - 3,01%
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)	Absent	178	61,81%	55,92% - 67,44%
	Present	110	38,19%	32,56% - 44,08%
Rheumatoid Disease	Absent	279	96,88%	94,15% - 98,56%
	Present	9	3,13%	1,44% - 5,85%
PUD (Peptic Ulcer Disease)	Absent	283	98,26%	96,00% - 99,43%
	Present	5	1,74%	0,57% - 4,00%
Mild Liver Disease	Absent	272	94,44%	91,13% - 96,79%
	Present	16	5,56%	3,21% - 8,87%
Diabetes	Absent	234	81,25%	76,25% - 85,59%
	Present	54	18,75%	14,41% - 23,75%
Diabetes + Complications	Absent	282	97,92%	95,52% - 99,23%
	Present	6	2,08%	0,77% - 4,48%
HP/PAPL (Hemiplegia or Paraplegia)	Absent	283	98,26%	96,00% - 99,43%
	Present	5	1,74%	0,57% - 4,00%
Renal Disease	Absent	270	93,75%	90,30% - 96,25%
	Present	18	6,25%	3,75% - 9,70%
Cancer	Absent	0	0,00%	0,00% - 1,27%
	Present	288	100,00%	98,73% - 100,00%
Moderate/Severe Liver Disease	Absent	285	98,96%	96,99% - 99,78%
	Present	3	1,04%	0,22% - 3,01%
Metastatic Cancer	Absent	110	38,19%	32,56% - 44,08%
	Present	178	61,81%	55,92% - 67,44%
AIDS	Absent	288	100,00%	98,73% - 100,00%
	Present	0	0,00%	0,00% - 1,27%

Figura 49 – Estudio de utilización: distribución de las condiciones de comorbilidad de los pacientes analizados.

Describimos en la siguiente tabla las variables numéricas relativas a ambas cohortes de pacientes:

Cohorte completa (778 pacientes)								
Variable	N	p50	p25	p75	mean	sd	min	max
Edad al diagnóstico (años)	778	65,65	58,57	72,31	65,27	9,99	30,71	92,42
Edad al fallecimiento (años)	432	67,39	59,34	75,03	66,80	10,40	40,72	93,63
Supervivencia desde el diagnóstico (días)	432	308,5	130	578,5	453,05	487,57	3	3827
Hábito tabáquico:								
Número de paquetes / año	349	50	40	70	56,16	29,06	4	188
Número de cigarrillos / día	581	20	20	40	28,92	14,63	2	100
Cohorte digital (522 pacientes) Fec. Diag. > 01/01/2009								
Variable	N	p50	p25	p75	mean	sd	min	max
Edad al diagnóstico (años)	522	66,25	60,19	72,93	65,92	9,87	33,79	92,42
Edad al fallecimiento (años)	224	68,80	60,66	75,84	67,62	10,88	41,18	93,63
Supervivencia desde el diagnóstico (días)	224	326	144,50	548,50	441,25	444,16	3	2521
Periodo de seguimiento (días)	522	634	359	1091	837,51	703,57	3	3107
Hábito tabáquico:								
Número de paquetes / año	220	50	37,50	70	55,23	27,81	5	171
Número de cigarrillos / día	385	20	20	40	27,83	14,48	2	80

Figura 50 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las cohortes de pacientes analizadas.

Comparando nuestra serie con la recientemente comunicada por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) (Grupo Español para el estudio del Cáncer de Pulmón (GECP), 2017), que incluye 2.200 pacientes de 53 centros españoles, observamos mediante la comparación de proporciones independientes de Epidat 4.2 diferencias estadísticamente significativas en las siguientes variables:

Variable	Valores	Cohorte completa (778 pacientes)		Cohorte GECP (2200 pacientes)		Dif.	p
		N	%	N	%		
Sexo	Hombre	611	78,53%	1620	73,64%	4,89%	0,007
	Mujer	167	21,47%	579	26,32%	-4,85%	0,007
	ND	0	0,00%	1	0,05%		
Raza	Caucásico	744	95,63%	2159	98,14%	-2,51%	<0.001
	Latino	21	2,70%	30	1,36%	1,34%	0,014
	Africano	11	1,41%	9	0,41%	1,00%	0,003
	Asiático	2	0,26%	1	0,05%		
	ND	0	0,00%	1	0,05%		
Hábito tabáquico	Ex fumador(>1 año)	545	70,05%	981	44,60%	25,45%	<0.001
	Fumador activo	137	17,61%	869	39,50%	-21,89%	<0.001
	Otras situaciones	96	12,34%	350	15,90%	-3,56%	0,016
Estadio al diagnóstico	I	119	15,30%	177	8,05%	7,25%	<0.001
	II	86	11,05%	210	9,55%		
	III	273	35,09%	640	29,09%	6,00%	0,002
	IV	295	37,92%	1124	51,09%	-13,17%	<0.001
	ND	5	0,64%	49	2,23%	-1,58%	0,004
ECOG-PS al diagnóstico	0	357	45,89%	805	36,59%	9,30%	<0.001
	1	317	40,75%	1097	49,86%	-9,12%	<0.001
	2	74	9,51%	191	8,68%		
	3	16	2,06%	52	2,36%		
	4	1	0,13%	10	0,45%		
	5	0	0,00%	36	1,64%		
	ND	13	1,67%	9	0,41%		

Figura 51 – Estudio de utilización: Comparación de la cohorte analizada con el registro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Pulmón (GECP).

Es necesario indicar que 152 pacientes de nuestra serie forman parte de la serie publicada del GECP (un 6,91% de sus registros).

Analizando la evolución histórica de la enfermedad en lo relativo a su incidencia en hombres y mujeres, observamos una clara tendencia creciente desde 2003 (10.00% de casos en mujeres en la serie) hasta 2016 (27.87%), con un incremento de la incidencia de 17.87 puntos porcentuales en 13 años.

Evolución histórica de la enfermedad

Figura 52 – Estudio de utilización. Evolución histórica de la incidencia del cáncer de pulmón en hombres y mujeres.

El crecimiento es aproximadamente de un 1.5% anual (IC95% 0.94%-2.06%), de forma que manteniendo la tendencia se estima que en 2020 un 35% de los casos de cáncer de pulmón se darán en mujeres. La tendencia es estadísticamente significativa ($p < 0.001$).

Análisis de la actividad ambulatoria de consultas externas y pruebas

La “cohorte digital” de 522 pacientes, diagnosticados desde el 01/01/2009 al 31/12/2016 y cuyos datos asistenciales están por tanto recogidos completamente en la historia clínica electrónica del HUPHM, genera 43.197 asistencias ambulatorias desde el 01/01/2009 hasta el 01/08/2017. De estas, 33.611 asistencias son posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón de 516 pacientes (6 pacientes, hasta los 522 de la serie analizada, no tienen registradas asistencias

ambulatorias posteriores al diagnóstico). Describimos en la siguiente tabla las variables categóricas relativas a dichas asistencias:

		Cohorte digital (33.611 asistencias) Fec. Diag. > 01/01/2009	
Variable	Valores	N	%
Procedencia	Servicio propio centro	33.340	99,19%
	Atención primaria	232	0,69%
	Atención Primaria (libre elección de centro)	30	0,09%
	Otras instituciones	9	0,03%
Servicio de procedencia	ONCOLOGIA MÉDICA	18.891	56,20%
	ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA	6.498	19,33%
	CIRUGIA TORÁCICA	1.919	5,71%
	NEUMOLOGÍA	1.640	4,88%
	REHABILITACIÓN	341	1,01%
	CARDIOLOGÍA	332	0,99%
	UROLOGÍA	325	0,97%
	ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN	297	0,88%
	OTORRINOLARINGOLOGÍA	244	0,73%
	OFTALMOLOGÍA	233	0,69%
	MEDICINA INTERNA	231	0,69%
	UNIDAD DEL DOLOR	214	0,64%
	CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA	205	0,61%
	DIGESTIVO	185	0,55%
	NEUROLOGÍA	167	0,50%
	TRAUMATOLOGÍA	144	0,43%
	DERMATOLOGÍA	128	0,38%
	OTRAS ESPECIALIDADES	1.617	4,81%
Servicio realizador	ONCOLOGIA MÉDICA	9.995	29,74%
	HOSPITAL DE DÍA MÉDICO	6.873	20,45%
	ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA	5.132	15,27%
	RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA	3.346	9,96%
	NEUMOLOGÍA	1.704	5,07%
	CIRUGIA TORÁCICA	1.119	3,33%
	MEDICINA NUCLEAR	785	2,34%
	CARDIOLOGÍA	499	1,48%
	REHABILITACIÓN	408	1,21%
	OFTALMOLOGÍA	311	0,93%
	UROLOGÍA	300	0,89%
	ANESTESIA Y REANIMACIÓN	298	0,89%
	ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN	293	0,87%
	OTORRINOLARINGOLOGÍA	252	0,75%
	DIGESTIVO	232	0,69%
	UNIDAD DEL DOLOR	225	0,67%
	MEDICINA INTERNA	191	0,57%
	OTRAS ESPECIALIDADES	1.648	4,90%
Tipo de asistencia	CONSULTA	18.922	56,30%
	PRUEBAS DE IMAGEN	4.356	12,96%
	TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO	3.690	10,98%
	ANALÍTICA	3.591	10,68%
	OTROS	1.278	3,80%
	CUIDADOS/PROCEDIMIENTOS	833	2,48%
	OTRAS PRUEBAS	515	1,53%
	TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO	426	1,27%
Tipo de demora	Sin demora	31.760	94,49%
	Motivos institucionales	1.249	3,72%
	Solicitud de paciente	602	1,79%

Figura 53 – Estudio de utilización: Variables categóricas de las asistencias ambulatorias.

Describimos en la siguiente tabla las variables numéricas relativas a dichas asistencias ambulatorias:

Cohorte digital (33.611 asistencias) Fec. Diag. > 01/01/2009								
Variable	N	p50	p25	p75	mean	sd	min	max
Número de asistencias por paciente	516	53,5	21	92	65,14	54,05	1	293
Número de asistencias por paciente / año	516	37,03	14,85	58,18	40,15	30,43	0,41	168,46
Días desde el diagnóstico a la asistencia	33.611	231	94	581	426,28	492,27	0	3.081
Días desde la asistencia al fallecimiento	12.309	258	116	503	391,14	412,40	0	2.517

Figura 54 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las asistencias ambulatorias.

Describimos también a continuación las asistencias ambulatorias en función del estadio al diagnóstico del paciente y del tipo de asistencia prestada:

Datos globales de asistencias ambulatorias

Estadio inicial del p..	Número de pacientes	Número de asistencias	Asistencias/Paciente
IA	58	2.658	45,83
IB	49	2.391	48,80
IIA	31	1.914	61,74
IIB	29	1.933	66,66
IIIA	129	10.466	81,13
IIIB	67	5.425	80,97
IV	153	8.824	57,67
Total general	516	33.611	65,14

Tipos de asistencia

TIPO_ASISTENCIA	Número de asistencias	% del total de asistencias	Número de pacientes	% del total de pacientes
CONSULTA	18.922	56,30%	516	100,00%
PRUEBAS DE IMAGEN	4.356	12,96%	459	88,95%
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO	3.690	10,98%	356	68,99%
ANALÍTICA	3.591	10,68%	356	68,99%
OTROS CUIDADOS/PROCEDIMIENTOS	1.278	3,80%	302	58,53%
OTRAS PRUEBAS	833	2,48%	269	52,13%
TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO	515	1,53%	215	41,67%
BRONCOSCOPIA	426	1,27%	261	50,58%
Total general	33.611	100,00%	516	100,00%

Figura 55 – Estudio de utilización: asistencias ambulatorias en función del estadio al diagnóstico del paciente y del tipo de asistencia prestada.

Entre los tipos de asistencia ambulatoria prestada, destaca la realización de consultas (médicas y de enfermería). Las consultas posteriores al diagnóstico de los pacientes (18.922) pueden clasificarse en primeras consultas médicas (2.064, 11%), consultas sucesivas médicas (13.746,

72%) y consultas de enfermería (3.112, 16%), con un ratio sucesivas/primeras (para todas las especialidades en conjunto) de 6,66.

Analizando la evolución histórica mediante modelos joinpoint, no vemos tendencias significativas en la evolución histórica del consumo de asistencias ambulatorias por paciente para los pacientes diagnosticados entre los años 2009 a 2016.

Considerando exclusivamente las asistencias realizadas por el Servicio de Oncología Médica (ONC), obtenemos los siguientes datos según el estadio del paciente:

Datos ONC

Estadio inicial del p..	Número de pacientes	Número de asistencias	Asistencias/Paciente
IA	36	331	9,19
IB	36	447	12,42
IIA	27	519	19,22
IIB	28	556	19,86
IIIA	120	2.854	23,78
IIIB	65	1.542	23,72
IV	151	3.746	24,81
Total general	463	9.995	21,59

Figura 56 - Estudio de utilización: asistencias ambulatorias realizadas por el Servicio de Oncología Médica.

Si nos centramos exclusivamente en el número de consultas sucesivas de Oncología Médica, analizando visualmente su evolución temporal obtenemos la siguiente figura:

Figura 57 - Estudio de utilización: evolución histórica del número de consultas sucesivas por paciente atendido en el Servicio de Oncología Médica según el estadio del paciente.

Empleamos joinpoint v4.5.0.1 para evaluar la significación estadística de la tendencia creciente observada en los estadios IV y comprobamos una tendencia creciente de pendiente 0,72 asistencias por paciente al año (IC95% 0,587-0,847), $p < 0,001$.

Para analizar las diferencias en el consumo de asistencias ambulatorias (consultas, pruebas o tratamientos de cualquier especialidad) realizamos un análisis basado en el ratio entre el número de asistencias y el periodo de seguimiento de cada paciente (desde el diagnóstico hasta el fallecimiento o hasta la fecha de corte del estudio – 01/08/2017). El periodo de seguimiento medio de los pacientes es de 837,51 días (mediana 634 días).

La distribución de asistencias ambulatorias por año de seguimiento del paciente respecto al estadio al diagnóstico, al ECOG-PS y al índice Charlson puede observarse en la Figura 58. Tomando como referencia el estadio IA que presenta un menor número medio de asistencias por año de seguimiento del paciente (media 16,56, IC95% 11,81-21,32), el estadio IIA consume un 66% más asistencias ambulatorias (1,66 veces), el IIIA un 138% (2,38 veces), el IV un 210% (3,10 veces) y el IIB un 246% más (3,46 veces). En lo relativo al índice Charlson, no se identifican diferencias significativas entre los índices 1-2 y 3-4 ni entre los 5-8 y >8, siendo el consumo del

grupo >8 (media 49,53, IC95% 43,75 – 55,31) un 95,02% superior (1,95 veces) superior a los pacientes con índice 1-2 (media 25,40, IC95% 15,86 – 34,94). Analizando la relación entre el consumo de asistencias ambulatorias y el número total de asistencias en urgencias en los 180 días previos al diagnóstico, observamos una baja correlación negativa con el consumo de asistencias ambulatorias (Spearman -0,176, $p = 0,009$, $N=219$). Analizando la relación con la edad al diagnóstico, observamos una baja correlación negativa entre ésta y el consumo de asistencias ambulatorias (Spearman -0,110, $p = 0,012$, $N=522$). No observamos diferencia significativa entre el consumo medio de asistencias ambulatorias por sexo ($p = 0,25$). Sí observamos una correlación positiva moderada entre el consumo de asistencias en urgencias y el consumo de asistencias ambulatorias (Spearman 0,588, $p < 0,001$, $N = 522$). La correlación entre el consumo de asistencias ambulatorias y el consumo de ingresos hospitalarios, si bien tiene también una relación lineal positiva, es de menor magnitud (Spearman 0,250, $p < 0,001$, $N = 522$).

Figura 58 – Estudio de utilización: Distribución univariante de la actividad ambulatoria en función del estadio y ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson.

Se ajusta un modelo de regresión binomial negativa multivariante construido por pasos con todas las variables estadísticamente significativas desde el punto de vista univariante, llegando a un modelo final con 9 variables predictoras (AIC = 5.158,6 vs. 17.193,3 del modelo multivariante de Poisson con las variables seleccionadas por SPSS Modeler, Cox & Snell $R^2 = 0,412$, Nagelkerke $R^2 = 0,412$). A partir de los valores de los coeficientes de la regresión binomial negativa (Figura 59), podemos concluir lo siguiente:

- Tomando como referencia los estadios IA, los estadios IIA presentan 1,75 veces (75%) más asistencias ambulatorias por año de seguimiento, los IIB 2,06 veces (105%) más, los IIIA 2,19 veces (119%) más, los IIIB 3,16 veces (216%) más y los IV 2,24 veces (124%) más.
- Por cada asistencia en urgencias adicional al año se observa un incremento de 1,13 veces (13%) más en el número de asistencias ambulatorias.

- Por cada día adicional de estancia en urgencias del paciente al año se observa un decremento en el número de asistencias ambulatorias por año de seguimiento de 0,95 veces menos (un 5% menos).
- Los pacientes con menor comorbilidad (Charlson 1-2) tienen 0,72 veces (28%) menos asistencias ambulatorias al año que los pacientes con Charlson >8 usados como referencia. A la inversa, los pacientes con Charlson >8 tienen 1,38 veces (38%) más asistencias que los Charlson 1-2.
- Por cada año más de edad al diagnóstico se observa un decremento de un 1% en el número de asistencias ambulatorias por año de seguimiento (0,99 veces). Así, una diferencia de 10 años en la edad al diagnóstico supone 0,93 veces (7%) menos asistencias.
- Por cada llamada adicional al teléfono de atención a pacientes (OncoCall, ver capítulo 5.5.1.1) se observa un incremento de 1,06 veces (6%) más asistencias ambulatorias por año de seguimiento.
- Por cada asistencia ambulatoria previa al diagnóstico se observa un incremento de 1,003 veces (0,3%) más asistencias ambulatorias por año de seguimiento tras el diagnóstico.
- Los pacientes con antecedentes de cáncer en familiares de primer grado presentan $1,36/1,19 = 1,14$ veces (14%) más asistencias que los pacientes sin dichos antecedentes familiares.

Variable	exp(B)	95% CI		p
Constante (intercept)	20,843	11,774	37,116	<0,001
Estadio IB	1,265	0,948	1,692	0,109
Estadio IIA	1,745	1,250	2,466	0,001
Estadio IIB	2,059	1,476	2,904	< 0,001
Estadio IIIA	2,195	1,712	2,799	< 0,001
Estadio IIIB	3,155	2,390	4,167	< 0,001
Estadio IV	2,237	1,703	2,930	< 0,001
Asistencias en urgencias por año de seguimiento	1,129	1,083	1,178	< 0,001
Estancia en urgencias por año de seguimiento	0,955	0,916	0,996	0,021
Charlson 1-2	0,721	0,539	0,974	0,032
Charlson 3-4	0,807	0,626	1,045	0,101
Charlson 5-8	1,031	0,824	1,295	0,780
Charlson desconocido	0,750	0,618	0,906	0,003
Urgencias en los 180 días previos al diagnóstico	1,062	0,979	1,157	0,113
Edad al diagnóstico	0,993	0,986	1,001	0,050
Número de llamadas (OncoCall)	1,063	1,008	1,129	0,023
Asistencias ambulatorias previas al diagnóstico	1,003	1,001	1,006	0,003
Sin antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	1,194	1,000	1,430	0,057
Con antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	1,359	1,139	1,626	< 0,001

Figura 59 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de asistencias ambulatorias por año de seguimiento.

Análisis de la actividad de urgencias

De la cohorte de 522 pacientes, 386 pacientes presentan actividad de urgencias (73,95%). En total generan 1.538 registros de asistencias en urgencias posteriores al diagnóstico entre el 12/02/2009 y el 23/10/2017. Describimos en la Figura 60 las variables categóricas y en la Figura 61 las variables numéricas relativas a la actividad de urgencias.

		Cohorte digital (1.538 asistencias URG) Fec. Diag. > 01/01/2009	
Variable	Valores	N	%
Vía de llegada (motivo)	Propios medios	1.257	81,73%
	Ambulancia	281	18,27%
Nivel de gravedad en triage	1 CRITICO - 0 min	8	0,65%
	2 EMERGENCIA - 10 min	185	15,11%
	3 URGENCIA - 60 min	744	60,78%
	4 ESTANDAR - 120 min	277	22,63%
	5 NO URGENTE- 240 min	10	0,82%
Motivo de asistencia (agrupado)	Adulto con mal estado general (MEG)	444	28,87%
	Otros	432	28,09%
	Disnea	345	22,43%
	Dolor	169	10,99%
	Problemas en las extremidades	53	3,45%
	Cefalea	23	1,50%
	Problemas oculares	19	1,24%
	Problemas urinarios	16	1,04%
	Mareo, lipotimia, síncope	15	0,98%
	Diarrea	11	0,72%
	Vómitos	7	0,46%
	Fiebre	4	0,26%
Tipo de día de ingreso	Laborable	1.160	75,42%
	Festivo	378	24,58%
Turno del ingreso	MAÑANA	827	53,77%
	TARDE	545	35,44%
	NOCHE	166	10,79%
Derivación desde Atención Primaria	No	1.441	93,69%
	Sí	97	6,31%
Reingreso en Urgencias	No	1.049	68,21%
	Entre 7 y 30 días tras el alta de URG	348	22,63%
	Menor de 7 días tras el alta de URG	141	9,17%
Destino al alta (motivo)	Alta clínica	796	51,76%
	Hospitalización	721	46,88%
	Traslado a Hosp de Apoyo	8	0,52%
	Fallecimiento	5	0,33%
	Alta voluntaria no comunicada	5	0,33%
	Alta voluntaria comunicada	3	0,20%

Figura 60 - Estudio de utilización: Variables categóricas de las asistencias en urgencias.

Cohorte digital (1538 asistencias URG) Fec. Diag. > 01/01/2009								
Variable	N	p50	p25	p75	mean	sd	min	max
Número de urgencias por paciente	386	3	2	5	3,98	3,32	1	24
Número de urgencias por paciente / año	386	2,16	0,88	4,35	3,30	3,47	0,12	23,05
Estancia (horas)	1.538	8,5	4,52	24,93	15,65	15,32	0,35	93,53
Estancia (días) por paciente / año	386	1,23	0,45	3,10	2,60	3,72	0,01	28,16
Días desde el diagnóstico al ingreso en URG	1.538	293	116	587	455,96	488,78	0	2.825
Días desde el alta al fallecimiento	730	118,5	35	294	250,08	347,87	0	2.179

Figura 61 - Estudio de utilización: Variables numéricas de las asistencias en urgencias.

Atendiendo a la gravedad del paciente al ingreso en urgencias, registrada en el triaje (algoritmo Manchester) se observa cómo los pacientes que son triados como menos urgentes y no urgentes (niveles 4 y 5) no fallecen en urgencias e ingresan en menor porcentaje (30% de estas asistencias en urgencias acaban en ingreso hospitalario) que los niveles más urgentes (nivel 1: 100%, nivel 2: 75,68% y nivel 3: 47,98%). Analizando la relación entre el nivel de triaje y el porcentaje de pacientes que ingresan en hospitalización, comprobamos la existencia de una fuerte asociación lineal inversa (Spearman = -0,9; $p = 0,0374$) con una pendiente (calculada mediante joinpoint v4.5.0.1) de -18,65% (IC95% - 25,02%, -12,28%). Así, un incremento en un nivel de gravedad del triaje implica un incremento aproximado del 18% en el porcentaje de ingreso.

Destino al alta según nivel gravedad

Figura 62 – Estudio de utilización: destinos al alta en función del nivel de gravedad en el triaje de urgencias.

Analizando la evolución histórica mediante modelos joinpoint, no vemos tendencias significativas en la evolución histórica del consumo de asistencias de urgencias por periodo

de seguimiento en los pacientes diagnosticados entre los años 2009 a 2016, a excepción del caso de los estadios IIA de pendiente -0,21 asistencias de urgencias por año de seguimiento del paciente (IC95% -0,35, -0,068), $p = 0,025$.

La distribución de urgencias por año de seguimiento del paciente respecto al estadio al diagnóstico, al índice Charlson y al valor de ECOG-PS al diagnóstico puede observarse en la Figura 63. Tomando como referencia el estadio IIA que presenta un menor número medio de asistencias en urgencias por año (0,88, IC95% 0,52 – 1,24), el estadio IIIB (2,77, IC95% 2,20 – 3,35) consume un 216% más de asistencias en urgencias (3,16 veces) más y el IV (4,16, IC95% 3,48 – 4,84) un 373% (4,73 veces) más. La diferencia se aprecia especialmente entre los estadios I-II vs III-IV. Así, vemos que los estadios III (2,31, IC95% 1,94 – 2,68) y estadios IV consumen respectivamente un 107% (2,07 veces) más y un 274% (3,74 veces) más asistencias de urgencias por año de seguimiento que los estadios I (1,11, IC95% 0,65 – 1,57).

Figura 63 - Estudio de utilización: Distribución univariante de las asistencias en urgencias en función del estadio y ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson.

En lo relativo al índice de comorbilidad de Charlson, los pacientes con un índice 3-4 (media 1,94, IC95% 1,24 – 2,65) consumen un 168% (2,68 veces) más asistencias de urgencias que los pacientes con índice 1-2 (media 0,72, IC95% 0,33 – 1,12). Los pacientes con índice 5-8 (media 2,85, IC95% 2,16 – 3,55) y con índice >8 (media 3,95, IC95% 3,14 – 4,75) consumen un 294% (3,94 veces) y un 445% (5,45 veces) más asistencias de urgencias respectivamente que los pacientes con índice 1-2. Analizando las diferencias según el ECOG-PS del paciente al diagnóstico los pacientes con ECOG-PS 1 (2,96, IC95% 2,44 – 3,47) consumen un 53% más asistencias que los ECOG-PS 0 (1,93, IC95% 1,59 – 2,27) y los pacientes ECOG-PS 2 (3,78, IC95% 2,54 – 5,03) consumen un 96% más asistencias de urgencias por periodo de seguimiento que los pacientes con ECOG-PS 0 al diagnóstico.

No observamos diferencia significativa entre el consumo de asistencias de urgencias por sexo ($p = 0,1250$) ni correlación significativa del consumo de asistencias en urgencias con la edad al diagnóstico (Spearman 0,0454, $p = 0,3$, $N = 522$).

Se ajusta un modelo de regresión binomial negativa multivariante construido por pasos con todas las variables estadísticamente significativas desde el punto de vista univariante,

llegando a un modelo final con 8 variables predictoras (AIC = 2.219 vs. 2.677 del modelo multivariante de Poisson con las variables seleccionadas por SPSS Modeler, Cox & Snell R² = 0,260, Nagelkerke R² = 0,263). A partir de los valores de los coeficientes de la regresión binomial negativa (Figura 64), podemos concluir lo siguiente:

- Los pacientes con menor comorbilidad (Charlson 1-2) tienen 0,487 veces (51,3%) menos asistencias en urgencias al año que los pacientes con Charlson >8 usados como referencia. A la inversa, los pacientes con Charlson >8 tienen 2,08 veces (108%) más asistencias que los Charlson 1-2.
- No se observan diferencias estadísticamente significativas en la influencia de los distintos estadios, a excepción del estadio IV, con 1,757 veces (75,7%) más asistencias en urgencias al año que los estadios IA usados como referencia.
- Los pacientes con ECOG-PS 1 tienen 1,358 veces (35,8%) más asistencias en urgencias al año que los ECOG-PS 0 usados como referencia.
- Por cada año más de edad al diagnóstico se observa un incremento de un 1,7% en el número de asistencias en urgencias por año de seguimiento. Así, una diferencia de 10 años en la edad al diagnóstico supone 1,17 veces más asistencias (17%).
- Por cada asistencia en urgencias en los 180 días anteriores al diagnóstico se observa un incremento de 1,116 veces (11,6%) en el número de asistencias en urgencias por año de seguimiento.
- Por cada ingreso hospitalario adicional al año se observa un incremento de 1,043 veces (4,3%) en el número de asistencias al año en urgencias.
- Por cada asistencia ambulatoria adicional al año se observa un incremento de 1,024 veces (2,4%) en el número de asistencias año en urgencias.
- Por cada asistencia ambulatoria más que el paciente haya tenido antes del diagnóstico se observa un incremento de un 0,4% en el número de asistencias en urgencias por año de seguimiento.

Variable	exp(B)	95% CI		p
Constante (intercept)	0,145	0,066	0,318	< 0,001
Asistencias ambulatorias por año de seguimiento	1,024	1,020	1,028	< 0,001
Estadio IB	1,461	0,968	2,209	0,075
Estadio IIA	0,793	0,480	1,312	0,367
Estadio IIB	0,713	0,433	1,178	0,195
Estadio IIIA	1,193	0,836	1,699	0,337
Estadio IIIB	1,463	0,978	2,187	0,067
Estadio IV	1,757	1,199	2,571	0,004
Ingresos hospitalarios por año de seguimiento	1,043	1,019	1,074	< 0,001
Charlson 1-2	0,487	0,319	0,748	< 0,001
Charlson 3-4	0,869	0,614	1,233	0,415
Charlson 5-8	0,799	0,592	1,081	0,137
Charlson desconocido	0,681	0,521	0,891	0,002
Ecog-PS 1	1,358	1,104	1,673	0,003
Ecog-PS 2	1,317	0,907	1,929	0,151
Ecog-PS 3	0,481	0,093	1,975	0,340
Ecog-PS 4	3,067	0,132	41,798	0,387
Ecog-PS desconocido	1,118	0,517	2,445	0,771
Edad al diagnóstico	1,017	1,006	1,027	0,001
Asistencias ambulatorias previas al diagnóstico	1,004	1,002	1,008	0,002
Urgencias en los 180 días previos al diagnóstico	1,116	1,004	1,244	0,031

Figura 64 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de asistencias en urgencias por año de seguimiento.

Análisis de la actividad de hospitalización

De la cohorte de 522 pacientes, 288 pacientes generan 753 episodios de hospitalización posteriores al diagnóstico de cáncer de pulmón (o en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha de diagnóstico) entre los años 2009 y 2014. Describimos en la Figura 65 las variables categóricas y en la Figura 66 las variables numéricas relativas a los ingresos en hospitalización.

Cohorte digital (753 ingresos en hospitalización) Fec. Diag. > 01/01/2009			
Variable	Valores	N	%
Procedencia del ingreso	Urgencias	374	56,58%
	Lista de Espera Quirúrgica	204	30,86%
	Consultas (incluyendo Pruebas Diagnósticas y/o terapéuticas)	56	8,47%
	Hospital de día	24	3,63%
	Otro hospital	3	0,45%
Circunstancia del ingreso	Urgente	401	53,25%
	Programado	335	44,49%
	Ingreso tras procedimiento ambulatorio	17	2,26%
Circunstancia del alta (destino)	Domicilio	688	91,37%
	Fallecimiento	61	8,10%
	Traslado a otro hospital	4	0,53%
% de ingresos de cada estadio con alta por fallecimiento	IA	1	1,59%
	IB	3	5,36%
	IIA	3	5,56%
	IIB	2	4,44%
	IIIA	13	5,49%
	IIIB	12	9,09%
	IV	27	16,27%
% de ingresos de cada estadio procedentes de urgencias	IA	22	34,92%
	IB	20	37,74%
	IIA	17	39,53%
	IIB	16	39,02%
	IIIA	105	50,97%
	IIIB	82	72,57%
	IV	112	78,87%
Reingresos (con la misma CDM)	No	418	60,93%
	Sí	268	39,07%

Figura 65 - Estudio de utilización: Variables categóricas de los ingresos en hospitalización.

Cohorte digital (753 ingresos en hospitalización, 288 pacientes) Fec. Diag. > 01/01/2009								
Variable	N	p50	p25	p75	mean	sd	min	max
Número de ingresos por paciente	288	2	1	3	2,61	1,90	1	12
Número de ingresos por paciente / año	280	1,27	0,44	3,49	2,84	3,89	0,12	24
Estancia por ingreso (días)	753	6	2	10	8,75	10,18	1	118
Estancia agregada por paciente (días)	288	17	8	30	22,87	21,28	1	179
Estancia media por paciente (días)	288	7,33	5	11,5	10,10	11,44	1	118
Días de estancia por paciente / año	280	8,54	2,42	33,62	29,48	47,32	0,17	287
Días desde el diagnóstico al ingreso	753	80	12	242	191,45	280,88	-30	1692,44
Días desde el alta al fallecimiento	547	180	41	436	340,82	446,99	0	2390

Figura 66 - Estudio de utilización: Variables numéricas de los ingresos en hospitalización.

Los pacientes ingresan una media de 2,61 veces (IC95% 2,39-2,83) y en cada ingreso su estancia media es de 8,75 días (IC95% 8,02-9,47). La estancia total (agregada) media de cada paciente durante el periodo de seguimiento es de 22,87 días (IC95% 20,40-25,34), siendo para los

pacientes fallecidos de 27,70 días (IC95% 24,42-30,98). La estancia media de los pacientes es de 10,10 días (IC95% 8,77 – 11,42). Se observan 7 pacientes en los que la estancia hospitalaria es superior al periodo de seguimiento (estancia por año de seguimiento superior a 365). Estos casos son debidos al fallecimiento del paciente durante el ingreso de hospitalización en el que se produce el diagnóstico (que por tanto se registra como posterior a la fecha de ingreso, siendo el periodo de seguimiento menor que la estancia).

Los 753 episodios de hospitalización contienen 5.197 diagnósticos codificados desde 2010, fecha a partir de la cual se codifican en el hospital los diagnósticos presentes en admisión (POA). De estos 5.197 diagnósticos, 68 se clasifican como no POA (1,3%) para 28 pacientes (de 268 pacientes, un 10,45%), y por tanto han sido adquiridos durante el ingreso (complicaciones en hospitalización). Analizando el número de ingresos por año de seguimiento (person-years) y su evolución histórica mediante modelos joinpoint, no encontramos tendencias significativas en la evolución temporal en los pacientes diagnosticados entre los años 2009 a 2014.

Para analizar las variables con influencia sobre el consumo de ingresos en hospitalización (y por tanto sobre el coste) aplicamos el algoritmo de selección de características de SPSS v18.0 descrito en la metodología del estudio. La distribución de ingresos por año de seguimiento del paciente respecto al estadio al diagnóstico, al índice Charlson y al valor de ECOG-PS al diagnóstico puede observarse en la Figura 67.

Figura 67 - Estudio de utilización: Distribución univariante del número de ingresos en hospitalización por año de seguimiento en función del estadio y ECOG-PS al diagnóstico y al índice de comorbilidad de Charlson.

Observamos diferencias estadísticamente significativas entre los estadios IA y IIIB, IB y IIIB. Agrupando estadios encontramos diferencia estadísticamente significativa ($p < 0,001$) entre los estadios I (media 0,79, IC95% 0,19 – 1,39) y los estadios III (media 1,68, IC95% 1,24 – 2,13). De esta forma los estadios III sufren un 112% más ingresos (2,12 veces más) que los estadios I por periodo de seguimiento. En lo relativo al índice Charlson, existe una diferencia estadísticamente significativa entre el número de ingresos de los grupos Charlson 1-2 (media 0,66, IC95% 0,41 – 0,90) y Charlson 5-8 (media 5,21, IC95% 2,24 – 8,19) y Charlson >8 (media 4,49, IC95% 3,39 – 5,59), así como entre los grupos Charlson 3-4 (media 2,30, IC95% 0,95 – 3,65) y los grupos Charlson 5-8 y >8. Así, el número de ingresos por año de seguimiento de los grupos Charlson 5-

8 y >8 son 7,95 y 6,84 veces superiores respectivamente al grupo Charlson 1-2 y 2,27 y 1,95 veces respectivamente superiores al grupo Charlson 3-4. Respecto del ECOG-PS, observamos diferencias estadísticamente significativas entre los ECOG-PS 0 (media 1,23, IC95% 0,90 – 1,56) y ECOG-PS 3 (media 10,34, 95% Poisson CI 7,77 – 13,64), y entre ECOG-PS 1 (media 2,31, IC95% 1,58 – 3,05) y ECOG-PS 3. De esta forma, los pacientes con ECOG-PS 1 sufren un 87,65% (1,87 veces) más ingresos por periodo de seguimiento y los pacientes con ECOG-PS 3 un 738% (8,38 veces) más ingresos por periodo de seguimiento que los pacientes con ECOG-PS 0 al diagnóstico. Observamos también una correlación positiva moderada entre el número de ingresos en hospitalización por año de seguimiento y la estancia total del paciente en las urgencias por año de seguimiento (Spearman 0,39, $p < 0,001$, $N = 522$).

Los modelos planteados sobre los 288 pacientes de la cohorte digital que tienen al menos un ingreso (regresión de Poisson y posteriormente binomial negativa, ante la presencia de sobre dispersión) no consiguieron un buen ajuste a los datos (Cox & Snell $R^2 = -0,22$, Nagelkerke $R^2 = -0,23$). Con el fin de obtener una cohorte más homogénea, realizamos una selección de datos para mantener sólo a aquellos pacientes fallecidos cuyo periodo de seguimiento es superior a 100 días (eliminando por tanto aquellos con periodos de seguimiento mínimos que disparan el número de ingresos por año de seguimiento) así como inferior a 1.000 días (eliminando aquellos pacientes con un seguimiento muy prolongado, y por tanto un número muy bajo, próximo a cero, del número de ingresos por año de seguimiento). En este último caso, justificamos el sesgo de selección en las dudas que nos genera la posibilidad de que se haya perdido seguimiento de estos pacientes, que podrían haber sido ingresados en otros centros hospitalarios sin que tuviéramos dicho registro en el HUPHM. A cambio, con esta decisión dejamos fuera del análisis al subgrupo poblacional de pacientes con mayor supervivencia (mayor o igual a 1.000 días), para los que no obstante podría realizarse un modelo de regresión específico. De esta forma, realizamos un nuevo análisis sobre esta población seleccionada con $n = 135$ pacientes (se eliminan 2 observaciones durante el análisis con *leverage* = 1), con periodos de seguimiento entre los 100 y los 1.000 días.

Se ajusta por tanto un modelo de regresión de Poisson multivariante construido por pasos con todas las variables estadísticamente significativas desde el punto de vista univariante, llegando a un modelo final con 5 variables predictoras (AIC = 518 vs. 536 del modelo multivariante de Poisson con todas las variables significativas desde un punto de vista univariante). Los valores de pseudo R^2 arrojan ahora resultados positivos (Cox & Snell $R^2 = 0,31$, Nagelkerke $R^2 = 0,31$), ji-cuadrado de Pearson 137,6 (dispersión 1,1). El test de ajuste (*deviance goodness of fit*) tiene un valor $p = 0,637$ indicando que la hipótesis nula (el modelo tiene un buen ajuste a los datos) no puede ser rechazada. A partir de los valores de los coeficientes de la regresión de Poisson (Figura 68) podemos concluir lo siguiente:

- Por cada día de estancia adicional en urgencias por año de seguimiento del paciente se observa un incremento de 1,17 veces (17%) más ingresos hospitalarios por año de seguimiento.
- Los pacientes con Charlson 5-8 tienen 1,38 veces (38%) más ingresos que los pacientes con Charlson >8 usados como referencia. En este modelo, los coeficientes de los valores Charlson 1-2 y 3-4 no tienen significación estadística, si bien tienen respectivamente 0,73 veces (27%) menos y 0,89 veces (11%) menos ingresos que los pacientes con Charlson >8.
- Los pacientes catalogados como nunca fumadores (con menos de 100 cigarrillos fumados en toda su vida) tienen 0,60 veces (40%) menos ingresos que los pacientes exfumadores (con más de un año desde que dejaron este hábito) usados como referencia.
- Por cada asistencia en urgencias en los 180 días anteriores al diagnóstico se observa un incremento de 1,15 veces (15%) más en el número de ingresos hospitalarios por año de seguimiento.

Variable	exp(B)	95% CI		p
Constante (intercept)	1,490	1,149	1,918	0,002
Estancia en urgencias por año de seguimiento	1,172	1,129	1,216	<0,001
Charlson 1-2	0,728	0,399	1,226	0,265
Charlson 3-4	0,886	0,614	1,246	0,500
Charlson 5-8	1,382	1,112	1,714	0,003
Hábito tabáquico: fumador activo	1,046	0,804	1,358	0,736
Hábito tabáquico: nunca fumador	0,598	0,377	0,903	0,021
Urgencias en los 180 días previos al diagnóstico	1,155	1,021	1,300	0,019
Sin antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	1,191	0,927	1,528	0,170
Con antecedentes de cáncer en familiares de 1er grado	0,778	0,541	1,096	0,162

Figura 68 - Estudio de utilización: Resultados del análisis de regresión multivariante sobre el número de ingresos en hospitalización por año de seguimiento.

Discusión

Nuestro estudio supone una nueva demostración de la utilidad del marco de trabajo planteado, indicando que la integración de datos clínicos con datos de actividad asistencial, y su análisis mediante metodologías como CRISP-DM, permite obtener nuevo conocimiento de interés clínico y de gestión.

Hasta dónde conocemos, es el primer estudio acerca del consumo de asistencias sanitarias en el cáncer de pulmón, en cualquiera de sus estadios, en España.

En lo relativo al método aplicado, la aplicación de CRISP-DM ha permitido llegar a resultados de interés sin necesidad de establecer una hipótesis conocida previamente y favorece la participación de perfiles técnicos, sin un conocimiento profundo del dominio de negocio, en la

realización de estudios en el ámbito médico. Adicionalmente, ha permitido identificar relaciones no esperadas, por su falta de descripción en la literatura, que pueden ser utilizadas en la generación de nuevas hipótesis de investigación y dar lugar a nuevos estudios. Consideramos que las herramientas y métodos empleados podrían ser aplicados a otras patologías para obtener un conocimiento de interés para la mejora de la gestión asistencial de los pacientes.

Para la realización del estudio ha sido clave nuevamente la integración de distintos orígenes de datos, fundamentalmente procedentes de la HCE, de la codificación de episodios hospitalaria y de los registros de casos cumplimentados manualmente por el Servicio de Oncología. Consideramos fundamental avanzar en la integración del resto de fuentes disponibles, en la estructuración y codificación de la información en más ámbitos asistenciales y en la automatización de la captura de datos en el ámbito hospitalario. La integración de fuentes adicionales (como en nuestro caso los datos de prescripción y administración de medicación ambulatoria) y la mayor disponibilidad de datos estructurados nos permitiría disponer de más variables para su estudio mediante las distintas técnicas estadísticas y de *data mining* y *Machine Learning* existentes, con un alto potencial para la realización de estudios de investigación y la implementación de algoritmos predictivos y de soporte a la decisión. Dado que un alto porcentaje del contenido clínico en la HCE se captura en texto libre por los profesionales, la aplicación de herramientas de procesamiento de lenguaje natural podría ser clave para avanzar en este campo. Por otra parte, el proceso manual de captura de datos en registros asistenciales paralelos a la HCE ha revelado problemas de calidad de los mismos en su recogida. En tanto no se produzca la automatización, es necesario al menos contar con bases de datos que implementen validaciones y procesos de depuración integrados, como la que se ha desarrollado en este trabajo de tesis basada en REDCap, y que puedan ser extendidas a otros centros para incrementar el número de registros analizados. Disponer de interoperabilidad en lo relativo a los datos de actividad asistencial es no obstante imprescindible para poder realizar un análisis multicéntrico como el realizado en este estudio.

En lo relativo a los resultados, el análisis de los datos correspondientes a los pacientes de cáncer de pulmón del HUPHM ha permitido comparar las poblaciones objeto de estudio con otras descritas en distintos estudios y obtener resultados de interés clínico y de gestión. Los 522 pacientes de nuestra cohorte para los que disponemos de todo su historial clínico digital, tienen una edad media de 65,92 años (desviación estándar 9,87) y son seguidos una mediana de 634 días. De estos, 224 pacientes fallecieron, con una mediana de supervivencia desde el diagnóstico de 326 días. La cohorte está mayoritariamente integrada por pacientes de cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP). Las características de la cohorte analizada son consistentes con las publicadas por el GECP para España basadas en un registro más amplio de pacientes (Grupo Español para el estudio del Cáncer de Pulmón (GECP), 2017), si bien encontramos diferencias

significativas y relevantes en el porcentaje de mujeres (-4,85%), de exfumadores (+25,45%) y fumadores activos (-21,89%), de estadios I (+7,25%) y IV al diagnóstico (-13,17%) y de ECOG-PS 0 al diagnóstico (+9,30%). Es necesario indicar que 152 pacientes de nuestra serie forman parte de la serie publicada del GECP (un 6,91% de sus registros). El alto nivel socioeconómico de los pacientes del área puede guardar una relación con estas diferencias (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2017), si bien no puede descartarse que el criterio de codificación de la información en el caso del alto porcentaje de exfumadores o de pacientes con ECOG-PS 0 deba ser revisado. El análisis de los datos nos permite detectar posibles errores, mejorar procedimientos internos y mejorar la calidad de los datos. En los datos de comorbilidad de los pacientes, calculados con los datos de los ingresos posteriores al diagnóstico, observamos una prevalencia de EPOC en los pacientes del 38,19% (N=110, IC95% 32,56% - 44,08%), inferior a lo encontrado en un estudio específico en la materia con 602 pacientes de cáncer de pulmón realizado en España (51.5%) (Mouronte-Roibás *et al.*, 2018). En lo relativo a la incidencia por sexos, observamos una tendencia creciente en el número de casos en mujeres, siendo el crecimiento de la incidencia de aproximadamente un 1,5% anual (IC95% 0,94%-2,06%) en el periodo 2003-2016, de forma que manteniendo la tendencia se estima que en 2020 un 35% de los casos de cáncer de pulmón se darán en mujeres. Esta tendencia creciente es consistente con la encontrada en otros estudios (Cheng *et al.*, 2016) (Bosetti *et al.*, 2012), si bien con datos hasta 2007 y 2008 respectivamente para el caso de España, y contraria a la tendencia decreciente en mujeres observada en países como los Estados Unidos (De la Cruz, Tanoue and Matthay, 2011). Por tanto, según nuestro estudio no hemos alcanzado el pico máximo en la incidencia, lo que sugiere la necesidad de aplicar medidas correctoras de la tendencia, en línea con las tomadas en otros países.

Los pacientes de nuestro estudio tienen una mediana de 35,8 asistencia ambulatorias por año de seguimiento (9,8 asistencia ambulatorias por cien días de seguimiento), suponiendo las asistencia en Oncología Médica y las prestaciones realizadas ambulatoriamente en hospital de día médico un 50,19% de dichas asistencia, siendo por tanto estos servicios los que asumen mayoritariamente la carga asistencial ambulatoria de estos pacientes. Si bien la mayor parte de las asistencia ambulatorias son consultas (56,30%), observamos que un 41,67% de los pacientes reciben tratamiento radioterápico y un 50,58% de los pacientes reciben al menos una broncoscopia. En los estadios IV observamos que el número de consultas sucesivas por paciente tiene una tendencia creciente en el periodo 2009-2016, lo que puede reflejar la mayor oferta terapéutica desde esa fecha, con el advenimiento de las terapias dirigidas y la consecuente mayor supervivencia conseguida para estos pacientes en los últimos años (Driessen *et al.*, 2017) y debería servir para informar decisiones relativas al dimensionamiento de las plantillas de oncólogos médicos en los centros. De acuerdo a nuestros datos, en 2018 se habrá doblado

respecto de 2009 el número de asistencias sucesivas de Oncología Médica al año por cada paciente con estadio IV.

De nuestro análisis obtenemos que el consumo de asistencias ambulatorias por año de seguimiento del paciente está relacionado desde un punto de vista univariante con el estadio del paciente al diagnóstico (mayor consumo cuanto mayor es el estadio, con pico en el estadio IIIB), con el consumo de asistencias en urgencias del paciente y en menor medida de hospitalización (mayor para una mayor demanda asistencial de urgencias y hospitalización) y con la comorbilidad del paciente (mayor cuanto mayor es el índice de Charlson). Teniendo en cuenta la influencia conjunta de las distintas variables, corroboramos estas relaciones modificando su cuantificación, y observamos la relación con la existencia de antecedentes de cáncer en familiares de primer grado (mayor número de asistencias si existen antecedentes) e inversa con la edad al diagnóstico (menos asistencias cuanto mayor es la edad).

En lo relativo a las asistencias de urgencias observamos que un 73,95% de los pacientes acudieron al menos una vez a urgencias, con una mediana de 2 asistencias durante el periodo de seguimiento, esto es, de 1,23 urgencias hospitalarias por año de seguimiento (0,336 por 100 días de seguimiento). Un 76,55% de las asistencias tuvieron un triaje urgente o muy urgente (niveles 1 a 3 de la escala Manchester), un 22,63% de las asistencias tuvieron un triaje menos urgente (nivel 4) y sólo un 0,82% tuvieron un triaje no urgente (nivel 5). Observamos una fuerte relación entre el nivel de triaje y la existencia de un posterior ingreso de los pacientes. Estos datos son sugestivos de la adecuación del triaje y de la asistencia en urgencias de estos pacientes, existiendo un margen de mejora en los pacientes con un triaje menos urgente, que sin embargo ingresan en aproximadamente un 30% de los casos. En el otro 70% de los casos con alta al domicilio, se podrían plantear alternativas para evitar, al menos en un porcentaje, asistencias en urgencias que podrían resolverse de otra manera.

De nuestro análisis obtenemos que el consumo de asistencias urgentes por año de seguimiento del paciente está relacionado desde un punto de vista univariante fundamentalmente con el estadio del paciente al diagnóstico (con una tendencia en forma de U, con un mínimo para los estadios IIA), con el número de ingresos hospitalarios por periodo de seguimiento (mayor cuanto mayor es el número de ingresos), con la comorbilidad del paciente (mayor cuanto mayor es el índice de Charlson), con el valor del ECOG-PS del paciente al diagnóstico (mayor cuanto mayor es el ECOG-PS). No observamos relación univariante significativa del consumo de asistencias de urgencias con el sexo o con la edad al diagnóstico. Teniendo en cuenta la influencia conjunta de las distintas variables, corroboramos estas relaciones modificando su cuantificación, pero sin embargo sí observamos la relación con la edad al diagnóstico (más asistencias cuanto mayor es la edad) y con el número de urgencias en los 180 días previos al diagnóstico y el número de asistencias ambulatorias previas (más urgencias post diagnóstico cuanto mayores son estas

cifras). Estos resultados son sugestivos de que la población mayor podría ser destinataria en mayor medida de acciones proactivas que permitieran evitar las asistencias en urgencias (con un seguimiento domiciliario, por ejemplo) y que la frecuentación en urgencias tras el diagnóstico puede depender en cierta medida de la historia previa del paciente en su consumo de asistencias sanitarias.

En lo relativo a los ingresos de hospitalización, un 55,17% de los pacientes tuvieron algún ingreso posterior a su diagnóstico de cáncer de pulmón en el periodo analizado, con una mediana de 2 ingresos durante el mismo, esto es, de 1,35 ingresos por año de seguimiento (0,37 ingresos por 100 días de seguimiento). Por cada cien días de seguimiento, los pacientes pasan una mediana de 2,5 días ingresados en hospitalización (9,3 días al año). La mediana de la duración media del ingreso por paciente es de 7,33 días. Los pacientes pasan una mediana de 17 días ingresados durante el periodo de cuatro años observado. La mediana de días que transcurren desde el diagnóstico hasta el ingreso es de 80 días, y de 180 entre el alta y el fallecimiento. Un 56,58% de los ingresos se producen desde urgencias, y resulta en fallecimiento en un 8,10% de los mismos. En el caso de los estadios IV, las cifras se elevan a un 78,87% de ingresos desde urgencias y a un 16,27% de los ingresos que acaban en fallecimiento. En un estudio norteamericano (Vera-Llonch *et al.*, 2011) con 4.068 pacientes con cáncer de pulmón metastásico, tratados con quimioterapia durante un periodo de seguimiento con mediana 334 días, los pacientes tuvieron en media 1,5 ingresos y una estancia media de 8,9 días (no se indica las desviaciones típicas). Del análisis de los diagnósticos codificados de la hospitalización, observamos que un 10,65% tuvieron algún diagnóstico no presente en el ingreso y por tanto adquirido durante su estancia.

De nuestro análisis obtenemos que el número de ingresos en hospitalización por año de seguimiento del paciente está relacionado desde un punto de vista univariante fundamentalmente con el valor del ECOG-PS del paciente al diagnóstico (mayor cuanto mayor es el ECOG-PS), con el estadio del paciente al diagnóstico (mayor cuanto mayor es el estadio) y con la comorbilidad del paciente (mayor cuanto mayor es el índice de Charlson). Debido a los problemas de ajuste observados en las regresiones de Poisson y binomial negativa sobre los datos completos de pacientes ingresados, se realizó una selección adicional de los datos de pacientes para evitar valores extremos en los periodos de seguimiento individuales. En estas condiciones, corroboramos la relación del índice Charlson modificando su cuantificación, pero sin embargo no observamos relación con el estadio al diagnóstico o con el ECOG-PS. Sí observamos que los pacientes nunca fumadores (con menos de 100 cigarrillos fumados en toda su vida) tienen un 40% menos ingresos que los pacientes exfumadores (con más de un año desde que dejaron este hábito a fecha de diagnóstico). Observamos nuevamente la relación con el número de urgencias en los 180 días previos al diagnóstico (más ingresos cuanto mayor es esta cifra).

A tenor de estos resultados, podemos decir que todas estas relaciones son coherentes con el sentido común y el conocimiento clínico actual, si bien hemos podido cuantificarlas en nuestro estudio y pueden ser de utilidad para planificar recursos, estimando las cargas asistenciales, y para proporcionar una atención sanitaria más personalizada y de mejor calidad.

5.5.1.4. Análisis del uso y coste de la asistencia sanitaria asociada a la fase final de la vida de pacientes de cáncer de pulmón en un hospital terciario español

Distintos estudios apuntan a que el consumo de recursos asistenciales y, por tanto, el coste asistencial, se incrementa en el periodo final de la vida de estos pacientes (Langton *et al.*, 2014) (Yabroff *et al.*, 2008). Existe, pues, un elevado interés en estudiar la asistencia prestada en esta fase de la enfermedad, no sólo desde un punto de vista económico, sino de su eficacia y humanidad, con el fin de mejorar la calidad de vida y evitar un sufrimiento innecesario al paciente (Barbera *et al.*, 2015). Sin embargo, no disponemos de suficientes estudios en nuestro ámbito nacional que se focalicen en cáncer en general y en el cáncer de pulmón, en especial. Por tanto, nos proponemos un análisis de la asistencia sanitaria en la fase final de la vida, y de los costes en los que incurre el sistema sanitario, en pacientes de cáncer de pulmón del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM), aplicando el marco de trabajo establecido en este trabajo de tesis. A fecha de elaboración de este documento de tesis, un manuscrito que contiene esta investigación está en fase de evaluación por la revista European Journal of Cancer Care.

Descripción de la cohorte de pacientes

Conformamos una cohorte de 224 pacientes, diagnosticados desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2016, que han fallecido a fecha de corte del estudio (07/03/2017) y son seguidos una mediana de 326 días. En su mayor parte son pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP), hombres (83%) con una mediana de edad de 66 años, fumadores activos o ex fumadores (91%), con carga elevada de comorbilidad (un 67% de los pacientes con índice Charlson mayor a 5) y en estadios III (43%) y IV (39%). Describimos en la Figura 69 las principales características de la cohorte de pacientes estudiada.

Variable	Total	Variable	Total
Número de pacientes	224 (100%)	Número de pacientes	224 (100%)
Sexo		Estadio al diagnóstico	
Hombre	187 (83,5%)	IA	7 (3,1%)
Mujer	37 (16,5%)	IB	13 (5,8%)
Edad al diagnóstico (años)		IIA	12 (5,4%)
Media (DT)	65,3 (10,0)	IIB	9 (4,0%)
Mediana (Mín.-Máx.)	66 (31-92)	IIIA	50 (22,3%)
Raza		IIIB	46 (20,5%)
Caucásico	217 (96,9%)	IV	87 (38,8%)
Africano	4 (1,8%)	Antecedentes familiares de 1er grado	
Latino	3 (1,3%)	Sí	41 (18,3%)
Hábito tabáquico		No	63 (28,1%)
Ex fumador (>1 año)	151 (67,4%)	Desconocido	120 (53,6%)
Cigarrillos día. Media (DT)	28,7 (13,4)	Antecedentes personales de cáncer	
Cigarrillos día. Mediana (P25-P75)	28 (20-40)	Sí	45 (20,1%)
Fumador activo	54 (24,1%)	No	150 (67,0%)
Cigarrillos día. Media (DT)	27,9 (13,6)	Desconocido	29 (12,9%)
Cigarrillos día. Mediana (P25-P75)	23,5 (20-40)	ECOG-PS al diagnóstico	
Nunca fumador	17 (7,6%)	0	104 (46,4%)
Desconocido	2 (0,9%)	1	87 (38,8%)
Histología		2	24 (10,7%)
Adenocarcinoma	101 (45,1%)	3	5 (2,2%)
Escamoso	89 (39,7%)	4	1 (0,4%)
Carcinoma de células grandes	19 (8,5%)	Desconocido	3 (1,3%)
NOS/Indiferenciado	5 (2,2%)	Índice de comorbilidad de Charlson	
Carc. de célula pequeña	4 (1,8%)	1-2	10 (4,5%)
Otros	6 (2,7%)	3-4	26 (11,6%)
Supervivencia desde el diagnóstico (días)		5-8	62 (27,7%)
Media (DT)	453,0 (487,6)	>8	89 (39,3%)
Mediana (P25-P75)	308,5 (130-578,5)	Desconocido	37 (16,5%)

Figura 69 – Estudio del final de la vida: descripción de la cohorte de pacientes analizada.

Actividad asistencial al final de la vida

Tal y cómo se muestra en la Figura 70, comprobamos que 221 pacientes (98,6%) recibieron 12.382 asistencias ambulatorias, 193 (86,2%) recibieron 733 asistencias de urgencias y 187 (83,5%) 547 ingresos en hospitalización durante el periodo de estudio. Un total de 182 pacientes (82,3% de los 221 que recibieron asistencia ambulatoria) fueron atendidos ambulatoriamente en los últimos 30 días de vida, sumando 821 asistencias. Un 99,4% fueron indicadas desde el Hospital (frente a un 0,6% indicadas desde Atención Primaria). Un 52,8% de las asistencias fueron realizadas por Oncología Médica en el Hospital de Día Médico, siendo mayoritariamente consultas y administración de tratamientos ambulatorios (66,1%). En un 96,6% de las asistencias no hubo demora.

Asistencias ambulatorias	Total
Número de pacientes con asistencias ambulatorias	221 (100%)
Número de pacientes con asistencias en los últimos 30 días de vida	182 (82,3%)
Número de asistencias ambulatorias	12.382 (100%)
Número de asistencias ambulatorias en los últimos 30 días de vida	821 (6,6%)
Número de asistencias ambulatorias en los últimos 30 días de vida	
Procedencia	
Servicio propio centro	816 (99,4%)
Atención primaria	5 (0,6%)
Servicio de procedencia	
ONCOLOGÍA MÉDICA	517 (63,0%)
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	144 (17,5%)
NEUMOLOGÍA	29 (3,5%)
UNIDAD DEL DOLOR	27 (3,3%)
CIRUGÍA TORÁCICA	18 (2,2%)
CARDIOLOGÍA	15 (1,8%)
MEDICINA INTENSIVA	10 (1,2%)
OTROS	61 (7,4%)
Servicio realizador	
ONCOLOGÍA MÉDICA	305 (37,1%)
HOSPITAL DE DÍA MÉDICO	129 (15,7%)
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	124 (15,1%)
RADIO DIAGNÓSTICO	78 (9,5%)
NEUMOLOGÍA	44 (5,4%)
UNIDAD DEL DOLOR	27 (3,3%)
TRABAJO SOCIAL	23 (2,8%)
CARDIOLOGÍA	19 (2,3%)
MEDICINA NUCLEAR	12 (1,5%)
OTROS	60 (7,3%)
Tipo de asistencia	
CONSULTA	493 (60,0%)
PRUEBAS DE IMAGEN	105 (12,8%)
ANALÍTICA	81 (9,9%)
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO	50 (6,1%)
BRONCOSCOPIA	27 (3,3%)
TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO	11 (1,3%)
OTROS CUIDADOS/PROCEDIMIENTOS	40 (4,9%)
OTRAS PRUEBAS	14 (1,7%)
Tipo de demora	
Sin demora	793 (96,6%)
Motivos institucionales	19 (2,3%)
Solicitud de paciente	9 (1,1%)

Figura 70 - Estudio del final de la vida: descripción de las asistencias ambulatorias realizadas.

En lo relativo a urgencias (Figura 71), 131 pacientes (67,9% de los 193 pacientes que recibieron asistencias en urgencias) fueron atendidos de forma urgente en los últimos 30 días de vida,

sumando 171 urgencias. En un 57,9% de estas asistencias el paciente acudió por sus propios medios, y en un 97,7% no fue derivado desde Atención Primaria. En un 88,4% de las asistencias el nivel de gravedad de triaje fue igual o superior a 3 en la escala Manchester. Un 84,8% de las asistencias se produjeron en los turnos de mañana o tarde, y en un 61,4% se expresó mal estado general, disnea o dolor. En un 69,6% de los casos los pacientes ingresaron en hospitalización, y en un 24,6% fueron dados de alta a domicilio. Se registraron 4 fallecimientos en urgencias (2,3%).

Asistencias en urgencias	Total
Número de pacientes con asistencias en urgencias	193 (100%)
Número de pacientes con asistencias en los últimos 30 días de vida	131 (67,9%)
Número de pacientes con asistencias en los últimos 14 días de vida	91 (47,1%)
Número de asistencias en urgencias	733 (100%)
Número de asistencias en los últimos 30 días de vida	171 (23,3%)
Número de asistencias en los últimos 14 días de vida	101 (13,8%)
Número de asistencias en los últimos 30 días de vida	
Vía de llegada	
Propios medios	99 (57,9%)
Ambulancia	72 (42,1%)
Nivel de gravedad en triaje	
1 CRITICO - 0 min	2 (1,7%)
2 EMERGENCIA - 10 min	38 (31,7%)
3 URGENCIA - 60 min	66 (55,0%)
4 ESTANDAR - 120 min	13 (10,8%)
5 NO URGENTE- 240 min	1 (0,8%)
Motivo de asistencia (agrupado)	
Adulto con mal estado general (MEG)	48 (28,1%)
Disnea	44 (25,7%)
Dolor	13 (7,6%)
Cefalea	2 (1,2%)
Problemas en las extremidades	2 (1,2%)
Diarrea	1 (0,6%)
Mareo, lipotimia, síncope	1 (0,6%)
Problemas oculares	1 (0,6%)
Otros	59 (34,5%)
Tipo de día de ingreso	
Laborable	122 (71,3%)
Festivo	49 (28,7%)
Turno del ingreso	
MAÑANA	86 (50,3%)
TARDE	59 (34,5%)
NOCHE	26 (15,2%)
Derivación desde Atención Primaria	
No	167 (97,7%)
Sí	4 (2,3%)
Destino al alta (motivo)	
Hospitalización	119 (69,6%)
Alta clínica	42 (24,6%)
Traslado a Hosp de Apoyo	5 (2,9%)
Fallecimiento	4 (2,3%)
Alta voluntaria comunicada	1 (0,6%)

Figura 71 - Estudio del final de la vida: descripción de las asistencias en urgencias realizadas.

Por último, dado que sólo disponemos de datos de ingresos correspondientes a los años 2009 a 2014, seleccionamos 163 pacientes de la cohorte completa de 224 pacientes que fallecieron hasta el 31/12/2014. Tal y cómo se muestra en la Figura 72, obtenemos 159 pacientes que tuvieron algún ingreso en hospitalización (97,5%), de los cuales 139 (87,4%) ingresaron en los últimos 30 días de vida, sumando 94 ingresos con una estancia media de 8,2 días (IC95% 6,9 – 9,6). En 3 ingresos el paciente ingresó en la UCI (3,2%). En un 86,2% en ingreso fue urgente y en un 12,8% de los casos se produjo un ingreso programado. Fallecieron durante el ingreso 57 pacientes (67,1% de los 85 pacientes que ingresaron en los últimos 30 días, y un 35% del total de pacientes de la cohorte).

Ingresos en hospitalización	Total
Número total de pacientes con ingreso en hospitalización	187 (100%)
Número de pacientes con ingreso en hospitalización (fallecidos hasta 31/12/2014)	159 (100%)
Número de pacientes con ingreso en los últimos 6 meses de vida	139 (87,4%)
Número de pacientes con ingreso en los últimos 30 días de vida	85 (53,5%)
Éxitus durante la hospitalización	61 (38,4%)
Número total de ingresos en hospitalización	547 (100%)
Número de ingresos en hospitalización (pacientes fallecidos hasta 31/12/2014)	465 (100%)
Número de ingresos en los últimos 6 meses de vida	264 (56,8%)
Número de ingresos en los últimos 30 días de vida	94 (20,2%)
Número de ingresos en UCI (incluyendo traslados internos)	9 (1,9%)
Número de ingresos en UCI (incluyendo traslados internos) en los últimos 30 días de vida	3 (3,2%)
Número de ingresos en los últimos 30 días de vida	
Procedencia	
Urgencias	79 (86,8%)
Consultas (incluyendo las de Pruebas Diagnósticas y/o terapéuticas)	6 (6,6%)
Lista de Espera Quirúrgica	4 (4,4%)
Hospital de día	1 (1,1%)
Otro hospital	1 (1,1%)
Circunstancias del ingreso	
Urgente	81 (86,2%)
Programado	12 (12,8%)
Ingreso tras procedimiento ambulatorio	1 (1,1%)
Circunstancia del alta (destino al alta)	
Éxitus	57 (60,6%)
Domicilio	36 (38,3%)
Traslado a otro hospital	1 (1,1%)
GRD del episodio de hospitalización	
NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	35 (37,2%)
NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	9 (9,6%)
EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	8 (8,5%)
NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	4 (4,3%)
TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	2 (2,1%)
QUIMIOTERAPIA	2 (2,1%)
PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR	2 (2,1%)
FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	2 (2,1%)
SIGNOS & SINTOMAS CON CC	2 (2,1%)
NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	2 (2,1%)
OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	2 (2,1%)
OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	2 (2,1%)
OTROS	22 (23,4%)
Estancia (días)	
Media (DT)	8,2 (6,5)
Mediana (P25-P75)	6 (3-11)

Figura 72 - Estudio del final de la vida: descripción de los ingresos en hospitalización realizados.

Distribución temporal de las asistencias al final de la vida

La distribución temporal de las asistencias ambulatorias, urgencias e ingresos en hospitalización pueden consultarse en la Figura 73. En ella se representa, en el eje vertical, el número de asistencias, y en el eje horizontal, el número de días que transcurrieron desde la realización (o ingreso) hasta el fallecimiento del paciente (indicado como cero en la escala temporal de días hasta el fallecimiento). En las asistencias ambulatorias se observa un fuerte incremento de perfil lineal hacia el final de la vida, que se convierte en un incremento exponencial en urgencias y hospitalizaciones. En los últimos 180 días de vida, las asistencias ambulatorias muestran un perfil aproximadamente constante, incluso con un leve descenso a medida que se aproxima el fallecimiento. No es el caso del perfil de utilización de urgencias y hospitalización, que crece en los últimos días de vida.

Figura 73 - Estudio del final de la vida: distribución temporal de la asistencia sanitaria al final de la vida (días hasta el fallecimiento)

En la Figura 74 se representa gráficamente el conjunto de asistencias para todo el periodo de seguimiento de cada uno de los 224 pacientes de la cohorte. En ella se comprueba nuevamente

cómo la densidad de asistencia sanitaria a lo largo del tiempo se incrementa a medida que se aproxima el fallecimiento del paciente.

Figura 74 - Estudio del final de la vida: distribución temporal de la asistencia sanitaria al final de la vida (días hasta el fallecimiento).

Coste de las asistencias al final de la vida

Desde el punto de vista del coste de las asistencias sanitarias (Figura 75), comprobamos que un 58,1% de los costes de asistencia sanitaria (excluyendo medicación administrada ambulatoriamente) se producen en los últimos 6 meses de vida, y un 21,2% en los últimos 30

días. Los costes de los últimos 30 días suponen un 36,4% de los costes de los últimos 6 meses. Los costes de hospitalización en los últimos 6 meses de vida suponen un 90,5% de los costes totales (excluyendo medicación ambulatoria), siendo los costes de urgencias y consultas del 2,6% y 6,8% respectivamente.

Consultas Externas	Total asistencias	Total coste
Número de consultas externas realizadas	4.154 (100%)	330.576€ (100%)
Número de consultas externas realizadas en los últimos 6 meses de vida	1.779 (42,8%)	137.578€ (41,6%)
Número de consultas externas realizadas en los últimos 30 días de vida	322 (7,7%)	25.156€ (7,6%)
Urgencias	Total asistencias	Total coste
Número de asistencias en urgencias realizadas	449 (100%)	80.820€ (100%)
Número de urgencias realizadas en los últimos 6 meses de vida	294 (65,5%)	52.740€ (65,3%)
Número de urgencias realizadas en los últimos 30 días de vida	117 (26,0%)	21.060€ (26,1%)
Hospitalización	Total asistencias	Total coste
Número de ingresos en hospitalización	465 (100%)	3.050.124€ (100%)
Número de ingresos en los últimos 6 meses de vida	264 (56,8%)	1.820.120€ (59,7%)
Número de ingresos en los últimos 30 días de vida	94 (20,2%)	686.421€ (22,5%)
Totales	Total asistencias	Total coste
Total asistencias	5.068 (100%)	3.461.520€ (100%)
Total asistencias en los últimos 6 meses de vida	2.337 (46,1%)	2.010.438€ (58,1%)
Total asistencias en los últimos 30 días de vida	533 (10,5%)	732.637€ (21,2%)

Figura 75 - Estudio del final de la vida: Coste de las asistencias sanitarias (163 pacientes fallecidos a 31/12/2014).

Discusión

Nuestro estudio demuestra que la integración de datos clínicos con datos de actividad asistencial, y su análisis mediante metodologías como CRISP-DM, permite obtener nuevo conocimiento de interés para la gestión, lo que nos reafirma en la validación del marco de trabajo planteado. Nuevamente, y hasta dónde conocemos, es el primer estudio en España acerca del consumo de asistencias sanitarias y su coste en el periodo final de la vida en pacientes con cáncer de pulmón, en todos sus estadios. Un meta análisis publicado en 2014 (Langton *et al.*, 2014) identificó 14.424 artículos de los cuales revisó 835 e incluyó en su análisis 78 artículos. De estos, un 69% estaban referidos a cualquier tipo de cáncer, y sólo 6 se centraban en cáncer de pulmón, ninguno referido a datos en España.

La gestión de los pacientes al final de su vida constituye un aspecto clave de la asistencia prestada, tanto desde el punto de vista humano como económico. Según nuestros resultados, un 82% de los pacientes recibieron asistencias ambulatorias, un 68% asistencias urgentes y un 53% tuvieron algún ingreso hospitalario en los últimos 30 días de vida. Un 38% de los pacientes fallecieron durante su ingreso hospitalario, en línea con lo encontrado en un estudio de 7 países desarrollados (Bekelman *et al.*, 2016). Según este estudio, entre un 20,2% (en Estados Unidos) y un 54,1% (en Canadá) de los pacientes con cáncer de pulmón, mayores de 65 años, fallecen en

el hospital. Entre un 45,3% (Países Bajos) y un 65,7% (Noruega) de los pacientes ingresan en hospitalización en los últimos 30 días de vida. De acuerdo a nuestros datos para los 163 pacientes fallecidos a fecha 31/12/2014 (de los que disponemos de toda su actividad asistencial), los costes de hospitalización suponen un 88% de los costes totales, siendo los costes de urgencias y consultas del 2,3% y 9,6% respectivamente. En un estudio brasileño publicado en 2017 (Knust *et al.*, 2017), de una cohorte de 277 pacientes, un 71,5% de los costes estuvieron relacionados con la atención ambulatoria y un 28,5% a los ingresos hospitalarios. En el ámbito ambulatorio, los costes de radioterapia supusieron un 34% y el tratamiento de quimioterapia un 22%. Nótese que en nuestro estudio no incorporamos los costes del tratamiento farmacológico ambulatorio. De acuerdo a otro estudio de 364 pacientes con cáncer de pulmón con mutación EGFR, en aquellos pacientes no tratados tras la progresión de la enfermedad un 90% de los costes correspondieron a la hospitalización (Skinner *et al.*, 2017). Nuestros resultados son similares además a los encontrados en otros estudios de referencia (Yabroff *et al.*, 2008) (Lang *et al.*, 2009).

Si nos centramos en el periodo final de la vida, observamos que el 58% de los costes de la asistencia (excluyendo medicación administrada ambulatoriamente) se producen en los últimos 6 meses de vida, y un 21% en los últimos 30 días. Los costes de los últimos 30 días suponen un 36% de los costes de los últimos 6 meses. Como hemos podido comprobar, y de forma consistente con (Langton *et al.*, 2014) y (Yabroff *et al.*, 2008), los costes crecen de forma exponencial hacia el final de la vida, siendo el coste de hospitalización el que más contribuye a la cifra total: un 90% de los costes en los últimos 6 meses de acuerdo a nuestros datos, en línea con (Langton *et al.*, 2014) (80%) y (Lang *et al.*, 2009) (85%, excluyendo igualmente la medicación ambulatoria). Observamos cómo la densidad de asistencias sanitarias a lo largo del tiempo se incrementa a medida que se aproxima el fallecimiento del paciente, con un crecimiento exponencial de las urgencias e ingresos en hospitalización en los últimos 180 días de vida del paciente, que sin embargo no se observa en las asistencias ambulatorias.

Entre las limitaciones del estudio, consideramos que la principal es la falta de datos relativos a la prescripción y administración de medicación ambulatoria y de tratamiento radioterápico. La integración de estos datos puede completar la visión integrada del coste de asistencia de estos pacientes en futuros estudios. Otras limitaciones encontradas tienen que ver con la calidad y completitud de los datos estructurados disponibles, así como en la variación en los estándares de codificación en el ámbito hospitalario. A pesar de ello, nuestro estudio ha permitido describir el consumo de asistencias sanitarias y su coste asociado en el periodo final de la vida para los pacientes de cáncer de pulmón en un hospital universitario de tercer nivel en España. En definitiva, consideramos que el análisis realizado aporta una información útil para la gestión y la mejora de la asistencia prestada a estos pacientes.

5.5.2. Otros resultados de la aplicación del marco de trabajo propuesto

5.5.2.1. Estructuración de la historia clínica electrónica mediante el concepto de proceso para la mejora de la calidad, seguridad y eficiencia asistencial

El resultado del trabajo de estructuración de la HCE, y específicamente en lo relativo al etiquetado de los procesos (ver capítulo 5.4.1.1), ha sido recogido en una comunicación presentada en el XV Congreso de Documentación Médica de la Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM) (CRUZ-BERMÚDEZ, JL MAXIMIANO *et al.*, 2017).

Se realizan descargas de datos relativas al uso del etiquetado de procesos en los meses de Enero y Febrero de 2016 (primer corte) y de Enero y Febrero de 2017 (segundo corte).

Análisis de datos del primer corte (Enero y Febrero de 2016)

En el análisis del primer corte, de 68.714 procesos generados entre el 1/1 y el 29/2, 878 fueron codificados (1,28%). Tomando los datos de los servicios piloto incorporados en esa fecha (Pediatría, Alergología, Oncología Médica), de 11.423 procesos creados (aproximadamente un 16,62% del total de procesos) se han codificado 784 (6,86%), en su mayoría en Urgencias Pediátricas (URGP: 610; 9,6% de sus procesos) y Oncología (ONC: 98; 12,6% de sus procesos). Es destacable que aproximadamente un 22% de los procesos generados en la Urgencia General se etiquetan en texto libre (unos 2.500 procesos), algo que supone un mayor esfuerzo que la selección de una etiqueta diagnóstica precargada en el sistema.

Análisis de datos del segundo corte (Enero y Febrero de 2017)

En el análisis del segundo corte, de 58.690 procesos generados entre el 1/1 y el 28/2, 1.895 fueron etiquetados (3,23%). En estas fechas todos los servicios piloto habían comenzado con el uso del estándar (Pediatría, Alergología, Oncología Médica, Psiquiatría y Urgencias Generales). De 23.022 procesos creados por estos servicios (un 39,23% del total de procesos) se etiquetaron 1.570 (6,82%).

Indicador	1º corte (2016)	2º corte (2017)	% Variación
Procesos creados	68.714	58.690	-14,59%

Procesos creados (servicios piloto)	11.423	23.022	101,54%
Procesos etiquetados	878	1.895	115,83%
Procesos etiquetados (servicios piloto)	784	1.570	100,26%
% de procesos etiquetados	1,28%	3,23%	152,69%
% de procesos etiquetados (servicios piloto)	6,86%	6,82%	-0,64%

Figura 76 – Estructuración de procesos en la HCE: datos de procesos creados y etiquetados.

El desglose de estos procesos etiquetados por Servicio o Sección (en volumen y porcentaje de los procesos generados por dichos Servicios o Secciones) puede verse en las siguientes figuras.

SERVICIO/SECCIÓN	% ETIQUETADO	VOLUMEN ETIQUETADO
ALG	1,5%	14
ALGI	0,0%	0
CSMM	0,0%	0
MIV	6,5%	2
NEO	7,4%	35
NEOUCI	88,9%	8
NRL	0,1%	2
ONC	25,0%	134
PED	11,1%	35
PEDCAR	0,0%	0
PEDEND	13,3%	15
PEDGAS	17,2%	28
PEDNEF	21,4%	9
PEDNML	3,9%	4
PEDNRL	0,0%	0
PEDREU	0,0%	0
PSQ	3,8%	17
PSQUPED	0,0%	0
URGG	7,2%	686
URGGIN	0,0%	0
URGOB	0,0%	0
URGP	11,4%	581
TOTAL		1570

Figura 77 - Estructuración de procesos en la HCE: volumen de procesos etiquetados y porcentaje del total de procesos creados por servicio y sección hospitalaria.

Analizando el volumen de procesos generados por los todos los servicios en el periodo obtenemos los siguientes datos:

4	URGG	9581	16,32%
	URGP	5104	8,70%
	TRA	4410	7,51%
	OFT	3734	6,36%
10	ORL	2168	3,69%
	GIN	1978	3,37%
	DER	1965	3,35%
	CGD	1893	3,23%
	DIG	1885	3,21%
	NRL	1379	2,35%
	URGOB	1340	2,28%
	CAR	1336	2,28%
	OBS	1280	2,18%
	MIR	1280	2,18%
	BIO	1012	1,72%
	URO	1007	1,72%
	TRAUPED	985	1,68%
	ALG	961	1,64%
	END	942	1,61%
	CSMM	925	1,58%
	NML	917	1,56%
	NRC	859	1,46%
	REU	838	1,43%
	URGGIN	813	1,39%
	CMF	645	1,10%
	REH	637	1,09%
	OFTP	629	1,07%
	AP	602	1,03%
	ONC	536	0,91%
	NEO	476	0,81%
	PSQ	452	0,77%
	FIS	394	0,67%
	MNU	380	0,65%
	NEF	376	0,64%
	ONR	319	0,54%
	PED	316	0,54%
	ORLP	313	0,53%
	HEM	289	0,49%
	PEDNRL	234	0,40%
	TSO	231	0,39%
	PEDCAR	224	0,38%
	DERP	190	0,32%

Figura 78 - Estructuración de procesos en la HCE: servicios con mayor volumen de procesos etiquetados (porcentaje sobre el total de procesos etiquetados).

Puede observarse cómo 42 Servicios o Secciones crean el 95% de los procesos. De estos, 4 Servicios o Secciones crean casi el 40% de los procesos. Los 10 siguientes Servicios o Secciones crean casi un 30% de los procesos. Los esfuerzos de implantación del estándar deben focalizarse por tanto en dichos servicios.

Atendiendo al ámbito, se observa que en hospitalización se etiqueta una mayor proporción de procesos (7,1%), seguido de urgencias (5,4%) y consultas externas (1,5%).

Figura 79 - Estructuración de procesos en la HCE: porcentaje de procesos etiquetados por ámbito asistencial hospitalario.

A través del análisis de las etiquetas empleadas en las Urgencias Pediátricas (URGP), se identifican algunas de las principales dificultades en el uso del estándar:

- Escritura manual de una etiqueta ya existente, y que por tanto podría haber sido seleccionada, lo que implica una falta de formación en el estándar, la realización de un trabajo extra innecesario y la aparición de distintas etiquetas para un mismo diagnóstico.
- Escritura manual de una etiqueta inexistente en el catálogo, lo que puede implicar la necesidad de incluirla como nuevo diagnóstico para que pueda ser seleccionada.
- Falta de motivación para el uso del estándar, objetivado por el bajo porcentaje del total de procesos generados por cada Servicio o Sección. Para fomentar la motivación se plantea ilustrar mediante casos de estudio concretos la utilidad de este estándar, más allá de la mejora en el acceso a la información por parte de los usuarios de la HCE.

La distribución de etiquetas más usadas en URGP fue la siguiente, en la que 20 patologías suponen el 85% de los procesos atendidos en URGP:

ID_UBICACION_PROCE	URG	
CODIFICADO	S	
SERVICIO	URGP	
Datos		
DESCRIPCION_PROCES	Cuenta de CODIFICADO	Cuenta de CODIFICADO2
PED URG Infección aguda de las vías respiratorias superiores	22,13%	127
PED URG Faringoamigdalitis aguda	7,49%	43
PED URG Dolor abdominal	6,97%	40
PED URG Diarrea/gastroenteritis aguda	6,45%	37
PED URG Otitis media	5,57%	32
PED URG Vómitos	5,23%	30
PED URG Síndrome febril	4,70%	27
PED URG Asma/broncospasmo	3,83%	22
PED URG Exantema inespecífico	3,14%	18
PED URG OTALGIA	2,79%	16
PED URG Laringitis/crup	2,79%	16
PED URG Bronquiolitis	2,26%	13
PED URG Trauma craneal/contusión craneal	2,26%	13
PED URG Urticaria	2,26%	13
PED URG Conjuntivitis	1,92%	11
PED URG Cefalea	1,74%	10
PED URG Irritabilidad/Nerviosismo	1,22%	7
PED URG Tos	1,22%	7
PED URG Estreñimiento	0,87%	5
PED URG Convulsión	0,70%	4

Figura 80 - Estructuración de procesos en la HCE: etiquetas más frecuentes en las Urgencias Pediátricas.

La distribución de etiquetas más usadas en Urgencias Generales (URGG) fue la siguiente, en la que 22 patologías suponen el 50% de los procesos atendidos en URGG:

ID_UBICACION_PROCE	URG	
CODIFICADO	S	
SERVICIO	URGG	
Datos		
DESCRIPCION_PROCES	Cuenta de CODIFICADO	Cuenta de CODIFICADO2
URGG Gastroenteritis aguda (GEA)	4,44%	26
URGG TCE no complicado	3,75%	22
URGG Lumbalgia mecánica	3,58%	21
URGG Viriasis	3,58%	21
URGG Dolor torácico atípico	3,58%	21
URGG CRU	3,41%	20
URGG Infección del tracto respiratorio alto	3,07%	18
URGG Bronquitis	2,22%	13
URGG Dolor abdominal inespecífico	2,05%	12
URGG Infección del tracto urinario (ITU)	2,05%	12
URGG Dolor de características osteomusculares	1,88%	11
URGG Neumonía	1,88%	11
URGG Cefalea	1,71%	10
URGG Mareo inespecífico	1,71%	10
URGG Hematuria	1,71%	10
URGG Traumatismo torácico	1,54%	9
URGG Cervicalgia mecánica	1,54%	9
URGG Fiebre sin foco	1,37%	8
URGG Otros diagnósticos	1,37%	8
URGG Insuficiencia cardiaca congestiva	1,37%	8
URGG Agudización de EPOC (AEPOC)	1,37%	8
URGG Ansiedad	1,37%	8

Figura 81 - Estructuración de procesos en la HCE: etiquetas más frecuentes en las Urgencias Generales.

Con el fin de impulsar el etiquetado de los procesos se realiza un análisis que pueda demostrar una utilidad del etiquetado más allá de la propia ordenación visual de la HCE. En concreto se propone como primera aproximación estudiar el etiquetado de los procesos en Urgencias Generales (URGG) y específicamente la petición de pruebas radiológicas (TC CEREBRO) en pacientes con procesos etiquetados como Cefalea o Migraña.

* Datos correspondientes a todos los procesos etiquetados hasta fecha del análisis con "URGG Cefalea" y "URGG Migraña"

Figura 82 - Estructuración de procesos en la HCE: Porcentaje de procesos de migraña o cefalea etiquetados en las Urgencias Generales con peticiones de TC de Cerebro.

Del análisis realizado se observa que en un 40% de las Migrañas/Cefaleas etiquetadas se solicita TC CEREBRO, en un 12% se realizan otras peticiones de pruebas y en un 48% no se realizan peticiones de pruebas complementarias.

Analizando la estancia media en Urgencias para estos procesos, se observa que los procesos con TC CEREBRO tienen una estancia media de 4,27h mientras que los procesos sin peticiones tienen una estancia media de 3,28h.

Conclusiones

Como conclusiones, podemos plantear las siguientes:

- Una adecuada estructuración de los contenidos de la HCE es fundamental, tanto para facilitar el acceso de los profesionales al contenido clínico buscado de una forma ágil y sencilla como para facilitar el análisis de la actividad realizada en ámbitos que típicamente no son codificados al alta, como urgencias o consultas externas.
- Es necesario identificar servicios piloto que tengan un interés real en mejorar la organización de la HCE, tanto en su propio beneficio como en beneficio del resto de los servicios y por ende en beneficio del paciente. Es conveniente seleccionar los servicios de acuerdo al volumen de procesos generados para maximizar el coste / beneficio de la implantación, impartir formación en distintos momentos temporales, y realizar un seguimiento continuado del uso del etiquetado de los procesos.
- A pesar de los esfuerzos realizados en el proceso de implantación del proyecto, el porcentaje de etiquetado de los procesos sigue sin ser óptimo. Es necesario incidir en la formación, particularmente de los residentes, y apoyar el proceso demostrando la utilidad del estándar para el análisis de la actividad, la mejora asistencial y la generación de hipótesis de investigación.
- La estructuración manual de contenidos es un proceso que requiere un cierto esfuerzo adicional por parte de los profesionales, lo que lastra sus posibilidades de éxito. Es necesario apostar por sistemas automáticos de estructuración basados en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (NLP) e inteligencia artificial (AI). Este hecho nos permite validar el planteamiento realizado en nuestro marco de trabajo, sugiriendo que la estructuración de un elevado número de variables en la HCE es inviable en la práctica, salvo que se tenga un interés muy específico por parte de un profesional o grupo de profesionales (por ejemplo, para la realización de una investigación concreta).

5.5.2.2. Perfil de los pacientes de cáncer de pulmón usuarios del servicio de atención telefónica del Servicio de Oncología Médica del HUPHM

Con el fin de probar la arquitectura para el procesamiento del texto libre implementada (ver capítulo 5.4.1.2) se planteó aplicarla al análisis de las características de los pacientes de cáncer de pulmón del Servicio de Oncología Médica del HUPHM que habían utilizado el servicio de atención telefónica. Se analizaron datos correspondientes a 64 de estos pacientes, y de las llamadas realizadas entre abril de 2015 y marzo de 2016. Se obtuvieron de la HCE un total de 2137 textos, de los cuales 1160 fueron notas clínicas (entre 1 y 76 por paciente, con una media de 18 y una moda de 3) y 977 fueron informes clínicos (entre 1 y 60 por paciente, con una media de 15 y una moda de 4). Esta investigación fue publicada como artículo en la revista Journal of Medical Systems (Menasalvas Ruiz *et al.*, 2018). Un ejemplo de informe clínico en texto libre puede observarse en la siguiente figura:

FECHA INGRESO: 07/02/2016 15:45
FECHA ALTA: 14/02/2016
MÉDICO RESPONSABLE INFORME: Dr. [REDACTED] (Médico Adjunto). Dra. [REDACTED] (Médico Residente)
Motivo de Ingreso:
 Disnea y fiebre.

Antecedentes Personales
 NO alergias medicamentosas conocidas.
 - No HTA, no DM, no DL.
 - Ex fumadora desde dice/2011 de 40 cigarrillos / día; exADVP desde el 1999 de heroína y cocaína (VIH negativo).
 - VHC con carga indetectable.
 - IOx: muelas y quiste mandibular, amigdalectomía.
 - Tratamiento habitual: ninguno.

Antecedentes Familiares:
 - Padre fallecido por ca. pulmón con 46 años.

HISTORIA ONCOLÓGICA:
 Varón de [REDACTED] años diagnosticado de Adenocarcinoma de pulmón tras hallar Rx de Tórax de preoperatorio de Cirugía bucal lesión sospechosa. En un año había presentado varios episodios de bronquitis que ha precisado tratar con antibiótica. Se han realizado hasta ahora las siguientes pruebas complementarias:
 - Rx tórax (solo informe): opacidad mediastínica inferior derecha. Fibrobroncoscopia ([REDACTED]): Masa endobronquial en el bronquio lobar inferior. Informe Anatomía Patológica:
 ASPIRADO BRONQUIAL : Citología SOSPECHOSA para células malignas BIOPSIA por broncoscopia BRONCOSCOPÍA: Sin hallazgos concluyentes. En la muestra remitida se incluyen fragmentos de material vegetal

Figura 83 – Aplicación de la arquitectura NLP: Ejemplo de contenido de un informe clínico.

La extracción de variables del texto como el hábito tabáquico, el tratamiento mediante inhibidores TKI, la edad al diagnóstico, el ECOG-PS, junto con el resto de variables ya estructuradas en origen (como el código postal de residencia del paciente), permitió realizar un análisis descriptivo de la población llamante de pacientes con cáncer de pulmón. Así, mostramos en la siguiente figura las distintas relaciones entre pacientes llamantes y no llamantes de acuerdo a su código postal de residencia:

Figura 84 - Aplicación de la arquitectura NLP: Distribución geográfica de la relación entre pacientes llamantes y no llamantes.

Más allá de los resultados de interés clínico obtenidos, que pueden consultarse en su totalidad en la publicación mencionada (Menasalvas Ruiz *et al.*, 2018), como conclusión principal podemos indicar que la arquitectura NLP planteada puede tener utilidad para la estructuración de contenido clínico obtenido de la HCE, habilitando posteriores análisis de interés clínico y de gestión de acuerdo al marco de trabajo planteado.

5.5.2.3. *Potenciación de la investigación clínica y traslacional oncológica a través de la integración y depuración de datos clínicos*

La implementación descrita del bloque funcional correspondiente al registro de casos de cáncer de pulmón ha permitido obtener distintos resultados de interés clínico durante la realización de este trabajo de tesis. Si bien estos resultados podrían haber sido obtenidos sin la implementación de este bloque funcional, su existencia facilitó enormemente la realización de estas investigaciones. Describimos brevemente a continuación los resultados obtenidos.

Cáncer de pulmón de células no pequeñas: análisis de las variaciones temporales e influencia real de los nuevos tratamientos en la supervivencia de los pacientes

El trabajo de consolidación de bases de datos de investigación descrito en el capítulo 5.4.2 permitió disponer de datos clínicos de 550 pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) diagnosticados entre los años 2000 y 2013. A través de su identificación se pudo

acceder a las HCE para obtener, de una forma manual, el resto de variables requeridas en la investigación planteada, en especial en lo relativo al tratamiento recibido por los pacientes. El análisis realizado permitió caracterizar a esta población de pacientes, demostrando un incremento en los casos registrados en mujeres (llegando a un 26% de los casos en el periodo 2008-2013) así como unos superiores resultados en aquellos pacientes tratados con tratamientos dirigidos (inhibidores tirosinaquinasa o TKIs). Como conclusión, se identificaron variaciones temporales a lo largo de los últimos años en aspectos clave como la supervivencia de los pacientes, estableciendo variables relacionadas con dicha mejora en la supervivencia (como los nuevos tratamientos disponibles) a partir de datos del mundo real.

Este trabajo fue aceptado como poster en la edición de 2016 del Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica (Díaz Campanero *et al.*, 2016).

Concordance between circulating tumor cells in ALK non-small-cell lung cancer and clinic status during follow-up

La disponibilidad de un registro unificado de los pacientes con cáncer de pulmón facilitó la realización de otras investigaciones, como la realizada para el estudio de la relación entre la existencia de células circulantes tumorales (CTCs) y la evolución clínica de pacientes con Cáncer de Pulmón No Célula Pequeña (CPNCP) mutados ALK, que fue publicada en la revista *Oncotarget* con el título "Concordance between circulating tumor cells in ALK non-small-cell lung cancer and clinic status during follow-up." (Provencio, Pérez-Callejo, *et al.*, 2017). Al igual que en el caso anterior, la disponibilidad de los datos clínicos básicos de los pacientes de CPNCP, estructurados y depurados, facilitó las tareas de análisis y la obtención del resto de variables clínicas necesarias, si bien este fue un proceso manual debido a la falta de estructuración de la HCE.

Dynamic circulating tumor dna quantification for the individualization of non small cell lung cancer patients treatment

Al igual que en el caso anterior, la disponibilidad del registro de casos permitió realizar una nueva investigación sobre otra sub población de pacientes con CPNCP. Así, se realizó una nueva publicación en la revista *Oncotarget* con el título "Dynamic circulating tumor dna quantification for the individualization of non small cell lung cancer patients treatment." (Provencio, Torrente, *et al.*, 2017) en la que se analizaba la correspondencia entre los niveles de DNA tumoral circulante a través de técnicas de biopsia líquida y los eventos clínicos observados en el seguimiento de los pacientes. El análisis integrado de los datos clínicos basales del paciente, junto con los datos del seguimiento y los datos procedentes de distintas biopsias líquidas a lo largo del seguimiento podrían facilitar a los profesionales una información valiosa en su rutina clínica diaria para la toma de decisiones, no sólo en lo relativo al pronóstico, sino también en lo relativo al reajuste de dosis o la detección de interacciones entre otros aspectos. Estos

resultados, además de demostrar la utilidad de la existencia de un registro unificado de casos de cáncer de pulmón, apoyan la necesidad de disponer de registros longitudinales de eventos durante el seguimiento de los pacientes, tal y cómo se plantea en nuestro marco de trabajo.

5.5.2.4. Extensión del marco de trabajo planteado a otras especialidades médicas

El desarrollo de las tareas de este trabajo de tesis doctoral ha permitido participar, y en algún caso estimular, la realización de análisis de datos clínicos en otras especialidades médicas, aplicando elementos del marco de trabajo planteado. Así, podemos mencionar las siguientes investigaciones de interés para nuestro propósito:

Hematología

Se planteó el análisis del impacto de la infección por Citomegalovirus (CMV) en los resultados clínicos y el consumo de recursos asistenciales de los pacientes sometidos a trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos. Para ello se aplicó el marco de trabajo planteado, realizando una integración de datos clínicos preexistentes en un registro clínico del Servicio de Hematología con datos de actividad asistencial obtenidos de la HCE y un análisis a través de la adaptación de CRISP-DM planteada en este trabajo de tesis. Del análisis realizado se comprobó que la estancia hospitalaria de los pacientes que presentaban infección por CMV fue en media 30 días mayor que los pacientes no infectados, llegando hasta 40 días en media más en el caso de que los pacientes tuvieran dos infecciones recurrentes o más.

La investigación realizada fue aceptada como comunicación en distintos congresos relevantes del ámbito de la Hematología, como los siguientes:

- BMT Tandem Meeting, Salt Lake City, Utah, Febrero de 2018.
- 44th Annual Meeting of the EBMT, Lisbon, Marzo de 2018 (European Society for Blood and Marrow Transplantation, 2018).
- 28th ECCMID Congress, Madrid, Abril de 2018.
- 23th Congress of EHA, Madrid, Abril de 2018.

Nefrología

Se planteó el estudio del impacto del tratamiento sustitutivo renal (TSR) en la actividad hospitalaria. Dicha investigación produjo una publicación en la revista Nefrología (López-Sánchez *et al.*, 2019). Tal y cómo se indica en dicha publicación, si bien es conocido que “la enfermedad renal crónica tiene una alta prevalencia y coste, así como un mayor riesgo de ingreso” no se dispone de suficientes estudios para estimar su impacto. Para abordar esta

cuestión, se planteó un análisis de datos clínicos correspondiente a los 7 hospitales de tercer nivel de la Comunidad de Madrid. Se integraron datos de actividad hospitalaria (CMBD) de los años 2013 a 2015 junto con datos clínicos del Registro Madrileño de Enfermos Renales (REMER) para analizar la actividad hospitalaria del primer año de TSR de 767 pacientes. Nuevamente, más allá de los resultados clínicos de interés, que pueden consultarse en la mencionada publicación, la aproximación realizada, aplicando parcialmente el marco de trabajo planteado, demostró la viabilidad del mismo en el ámbito hospitalario más allá del ámbito oncológico.

Capítulo 6

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

6.1. CONCLUSIONES

Indicamos a continuación las conclusiones de nuestro trabajo:

1. La aplicación del marco de trabajo propuesto en el ámbito del cáncer de pulmón permite obtener nuevo conocimiento de interés clínico y para la gestión. En concreto:

1. El coste medio total por paciente al año, excluyendo medicación ambulatoria y radioterapia, ascendió a 16.406 euros, siendo un 10% atribuible a las asistencias ambulatorias, un 3% a las asistencias en urgencias y un 87% a los ingresos en hospitalización.
2. Observamos una tendencia creciente de la incidencia del cáncer de pulmón en mujeres desde 2003, de aproximadamente un 1.5% anual, de forma que manteniendo la tendencia se estima que en 2020 un 35% de los casos de cáncer de pulmón se darán en mujeres.
3. Los pacientes de nuestro estudio tienen una mediana de 36 asistencias ambulatorias por año de seguimiento, suponiendo las asistencias en Oncología Médica, y las prestaciones realizadas ambulatoriamente en hospital de día médico, un 50% de dichas asistencias.
4. Observamos una tendencia creciente en el número de consultas sucesivas de los pacientes estadio IV, con un incremento de 0,72 asistencias por paciente al año, lo que debería servir para informar decisiones relativas al dimensionamiento de las plantillas de oncólogos médicos en los centros.
5. El consumo de asistencias ambulatorias por año de seguimiento del paciente está relacionado directamente con el estadio del paciente al diagnóstico, con el

consumo de asistencias en urgencias del paciente, con la comorbilidad del paciente, con la existencia de antecedentes de cáncer en familiares de primer grado e inversamente con la edad al diagnóstico.

6. Un 74% de los pacientes acudieron al menos una vez a urgencias, con una mediana de 1,2 urgencias hospitalarias por año de seguimiento. Un 76,6% de las asistencias tuvieron un triaje urgente o muy urgente (niveles 1 a 3 de la escala Manchester), un 22,6% de las asistencias tuvieron un triaje menos urgente (nivel 4) y sólo un 0,8% tuvieron un triaje no urgente (nivel 5). Observamos relación entre el nivel de triaje y la existencia de un posterior ingreso de los pacientes. Sin embargo, un 30% de los casos con un triaje menos urgente acaban ingresando en hospitalización.
7. El consumo de asistencias en urgencias por año de seguimiento del paciente está relacionado directamente con el estadio del paciente al diagnóstico, con el número de ingresos hospitalarios por periodo de seguimiento, con la comorbilidad del paciente, con el valor del ECOG-PS del paciente al diagnóstico, con la edad al diagnóstico y con el número de urgencias en los 180 días previos al diagnóstico y el número de asistencias ambulatorias previas. Estos resultados son sugestivos de que la población mayor podría ser destinataria en mayor medida de acciones proactivas que permitieran evitar las asistencias en urgencias (con un seguimiento domiciliario, por ejemplo) y que la frecuentación en urgencias tras el diagnóstico puede depender en cierta medida de la historia previa del paciente en su consumo de asistencias sanitarias.
8. Un 55% de los pacientes tuvieron algún ingreso posterior a su diagnóstico de cáncer de pulmón en el periodo analizado, con una mediana de 1,35 ingresos por año de seguimiento. La mediana de días que transcurren desde el diagnóstico hasta el ingreso es de 80 días, y de 180 entre el alta y el fallecimiento.
9. Un 57% de los ingresos en hospitalización se producen desde urgencias, y resultan en fallecimiento en un 8% de casos. Para los estadios IV, las cifras se elevan a un 79% de ingresos desde urgencias y a un 16% de los ingresos que acaban en fallecimiento.

10. El número de ingresos en hospitalización por año de seguimiento del paciente está relacionado directamente con la comorbilidad del paciente y con el número de urgencias en los 180 días previos al diagnóstico. Observamos también que los pacientes nunca fumadores tienen un 40% menos ingresos que los pacientes exfumadores.
 11. En los últimos 30 días de vida un 82% de los pacientes recibieron asistencias ambulatorias, un 68% asistencias urgentes y un 53% tuvieron algún ingreso hospitalario. Un 61% de estos ingresos hospitalarios acaban con el fallecimiento del paciente.
 12. El 58% de los costes de la asistencia (excluyendo medicación administrada ambulatoriamente) se producen en los últimos 6 meses de vida, y un 21% en los últimos 30 días. Los costes de los últimos 30 días suponen un 36% de los costes de los últimos 6 meses. Los costes crecen de forma exponencial hacia el final de la vida, siendo el coste de hospitalización un 90% de los costes en los últimos 6 meses.
-
2. **A partir de las características actuales de volumen, variedad y velocidad de los datos observadas en el ámbito oncológico, no es requisito imprescindible disponer de una infraestructura Big Data para la realización de análisis de datos clínicos oncológicos que tengan utilidad clínica y de gestión.**
 3. **La implementación del marco de trabajo propuesto requiere de una aproximación multidisciplinar, con la participación de informáticos con dedicación a esta cuestión en la estructura organizativa del hospital, y de la implicación de clínicos y directivos.**
 4. **La comunicación efectiva y continuada entre el médico y el informático es imprescindible a lo largo de todo el proceso (elaboración, implantación y aplicación del marco de trabajo) para obtener resultados de utilidad clínica.**

Estas conclusiones se han obtenido a partir de la consecución de los objetivos planteados mediante las distintas tareas realizadas, que resumimos a continuación:

- 1. Se ha seleccionado el cáncer de pulmón como la patología oncológica sobre la que desarrollar un marco de trabajo y se ha analizado la situación actual de la gestión de los datos clínicos y su procesado.**
- 2. Se ha definido un marco de trabajo, adaptado específicamente al cáncer de pulmón, consistente en un modelo conceptual, una arquitectura funcional de alto nivel y un método común que establece procesos de trabajo y herramientas.**
 - a. La arquitectura planteada está integrada por cuatro bloques funcionales: HCE y su extensión en el ámbito oncológico (HCEO), Modelo de Datos Oncológico (MDO), Análisis de Datos Clínicos (ADC) y Soporte a la Decisión Clínica (SDC) que se relacionan entre sí a través del intercambio de datos y que pueden o no ser sistemas independientes en función de las características del mapa de sistemas de información disponibles en el hospital.
 - b. El método de trabajo común planteado consiste en la adaptación de la metodología CRISP-DM y de la consideración de los aspectos de seguridad y protección de datos personales requeridos por la normativa.
- 3. Se ha desarrollado e implementado el marco de trabajo en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.**
 - a. Se ha implantado un procedimiento para la estructuración de la HCE a través del concepto de proceso asistencial.
 - b. Se han desarrollado y probado herramientas para el procesado del lenguaje natural capaces de obtener variables estructuradas a partir del análisis de notas e informes clínicos en texto libre.
 - c. Se ha desarrollado e implantado en un entorno productivo el registro integrado de casos de cáncer de pulmón (REC), como parte del MDO. Se ha realizado una migración, depuración y consolidación de los registros preexistentes en este nuevo registro.
 - d. Se ha adaptado y aplicado la metodología CRISP-DM de forma iterativa, descargando e integrando datos clínicos procedentes del REC con datos de actividad asistencial procedentes de la HCE, generando variables derivadas, realizando un análisis descriptivo y visual y análisis univariantes y multivariantes.

4. Se ha aplicado el marco de trabajo previamente definido e implantado al estudio de la asistencia sanitaria del cáncer de pulmón en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, obteniendo resultados de interés clínico y de gestión que han permitido validar la utilidad del marco de trabajo.

- a. Se ha realizado un análisis del servicio de atención telefónica a pacientes oncológicos y de su frecuentación de urgencias.
- b. Se ha realizado un análisis del coste de la asistencia sanitaria de los pacientes con cáncer de pulmón.
- c. Se ha realizado un análisis del uso de la asistencia sanitaria de los pacientes con cáncer de pulmón.
- d. Se ha realizado un análisis del uso y coste de la asistencia sanitaria asociada a la fase final de la vida de pacientes de cáncer de pulmón.
- e. Se ha realizado un análisis del proyecto de estructuración de la historia clínica electrónica mediante el concepto de proceso.
- f. Se ha realizado un análisis del perfil de los pacientes de cáncer de pulmón usuarios del servicio de atención telefónica del Servicio de Oncología Médica del HUPHM.
- g. Se ha facilitado la realización de investigación clínica y traslacional oncológica a través de la integración y depuración de datos clínicos.
- h. Se ha participado en la aplicación del marco de trabajo planteado a otras especialidades médicas, en particular en el ámbito de la Hematología y la Nefrología.

Por tanto, podemos afirmar que todos los objetivos planteados en el presente trabajo de tesis se han alcanzado con éxito.

6.2. PROPUESTA DE LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

A pesar de haber conseguido alcanzar los objetivos propuestos, el trabajo desarrollado ha abierto otras líneas de investigación, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Avanzar en la integración fuentes de datos no tratadas en esta tesis, como la medicación prescrita y administrada ambulatoriamente, y en la estructuración y codificación de la información clínica generada en el ámbito de consultas y urgencias.
2. Elaborar y validar modelos predictivos y de soporte a la decisión sobre los datos integrados disponibles.
3. Implantar completamente el marco de trabajo propuesto en el conjunto de patologías oncológicas tratadas en el Servicio de Oncología Médica del HUPHM.
4. Extender el marco de trabajo a otras especialidades clínicas en el HUPHM y en otros centros del SNS.

Capítulo 7

BIBLIOGRAFÍA

Abernethy, A. P. *et al.* (2010) 'Rapid-learning system for cancer care', *Journal of Clinical Oncology*, 28(27), pp. 4268–4274. doi: 10.1200/JCO.2010.28.5478.

Agencia Española de Protección de Datos (2016) *Orientaciones y garantías en los procedimientos de ANONIMIZACIÓN de datos personales*. Available at: <https://www.aepd.es/media/guias/guia-orientaciones-procedimientos-anonimizacion.pdf>.

Agencia Española de Protección de Datos (2018a) *Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de los datos sujetas al RGPD*. Available at: <https://www.aepd.es/media/guias/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf>.

Agencia Española de Protección de Datos (2018b) *INFORME: 073667/2018*. Available at: <https://www.aepd.es/media/informes/2018-0046-investigacion-biomedica.pdf>.

Agencia Española de Protección de Datos (2019a) *LA K-ANONIMIDAD COMO MEDIDA DE LA PRIVACIDAD*. Available at: <https://www.aepd.es/media/notas-tecnicas/nota-tecnica-kanonimidad.pdf>.

Agencia Española de Protección de Datos (2019b) *LISTAS DE TIPOS DE TRATAMIENTOS DE DATOS QUE REQUIEREN EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS (art 35.4)*. Available at: <https://www.aepd.es/media/criterios/listas-dpia-es-35-4.pdf>.

Ahrberg, C. D. *et al.* (2016) 'Handheld real-time PCR device', *Lab Chip*, 16(3), pp. 586–592. doi: 10.1039/C5LC01415H.

ASCO (2017) *Systemic Therapy for Stage IV Non - Small - Cell Lung Non - Squamous Cell Carcinoma*, *American Society of Clinical Oncology Guidelines*. Available at: <https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/practice-and-guidelines/2017-NSCLC-NSCC-algorithm.pdf> (Accessed: 19 July 2018).

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (2019) *Dictamen en relació amb la consulta d'una associació de l'àmbit sanitari sobre diferents aspectes relacionats amb l'apartat 2 de la disposició addicional dissetena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de*. Available at: https://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/2019/Documents/ca_cns_2019_018.pdf.

Ayuso, D. and Grande, R. (2012) *La apertura de un hospital*. Ediciones Díaz de Santos. Available at: <http://www.editdiazdesantos.com/libros/ayuso-murillo-diego-la-apertura-de-un-hospital-L27001050301.html> (Accessed: 13 May 2019).

Baclawski, K. (2009) 'Journal of Statistical Software', 30(April), pp. 1–3.

Badía, X. *et al.* (2018) 'The burden of cancer in Spain', *Clinical and Translational Oncology*. Springer International Publishing, (0123456789), pp. 4–9. doi: 10.1007/s12094-018-1972-7.

Barbera, L. *et al.* (2015) 'Quality of end-of-life cancer care in Canada : a retrospective four-

province study using administrative health care data', 22(5), pp. 341–355.

Basch, E. and Schrag, D. (2019) 'The Evolving Uses of "Real-World" Data', *JAMA*. American Medical Association, 321(14), p. 1359. doi: 10.1001/jama.2019.4064.

BDVA (2019) *Innovation and Deployment Agenda for an AI PPP*. Available at: [http://www.bdva.eu/sites/default/files/AI_PPP_SRIDA-Consultation_Version-June_2019 - Online version.pdf](http://www.bdva.eu/sites/default/files/AI_PPP_SRIDA-Consultation_Version-June_2019_-_Online_version.pdf).

Becker, M. *et al.* (2019) 'Natural language processing of German clinical colorectal cancer notes for guideline-based treatment evaluation', *International Journal of Medical Informatics*. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2019.04.022.

Bekelman, J. E. *et al.* (2016) 'Comparison of Site of Death, Health Care Utilization, and Hospital Expenditures for Patients Dying With Cancer in 7 Developed Countries', *JAMA*, 315(3), p. 272. doi: 10.1001/jama.2015.18603.

Biden, J. J. (2016) 'Report of the Cancer Moonshot Task Force'. Available at: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/final_cancer_moonshot_task_force_report_1.pdf.

Boletín Oficial del Estado (2018) *Ley Orgánica 3/2018, Boletín Oficial del Estado*. Available at: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673>.

Boletín Oficial del Estado (1987) *Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud.*, Boe. Available at: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-9351-consolidado.pdf>.

Boletín Oficial del Estado (2010) 'Esquema Nacional de Seguridad - RD 3/2010, de 8 de enero', p. 51. Available at: <http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf>.

Bosetti, C. *et al.* (2012) 'Lung cancer mortality in European women: Trends and predictions', *Lung Cancer*. Elsevier Ireland Ltd, 78(3), pp. 171–178. doi: 10.1016/j.lungcan.2012.08.008.

Brierley, J., Gospodarowicz, M. K. (Mary K. . and Wittekind, C. (Christian) (2016) *TNM classification of malignant tumours*. Wiley. Available at: <https://www.wiley.com/en-gb/TNM+Classification+of+Malignant+Tumours%2C+8th+Edition-p-9781119263579> (Accessed: 29 April 2019).

Buchanan, N. S. (1980) 'Evolution of a Hospital Information System', *Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care*. American Medical Informatics Association, 1, p. 34. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2203735/?page=1> (Accessed: 14 May 2019).

Bush, G. W. (2004) *Transforming Health Care: The President's Health Information Technology Plan*. Available at: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/technology/economic_policy200404/chap3.html (Accessed: 18 September 2019).

Calabrese, F. *et al.* (2019) 'Are There New Biomarkers in Tissue and Liquid Biopsies for the Early Detection of Non-Small Cell Lung Cancer?', *Journal of Clinical Medicine*, 8(3), p. 414. doi: 10.3390/jcm8030414.

Canadian Cancer Society (2019) *Life after cancer treatment*. Available at: <http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-journey/life-after-cancer/?region=bc>

(Accessed: 18 September 2019).

Carcereny, E., España, P. and Provencio, M. (2004) 'Gemcitabine in multi-resistant non-Hodgkin lymphomas.', *Tumori*, 90(3), pp. 363–4. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15315323> (Accessed: 19 September 2019).

Castillo, L. (2017) *Best of Breed vs. Legacy Systems: Is One Better than the Other?*, *The Healthcare Guys*. Available at: <https://www.healthcareguys.com/2017/08/31/best-of-breed-vs-legacy-systems-is-one-better-than-the-other/> (Accessed: 18 September 2019).

Centro Criptológico Nacional (2018) 'Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2018'. Available at: <https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2835-ccn-cert-ia-09-18-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2018-1/file.html>.

Centro Criptológico Nacional (2017) *Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 804. ENS. Guía de implantación*. Available at: <https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/505-ccn-stic-804-medidas-de-implantacion-del-ens/file.html>.

Centro Criptológico Nacional (2018) *CCN-CERT IA-09/18 Ciberamenazas y Tendencias Edición 2018*. Available at: <https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/2835-ccn-cert-ia-09-18-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2018-1/file.html>.

Chamberlin, D. D. and Boyce, R. F. (1976) 'SEQUEL', in *Proceedings of the 1976 ACM SIGFIDET (now SIGMOD) workshop on Data description, access and control - FIDET '76*. New York, New York, USA: ACM Press, pp. 249–264. doi: 10.1145/800296.811515.

Chapman, P. et al. (2000) *CRISP-DM 1.0 Step-by-step data mining guide*. SPSS.

Charlson, M. E. et al. (1987) 'A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation.', *Journal of chronic diseases*, 40(5), pp. 373–83. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3558716> (Accessed: 8 February 2018).

Cheng, T.-Y. D. et al. (2016) 'The International Epidemiology of Lung Cancer: Latest Trends, Disparities, and Tumor Characteristics', *Journal of Thoracic Oncology*, 11(10), pp. 1653–1671. doi: 10.1016/j.jtho.2016.05.021.

Chico, V. (2018) 'The impact of the General Data Protection Regulation on health research', *British Medical Bulletin*, 128(1), pp. 109–118. doi: 10.1093/bmb/ldy038.

Clark, M. M. et al. (2019) 'Diagnosis of genetic diseases in seriously ill children by rapid whole-genome sequencing and automated phenotyping and interpretation', *Science Translational Medicine*, 11(489), p. eaat6177. doi: 10.1126/scitranslmed.aat6177.

Codd, E. and Codd, S. (1993) *Providing OLAP to User-Analysts*, E. F. Codd & Associates. Available at: <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Providing+OLAP+to+User-Analysts#1>.

Codd, E. F. (1970) 'A relational model of data for large shared data banks', *Communications of the ACM*. ACM, 13(6), pp. 377–387. doi: 10.1145/362384.362685.

Codd, E. F. and F., E. (1990) *The relational model for database management : version 2*. Addison-Wesley. Available at: <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=77708> (Accessed: 13 May 2019).

Cogliano, V. J. et al. (2010) 'Preventable exposures associated with human cancers', *Journal of the National Cancer Institute*, 103(24), pp. 1827–1839. doi: 10.1093/jnci/djr483.

Coletta, A. M. *et al.* (2019) 'Clinical factors associated with adherence to aerobic and resistance physical activity guidelines among cancer prevention patients and survivors', *PLOS ONE*. Edited by D. K. Ehlers, 14(8), p. e0220814. doi: 10.1371/journal.pone.0220814.

Collins, F. S. and Varmus, H. (2015) 'A New Initiative on Precision Medicine', *New England Journal of Medicine*. Massachusetts Medical Society, 372(9), pp. 793–795. doi: 10.1056/NEJMp1500523.

Comisión Europea (2018) *COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital*. Bruselas. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0233&from=es>.

Comunidad de Madrid (2013) 'Orden 731/2013, de 6 de septiembre, del Consejero de Sanidad, por la que se fijan los precios públicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza sanitaria de la Red de Centros de la Comunidad de Madrid. BOCM núm 215', *Bocm*, 215, pp. 8–30.

Comunidad de Madrid (2018) *Oficina de seguridad y centro de soporte especializado en el Área de seguridad de sistemas y tecnología de la información del Servicio Madrileño de Salud (OSSI-CERT), Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid*. Available at: http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354721491864 (Accessed: 18 September 2019).

Council of the European Union (2015) *Personalised medicine for patients – Council conclusions (7 December 2015)*. Available at: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15054-2015-INIT/en/pdf>.

CRUZ-BERMÚDEZ, JL MAXIMIANO, C. *et al.* (2017) 'Estructuración de la historia clínica electrónica mediante el concepto de proceso para la mejora de la calidad, seguridad y eficiencia asistencial', in *XV Congreso de Documentación Médica*. Valencia, España: Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM).

Cruz-Bermúdez, J. L. (2015) *Análisis de la información clínica: del hospital a la región, del presente al futuro, Sesión "Analítica de datos en salud para tableros de mando"*. HIMSS Chile. Available at: https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/5d24b716f856640024e320e100eb7d76_HIMSSChile2015_JuanLuisCruz.pdf (Accessed: 18 September 2019).

Cruz-Bermúdez, J. L., Parejo, Consuelo, *et al.* (2019) 'Aplicación de métodos y herramientas de la ciencia de datos para el análisis del coste de la asistencia sanitaria de los pacientes con cáncer de pulmón en un hospital universitario de tercer nivel en España', *Revista Española de Economía de la Salud*, 14(1), pp. 2–17.

Cruz-Bermúdez, J. L., Parejo, C., *et al.* (2019) 'Applying Data Science methods and tools to unveil healthcare use of lung cancer patients in a teaching hospital in Spain', *Clinical and Translational Oncology*. Springer International Publishing, pp. 1–10. doi: 10.1007/s12094-019-02074-2.

Dasu, T. and Johnson, T. (2003) *Exploratory data mining and data cleaning*. Wiley-Interscience. Available at: <https://www.wiley.com/en-us/Exploratory+Data+Mining+and+Data+Cleaning-p-9780471268512> (Accessed: 13 May 2019).

Departamento de Seguridad Nacional (2013) *Estrategia de Ciberseguridad Nacional*. Available

at: [https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/estrategia de ciberseguridad nacional.pdf](https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/estrategia%20de%20ciberseguridad%20nacional.pdf).

Department of Health & Social Care (2018) 'Securing cyber resilience in health and care Title: Securing cyber resilience in health and care: Progress update October 2018', (October). Available at: www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/.

Department of Homeland Security (2014) *Federal Information Security Modernization Act*. Available at: <https://www.dhs.gov/cisa/federal-information-security-modernization-act>.

Deyo, R. A., Cherkin, D. C. and Ciol, M. A. (1992) 'Adapting a clinical comorbidity index for use with ICD-9 administrative databases', *J Clin Epidemiol*, 45(10), pp. 613–619. doi: 10.1016/0895-4356(93)90104-9.

Díaz Campanero, P. *et al.* (2016) 'Análisis de las variaciones temporales e influencia real de los nuevos tratamientos en la supervivencia de los pacientes con carcinoma de pulmón de células no pequeñas.', in *Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)*. Madrid: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Driessen, E. J. *et al.* (2017) 'Trends in treatment and relative survival among Non-Small Cell Lung Cancer patients in the Netherlands (1990–2014): Disparities between younger and older patients', *Lung Cancer*, 108, pp. 198–204. doi: 10.1016/j.lungcan.2017.04.005.

Earle, B. C. C. *et al.* (2003) 'Identifying Potential Indicators of the Quality of End-of-Life Cancer Care From Administrative Data', 21(6), pp. 1133–1138. doi: 10.1200/JCO.2003.03.059.

ENISA (2017) *Smart Hospitals: Security and Resilience for Smart Health Service and Infrastructures*. doi: 10.2824/28801.

European Commission (2017) 'State of the Union 2017. Cybersecurity. Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity in Europe'. Available at: <http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3193/en/Cybersecurity.en.pdf>.

European Society for Blood and Marrow Transplantation (2018) 'The 44th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation: Physicians Poster Sessions', *Bone Marrow Transplantation*. doi: 10.1038/s41409-018-0320-4.

European Union (2014) *1 in 4 deaths caused by cancer in the EU28: Lung cancer main fatal cancer, Eurostat Newsrelease*. Available at: <http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-25112014-BP> (Accessed: 10 July 2018).

Expansión Economía Digital (2017) *La ciberseguridad representa el 22% del presupuesto TI de las empresas españolas*. Available at: <https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/12/08/5a27d24e268e3ed9598b45f7.html> (Accessed: 18 September 2019).

FDA (2018a) 'Framework for FDA's Real-World Evidence Program', *FDA framework*, (December). Available at: www.fda.gov.

FDA (2018b) *Press Announcements - FDA permits marketing of artificial intelligence-based device to detect certain diabetes-related eye problems*. Office of the Commissioner. Available at: <https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm604357.htm> (Accessed: 26 April 2019).

Ferlay, J. *et al.* (2013) *GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]*, International Agency for Research on Cancer. Available at: <http://globocan.iarc.fr> (Accessed: 13 January 2018).

Friedberg, M. W. *et al.* (2013) *Factors Affecting Physician Professional Satisfaction and Their Implications for Patient Care, Health Systems, and Health Policy*, RAND Corporation. doi: 10.1214/07-EJS057.

Fundación Instituto Roche (2019) *MAPA DE COMUNIDADES MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN EN ESPAÑA: MAPA DE COMUNIDADES*. Available at: https://www.institutoroche.es/static/pdfs/MPP_EN_ESPANA_MAPA_DE_CCAA.pdf.

García Cornejo, B. (2004) 'La experiencia en contabilidad de costes y en benchmarking del Sistema Nacional de Salud español. Balance de una década', *Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI*, 2(1), pp. 103–123. Available at: http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pidet_articulo=13059391&pidet_usuario=0&pcontactid=&pidet_revista=261&ty=121&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=261v2n1a13059391pdf001.pdf.

Gartner (2018) *Magic Quadrant for Operational Database Management Systems*. Available at: <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-5LPN68I&ct=181015&st=sb> (Accessed: 7 May 2019).

Gartner (2019) *Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics*. Available at: <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-672QQ8D&ct=190205&st=sb&elqTrackId=a7f0d777204d4672b4f926c472175ee3&elqaid=80645&elqat=2&source=:ow:lp:cpo::> (Accessed: 7 May 2019).

Government Printing Office (2015) *H.R. 2 — 114th Congress: Medicare Access and CHIP Reauthorization Act of 2015*. Available at: <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2> (Accessed: 23 May 2019).

Grupo Español para el estudio del Cáncer de Pulmón (GECP) (2017) *El GECP dibuja el primer mapa del cáncer de pulmón en España*. Available at: <https://www.gecp.org/el-gecp-dibuja-el-primer-mapa-del-cancer-de-pulmon-en-espana/> (Accessed: 18 September 2019).

Gyawali, B. (2018) 'Perspectives Art of medicine Does global oncology need artificial intelligence?', *Lancet Oncology*. Elsevier Ltd, 19(5), pp. 599–600. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30269-9.

Harris, P. A. *et al.* (2009) 'Research Electronic Data Capture (REDCap) - A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support', *Journal of Biomedical Informatics*, 42(2), pp. 377–381. doi: 10.1016/j.jbi.2008.08.010.Research.

Hayhurst, C. (2018) *Everything You Need to Know About SMART on FHIR*, HealthTech. Available at: <https://healthtechmagazine.net/article/2018/10/everything-you-need-know-about-smart-fhir-perfcon> (Accessed: 20 September 2019).

Healy, M. A., Thirumurthi, S. and You, Y. N. (2019) 'Screening high-risk populations for colon and rectal cancers', *Journal of Surgical Oncology*, p. js0.25648. doi: 10.1002/js0.25648.

Hewitt, M; Greenfield, S. S. E. (2015) *From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition*, *From Cancer Patient to Cancer Survivor*. Washington, D.C.: National Academies Press. doi: 10.17226/11468.

HIMSS (2017) *Electronic Medical Record Adoption Model*. Available at: <https://www.himssanalytics.org/emram> (Accessed: 18 September 2019).

HIMSS (2018) *2018 HIMSS Cybersecurity Survey*. Available at: https://www.himss.org/sites/himssorg/files/u132196/2018_HIMSS_Cybersecurity_Survey_Fin

al_Report.pdf.

Howson, C. *et al.* (2019) *Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms*, Gartner, Inc.

Hoyt, J. P. (2015) *European Hospitals EMRAM Maturity Overview*. CIO Summit 2015. Available at:

https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/0cf548ab2f4eaeafd0a6b4ce615f0399_Hoyt_Session_1_European_Hospitals_EMRAM_Maturity_Overview_CIOSummit.pdf.

IBM Corporation (2012) 'IBM SPSS Modeler 18 Modeling Nodes'. Available at: <ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/modeler/18.0/en/ModelerModelingNodes.pdf>.

Idoine, C., Howson, C. and Sallam, R. (2017) *Augmented Analytics Is the Future of Data and Analytics*, Gartner, Inc. Available at: <https://www.gartner.com/en/documents/3773164/augmented-analytics-is-the-future-of-data-and-analytics> (Accessed: 18 September 2019).

Ihaka, R. and Gentleman, R. (1996) 'R: A Language for Data Analysis and Graphics', *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 5(3), pp. 299–314. doi: 10.1080/10618600.1996.10474713.

Inmon, W. H. (2002) *Building the data warehouse*. J. Wiley. Available at: <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=560407> (Accessed: 28 May 2019).

Instituto Nacional de Estadística (INE) (2017) *Indicadores Urbanos 2017. Nota de prensa*. Available at: http://www.ine.es/prensa/ua_2017.pdf.

Instituto Nacional de la Salud (2001) *GECLIF: Gestión clínico-financiera y coste por proceso*. Madrid.

Instituto Nacional del Cáncer (2015) *Estadificación del cáncer*. Available at: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/diagnostico-estadificacion/estadificacion> (Accessed: 6 March 2019).

Instituto Nacional del Cáncer (2019a) *¿Qué es el cáncer? - National Cancer Institute*. Available at: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/que-es> (Accessed: 6 March 2019).

Instituto Nacional del Cáncer (2019b) *Diccionario de cáncer: medicina personalizada de precisión*. Available at: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/medicina-personalizada> (Accessed: 26 April 2019).

International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) (2017) 'Lung cancer data collection. Measuring results that matter Social functioning'.

International Organization for Standardization (2016) *ISO/IEC 9075-1:2016 - Information technology -- Database languages -- SQL -- Part 1: Framework (SQL/Framework)*. Available at: <https://www.iso.org/standard/63555.html> (Accessed: 7 May 2019).

International Organization for Standardization (ISO) (2008) *ISO 13606-1:2008 Health informatics - Electronic health record communication - Part 1: Reference model*. Available at: <https://www.iso.org/standard/40784.html> (Accessed: 18 September 2019).

Jara González, E. *et al.* (2014) '¿puede la calidad del cuidado del paciente oncológico ser mejorada?: Resultados de la puesta en marcha de una línea de atención telefónica en la

enfermería oncológica', *Atencion Primaria*. SEGO, 46(9), pp. 524–525. doi: 10.1016/j.aprim.2014.03.003.

Jefatura del Estado Español (2002) *Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica*. Available at: <https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con>.

Kellermann, A. L. and Jones, S. S. (2013) 'What It Will Take to Achieve The As-Yet-Unfilled Promises of Health Information Technology', *Health Affairs*, 32(1), pp. 63–68. doi: 10.1377/hlthaff.2012.0693.

Khozin, S., Blumenthal, G. M. and Pazdur, R. (2017) 'Real-world Data for Clinical Evidence Generation in Oncology', *Journal of the National Cancer Institute*, 109(11), pp. 1359–1360. doi: 10.1093/jnci/djx187.

Kimball, R. and Ross, M. (2013) *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, Third Edition*. John Wiley & Sons, Inc.

KLAS (2019) *GLOBAL (NON-US) EMR MARKET SHARE 2019*. Available at: <https://klasresearch.com/report/global-non-us-emr-market-share-2019/1460> (Accessed: 15 August 2019).

Knust, R. E. *et al.* (2017) 'Estimated costs of advanced lung cancer care in a public reference hospital.', *Revista de saude publica*. Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública., 51, p. 53. doi: 10.1590/S1518-8787.2017051006665.

Kubben, P., Dumontier, M. and Dekker, A. (2019) *Fundamentals of Clinical Data Science, Fundamentals of Clinical Data Science*. Edited by P. Kubben, M. Dumontier, and A. Dekker. Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-99713-1.

De la Cruz, C. S., Tanoue, L. T. and Matthay, R. A. (2011) 'Lung cancer: epidemiology, etiology, and prevention.', *Clinics in chest medicine*. NIH Public Access, 32(4), pp. 605–44. doi: 10.1016/j.ccm.2011.09.001.

Lago, C. (2018) *150 years of Business Intelligence: A brief history*, *cio.com*. Available at: <https://www.cio.com/article/3290407/history-of-business-intelligence.html?page=2> (Accessed: 18 September 2019).

Landi, H. (2018) *Report: EHR market share shifting, Cerner continues to lead global market, Healthcare Innovation*. Available at: <https://www.hcinnovationgroup.com/clinical-it/news/13030225/report-ehr-market-share-shifting-cerner-continues-to-lead-global-market> (Accessed: 18 September 2019).

Lang, K. *et al.* (2009) 'Costs of first-line doublet chemotherapy and lifetime medical care in advanced non-small-cell lung cancer in the United States', *Value in Health*. International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), 12(4), pp. 481–488. doi: 10.1111/j.1524-4733.2008.00472.x.

Langton, J. M. *et al.* (2014) 'Retrospective studies of end-of-life resource utilization and costs in cancer care using health administrative data: A systematic review', *Palliative Medicine*, 28(10), pp. 1167–1196. doi: 10.1177/0269216314533813.

Langton, J. M. *et al.* (2016) 'Health service use and costs in the last 6 months of life in elderly decedents with a history of cancer: A comprehensive analysis from a health payer perspective', *British Journal of Cancer*. Nature Publishing Group, pp. 1293–1302. doi: 10.1038/bjc.2016.75.

- LeBlanc, T. W. and Abernethy, A. P. (2017) 'Patient-reported outcomes in cancer care — hearing the patient voice at greater volume', *Nature Reviews Clinical Oncology*, 14(12), pp. 763–772. doi: 10.1038/nrclinonc.2017.153.
- Leek, J. (2019) *Research quality data and research quality databases, simplystats*. Available at: <https://simplystatistics.org/2019/05/29/research-quality-data-and-research-quality-databases/> (Accessed: 18 September 2019).
- Levit, L. et al. (2013) *Delivering High-Quality Cancer Care: Charting a New Course for a System in Crisis., Challenges of an Aging Population; Board on Health Care Services; Institute of Medicine*. doi: 10.17226/18359.
- Lim, W. et al. (2018) 'The 8th lung cancer TNM classification and clinical staging system: review of the changes and clinical implications', *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery*, 8(7), pp. 709–718. doi: 10.21037/qims.2018.08.02.
- Lin, J. J. and Shaw, A. T. (2016) 'Resisting Resistance: Targeted Therapies in Lung Cancer', *Trends in Cancer*, 2(7), pp. 350–364. doi: 10.1016/j.trecan.2016.05.010.
- van der Linden, N. et al. (2016) 'Costs of non-small cell lung cancer in the Netherlands', *Lung Cancer*. Elsevier Ireland Ltd, 91(2016), pp. 79–88. doi: 10.1016/j.lungcan.2015.10.015.
- Liu, H., Lussier, Y. A. and Friedman, C. (2001) 'Disambiguating ambiguous biomedical terms in biomedical narrative text: an unsupervised method.', *Journal of biomedical informatics*, 34(4), pp. 249–61. doi: 10.1006/jbin.2001.1023.
- López-Sánchez, P. et al. (2019) 'Impacto del primer año de tratamiento sustitutivo renal en la hospitalización de una comunidad autónoma', *Nefrología*, (x x), pp. 1–11. doi: 10.1016/j.nefro.2019.01.004.
- Luengo-Fernandez, R. et al. (2013) 'Economic burden of cancer across the European Union: A population-based cost analysis', *The Lancet Oncology*. Elsevier Ltd, 14(12), pp. 1165–1174. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70442-X.
- Manser, R. et al. (2013) 'Screening for lung cancer Review', *Cochrane Database of Systematic Reviews* Screening, (6), p. 27. doi: 10.1002/14651858.CD001991.pub3.www.cochranelibrary.com.
- Manzano, J.-G. M. et al. (2014) 'Patterns and predictors of unplanned hospitalization in a population-based cohort of elderly patients with GI cancer.', *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology*. American Society of Clinical Oncology, 32(31), pp. 3527–33. doi: 10.1200/JCO.2014.55.3131.
- Marbán, O., Mariscal, G. and Segovia, J. (2012) 'A Data Mining & Knowledge Discovery Process Model', in *Data Mining and Knowledge Discovery in Real Life Applications*. I-Tech Education and Publishing. doi: 10.5772/6438.
- Massachusetts Medical Society (2016) *What Is Value-Based Healthcare?* Available at: <https://catalyst.nejm.org/what-is-value-based-healthcare/> (Accessed: 18 September 2019).
- Menasalvas-Ruiz, E. et al. (2017) 'OncoCall: Analyzing the Outcomes of the Oncology Telephone Patient Assistance', *Proceedings - IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems*, 2017-June, pp. 624–629. doi: 10.1109/CBMS.2017.103.
- Menasalvas Ruiz, E. et al. (2018) 'Profiling Lung Cancer Patients Using Electronic Health Records', *Journal of Medical Systems*. Journal of Medical Systems, 42(7), pp. 1–10. doi: 10.1007/s10916-

018-0975-9.

Meystre, S. *et al.* (2008) 'Extracting information from textual documents in the electronic health record: a review of recent research.', *IMIA Yearbook of Medical Informatics*, pp. 128–144. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.462.5779&rep=rep1&type=pdf>.

Ming, C. *et al.* (2019) 'Machine learning techniques for personalized breast cancer risk prediction: Comparison with the BCRAT and BOADICEA models', *Breast Cancer Research*. *Breast Cancer Research*, 21(1), pp. 1–11. doi: 10.1186/s13058-019-1158-4.

Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social (2019) *Registro de Altas de los Hospitales Generales del Sistema Nacional de Salud. CMBD. Norma Estatal de Años Anteriores*. Available at: <https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbdAnteriores.htm> (Accessed: 18 September 2019).

Ministerio de Sanidad, S. S. e I. (2015) *Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada*.

Molina, J. R. *et al.* (2008) 'Non-small cell lung cancer: epidemiology, risk factors, treatment, and survivorship.', *Mayo Clinic proceedings*. NIH Public Access, 83(5), pp. 584–94. doi: 10.4065/83.5.584.

Montouchet, C. *et al.* (2018) *The oncology data landscape in Europe: report*. Available at: <https://efpia.eu/media/412192/efpia-onco-data-landscape-1-report.pdf>.

Mooney, K. *et al.* (2017) 'Improving Cancer Care Through the Patient Experience: How to Use Patient-Reported Outcomes in Clinical Practice', *American Society of Clinical Oncology Educational Book*, 37, pp. 695–704. doi: 10.14694/edbk_175418.

Mouronte-Roibás, C. *et al.* (2018) 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Lung Cancer Patients: Prevalence, Underdiagnosis, and Clinical Characterization', *Respiration*. doi: 10.1159/000487243.

Murdoch, T. and Detsky, A. (2013) 'The inevitable application of big data to health care', *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 309(13), pp. 1351–1352. doi: 10.1001/jama.2013.393.

National Audit Office (2018) *Investigation: WannaCry cyber attack and the NHS*. Available at: <https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/Investigation-WannaCry-cyber-attack-and-the-NHS.pdf>.

National Research Council (2011) *Toward Precision Medicine: Building a Knowledge Network for Biomedical Research and a New Taxonomy of Disease*. Edited by The National Academies Press. Washington, DC. doi: 10.17226/13284.

Networked European Software and Services Initiative (NESSI) (2012) 'Big Data: A New World of Opportunities', (December), p. 25.

Oken, M. M. *et al.* (1982) 'Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group.', *American journal of clinical oncology*, 5(6), pp. 649–55. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7165009> (Accessed: 27 February 2018).

El País (1988) *El Insalud invertirá 2.500 millones para informatizar toda su red*, *El País*. Madrid. Available at: https://elpais.com/diario/1988/11/25/sociedad/596415613_850215.html (Accessed: 18 September 2019).

Pao, W. and Girard, N. (2011) 'New driver mutations in non-small-cell lung cancer', *The Lancet Oncology*. Elsevier Ltd, 12(2), pp. 175–180. doi: 10.1016/S1470-2045(10)70087-5.

Park, H. (2019) *The Death of Big Data and the Emergence of the Multi-Cloud Era*, *KDnuggets News*. Available at: <https://www.kdnuggets.com/2019/07/death-big-data-multi-cloud-era.html> (Accessed: 18 September 2019).

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2016a) *DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148>.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2016b) *Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la D*, *Diario Oficial de la Unión Europea*. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>.

Pérez, J. et al. (2015) 'A Data Preparation Methodology in Data Mining Applied to Mortality Population Databases', *Journal of Medical Systems*, 39(11), p. 152. doi: 10.1007/s10916-015-0312-5.

Piatetsky, G. (2018) *Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis*, *KDnuggets News*. Available at: <https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html> (Accessed: 18 September 2018).

Piñeros, M. et al. (2019) 'Essential TNM: a registry tool to reduce gaps in cancer staging information', *The Lancet Oncology*. International Agency for Research in Cancer. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved, 20(2), pp. e103–e111. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30897-0.

Ponencia de estudio sobre genómica (2019) *Sección cortes Generales. Boletín oficial de las Cortes Generales*. Available at: http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_341_2574.PDF.

Porter, M. E. (2010) 'What Is Value in Health Care?', *New England Journal of Medicine*. Massachusetts Medical Society, 363(26), pp. 2477–2481. doi: 10.1056/NEJMp1011024.

Porter, M. E., Larsson, S. and Lee, T. H. (2016) 'Standardizing Patient Outcomes Measurement.', *The New England journal of medicine*, 374(6), pp. 504–6. doi: 10.1056/NEJMp1511701.

Porter, M. E. and Teisberg, E. O. (2006) *Redefining health care : creating value-based competition on results*. Harvard Business School Press.

Project IASIS (2019) *IASIS. Big Data for Precision Medicine*. Available at: <http://project-iasis.eu/> (Accessed: 19 September 2019).

Provencio, M. et al. (1999) 'Comparison of the long-term mortality in Hodgkin's disease patients with that of the general population.', *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology*, 10(10), pp. 1199–205. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10586337> (Accessed: 29 December 2018).

Provencio, M. et al. (2003) 'The Management of Stage I-II Supradiaphragmatic Hodgkin's Disease with Chemotherapy Alone', *Leukemia & Lymphoma*, 44(2), pp. 263–268. doi: 10.1080/1042819021000035635.

Provencio, M. et al. (2004) 'Prognostic factors in Hodgkin's disease.', *Leukemia & lymphoma*,

45(6), pp. 1133–9. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15359992> (Accessed: 29 December 2018).

Provencio, Mariano *et al.* (2006) 'Association Between Hepatitis C Virus and Non-Hodgkin's Lymphomas', *Journal of Clinical Oncology*, 24(21), pp. 3513–3513. doi: 10.1200/JCO.2006.06.4329.

Provencio, M. *et al.* (2006) 'Rapid-infusion rituximab in lymphoma treatment', *Annals of Oncology*, 17(6), pp. 1027–1028. doi: 10.1093/annonc/mdj103.

Provencio, M. *et al.* (2008) 'Analysis of competing risks of causes of death and their variation over different time periods in Hodgkin's disease.', *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research*, 14(16), pp. 5300–5. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-07-0927.

Provencio, M., Pérez-Callejo, D., *et al.* (2017) 'Concordance between circulating tumor cells and clinical status during follow-up in anaplastic lymphoma kinase (ALK) non-small-cell lung cancer patients', *Oncotarget*, 8(35), pp. 59408–59416. doi: 10.18632/oncotarget.19722.

Provencio, M., Torrente, M., *et al.* (2017) 'Dynamic circulating tumor DNA quantification for the individualization of non-small-cell lung cancer patients treatment.', *Oncotarget*, 8(36), pp. 60291–60298. doi: 10.18632/oncotarget.20016.

Provencio, M., Carcereny, E., *et al.* (2019) 'Lung cancer in Spain : information from the Thoracic Tumors Registry (TTR study)', 8(4), pp. 461–475. doi: 10.21037/tlcr.2019.08.05.

Provencio, M., Pérez-Barrios, C., *et al.* (2019) 'Next-generation sequencing for tumor mutation quantification using liquid biopsies', *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 0(0). doi: 10.1515/cclm-2019-0745.

Provost & Fawcett (2013) *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*, *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Quan, H. *et al.* (2005) 'Coding algorithms for defining comorbidities in', *Medical Care*, 43(11), pp. 1130–1139.

Raghu, V. K. *et al.* (2019) 'Feasibility of lung cancer prediction from low-dose CT scan and smoking factors using causal models', *Thorax*, p. thoraxjnl-2018-212638. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-212638.

Rajkomar, A. *et al.* (2018) 'Scalable and accurate deep learning for electronic health records', *npj Digital Medicine*. Springer US, (March), pp. 1–10. doi: 10.1038/s41746-018-0029-1.

Recasens, M. and Martí, M. A. (2010) 'AnCorra-CO: Coreferentially annotated corpora for Spanish and Catalan', *Language Resources and Evaluation*. Springer Netherlands, 44(4), pp. 315–345. doi: 10.1007/s10579-009-9108-x.

Reeve, R. *et al.* (2018) 'Health care use and costs at the end of life: a comparison of elderly Australian decedents with and without a cancer history', *BMC Palliative Care*, 17(1), p. 1. doi: 10.1186/s12904-017-0213-0.

Rivo, E. *et al.* (2012) 'Cross-Industry Standard Process for data mining is applicable to the lung cancer surgery domain, improving decision making as well as knowledge and quality management', *Clinical and Translational Oncology*. Springer Milan, 14(1), pp. 73–79. doi: 10.1007/s12094-012-0764-8.

- Ruch, P., Baud, R. and Geissbühler, A. (2003) 'Using lexical disambiguation and named-entity recognition to improve spelling correction in the electronic patient record.', *Artificial intelligence in medicine*, 29(1–2), pp. 169–84. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12957786> (Accessed: 3 September 2019).
- Rudin, R. S., Bates, D. W. and MacRae, C. (2016) 'Accelerating Innovation in Health IT', *New England Journal of Medicine*, 375(9), pp. 815–817. doi: 10.1056/NEJMp1606884.
- Rueda, A. *et al.* (2008) 'R-CHOP-14 in patients with diffuse large B-cell lymphoma younger than 70 years: a multicentre, prospective study', *Hematological Oncology*, 26(1), pp. 27–32. doi: 10.1002/hon.829.
- Rumbold, J. M. M. and Pierscioneck, B. (2017) 'The Effect of the General Data Protection Regulation on Medical Research.', *Journal of medical Internet research*. JMIR Publications Inc., 19(2), p. e47. doi: 10.2196/jmir.7108.
- Rutherford, C. *et al.* (2019) 'Patient-reported outcomes as predictors of survival in patients with bowel cancer: a systematic review', *Quality of Life Research*. doi: 10.1007/s11136-019-02255-0.
- Schork, N. J. (2015) 'Personalized medicine: Time for one-person trials', *Nature*, 520(7549), pp. 609–611. doi: 10.1038/520609a.
- Scott, I. A. *et al.* (2018) 'Using EMR-enabled computerized decision support systems to reduce prescribing of potentially inappropriate medications: a narrative review', *Therapeutic Advances in Drug Safety*, 9(9), pp. 559–573. doi: 10.1177/2042098618784809.
- Scott Morton, M. S. (1971) *Management Decision Making. Computer based support for decision making*. Boston: Harvard University.
- Sennaar, K. (2019) *Chatbots for Healthcare – Comparing 5 Current Applications*, *Techemergence*. Available at: <https://emerj.com/ai-application-comparisons/chatbots-for-healthcare-comparison/> (Accessed: 26 April 2019).
- Serrano, P. *et al.* (2009) 'Utilidad de los arquetipos ISO 13606 para representar modelos clínicos detallados', *Revista de Salud.com*, 5(18).
- Sewell, J. and Thede, L. (2012) *Informatics and Nursing: Opportunities and Challenges*. 4th edn, Lippincott. 4th edn. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Available at: http://dlthede.net/informatics/chap01introni/healthcare_computers.html (Accessed: 14 May 2019).
- Shelton, R. (2018) *Avoiding the best of breed vs best in suite technology trap*, *MD Interconnect for Healthcare*. Available at: <https://www.mdinterconnect.com/business/avoiding-suite-technology-trap/>, <https://www.healthcareguys.com/2017/08/31/best-of-breed-vs-legacy-systems-is-one-better-than-the-other/> (Accessed: 18 September 2019).
- Singal, G. *et al.* (2019) 'Association of Patient Characteristics and Tumor Genomics With Clinical Outcomes Among Patients With Non–Small Cell Lung Cancer Using a Clinicogenomic Database', *JAMA*, 321(14), p. 1391. doi: 10.1001/jama.2019.3241.
- Sinsky, C. *et al.* (2016) 'Allocation of Physician Time in Ambulatory Practice: A Time and Motion Study in 4 Specialties', *Annals of Internal Medicine*. American College of Physicians, 165(11), p. 753. doi: 10.7326/M16-0961.
- Skinner, K. E. *et al.* (2017) 'Healthcare costs in patients with advanced non-small cell lung cancer and disease progression during targeted therapy: a real-world observational study', *Journal of*

- Medical Economics*. Informa UK Ltd., 0(0), pp. 1–9. doi: 10.1080/13696998.2017.1389744.
- Skinner, K. E. *et al.* (2018) 'Healthcare costs in patients with advanced non-small cell lung cancer and disease progression during targeted therapy: a real-world observational study.', *Journal of medical economics*, 21(2), pp. 192–200. doi: 10.1080/13696998.2017.1389744.
- Sledge, G. W. *et al.* (2013) 'Special Series : Quality Care Symposium Perspective ASCO ' s Approach to a Learning Health Care System in Oncology', pp. 145–148.
- Sledge, G. W., Miller, R. S. and Hauser, R. (2013) 'CancerLinQ and the Future of Cancer Care', *American Society of Clinical Oncology Educational Book*, 33, pp. 430–434. doi: 10.1200/EdBook_AM.2013.33.430.
- Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) (2018) 'Las cifras del cáncer en España en 2018.', *Sociedad Española de Oncología Médica*. doi: M-3161-2018.
- Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) (2019) *Valoración de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales en lo que hace al tratamiento de datos de salud*. Available at: <https://sespas.es/wp-content/uploads/2019/02/Valoración-nueva-LOPD-febrero-2019.pdf>.
- Somashekhar, S. P. *et al.* (2017) 'Early experience with IBM Watson for Oncology (WFO) cognitive computing system for lung and colorectal cancer treatment.', *Journal of Clinical Oncology*. American Society of Clinical Oncology, 35(15_suppl), pp. 8527–8527. doi: 10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.8527.
- Somashekhar, S. P. *et al.* (2018) 'Watson for Oncology and breast cancer treatment recommendations: agreement with an expert multidisciplinary tumor board', *Annals of Oncology*. Oxford University Press, 29(2), pp. 418–423. doi: 10.1093/annonc/mdx781.
- Sprague, R. H. J. (1980) 'A Framework for the Development of Decision Support Systems', *MIS Quarterly*, 4(4), pp. 1–26.
- Stagg, V., Stagg and Vicki (2017) 'CHARLSON: Stata module to calculate Charlson index of comorbidity'. Boston College Department of Economics. Available at: <https://econpapers.repec.org/software/bocbocode/s456719.htm> (Accessed: 8 February 2018).
- Tung, L. (2019) *R vs Python: R's out of top 20 programming languages despite boom in statistical jobs*, *ZDNet*. Available at: <https://www.zdnet.com/article/r-vs-python-rs-out-of-top-20-programming-languages-despite-boom-in-statistical-jobs/> (Accessed: 18 September 2019).
- U.S. Department of Health & Human Services (2009) *Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act*. Available at: <https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/privacy/hipaa/understanding/coveredentities/hitechact.pdf> (Accessed: 18 September 2019).
- U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights (2013) 'HIPAA Administrative Simplification'. Available at: <https://www.hhs.gov/sites/default/files/hipaa-simplification-201303.pdf>.
- U.S. Food and Drug Administration (2018) *CFR - Code of Federal Regulations Title 21*. Available at: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=11> (Accessed: 5 June 2018).
- USAID (2019) *Artificial Intelligence in Global Health: Defining a Collective Path Forward*. Available at: <https://rmportal.net/library/content/ai-in-global-health-defining-a-collective-path->

forward/at_download/file.

Vayr, F. *et al.* (2019) 'Lung cancer survivors and employment: A systematic review', *Lung Cancer*, 131, pp. 31–39. doi: 10.1016/j.lungcan.2019.03.010.

Vera-Llonch, M. *et al.* (2011) 'Healthcare costs in patients with metastatic lung cancer receiving chemotherapy.', *BMC health services research*. BioMed Central, 11, p. 305. doi: 10.1186/1472-6963-11-305.

Wilson, L. F. *et al.* (2018) 'How many cancer cases and deaths are potentially preventable? Estimates for Australia in 2013', *International Journal of Cancer*, 142(4), pp. 691–701. doi: 10.1002/ijc.31088.

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (2007) *Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: A Global Perspective*. Edited by AICR. Washington D.C. Available at: http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/reports/Second_Expert_Report.pdf.

Xie, F. *et al.* (2017) 'Application of Text Information Extraction System for Real-Time Cancer Case Identification in an Integrated Healthcare Organization.', *Journal of pathology informatics*, 8(1), p. 48. doi: 10.4103/jpi.jpi_55_17.

Yabroff, K. R. *et al.* (2008) 'Cost of Care for Elderly Cancer Patients in the United States', *JNCI: Journal of the National Cancer Institute*, 100(9), pp. 630–641. doi: 10.1093/jnci/djn103.

Yabroff, K. R., Warren, J. L. and Brown, M. L. (2007) 'Costs of cancer care in the USA: a descriptive review', *Nature Clinical Practice Oncology*, 4(11), pp. 643–656. doi: 10.1038/ncponc0978.

Zikos, D. and Delellis, N. (2018) 'CDSS-RM: A clinical decision support system reference model', *BMC Medical Research Methodology*. BMC Medical Research Methodology, 18(1), pp. 1–14. doi: 10.1186/s12874-018-0587-6.